


四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

子部
第四一冊



魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

EB/07

四庫全書存目叢書·子部四一

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 51.25 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第四一冊目次

子部·醫家類

大本瓊瑤發明神書三卷

〔宋〕劉真人撰
天一閣文物保管所藏明刻本

一

珍珠囊指掌補遺藥性賦四卷

〔金〕李杲撰
山東省圖書館藏清光緒二十三年李光明莊刻本

八〇

張子和心鏡別集一卷

〔元〕常德輯
中國科學院圖書館藏明萬曆二十九年新安吳勉學刻古今醫統正脈全書本

一二七

河間傷寒心要一卷

〔金〕劉洪輯
中國科學院圖書館藏明萬曆二十九年新安吳勉學刻古今醫統正脈全書本

一三〇

如宜方二卷

〔元〕艾元英撰
北京圖書館藏明初刻本

一三八

泰定養生主論十六卷

〔元〕王珪撰
北京圖書館藏明正德六年冒鸞刻本

一八七

南北經驗醫方大成不分卷

〔元〕孫允賢撰
中國中醫研究院圖書館藏日本寬永三年刻本

三〇五

劉河間傷寒醫鑒一卷

〔元〕馬宗素撰

中國科學院圖書館藏明萬曆二十九年新安吳勉學刻古今醫統正脈全書本

四二三

雜病治例一卷

〔明〕劉純撰

遼寧中醫學院圖書館藏明成化十五年蕭謙刻本

四三五

傷寒治例一卷

〔明〕劉純撰

北京圖書館藏明刻本

四六七

醫方選要十卷

〔明〕周文采輯

北京圖書館藏明刻本

四九九

袖珍小兒方六卷

〔明〕徐用宣撰

上海圖書館藏明刻本

七四九

大本瓊瑤發明神書三卷

〔宋〕劉真人撰

天一閣文物保管所藏明刻本

附《四庫全書總目·大本瓊瑤

發明神書二卷》提要

大本瓊瑤真人鍼經序

觀文於天者非宿度無以稽七政之行察理於地者非經水無以別九圍之域矧夫人身而不明經脉又焉知榮衛之所統哉此內經靈樞之所由作也竊攷之人與天地爲三才蓋一氣也經脉十二以應經水經絡三百六十有五以應周天之數氣血稱是以應周期之日宜乎榮衛之於人身

大本瓊瑤神書序

晝夜循環周轉天之度十四九或謂衛氣不循其經始以晝夜晝行諸陽夜行諸陰之異未始相從而亦未嘗相離也夫日星雖殊所以麗乎天者皆陽輝之照著也河海雖殊所以行乎地中者寔以水之流衍也經絡雖交相貫所以周於人身者一榮氣也噫七政失度則災害見焉經水失道則洚潦作焉經脉失常則病生焉以故用

鍼石者必明腧穴審開圖因以虛實以補
瀉之此經本輸之旨尤當究心靈樞是無
著本學者病焉許昌滑君伯仁父嘗看經
絡專專手足三陰三陽及任督也觀其圖
彰訓釋綱舉目張足以為學者出入向方
寔醫門之司南也書既成徵予序之手輒
書三才一氣之說以歸之若別經絡筋骨
之屬則不暇備論也皆

本草綱目卷之

七

崇寧初元年閏月六日四明序

大本瓊瑤發明神書卷上

賜太師劉真人集

鍼灸三百六十穴

手太陰肺經 十一穴

中府 雲門 天府 俠白 尺澤

孔最 列缺 經渠 大淵 魚際

少商

手陽明大腸經 二十穴

本草綱目卷之

一

商陽 二間 三間 合谷 陽谿

偏瀝 溫溜 上廉 下廉 三里

曲池 肘髃 五里 臂臑 肩髃

巨骨 天鼎 扶突 禾突 迎香

足陽明胃經 四十五穴

頭維 下關 頰車 承泣 四白

巨髃 地倉 大迎 人迎 水突

氣舍 缺盆 氣戶 庫舍 屋翳

手少陰心經 九穴	極泉 青靈 少海 靈道 通理	陰郄 神門 少府 少衝	手太陰小腸經 十九穴
大包	腹哀 食竇 天谿 胃鄉 周榮	箕門 衝門 府舍 腹結 大橫	三陰交 漏谷 地機 陰陵泉 血海
隱白 大都 太白 公孫 商丘	足太陰脾經 二十一穴	解谿 衝陽 陷谷 內庭 厲兌 <small>眼膝</small>	三里 上巨虛 條口 下巨虛 豐隆
外陵 大巨 水道 歸來 氣冲	髀關 伏兔 陰市 梁丘 犢鼻	梁門 關門 太乙 滑肉門 天樞	膺腧 乳中 乳根 下容 承滿

足太陽膀胱經 六十六穴	睛明 攢竹 曲差 五處 承光	通天 絡却 玉枕 天柱 大杼	風門 肺腧 厥腧 心腧 督腧
高肎 肝腧 膽腧 脾腧 胃腧	三焦腧 腎腧 氣腧 大腸腧 關腧	小腸腧 膀胱腧 <small>中膂 肉膂</small> 白環腧 上膠	次膠 中膠 下膠 會陽 附分
魄戶 高肎 神堂 譙譙 膈關	魄門 陽綱 意舍 胃倉 育門	志室 胞育 秩邊 扶承 殷門	浮郄 委陽 委中 合陽 承筋
少澤 前谷 後谿 腕骨 陽谷	養老 支正 小海 肩貞 臑腧	天宗 秉風 曲垣 肩髃 臑腧	天應 天容 顙膠 聽宮

承山	飛陽	附陽	金門	崑崙
僕參	申脉	京骨	束骨	通骨
至陰				
足少陰腎經 二十七穴				
湧泉	然骨	大谿	大鍾	水泉
照海	復溜	交信	築賓	陰骨
橫骨	大赫	氣穴	四滿	中注
育脬	商曲	石關	陰都	通谷
太極神書卷上				
幽門	步郎	神封	靈虛	神藏
或中	脬府			
手厥陰心包絡經 九穴				
天池	天泉	曲澤	都門	間使
內關	大陵	勞官	中冲	
手少陽三焦經 二十三穴				
關衝	液門	中渚	陽池	外關
支溝	會宗	三陽絡	四瀆	天井

漬淵	消灤	臑會	肩髃	天膠
天牖	翳風	瘰脉	顙顙	角孫
絲空	和膠	耳風		
足少陽膽經 四十四穴				
瞳髎	聽會	上關	懸釐	懸顙
頰厭	曲鬢	率谷	本神	陽白
臨泣	目聰	正營	承靈	天衝
浮白	竅陰	完骨	腦空	風池
太極神書卷上				
肩井	淵液	輒筋	日月	京門
帶脉	五樞	維道	居髃	環跳
風市	中瀆	陽關	陽陵泉	陽交
外丘	光明	陽輔	懸鍾	丘墟
五會	俠谿	竅陰		
足厥陰肝經 十四穴				
大敦	行間	大衝	中封	蠡溝
中都	膝關	曲泉	陰包	五里

陰廉 羊大 章門 期門

督脉 二十八穴

長強 腰腧 陽關 命門 懸樞
脊中 筋縮 至陽 靈臺 神道
身柱 接脊 陶道 大顙 瘕門
風府 腦戶 強間 後頂 前頂
神庭 百會 顙門 上星 素膠
水溝 兌端 斷交

任脉 二十四穴

天突 承漿 陰交 神闕 下脘
建里 巨闕 中庭 玉堂 紫宮
會陰 曲骨 中極 關元 石門
氣海 水分 中脘 上脘 鳩尾
臍中 璇璣 華蓋 廉泉

流注六十六穴經絡所屬

手太陰經五穴

少商 魚際 與大淵 經渠 尺澤 肺相連

手陽明大腸經六穴

商陽 二三間 合谷 陽谿 曲尺 大腸源

手少陰心經五穴

少衝 少府 屬於心 神門 靈道 少海 尋

手太陽小腸經六穴

少澤 前谷 後谿 腕 陽骨 小海 小腸經

足厥陰肝經五穴

大敦 行間 大衝 看 中封 曲泉 屬於肝

足少陽膽經六穴

竅陰 俠谿 臨泣 膽 坵墟 陽輔 陽陵泉

足太陰脾經五穴

隱白 大都 太白 脾 商丘 陰陵 切要 知

足少陰腎經五穴

湧泉 然骨 大谿 穴 復溜 陰谷 腎之經

足陽明胃經六穴

厲兌內庭陷骨胃 衝陽解骨三里隨

足太陽膀胱經六穴

至陰通谷束京骨 崑崙中是膀胱

手厥陰心包絡經五穴

中衝勞宮心包絡 大陵間使曲澤博

手少陽三焦經六穴

關衝液門并中渚 陽池支溝天井源

八法流注八穴

大藏經書卷

內關相刺是公孫 外關臨泣此穴同

烈缺自然連照海 後谿申脉不須論

十二經脉之所起

手太陰肺之脉起於中焦

手陽明大腸之脉起於大指次指之端

足陽明胃之脉起於鼻之交頤中

足太陰脾之脉起於大指之端

手少陰心之脉起於中心

手太陽小腸之脉起於小指之端

足太陽膀胱之脉起於目內眥

足少陰腎之脉起於小指之下

手厥陰心包絡之脉起於肱中

手少陽三焦之脉起於小指次指之端

足少陽膽之脉起於目銳眥

足厥陰肝之脉起於大指葉毛之際

十二經脉外合於十二經水

大藏經書卷

九

足太陽外合於清水內屬於膀胱通水焉

足少陽外合於渭水內屬於膽

足陽明外合於海水內屬於胃

足太陰外合於湖水內屬於脾

足少陰外合於汝水內屬於腎

足厥陰外合於灋水內屬於肝

手太陽外合於灌水內屬於小腸水道出焉

手少陽外合於漯水內屬於三焦

手陽明外於江水內屬于大腸

手太陰外合於河水內屬于肺

手少陰外合於濟水內屬于心

手厥陰外合於漳水內屬于心包

十二源主治五臟六腑之有疾也

陽中之少陰肺也其源出於大淵大淵

陽中之太陰心也其源出於大陵大陵

陰中之少陽肝也其源出於大衝大衝

大經書卷五

十一

陰中之至陰脾也其源出於大白大白

陰中之太陰腎也其源出於大谿大谿

膏之源出於鳩尾鳩尾

肓之源出於臍腴臍腴

四根

根於四味也

三結

三陰三陽同結也

六根結

大陽根於至陰結于命門 目也

陽明根於厲兌結于頰大 錯耳也

少陽根於竅陰結于窓籠 耳中也

太陰根於隱白結于太倉

少陰根於湧泉結于廉泉

厥陰根於大敦結于玉英絡于臆中

五會

大經書卷五

十二

一百會 二肓會 三聽會 四氣會

五臍會

五門

即井榮腧經合也

八脉

即奇經八脉也

八會

府會太倉 臟會季脇 筋會陽陵泉

髓會絕骨 血會鬲腧 骨會大杼

脉會太淵 氣會三焦

九鍼

鑱鍼 長一寸 員鍼 長一寸 鍤鍼 長一寸

鋒鍼 長一寸 鈹鍼 長一寸 員利鍼 長一寸

毫鍼 長六分 長鍼 長七寸 燔鍼 長四寸

九鍼應天地四時陰陽

一天 應人皮 二地 應肉 三人 應脉 四時 應筋

時五音 聲應 六律 陰陽合 七星 齒面目

八風 出入氣 九野 九竅三百六

九鍼應身形

一皮 二肉 三脉 四筋 五聲音

六陰陽 七齒 八風 九竅

十二經流注法

所出為井 山谷之中泉水 法木應肝

所流為榮 泉水既出榮透 法火應心

所注為腧 有注風留既深便 法土應脾

所行為經 成流經歷而 法金應肺

所入為合 合於海為合 法水應腎

所過為原 三焦行於諸陽故署一腧名

手指補法 源為

動搖進退搓盤彈撚

循捫提按攝戰刮搜

爪切橫順逆走伸摩

前後撞隨迎升陰氣下

升陽氣上

三陰三陽配合補瀉循提歌

太陽膀胱并小腸 少氣多血循補良

多血多氣提循瀉 陽明胃脘大腸傍

血少氣多循補刮 少陽膽至三焦鄉

少血多氣補循提 太陰脾臟肺經臟

原缺第十四、十五葉

而瘥者死

十四禁刺

新內勿刺 新刺勿內 已醉勿刺

已刺勿醉 新怒勿刺 已刺勿怒

新勞勿刺 已刺勿勞 已飽勿刺

已刺勿飽 已饑勿刺 已刺勿饑

已渴勿刺 已刺勿渴

刺有五節

末瓊璽書卷上

六

一曰振埃刺外去陽病也 二曰發矇刺肺輸去

三曰去爪支絡也 四曰徹衣晝刺諸陽之奇輸也

五曰解惑晝之知調陰陽補瀉有餘不足相傾移也

刺有五禁

甲乙日自乘無刺頭 丙丁日自乘無刺

戊己日自乘四時無刺 庚辛日自乘

壬癸日自乘無刺足脛

刺有五奪

形肉之奪 大奪血之後 大汗出之

後 大泄之後 新產及大血之後

刺有五逆

熱病脉靜汗已出盛一逆也 病泄脉洪

大二逆也 着痺不移腠肉破身熱脉偏

絕三逆也 淫而奪形身熱色天然白及

後下血血篤重四逆也 寒熱奪形脉堅

搏五逆也

八瓊璽書卷上

七

禁鍼穴歌

禁鍼膺穴古今留 顙戶神庭腦戶由

神道靈臺腰膺穴 石門神闕水分休

會陰氣衝於五里 陽落清冷膻中收

橫骨承筋若有疾 禁鍼用艾即時瘳

妊婦不宜鍼合谷 三陰恐有墮胎憂

關元胎死不能出 子母俱亡慎莫投

禁灸穴歌

瘕門風府及承漿 攢竹睛明與少商
 天牖頭維下關穴 絲竹天府並迎香
 索膠鳩尾陽關足 心膕經渠陰市當
 因庸白環并五會 陽池伏兔脊中藏
 人迎條口委中穴 乳中關冲脾關鄉
 避灸穴中二十九 用鍼補瀉即安康
 流注逐日開穴法

大環經書卷上

大

甲竅陰 乙太敦 丙少澤 丁少衝
 戊厲兌 己隱白 庚商陽 辛少商
 壬至陰 癸湧泉

流注十二經動脈源穴所出法

甲出丘墟乙太衝 丙歸腕骨是源中
 丁出太陵源內過 戊胃衝陽氣可通
 己出太白庚合骨 辛緣本出太淵同
 壬歸京骨期中過 癸出之後太谿從
 十二干臟腑配合日辰

甲膽乙肝丙小腸 丁心戊胃己脾鄉
 庚屬大腸辛是肺 壬是膀胱癸腎當
 金鎖玉璣環

大環經書卷上

九

丁巳辛

十干所屬經穴

甲竅陰前骨陷骨引 所過為源丘墟準
 陽谿為經委中合 甲甲還還氣化本
 乙大敦少府太白膕 經渠陰骨腎臟注
 厥陰肝經與經合 乙未血納包絡處
 丙丙甲為井起少澤 丙午氣納三焦穴
 腕骨本源陽陵泉

丁少冲為井初大都 大淵復留曲泉屬

少陰心膀丁壬合 丁巳血納包絡述

戊厲兌二間束骨內 冲陽本源出入位

陽輔少海合小腸 戊辰氣納三焦處

巳隱白魚際大谿腎 中封少海合依定

甲與巳合相配行 巳卯血納包絡順

庚商陽通谷相臨泣 所過為源合谷及

陽谷三里屬胃經 庚寅氣納三焦隨

辛卯為井手少商 然骨太衝靈道當

脾屬隱白陰陵泉 辛丑血納包絡鄉

壬至陰俠谿後泣通 所過為源京骨窮

解谿更後曲池合 壬子氣納三焦中

癸湧泉行間神門穴 商丘尺澤相連接

戊與癸合腎所行 癸丑血入包絡微

也通

瓊瑤論十二經中氣血多少 經曰其可

骨痛熱多則骨消筋緩也

經絡腧穴配合法

五臟六腑各有井榮腧經合腑為陽臟

為陰陽主表陰主裏故有陰陽榮衛相

合其中陰井乙木陽井庚金陰榮丁火

陽榮壬水陰腧巳土陽腧甲木陰經辛

金陽經丙火陰合癸水陽合戊土故陰

陽腧榮而各不同有配之法名曰對刺

手之三陰始于癸而絡于乙手之三陽

始于庚而終于戊足之三陽始于戊而

終于庚足之三陰始于乙而終于癸手

之陰陽陰逆而陽順足之陰陽陽逆而

陰順此陰陽逆順不可不知也

傍通十二經絡流注孔穴之圖

肺心肝脾腎胃

春刺井木

少商少衝大敦隱白泉中衝

春刺榮火

魚際少府行間大都然谷勞宮

仲夏刺腧土

大淵神門太衝太白太谿太陵

秋刺經金

經渠靈道中封商陽復溜間使

冬刺合水

尺澤少海曲泉陰谿陰谷曲澤

太陽小腸膽胃膀胱三焦

所出為井金

商陽少澤竅陰厲兌陰關

所流為榮水

二間前谷俠谿後谿通谷商陽

所注為腧木

三間後谿臨泣陽骨束骨中渚

木經

生

所過為源

合谷腕骨丘墟衝陽京骨陽池

所行為經火

陽谿陽谷陽輔解谿崑崙支溝

所入為合土

曲池少海陽谿三里委中并

假令鍼肝經病了于本經源穴亦鍼一

鍼如補肝經來亦于本經源穴補一鍼

如瀉肝經來亦與本經源穴瀉一鍼如

餘經有補瀉鍼畢倣此例亦補瀉

各經源穴

手太陰之源出於太淵 手少陰之源

出於神門 手厥陰之源出於太陵

手太陽之源出於腕骨 手陽明之源

出於合谷 手少陽之源出於陽池

足太陰之源出於太白 足少陰之源

出於太谿 足厥陰之源出於太衝

足太陽之源出於京骨 足陽明之源

出於衝陽 足少陽之源出於丘墟

木經

生

凡此十二源穴非瀉補母之法虛實通

用故五臟六腑有病皆取其源是也

井主心下滿 榮主身熱 腧主體重

骨節痛 經主咳嗽寒熱 合主逆氣

而泄

陽日流注正經活法 六十餘首穴晝夜

周環無窮每一穴分得一刻六十六分

六毫六絲六忽六渺之數

甲日

甲戌時

竅陰穴井金

前谷穴榮水

陷谷穴腧木

丘墟穴源穴

陽谿穴經火

委中穴合土

乙亥時

大敦穴井木

少府穴榮火

太白穴腧土

經渠穴經金

陰谷穴合水

丙子時

少澤穴井金

內庭穴榮水

不獨接神書卷上

廿五

三間穴腧木

腕骨穴源穴

崑崙穴經火

陽陵穴合土

丁丑時

少衝穴井木

大都穴榮火

大淵穴腧土

復溜穴經金

曲泉穴合水

戊寅時

厲兌穴井金

二間穴榮水

束骨穴腧木

衝陽穴源穴

陽輔穴經火

少海穴合土

己卯時

隱白穴井木

魚際穴榮火

太谿穴腧土

中封穴經金

少海穴合水

庚辰時

商陽穴井金

通谷穴榮水

臨泣穴腧木

合骨穴源穴

陽谷穴經火

三里穴合土

辛巳時

少商穴井木

然骨穴榮火

太衝穴腧土

靈道穴經金

天龜經神書卷上

廿六

陽陵穴合土

壬午時

至陰穴井金

俠谿穴榮水

後谿穴腧木

京骨穴源穴

解谿穴經火

曲池穴合土

癸未時

湧泉穴井木

行間穴榮火

神門穴腧土

商丘穴經金

尺澤穴合水

甲申時

關冲穴井金

液門穴榮水

陽輔穴經火 少海穴舍土

大谿穴膈土 中封穴經金

少海穴合水

庚寅時 商陽穴井金 通谷穴榮水

臨泣穴 膈木 合谷穴 源穴

陽谷穴經火 三里穴合土

辛卯時 少商穴井木 然骨穴榮火

大衝穴輸土 靈道穴經金

陰陵穴合水

壬辰時 至陰穴井金 候谿穴榮水

後谿穴
腕骨穴
京骨穴
源穴

解谿穴經火
曲池穴合土

癸巳時 湧泉穴井木 行間穴榮火

神門穴
膺土
商丘穴
經金

甲午時 竅陰穴井金 前谷穴榮水

陷谷穴 腧木 丘墟穴 源穴

陽谿穴經火 委中穴合土

乙未時 中衝穴井木 勞宮穴榮火

大陵穴膈土 間使穴經金

曲澤穴合水

丙申時 關冲穴井金 液門穴榮水

中渚穴 腧木 陽池穴 源穴

支溝穴經火 天井穴合土

丙日

丙申時 少澤穴井金 內庭穴榮水

三間穴
腕骨穴
源穴

崑崙穴經火
陽陵穴合土

丁酉時 少冲穴井木 大都穴榮火

大淵穴
土
復溜穴
經金

曲泉穴合水

戊戌時

厲兌穴井金

二間穴榮水

束骨穴膈木

冲陽穴源穴

陽輔穴經火

少海穴合土

巳亥時

隱白穴井木

魚際穴榮火

大谿穴膈土

中封穴經金

少海穴合水

庚子時

商陽穴井金

通谷穴榮水

大谿穴膈土

手

臨泣穴膈木

合谷穴源穴

陽谷穴經火

三里穴合土

辛丑時

少商穴井木

然骨穴榮火

太衝穴膈土

靈道穴經金

陰陵穴合水

壬寅時

至陰穴井金

俠谿穴榮水

後谿穴膈木

京骨穴源穴

解谿穴經火

曲池穴合土

癸卯時

湧泉穴井金

行間穴榮火

神門穴膈土

商丘穴經金

尺澤穴合水

甲辰時

竅陰穴井金

前谷穴榮水

陷谷穴膈木

丘墟穴源穴

陽谷穴經火

曲池穴合土

乙巳時

大敦穴井木

少府穴榮火

太白穴膈土

經渠穴經金

大谿穴膈土

手

陰谷穴合水

丙午時

關冲穴井金

液門穴榮水

中渚穴膈木

陽池穴源穴

支溝穴經火

天井穴合土

丁未時

中冲穴榮火

勞宮穴榮火

大陵穴膈土

間使穴經金

曲澤穴合水

丁日

壬子時	至陰穴井金	俠谿穴榮水
辛亥時	少商穴井木	然谷穴榮火
	太冲穴膈土	靈道穴經金
	陰陵穴合水	
庚戌時	商陽穴井金	通谷穴榮水
	臨泣穴膈木	合谷穴源穴
	陽谷穴經火	三里穴合土
	少海穴合水	
巳酉時	隱白穴井木	魚際穴榮火
	大谿穴膈土	中封穴經金
	陽輔穴經火	小海穴合土
	束骨穴膈木	衝陽穴源穴
戊申時	厲兌穴井金	二間穴榮水
	曲泉穴合水	
	大淵穴膈土	復溜穴經金
丁未時	少冲穴井木	大都穴榮火

丁巳時	中冲穴井木	勞宮穴榮火
	大陵穴膈土	間使穴經金
丙辰時	少澤穴井金	內庭穴榮水
	三間穴膈木	腕骨穴源穴
	崑崙穴經火	陽陵穴合土
	乙卯時	大敦穴井木
	太白穴膈土	經渠穴經金
	陰谷穴合水	
	甲寅時	竅陰穴井金
	陷骨穴膈木	埴墟穴源穴
	陽谷穴經火	委中穴合土
	尺澤穴合水	
	神門穴膈土	商丘穴經金
	湧泉穴井木	行間穴榮火
	癸丑時	解谿穴經火
	後谿穴膈木	京谷穴源穴

丁卯時

少冲穴井木

大都穴榮火

大淵穴膈土

復溜穴經金

曲泉穴合水

戊辰時

關冲穴井金

液門穴榮水

中渚穴膈木

陽池穴源穴

支溝穴經火

天井穴合土

巳巳時

中冲穴井木

勞宮穴榮火

大陵穴膈土

間使穴經金

大淵經書卷上

五

曲澤穴合水

巳日

巳巳時

隱白穴井木

魚際穴榮火

大谿穴膈土

中封穴經金

少海穴合水

庚午時

商陽穴井金

通谷穴榮水

臨泣穴膈木

合谷穴源穴

陽谷穴經火

三里穴合土

辛未時

少商穴井木

然谷穴榮火

大衝穴膈土

靈道穴經金

陰陵穴合水

壬申時

至陰穴井金

俠谿穴榮水

後谿穴膈木

京骨穴源穴

解谿穴經火

曲池穴合土

癸酉時

湧泉穴井木

行間穴榮火

神門穴膈土

商丘穴經金

大淵經書卷上

五

尺澤穴合水

甲戌時

竅陰穴井金

前谷穴榮水

陷骨穴膈木

丘墟穴源穴

陽谷穴經火

委中穴合土

乙亥時

大敦穴井木

少府穴榮火

太白穴膈土

經渠穴井金

陰谷穴合水

丙子時

少澤穴井金

內庭穴榮水

庚辰時	商陽穴井金	通谷穴榮水
	商陽穴井金	通谷穴榮水
庚辰時	關冲穴井金	液門穴榮水
	關冲穴井金	液門穴榮水
庚辰時	中渚穴腧木	陽池穴源穴
	中渚穴腧木	陽池穴源穴
庚辰時	支溝穴經火	天井穴合土
	支溝穴經火	天井穴合土
庚辰時	曲澤穴合水	間使穴經金
	曲澤穴合水	間使穴經金
巳卯時	中冲穴井木	勞宮穴榮火
	中冲穴井木	勞宮穴榮火
巳卯時	大陵穴腧土	少海穴合土
	大陵穴腧土	少海穴合土
巳卯時	陽輔穴經火	冲陽穴源穴
	陽輔穴經火	冲陽穴源穴
戊寅時	厲兌穴井金	二間穴榮水
	厲兌穴井金	二間穴榮水
戊寅時	束骨穴腧木	復溜穴經金
	束骨穴腧木	復溜穴經金
戊寅時	曲泉穴合水	大都穴榮火
	曲泉穴合水	大都穴榮火
丁丑時	少冲穴井木	陽陵穴合土
	少冲穴井木	陽陵穴合土
丁丑時	大淵穴腧土	崑崙穴經火
	大淵穴腧土	崑崙穴經火
丁丑時	三間穴腧木	腕骨穴源穴
	三間穴腧木	腕骨穴源穴

乙酉時	太白穴腧土	經渠穴經金
	太白穴腧土	經渠穴經金
乙酉時	大敦穴井木	少府穴榮火
	大敦穴井木	少府穴榮火
乙酉時	陽谿穴經火	委中穴合土
	陽谿穴經火	委中穴合土
甲申時	陷骨穴腧木	丘墟穴源穴
	陷骨穴腧木	丘墟穴源穴
甲申時	竅陰穴井金	前谷穴榮水
	竅陰穴井金	前谷穴榮水
甲申時	尺澤穴合水	商丘穴經金
	尺澤穴合水	商丘穴經金
癸未時	神門穴腧土	行間穴榮火
	神門穴腧土	行間穴榮火
癸未時	湧泉穴井木	束骨穴源穴
	湧泉穴井木	束骨穴源穴
癸未時	解谿穴經火	曲池穴合土
	解谿穴經火	曲池穴合土
壬午時	至陰穴井金	俠谿穴榮水
	至陰穴井金	俠谿穴榮水
壬午時	後谿穴腧木	陵道穴經金
	後谿穴腧木	陵道穴經金
壬午時	陰陵穴合水	然谷穴榮火
	陰陵穴合水	然谷穴榮火
辛巳時	少商穴井木	陽谷穴經火
	少商穴井木	陽谷穴經火
辛巳時	大冲穴腧土	合谷穴源穴
	大冲穴腧土	合谷穴源穴
辛巳時	臨泣穴腧木	三里穴合土
	臨泣穴腧木	三里穴合土

陰谷穴合水

丙戌時

少澤穴井金

內庭穴榮水

三間穴膈木

腕骨穴源穴

崑崙穴經火

陽陵穴合土

丁亥時

少衝穴井木

大都穴榮火

大淵穴膈土

復溜穴經金

曲泉穴合水

戊子時

厲兌穴井金

二間穴榮水

太極經書卷上

聖

束骨穴膈木

冲陽穴源穴

陽輔穴經火

少海穴合土

巳丑時

隱白穴井木

魚際穴榮火

大谿穴膈土

中封穴經金

少海穴合水

庚寅時

關冲穴井金

液門穴榮水

中渚穴膈木

陽池穴源穴

支溝穴經火

天井穴合土

辛卯時

中冲穴井木

勞宮穴榮火

大陵穴膈土

間使穴經金

曲澤穴合水

辛日

辛卯時

少商穴井木

然骨穴榮火

太冲穴膈土

陵道穴經金

陰陵穴合水

壬辰時

至陰穴井金

俠谿穴榮水

太極經書卷上

聖

後谿穴膈木

京骨穴源穴

解谿穴經火

曲池穴合土

癸巳時

湧泉穴井木

行間穴榮火

神門穴膈土

商丘穴經金

尺澤穴合水

甲午時

竅陰穴井金

前谷穴榮水

陷骨穴膈木

丘墟穴源穴

陽谿穴經火

委中穴合土

乙未時	大敦穴井木	少府穴榮火
	太白穴膈土	經渠穴經金
丙申時	陰谷穴合水	
	少澤穴井金	內庭穴榮水
丁酉時	三間穴膈木	腕谷穴源穴
	崑崙穴經火	陽陵穴合土
戊戌時	少冲穴井木	大都穴榮火
	大淵穴膈土	復溜穴經金
己亥時	曲泉穴合水	
	厲兌穴井金	二間穴榮水
庚子時	東骨穴膈木	冲陽穴源穴
	陽輔穴經火	少海穴合土
辛丑時	隱白穴井木	魚際穴榮火
	大谿穴膈土	中封穴經金
壬寅時	少海穴合水	
	商陽穴井金	通谷穴榮水

壬寅時	臨泣穴膈木	合谷穴源穴
	陽谷穴經火	三里穴合土
癸卯時	中冲穴井木	勞宮穴榮火
	大陵穴膈土	間使穴經金
甲辰時	曲澤穴合水	
	關冲穴井金	液門穴榮水
乙巳時	中渚穴膈木	陽池穴源穴
	支溝穴經火	天井穴合土
丙午時	至陰穴井金	俠谿穴榮水
	後谿穴膈木	京骨穴源穴
丁未時	解谿穴經火	曲池穴合土
	湧泉穴井木	行間穴榮火
戊申時	神門穴膈土	商丘穴經金
	尺澤穴合水	
己酉時	竅陰穴井金	前谷穴榮水

陷谷穴 肱木 丘墟穴 源火	
陽谿穴 經火 委中穴 合土	
乙巳時 大敦穴 井木 少府穴 榮火	
太白穴 肱土 經渠穴 經金	
陰谷穴 合水	
丙午時 少澤穴 井金 內庭穴 榮水	
三間穴 肱木 腕骨穴 源火	
崑崙穴 經火 陽陵穴 合土	
丁未時 少冲穴 井木 大都穴 榮火	
大淵穴 肱土 復溜穴 經金	
曲泉穴 合水	
戊申時 厲兌穴 井金 二間穴 榮水	
束骨穴 肱木 冲陽穴 源火	
陽輔穴 經火 少海穴 合土	
巳酉時 隱白穴 井木 魚際穴 榮火	
大谿穴 肱土 中封穴 經金	

少海穴 合水	
庚戌時 商陽穴 井金 通谷穴 榮水	
臨泣穴 肱木 合谷穴 源火	
陽谷穴 經火 三里穴 合土	
辛亥時 少商穴 井木 然骨穴 榮火	
太冲穴 肱土 陵道穴 經金	
陰陵穴 合水	
壬子時 關冲穴 井金 液門穴 榮水	
中渚穴 肱木 陽池穴 源火	
支溝穴 經火 天井穴 合土	
癸丑時 中冲穴 井木 勞宮穴 榮火	
大陵穴 肱土 間使穴 經金	
曲澤穴 合水	
癸卯時 湧泉穴 井木 行間穴 榮火	
神門穴 肱土 商丘穴 經金	

尺澤穴合水		甲子時	
前谷穴榮水	竅陰穴井金	陷谷穴膈木	陽谿穴經火
乙丑時		大敦穴井木	
少府穴榮火	太白穴膈土	陰谷穴合水	少澤穴井金
丙寅時		內庭穴榮水	
三間穴膈木		崑崙穴經火	
陽陵穴合土	少冲穴井木	大淵穴膈土	曲泉穴合水
戊辰時		厲兌穴井金	
二間穴榮水	束骨穴膈木	陽輔穴經火	少海穴合土

已巳時		隱白穴井木	
魚際穴榮火	大泣穴膈土	少海穴合水	商陽穴井金
庚午時		通谷穴榮水	
合谷穴源穴	臨泣穴膈木	陽谷穴經火	少商穴井木
辛未時		然骨穴榮火	
陵道穴經金	太冲穴膈土	陰陵穴合水	壬申時
俠谿穴榮水		至陰穴井金	
束骨穴源穴	後谿穴膈木	解谿穴經火	中冲穴井木
癸酉時		勞宮穴榮火	
間使穴經金	大陵穴膈土	曲澤穴合水	甲戌時
液門穴榮水	關冲穴井金		

中渚穴膺木 陽池穴源

支溝穴經火 天井穴合土

十干所屬治病歌

甲日

脚膝難行刺竅陰 前骨喉痺並腸鳴

腹痛脹滿陷骨愈 腋腫坵墟滿腹疼

顛狂喜笑陽谿取 脾嘔膝痛委中尋

乙日

本經書卷上

天

心痛血崩大敦攻 顛狂言語少府中

嘔逆霍亂大白愈 熱病嘔吐經渠中

脚膝難行陰骨効 小便黃赤建中通

丙日

臂痛咳嗽少澤中 四肢厥逆內庭逢

喉痺膏滿三間刺 熱病汗難脫骨通

腰疼脚腫崑崙取 半身不遂陽陵攻

丁日

熱病虛則刺少冲 腹滿煩悶大都攻

嘔逆咳嗽大淵取 腸內雷鳴復溜中

曲泉身熱風勞病 足疼洩痢大便濃

戊日

汗病不出厲兌中 喉閉鼻衄二間榮

耳聾項隱束骨愈 寒熱偏風冲陽攻

風痺筋攣陽輔取 四肢無力少海中

己日

本經書卷上

地

隱白鼻衄血山崩 魚際咳嗽又頭疼

足厥心疼大谿取 臍痛中封寒疝尋

嘔逆膏滿少海効 用鍼一刺管驚人

庚日

商陽耳聾目赤紅 鼻衄頭疼通骨中

臨泣月水依此用 痺痿漏下合谷攻

陽骨熱病狂言語 諸般三里一鍼通

辛日

寒熱咽痛少商中 臍風口噤然骨通
淋證足寒大衝取 暴暗心痛靈道中
霍亂疝瘕嘔逆喘 陰陵一刺有神功
壬日

日生翳膜至陰強 胃脇脹滿俠谿良
耳聾項強後谿取 寒熱腰疼京骨康
腹脹解谿并面腫 半身肘腫曲池詳
癸日

大便秘結湧泉中 咳嗽吐血行間攻
惡寒身熱神門取 腹脹腸鳴商丘中
手攣風痺尺澤効 五子元建法中通
甲日三焦

臂肘喉閉刺三焦 驚悸癰熱液門調
咽喉翳膜鍼中渚 寒熱身沉陽池高
霍亂吐時支溝効 風腫筋攣天井燒
乙日包絡

熱病煩燥刺中冲 翻胃吐食灸勞宮
胸膈脹滿大陵効 寒熱間使一鍼攻
肘臂筋攣多嘔血 曲澤心疼總去根
十二經病穴歌

手太陰肺經 辛未

咽喉腫痛少商中 魚際胸中氣不通
太淵促滿背悶 經渠咳嗽熱寒攻
瘡疾咽喉乾口燥 熱病無汗一同窮

手少陰心經 壬申

肘臂疼時尺澤取 効取三分病無蹤
手陽明大腸經 庚卯

耳聾齒痛取商陽 口眼喎邪二間詳

三間喉閉寒瘡疾 合谷頭疼背脾傷

瘡疾助臂牙齒痛 陽谿諸風効為良

半身不遂呼吸取 肋臂難擡曲尺強

足陽明胃經 戊酉

口噤腹痛厲兌中 寒熱腹脹內庭攻

陷骨浮腫并水氣	衝陽癰瘰及諸風
解谿面目風浮腫	霍亂吐瀉當時通
臍臍腸鳴脾臍冷	三里穴取効如神
足太陰脾經	巳丑
腹脹難禁隱白間	月水不止一同看
熱病不汗并嘔吐	取問大都有何難
太白吐瀉腸中病	商丘脾冷胃虛寒
腹脹陰陵并水腫	腰疼喘逆當時安
手少陰心經	丁午
寒熱心疼取少冲	少府心疼及惡風
心煩瘡疾神門取	諸風及効最為功
靈道失音并心痛	癰風嘔吐在其中
目病頭風牙齒痛	少海穴內細推窮
手太陽小腸經	丙辰
少澤瘡疾寒熱重	口乾舌強更能攻
前谷耳聾疾病熱	瘡疾喉閉上連同

臂背肘節痛難舉	曲澤妙穴有神功
手少陽三焦經	甲寅
膏中氣噎取關冲	驚風喉閉液門同
寒熱瘡疾求中渚	耳聾頭痛更連風
冷熱瘡疾陽池取	肘臂難擡更能攻
手臂癰瘰支溝取	喘嗽胸滿天井窮
足少陽膽經	甲申
耳聾癰瘰及諸風	煩熱無汗竅陰通
腰疼胸滿腸鳴冷	目痛耳聾俠骨中
臨泣月水咽喉痛	寒熱咳嗽坵墟窮
風痺腰疼陽輔取	膝痛冷痺陽陵攻
足厥陰肝經	乙亥
心疼疝氣大敦詳	腰脹腹痛行間強
太衝腰痛小便禁	中封臍痛瘡疾良
婦人血海陰疝痛	小便難禁痛愁腸
膝內輔下曲泉穴	免教病者受恓惶

陰日流注正經活法

六十首腧穴循環無窮內有氣血交行
陽日有陰經之貫陰日有陽氣之連時
間亦有剛柔之配也考究鍼經之圖錄
出開具

甲日

甲戌時 隱白穴井木 魚際穴榮火

大谿穴腧土 中封穴經金

少海穴合水

通谷穴榮水

乙亥時 商陽穴井金 通谷穴榮水

臨泣穴腧木 合谷穴原穴

陽谷穴經火 三里穴合土

丙子時 少商穴井木 然谷穴榮火

大衝穴腧土 陵道穴經金

陰陵穴合水

丁丑時 至陰穴井金 俠谿穴榮水

後谿穴腧木 京骨穴原穴

解谿穴經火 曲池穴合土

戊寅時 湧泉穴井木 行間穴榮火

神門穴腧土 商丘穴經金

尺澤穴合水

己卯時 竅陰穴井金 前谷穴榮水

陷谷穴腧木 丘墟穴原穴

陽谷穴經火 委中穴合土

庚辰時

大敦穴井木 少府穴榮火

太白穴腧土 經渠穴經金

陰谷穴合水

辛巳時 少澤穴井金 內庭穴榮水

三間穴腧木 腕骨穴原穴

崑崙穴經火 陽陵穴合土

壬午時 少衝穴井木 大都穴榮火

大淵穴腧土 復溜穴經金

壬辰時	少冲穴井木	大都穴榮火
	大淵穴膈土	復溜穴經金
癸巳時	曲泉穴合水	
	厲兌穴井金	二間穴榮水
甲午時	束骨穴膈木	冲陽穴原穴
	陽輔穴經火	少海穴合土
乙未時	隱白穴井木	魚際穴榮火
	大谿穴膈土	中封穴經金
丙申時	少海穴合水	
	關冲穴井金	液門穴榮水
丁酉時	中渚穴膈木	陽池穴原穴
	支溝穴經火	天井穴合土
戊戌時	中冲穴井木	勞宮穴榮火
	大陵穴膈土	間使穴經金
己亥時	曲澤穴合水	

丙申時	少商穴井木	然谷穴榮火
	大冲穴膈土	陵道穴經金
丁酉時	陰陵穴合水	
	至陰穴井金	俠谿穴榮水
戊戌時	後谿穴膈木	京骨穴原穴
	解谿穴經火	曲池穴合土
己亥時	湧泉穴井木	行間穴榮火
	神門穴膈土	商丘穴經金
庚子時	尺澤穴合水	
	竅陰穴井金	前谷穴榮水
辛丑時	陷谷穴膈木	丘墟穴原穴
	陽谿穴經火	委中穴合土
壬寅時	大敦穴井木	少府穴榮火
	太白穴膈土	經渠穴經金
癸卯時	陰谷穴合水	
	少澤穴井金	內庭穴榮水

三間穴 膺木 腕骨穴 原火	
崑崙穴 經火 陽陵穴 合土	
壬寅時	
少冲穴 井木	大都穴 榮火
大淵穴 膺土	復溜穴 經金
曲泉穴 合水	
癸卯時	
厲兌穴 井金	二間穴 榮水
束骨穴 膺木	冲陽穴 原火
陽輔穴 經火	小海穴 合土
甲辰時	
隱白穴 井木	魚際穴 榮火
大谿穴 膺土	中封穴 經金
少海穴 合水	
乙巳時	
商陽穴 井金	通谷穴 榮水
臨泣穴 膺木	合谷穴 原火
陽谷穴 經火	三里穴 合土
丙午時	
中冲穴 井木	勞宮穴 榮火
大陵穴 膺土	間使穴 經金

曲澤穴 合水	
丁未時	
關冲穴 井金	液門穴 榮水
中渚穴 膺木	陽池穴 原火
支溝穴 經火	天井穴 合土
丁巳時	
至陽穴 井金	俠谿穴 榮水
後谿穴 膺木	京骨穴 原火
解谿穴 經火	曲池穴 合土
戊申時	
湧泉穴 井木	行間穴 榮火
神門穴 膺土	商丘穴 井金
尺澤穴 合水	
己酉時	
竅陰穴 井金	前谷穴 榮水
陷谷穴 膺木	丘墟穴 原火
陽谿穴 經火	委中穴 合土
庚戌時	
大敦穴 井木	少府穴 榮火
太白穴 膺土	經渠穴 經金

陷骨穴合水

辛亥時

少澤穴井金

內庭穴榮水

二間穴膈木

腕骨穴原穴

崑崙穴經火

陽陵穴合土

壬子時

少冲穴井木

大都穴榮火

太淵穴膈土

復溜穴經金

曲泉穴合水

癸丑時

厲兌穴井金

二間穴榮水

六經辨書卷上

李一

束骨穴膈木

衝陽穴原穴

陽輔穴經火

小海穴合土

甲寅時

隱白穴井木

魚際穴榮火

大谿穴膈土

中封穴經金

少海穴合水

乙卯時

商陽穴井金

臨泣穴膈水

臨泣穴膈木

合谷穴原穴

陽谷穴經火

三里穴合土

丙辰時

少商穴井木

然谷穴榮火

太冲穴膈土

靈道穴經金

陰陵穴合水

丁巳時

關冲穴井金

液門穴榮水

中渚穴膈木

陽池穴原穴

支溝穴經火

天井穴合土

戊午時

中冲穴井木

勞宮穴榮火

大陵穴膈土

間使穴經金

六經辨書卷上

李一

曲澤穴合水

戊日

戊午時

湧泉穴井木

行門穴榮火

神門穴膈土

商丘穴經金

尺澤穴合水

己未時

竅陰穴井金

前谷穴榮水

陷谷穴膈木

丘墟穴原穴

陽谿穴經火

委中穴合土

庚申時

大敦穴井木

少府穴榮火

大白穴膺土

經渠穴經金

陰谷穴合水

辛酉時

少澤穴井金

內庭穴榮水

二間穴膺木

腕骨穴原穴

崑崙穴經火

陽陵穴合土

壬戌時

少冲穴井木

大都穴榮火

太淵穴膺土

復溜穴經金

六環經書卷上

李圭

曲泉穴合水

癸亥時

厲兌穴井金

二間穴榮水

束骨穴膺木

冲陽穴原穴

陽輔穴經火

少海穴合土

甲子時

隱白穴井木

魚際穴榮火

大谿穴膺土

中封穴經金

少海穴合水

乙丑時

商陽穴井金

通谷穴榮水

臨泣穴膺木

合谷穴原穴

陽谷穴經火

三里穴合土

丙寅時

少商穴井木

然骨穴榮火

大冲穴膺土

陵道穴經金

陰陵穴合水

丁卯時

至陰穴井金

俠谿穴榮水

復溜穴膺木

京谷穴原穴

解谿穴經火

曲池穴合土

六環經書卷上

李圭

戊辰時

中冲穴井木

勞宮穴榮火

大陵穴膺土

間使穴經金

曲澤穴合水

己巳時

關冲穴井金

液門穴榮水

中渚穴膺木

陽池穴原穴

支溝穴經火

天井穴合土

己日

己巳時

竅陰穴井金

前谷穴榮水

<p>六壬攝神書卷上</p>		<p>壬申時</p>		<p>辛未時</p>		<p>庚午時</p>		<p>陷谷穴 膈木 丘墟穴 原穴</p>	
<p>少冲穴 井木 大都穴 榮火</p>		<p>三間穴 膈木 腕骨穴 原穴</p>		<p>少澤穴 井金 內庭穴 榮水</p>		<p>大敦穴 井木 少府穴 榮火</p>		<p>陽谿穴 經火 委中穴 合土</p>	
<p>大淵穴 膈土 復溜穴 經金</p>		<p>崑崙穴 經火 陽陵穴 合土</p>		<p>陰谷穴 合水</p>		<p>大白穴 膈土 經渠穴 經金</p>		<p>陽谿穴 經火</p>	
<p>曲泉穴 合水</p>		<p>厲兌穴 井金 二間穴 榮水</p>		<p>束骨穴 膈木 冲陽穴 原穴</p>		<p>陽輔穴 經火 少海穴 合土</p>		<p>甲戌時</p>	
<p>隱白穴 井木 魚際穴 榮火</p>		<p>大谿穴 膈土 中封穴 經金</p>		<p>癸酉時</p>		<p>中封穴 經金</p>		<p>大谿穴 膈土</p>	

<p>八壬攝神書卷上</p>		<p>丁丑時</p>		<p>丙子時</p>		<p>乙亥時</p>		<p>少海穴 合水</p>	
<p>後谿穴 膈木 京谷穴 原穴</p>		<p>陰陵穴 合水</p>		<p>少商穴 井木 然谷穴 榮火</p>		<p>商陽穴 井金 通谷穴 榮水</p>		<p>臨泣穴 膈木 合谷穴 原穴</p>	
<p>解谿穴 經火 曲池穴 合土</p>		<p>大冲穴 膈土 陵道穴 經金</p>		<p>陽谷穴 經火 三里穴 合土</p>		<p>陽谷穴 經火</p>		<p>乙亥時</p>	
<p>湧泉穴 井木 行間穴 榮火</p>		<p>至陰穴 井金 俠谿穴 榮水</p>		<p>尺澤穴 合水</p>		<p>神門穴 膈土 商丘穴 經金</p>		<p>關冲穴 井金 液門穴 榮水</p>	
<p>戊寅時</p>		<p>已卯時</p>		<p>中渚穴 膈木 陽池穴 原穴</p>		<p>支溝穴 經火 天井穴 合土</p>		<p>支溝穴 經火</p>	

庚辰時

中冲穴井木

勞宮穴榮火

大陵穴膈土

間使穴經金

曲澤穴合水

庚日

庚辰時

大敦穴井木

少府穴榮火

太白穴膈土

經渠穴經金

陰谷穴合水

辛巳時

少澤穴井金

內庭穴榮水

六壬神書卷上

辛

三間穴膈木

腕谷穴原穴

崑崙穴經火

陽陵穴合土

壬午時

少冲穴井木

大都穴榮火

大淵穴膈土

復溜穴經金

曲泉穴合水

癸未時

厲兌穴井金

二間穴榮水

東骨穴膈木

冲陽穴原穴

陽輔穴經火

小海穴合土

甲申時

隱白穴井木

魚際穴榮火

大谿穴膈土

中封穴經金

少海穴合水

乙酉時

商陽穴井金

通谷穴榮水

臨泣穴膈木

合谷穴原穴

陽谷穴經火

三里穴合土

丙戌時

少商穴井木

然谷穴榮火

太冲穴膈土

靈道穴經金

六壬神書卷上

壬

陰陵穴合水

至陰穴井金

俠谿穴榮水

後谿穴膈木

京谷穴原穴

解谿穴經火

曲池穴合土

戊子時

湧泉穴井木

行間穴榮火

神門穴膈土

商丘穴經金

尺澤穴合水

己丑時

竅陰穴井金

前谷穴榮水

庚寅時	中冲穴井木	勞宮穴榮火
大陵穴膺土	間使穴經金	
曲澤穴合水		
辛卯時	關冲穴井金	液門穴榮水
中渚穴膺木	陽池穴原穴	
支溝穴經火	天井穴合土	
辛巳時	少澤穴井金	內庭穴榮水
三間穴膺木	腕骨穴原穴	
崑崙穴經火	陽陵穴合土	
壬辰時	少冲穴井木	大都穴榮火
大淵穴膺土	復溜穴經金	
曲泉穴合水		
癸巳時	厲兌穴井金	三間穴榮水

東骨穴膈木	冲陽穴原穴
陽輔穴經火	少海穴合土
隱白穴井木	魚際穴榮火
大谿穴膈土	中封穴經金
少海穴合水	
商陽穴井金	通谷穴榮水
臨泣穴膈木	合谷穴原穴
陽谷穴經火	三里穴合土
丙申時	
少商穴井木	然骨穴榮火
大冲穴膈土	陵道穴經金
陰陵穴合水	
丁酉時	
至陰穴井金	俠谿穴榮水
後谿穴膈木	京骨穴原穴
解泣穴經火	曲池穴合土
湧泉穴井木	行間穴榮火
神門穴膈土	商丘穴經金
戊戌時	

戊申時

湧泉穴井木

行間穴榮火

神門穴膈土

商丘穴經金

尺澤穴合水

巳酉時

竅陰穴井金

前谷穴榮水

陷谷穴膈木

丘墟穴原穴

陽谿穴經火

委中穴合土

庚戌時

大敦穴井木

少府穴榮火

太白穴膈土

經渠穴經金

不現諸經上

章

陰谷穴合水

辛亥時

少澤穴井金

內庭穴榮水

三間穴膈木

腕骨穴原穴

崑崙穴經火

陽陵穴合土

壬子時

中冲穴井木

勞宮穴榮火

大陵穴膈土

間使穴經金

曲澤穴合水

癸丑時

關冲穴井金

液門穴榮水

癸日

中渚穴膈木

陽池穴原穴

支溝穴經火

天井穴合土

癸亥時

厲兌穴井金

二間穴榮水

束骨穴膈木

冲陽穴原穴

陽輔穴經火

少海穴合土

甲子時

隱白穴井木

魚際穴榮火

大谿穴膈土

中封穴經金

不現諸經上

美

少海穴合水

乙丑時

商陽穴井金

通谷穴榮水

臨泣穴膈木

合谷穴原穴

陽谷穴經火

三里穴合土

丙寅時

少商穴井木

然谷穴榮火

太冲穴膈土

陵道穴經金

陰陵穴合水

丁卯時

至陰穴井金

俠谿穴榮水

後谿穴膈木 京骨穴原穴	
解谿穴經火 曲池穴合土	
戊辰時 湧泉穴井木 行間穴榮火	
神門穴膈土 商丘穴經金	
尺澤穴合水	
己巳時 竅陰穴井金 前谷穴榮水	
陷谷穴膈木 丘墟穴原穴	
陽谿穴經火 委中穴合土	
庚午時 大敦穴井木 少府穴榮火	
太白穴膈土 經渠穴經金	
陰谷穴合水	
辛未時 少澤穴井金 內庭穴榮水	
三間穴膈木 腕骨穴原穴	
崑崙穴經火 陽陵穴合土	
壬申時 少冲穴井木 大都穴榮火	
大淵穴膈土 復溜穴經金	

曲泉穴合水	
癸酉時 關冲穴井金 液門穴榮水	
中渚穴膈木 陽池穴原穴	
支溝穴經火 天井穴合土	
甲戌時 中冲穴井木 勞宮穴榮火	
大陵穴膈土 間使穴經金	
曲澤穴合水	
又曰	
此書晝夜循環已上一百二十首每一時之榮膈經合每一經中各有一穴後有陽經陰配陰經之貫陰時中配陽經之貫此陽經而不息之意 此書的確	
又曰	
本來天意一何歸 只故醒醒着意疑	
疑到情忘心絕處 金烏夜半徹天飛	
又曰	

毫毛如草體如天 肢節參差度一然
經水長流原海納 天河湧溢地河連
教醫道工夫也

大本瓊瑤發明神書卷上 終

大瓊瑤神書卷上

五

大本瓊瑤發明神書卷中

賜太師劉真人集

神農皇帝煮鍼法

乳香 沒藥錢各一 細辛 檀香 防風

當歸 石菖蒲 木通 三稜 莪朮

川烏 烏藥 蒼朮 白芷 川山甲

牽牛 龍骨 虎骨 黃連 黃耆 黃

芩 麝香 陳皮 芍藥已上各三錢 羊腦髓

大瓊瑤神書卷中

二

羊骨髓 無灰好酒一瓶 酥油五兩

無根水五碗 用酒煮乾為度

右將各味為片羊骨打破取髓同前藥

煮乾埋在土中三宿取出磨揩光滑為

度用猪膏油代之揩磨後用清油或酥

油潤過後用 酥油 鹿髓 羊髓

乳香 沒藥 麝香 丁香 磁石

龍骨 虎牙 虎髓

裝在收鍼一處常帶身邊日暖用之如

神

陰陽天干

甲丙戊庚壬屬陽 乙丁己辛癸屬陰

十干所屬

甲乙屬木 丙丁屬火 戊己屬土

庚辛屬金 壬癸屬水

十干相生

大要經神書卷中

十一

甲木生丙火 丙火生戊土 戊土生

庚金 庚金生壬水 壬水生甲木

乙木生丁火 丁火生己土 己土生

辛金 癸水生乙木

十二配合十二支

寅肺卯大腸 辰胃巳脾鄉 午心未

小腸 申膀酉腎當 戌與心包配

亥合三焦方 子膽丑肝位 支經配

合強

陽干

見前

陰干

見前

逐日人神

大指鼻柱小指甲 外踝髮際外踝同

三股牙齒肝及足 四腰胃腕手陽明

五口遍身陽明足 六手宵中及在宵

七內踝氣衝膝上 八腕腋內及陰中

大要經神書卷中

十二

九尻兩足并膝脛 十腰內踝足趺同

九宮究神

坤踝震牙端 巽頭口乳邊 中宮肩

究上 乾背面耳前 兌宮當手膊

艮位腰項纏 膝肋離當正 腳肘肚

坎偏

十二部人神不宜鍼灸

心喉頭肩背 腰腹項足膝 陰股次

序排 輪回周十二

九部人神不宜鍼灸

一歲臍心肘 輪流到咽口 頭脊次

第輪 膝足膝成九

男女忌日

男忌 壬辰 甲辰 乙巳 丙午

丁未 辛未 不宜除日

女忌 甲寅 乙卯 乙酉 乙巳

天壤經神書卷中

四

丁巳 辛未 不宜破日

除破滿閉日 白虎 黑道 血支

血忌 月厭 月殺 月影 獨火

切忌火葛之日

十萬日 天林地神火山鬼人水州

正七寅 二八子 三九戌 四十申

五十一午 六十二辰

假如正七日從寅起天萬順行十二宮

餘皆倣此

火 午 辰 寅 子 戌 申

十千人神

甲頭 乙喉 丙肩 丁心 戊腹

巳腹 庚腰 辛膝 壬脛 癸足

十二支人神

子時頭 丑時耳 寅時耳 卯時面 辰時項 巳時乳

午時心 未時足 申時頭 酉時膝 戌時陰 亥時脛

天壤經神書卷中

五

四季人神

春在左脇 秋在右脇 夏在臍 冬

在腰

十二日人神

建日在足禁晡時 除日在眼禁目入

滿日在腹禁黃昏 平日在背禁人定

定日在心禁夜半 執日在手禁雞鳴

破日在手禁平旦 危日在鼻禁日出
成日在唇禁食時 收日在頭禁日中
開日在耳禁午時 閉日在目禁日晚
鍼灸吉日

丁亥 丁卯 丁丑 甲申 甲辰
甲戌 丙子 丙午 丙申 丙辰
壬午 壬子 壬戌 庚午 戊戌
戊申 己未 己亥

六 彙編書卷中

六

鍼灸凶日

每月 六日 十五 十八 二十三

二十四 二十八 小盡療病令
人長病不安

逐月所忌傍通不宜鍼灸

正月三月胃育六月七月
辰戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥
辰戌戌戌丑丑丑辰辰辰未未未
丑戌戌未辰丑戌未辰丑戌未辰

月刑巳子辰申午丑寅酉未亥卯戌
晷巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午
手太陰肺經人形穴道氣血主病本經治
藥

是經外應皮毛大腸合為表裏為傳送
之府此臟氣絕則皮毛焦津液涸丙日
篤丁日死肺屬金其脉浮而短漚得洪
大而數謂相得緩而微為相生本臟其

六 彙編書卷中

七

聲呼其色白其臭腥其味辛其補酸其
瀉辛其液涕其積息奔其斤重三斤三
兩凡六榮相傳之官治節出焉手太陰
之脉起於中焦下絡大腸還脾胃口上
膈屬從肺系橫出液下下循臍內行少
陰心主之前下肘中循臂內上骨下廉
入寸口循魚際出大指之端其支者從
腕行後直出次指內廉出其端是動則

病所生病者也

中府穴

一名膺中肺之募雲門下一十乳上三肋間陷中動脈應手仰取

入三分五

雲門穴

巨骨下俠氣戶旁各二寸陷中動脈應手舉臂取之在人迎下第二

骨鐻間橫相去三寸三分刺

天府穴

在腋下一寸臂臑內廉禁不可灸之令人氣逆鍼四分三呼

挾白穴

在天府下三寸去肘五寸四分三呼五壯

尺澤穴

在肘中約上兩筋內三分五壯

孔最穴

去腕上拆量七寸甲乙經七寸三分自太淵至尺澤一尺一寸之內

拆量取七寸

列缺穴

去腕側上一寸以手交叉頭指末兩筋兩骨鐻中三分二分五吸七

壯甲乙經三分三呼五壯

經渠穴

在寸口陷中三分三呼不可灸灸之傷人神明

大淵穴

一名大泉掌後陷中橫文頭二分五壯甲乙經二呼三壯

魚際穴

在手大指本節後內側二分留二呼三壯

少商穴

在手大指端內側去爪甲如韭葉宜鍼不宜灸鋒鍼出血宜諸熱

湊一分三呼五吸三壯甲乙經留一呼一分三壯

氣主病

腹脹滿膨膨喘咳

缺盆痛

交兩手臂

臂厥

血主病

臑臂前廉痛

煩心

掌中熱

咯血

有餘外証

肩臂痛

汗出中風

小便

數次

鼠瘻生腋

有餘內証

肺癰

膈消

嗽有黃痰

夢兵戈競

不足外証

肩臂疼痛

少氣不足

嗽

夜劇有黃痰

面無膏澤

不足內証

嗽有聲無痰

咽中梗梗

夢涉大水

本經藥

桔梗

砂仁

木香

丁香

生薑

沙參

肺熱則用

紫苑

阿膠

陳皮

石膏

藿香 人參

肺寒則用 杏仁 檀香 葶藶 五味

枸杞 欵冬花 烏梅 知母 黃芩

山梔子 枳殼 木瓜 葱白 山藥

粳米 豆蔻 玄胡索 芍藥 地黃

麥天門冬 伏而草

引經藥 半夏 香附子 木通 貝母

南星 升麻 桔梗 旋覆花

大藥指書卷中

十

本經熱浮之藥 欵冬花 生薑 厚朴

砂仁 丁香 豆蔻 木香 檀香

益智

本經濕化之藥 香附子 麝香 杏仁

山藥 白芨 貝母 阿膠 人參

粳米 旋覆花 陳皮 藿香

本經燥降之藥 芍藥 枳殼 烏梅

木瓜 五味 天門冬 麥門冬 桑

白皮 葶藶 夔苓

本經寒沉之藥 山梔子 黃芩 玄胡

索 白芍藥 防己 知母 石膏

砂仁

本經風升之藥 麻黃 防風 升麻

桔梗 牛蒡子 薄荷 前胡 葱白

手陽明大腸經人形穴道氣血主病本經

治藥

大藥指書卷中

十一

是經與肺合為表裏傳化糟粕之道路

大腸重二斤十二兩長二丈一尺廣四

寸徑一寸當臍右回一十六曲盛水穀

一斗七升傳道之官變化出焉手陽明

之脉起於大指次指之端循指上廉出

合骨兩骨之間上入兩筋之中循臂上

廉入肘外廉循臑外前肩上有出顯骨

之前廉上出桂骨之會上下入缺盆絡

肺下膈屬大腸其支別者從缺盆上

貫頰下入齒縫中還出俠口交人中左

之右之左上俠鼻孔是動則病所生病

者也

商陽穴

一名絕陽手大指次指內側去爪甲角如韭葉一分一呼三壯

二間穴

一名間骨手大指次指本節前內側陷中三分六呼三壯

三間穴

合谷穴

一名虎口大指後指岐骨間陷中孕婦刺之損胎氣三分三呼三壯

大經絡書卷中

主

陽谿穴

一名中魁腕中上側兩筋間陷中三分七呼三壯

偏瀝穴

陰在腕後三寸別走太陰三分七呼三壯

溫溜穴

一名逆注一名蛇頭腕後五寸小士大士五寸半六寸三分三壯

上廉穴

三里下一寸獨抵陽明之會外鉞頭向外斜鉞五分五壯

下廉穴

輔骨下一寸五分呼三壯

三里穴

在曲池三寸按之肉起

曲池穴

肘外輔骨屈肘橫文頭曲骨尖肉陷中以手拱骨取之五分七呼七壯

壯

肘髃穴

並在肘大骨外廉陷中與天井並肩而相去一寸四分三壯

五里穴

去肘上三寸行向裏大脉中禁鍼炎三壯

臂臑穴

兩筋兩骨缺陷穴中端正手取之不

得握拳三分三壯

肩髃穴

一名中有井一名偏骨在膊骨頭肩端肉骨間宛宛中舉臂有空是

穴六分留六呼灸三壯不及鉞若偏風不遂可七壯百壯

巨骨穴

在肩端上行兩叉骨間陷中入一寸半灸五壯

天鼎穴

在頸缺盆上直扶突後一寸半灸五壯

大經絡書卷中

主

扶突穴

一名水穴人迎後一寸半在曲頰尖後向下一寸循曲紋中仰取三分

壯三

禾突穴

一名長頰一名頰直鼻孔下頰水溝旁五分入二分五壯

迎香穴

旁五分鉞縫中是穴刺入一寸鼻下孔鼻塞不聞香臭宜瀉鼻內

生息肉宜瀉禁灸可三壯

內迎香穴

在鼻孔內是穴治眼目紅腫疼痛將蘆葉做小兒呼搖血出神

効

氣主病

齒痛

肩前臑痛

大指次指

痛不用 腸鳴 黃响

血主病 目黃 孰𦵏 下血 頸腫

腸僻

有餘外証 熱腫 口乾 喉閉 紅腫

挾癰臂生疔

有餘內証 腸癰 腸中切痛 下迫

不足外証 寒慄

不足內証 冬感寒泄 飲食不下 下

六經辨證

古一

痢完穀 癥瘕 腸鳴至耀耀有聲

本經藥 白芷 秦艽 厚朴 乾薑

檳榔 威靈仙 赤石脂 三稜 莪

朮 大黃 地榆 蒲黃 訶黎勒

槐花 枳實

引經藥 乾漆 黑豆 紫蘇 天麻子

肉豆蔻

本經風升之藥 升麻 白芷 秦艽

葛根 威靈仙 麻黃

本經熱浮之藥 肉豆蔻 韭白 砂仁

本經濕化之藥 白朮

本經燥降之藥 烏梅 連翹 枳殼

秦艽 郁李仁 麻子仁

本經寒沉之藥 黃芩 大黃 地榆

石膏 防已

足陽明胃經人形穴道氣血主病本經治

人形穴道

圭

藥

是經與脾合為表裏胃重二斤十四兩
紆屈伸長二尺大一尺三寸徑五寸盛
水穀三斗五升足陽明之脉起於鼻交
頰中旁約太陽之脉下循鼻外入上齒
中還出挾口環唇下交承漿却循頰後
下廉出大迎循挾車上耳前過客主人
循髮際至額顙其支別者從大迎前下

人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾
直者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣衝
中其支者起胃下口循復裏下至氣衝
中而合以下髀關抵伏兔下臍臄中下
循膈外廉下足跗入中指內間其支者
下膝三寸而別以下入中指外間其支
者別肘上入大指間出其端是動則病
所生病者也

金匱要略

卷五

頭維穴

在額角入髮際俠本神兩旁各十
半入一分沿皮向下寸半可灸七

壯治偏正頭風痛先
補後瀉瀉多禁灸

下關穴

在客入下耳前動脈下廉合口有
空開口則開側卧開口取穴入三

分七呼不可久留鍼則令人
却而不能欠禁灸可三壯止

頰車穴

一名機關在耳墜下一分曲頰端
陷中開口有孔入一分沿皮向下

透地倉治口眼歪斜左補右瀉左
喝斜右補左瀉右可灸二七壯

承泣穴

在目下七分直瞳子陷中禁鍼鍼
之令人目烏色一云入三分非急

務勿鍼此穴禁
灸可三壯止

原缺第十七、十八葉

伏兔穴

膝蓋上六寸循起肉下跪坐而下
之治婦人八部諸病症入五分禁

灸可三
壯止

陰市穴

一名陰鼎在膝蓋三寸伏兔下陷
中膝內輔骨後大筋下小筋上屈

膝拜而取之
三分不可灸

梁丘穴

膝上二寸兩筋
間三分三壯

犢鼻穴

膝下脣骨上骨解大筋中治膝
痛難跪起膝蓋腫潰不治不潰者

可治賴膝腫出液
為破三分三壯

三里穴

犢鼻下在膝下三寸脣骨外廉兩
筋間諸病皆入分或一寸七呼吸

金匱要略

卷五

三壯瀉脚無力補餘証看虛實補瀉此
穴開溝渠也人三十已上不灸熱氣冲

眼則可
灸百壯

上巨虛穴

一名上廉在三里下三寸八分
三壯七呼藏氣不足偏風腰腿

手足

條口穴

在下廉上一寸八分三壯上
廉下一寸舉足取之是也

下巨虛穴

下廉與小腸合在上
廉下三寸三分三壯

豐隆穴

在踝上八寸下廉附分外廉
陷中別走太陰三分三壯

解谿穴

在衝陽後一寸五分脫
上陷中五分三呼三壯

衝陽穴 一名合陽在足跗上五寸骨間去陷骨三寸三分十呼三壯

陷谷穴 足大指次指之外間本筋後陷中去內庭二寸五分三呼三壯

內庭穴 足大指次指外間陷中三分二呼三壯素問氣火注十呼三壯

厲兌穴 足大指次指之端去爪甲角如非葉一分一呼一壯

太溪穴 足內踝後陷中橫腓透膝關穴入五分治膝蓋腫痛

主病 瀉穴與陰骨并禁灸七壯止三呼五吸

身以前皆熱 善申火數 顏黑 胃

腕痛妨食 大便難

血主病 狂瘡 濕淫 飢飢 頭痛

有餘外証 欲上高而歌 棄衣而走

肝厥 盜汗口喎 唇膠

有餘內証 消穀善饑 胃脘貪 胃中

滿 翻胃

不足外証 惡聞人與火 聞木聲則陽

然而驚 身以前皆熱

不足內証 心欲動獨閉戶牖 善食而

饑

本經藥 升麻 葛根 砂仁 丁香

草豆蔻 大麥 良薑 乾薑 厚朴

神曲 蒼朮 白朮 半夏 陳皮

香附子 紫蘇 香薷 旋覆花

石膏 朴硝 三稜 莪朮 蘇木

茴香 枳實 大黃 貝母 烏藥

訶子 麝香 韭白 瓜蒂 葱白

大棗 甘遂 大戟 牽牛 粳米

甘草 藿香 白芷 前胡 黃耆

人參 檀香

引經藥 檳榔 枳殼 黃芩 黃連

知母 茵陳 艾 酸棗仁

本經風升之藥 防風 升麻 葛根

白芷 葱白

本經熱浮之藥 生薑 砂仁 厚朴

丁香 白檀 神曲 良薑 巴豆

韭白

本經濕化之藥 香附 廣木 蒼朮

烏藥 白朮 貝母 粳米 半夏

陳皮 三稜 南星 旋覆花

本經燥降之藥 枳實 連翹 枳殼

竹葉 黑豆 竹茹 犀角

本草綱目卷中

廿

本經寒沉之藥 知母 大黃 瓜蒂

石膏 朴硝 防已

足太陰脾經人形穴道氣血主病本經治

藥

是經外應於唇與胃合為表裏為水穀之海此臟氣飽則饑不老澤唇乃反肉先死甲日篤乙日死脾經屬土其脉緩而弱得弦而緊謂之相勝得洪大為相

生本臟其聲歌其色黃其臭香其味甘

其液涎其補甘其瀉苦其積痞氣重二

斤三兩扁廣三寸有散膏半斤二十一

裏血溫五臟倉廩之官五味出焉足太

陰之脉起於大指之端循指內側白肉

際過覆骨後上內踝前廉上腓內循脛

骨後交交出厥陰之前上循膝股內前

廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散

本草綱目卷中

廿

舌下其別者復從胃別上膈注心中是

動則病所生病者也

隱白穴

足大指端內側去爪甲角如韭葉治女人月事過時不止刺之立愈

二分三呼三壯

大都穴

在足大指本節內側白肉際三分七呼三壯

太白穴

足大指內側核骨下陷中三分七呼三壯

公孫穴

足大指本節後一寸陷中四分二十呼三壯

商丘穴

內踝下微前陷中前有中封後有照海其穴居牛內踝下有橫文如

婦口形其間三分七呼三壯

三陰交穴

足內踝上三寸骨下陷中入三分

婦人經血不調赤白帶下先瀉後補男婦遺精白濁宜補小腸疝氣偏墜外腎腫疼痛小便秘結不通先補後瀉

漏谷穴

內踝上六寸骨下陷中三分七呼三壯

地機穴

一名脾舍在膝下一寸五分入三分五壯

陰陵泉穴

在膝下內側輔骨下陷中伸足取與陰陵泉相對是穴橫刺透

陽陵泉治小便不通瀉膝蓋紅腫痛宜瀉入五分留七呼三壯

血海穴

膝膕上內廉白肉際二寸陷中膝內輔骨上三寸橫入五分或三寸

灸二十七壯治腎臟風兩腿生瘡濕痒不可當先補後瀉女人陰腫內痛宜瀉即百蟲窠穴也

衝門穴

一名慈宮去大橫五寸在府舍下橫骨端的中動脈是七分五壯

府舍穴

在腹結下三寸關元旁各五寸七壯七分

腹結穴

一名腸屈大橫下三分入七分五壯

箕門穴

在血海上越筋間陰股內廉三分六呼三壯

大橫穴

在腹哀下三寸直臍旁五分七分五壯

腹哀穴

雖曰日月下寸半腋下一寸三分平向裏寸半若是定穴須於食寶

下按尋脇縫中是穴入三分不灸灸可一壯止

食寶穴

在天谿下一寸六分舉臂取之四分五壯

天谿穴

在胃鄉下一寸六分陷中仰取四分五壯

胃鄉穴

在周榮下一寸六分陷中仰取以乳中穴上半寸為標四分五壯

周榮穴

在中府下一寸六分陷中仰取四分五壯

大包穴

在淵液下三寸布胃脇中出九肋間委肋端三分三壯

氣主病

腹脹善噫四肢煩體重

不能勝長

血主病

黃疸木舌重舌

有餘外証

舌本強癰癰

有餘內証

胃脘痛食前嘔心不急

痛夢譟樂口臭

不足外証

體不能動搖不能卧強

立股

膝內腫痛風痿四肢不能用

不足內証

食不下煩心溏泄夢

爭飲食

本經藥 砂仁 玄胡索 當歸 草豆

蔻 吳茱萸 白朮 蒼朮 半夏

藿香 白芍藥 白茯苓 木通 木

瓜 天麻 烏梅

引經藥 升麻 防風 木香 南星

本經風升之藥 防風 升麻

本經熱浮之藥 乾薑 神曲 益智

不憂金匱書卷中

其

玄胡索 良薑 吳茱萸 木香 檀

香 紅荳 巴荳 草豆蔻

本經濕化之藥 甘草 陳皮 大棗

鉛 蜜 香附 三稜 黃耆 人參

麥芽 半夏 藿香 蒼朮 莪朮

廣朮 當歸

本經燥降之藥 本瓜 芍藥 麻仁

枳實

本經寒沉之藥 防已 石膏 代赭石
手少陰心經人形穴道氣血主病本經治藥

是經外應於舌與小腸為表裏為受盛之府此臟氣絕則血脈不流舌強短壬日篤癸日死心屬火其脈洪大而數得沉而遲謂之相勝得弦而長為相生本臟其聲言其色赤其臭焦其味若其液

不憂金匱書卷中

其

汗其補鹹其瀉甘其積聚伏梁其斤重十二兩七孔三毛盛精汁三合君主之官神明出焉手少陰之脈起於心中出屬屬心系下膈絡小腸其支者從心系上挾咽系目其直者復從心系却上肺出腋腋下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內廉循臂內後廉抵掌後兌骨之端掌內廉循小指之內出其端是動

則病所生病者也

極泉穴

在臂內腋二筋間動

青靈穴

在肘節上三寸舉

少海穴

一名曲節在肘內大骨外去肘端五分肘內橫文頭屈肘向頭取五

灸可三壯止

靈道穴

在掌後寸半

通里穴

在腕後一寸手側起骨上入三分禁灸治虛煩面赤先補後瀉手背

灸三壯

不壞書卷中

艾

陰郄穴

在掌後脉中去腕五分入三分三壯

神門穴

一名兌冲一名中都都在掌後兌骨之端陷者中轉手骨開得穴刺一

分七壯治惺惺呆癡洩瀉

少府穴

在手小指本節後陷中與

少衝穴

在手小指內廉端去爪甲韭葉大

刺一分沿皮向後二分治心虛驚

氣主病

心痛

脇痛

煩心

短氣不

得卧

血主病

目黃

掌中熱

血液

唾血

有餘外証

咽乾

兩目皆赤

渴而飲

水

液癰舌生瘡

諸瘡痒

狂笑不

體

有餘內証

喉閉

心中跳動

瘕瘕

夢驚悸

如見鬼狀

大腸中痛

不足外証

目淚出

善噦

瘖耳鳴

癰疾

兩膈臂後廉痛厥

不壞書卷中

艾

不足內証

心懸若餓

心腸如人將捕

小腸鳴

膈中痛

夢煙火明

本經藥

牛蒡子

當歸

生地黃

熟

地黃

青皮

黃連

鬱金

天花粉

竹葉

赤石脂

辰砂

引經藥

獨活

本經風升之藥

獨活

細辛

麻黃

牛蒡子

本經熱浮之藥 玄胡索 肉桂 紅花

木香

本經濕化之藥 黃耆 白朮 當歸

甘草 粳米 茯苓

本經燥降之藥 蒲黃 竹葉 紫苑

大腹皮 辰砂 鬱金 犀角

本經寒沉之藥 生地黃 知母 山梔

子 黃芩 黃連 川練子 防己

六經藥書卷

卅一

香豆豉

手太陽小腸經人形穴道氣血主病本經

治藥

是經小腸與心合為表裏小腸重二斤

十二兩長三丈二寸廣二寸半徑八分

分中之少半左回疊積一十六曲盛水

穀二斗四升水六斤三合之大半受盛

之官化為出焉手太陽之脉起於小指

之端循于外側上腕出踝中直上循臂

骨下廉出肘內側兩骨之間循臑外後

廉出肩解繞肩髀交肩入曲盆循頸

至目銳眦却入耳中其支者頰上出抵

鼻至目內皆是動則病所生病者也

少澤穴

名小吉手小指外側端去爪甲角

治婦人無乳先瀉後補

前谷穴

在手小指外本節前

六經藥書卷

卅一

後谿穴

針入半寸可灸二壯治癰病宜瀉

壯立効又去前直入一分三壯

腕骨穴

手外側腕前起骨下正當吹鐸陷

熱先補後瀉肩背

陽治穴

在手外側腕中兌肉之

養老穴

手外側腕後一寸三分三壯

支正穴

在手外側腕後五分三壯

小海穴

在手外側腕後五分三壯

肩貞穴

在肩曲解下兩骨解間
肩顯後陷中五分七壯

臑腧穴

在肩髃後大骨下胛上廉
陷中舉臂取八分三壯

天宗穴

在秉風後大骨下陷
中五分六呼三壯

秉風穴

在天窠外肩上一小髃後
舉臂有空五分五壯

曲垣穴

在肩中央曲甲陷中按
之應手痛九分十壯

肩外腧穴

在甲上廉去脊骨一推旁三寸
陷中與大杼並肩相去一寸六

分三壯

肩中腧穴

在甲內廉去脊骨大推旁
二寸陷中五分七壯止

天窓穴

一名窓龍頸大筋前曲頰下扶
突後動脈應手陷中三分三壯

天容穴

顴膠穴

一名兌骨面頰骨下廉兌骨
端當缺內陷中二分三壯

聽宮穴

在耳中珠子大如
赤豆三分三壯

氣主病

耳聾 小腹痛

血主病

頰腫 頰腫

有餘外証

肩臑肘臂外廉痛 目內眦

痛口糜

腰脊控四辛而痛時窘

有餘內証

小腹痛 咽痛 膈脹不便

不足外証

肩似板 臑似折 耳中蟬

鳴

不足內証

欬而失氣

本經藥

白朮 赤茯苓 車前 木通

引經藥

滑石 瞿麥 山梔子

本經風升之藥

藁本 羌活 防風

本經熱浮之藥

砂仁 茴香

本經濕化之藥

白朮

本經燥降之藥

茯苓 木通 通草

赤石脂

防己 生地黄

足太陽膀胱經人形穴道氣血主病本經

治藥

是經與腎合為表裏膀胱重九兩二銖

盛溺九升九合縱廣九寸主不出納州

都之官津液藏焉氣化乃出足太陽之

脉起於目内眥上額交顛上其支別者
從顛至耳上角其直行者從顛入絡腦
還出別下頂循肩髀内挾脊抵腰中入
循督絡腎屬膀胱其支別者以腰中下
會於後陰下貫臂入胛中其支別者以
髀内左右別下貫伸挾脊内過髀樞循
髀外後廉下合胛中以下貫腓内出外
踝之後循京骨至小指外側端是動則

病所生病者也腰中下貫

睛明穴

一名淚孔在目内眥治犖肉攀睛
紅腫痛宜瀉睛昏失明先補後瀉
同前穴禁灸可

攢竹穴

在兩眉尖少陷中入一分沿皮向
外魚腰一寸治目失明睛昏先補
後瀉目赤痛瀉宜

曲差穴

鼻衝上入髮際神庭
旁寸半三分三壯

五處穴

在上星旁寸半入
三寸七呼三壯

承光穴

在五處後寸半直
前項禁灸刺三分

廿

通天穴

在承光後寸半橫直
百會三分七呼三壯

絡却穴

一名強陽一名腦蓋一名反行
在通天一寸半三分五呼三壯

五枕穴

在絡却後一寸半起肉枕骨上
入髮際三寸三呼入三分三壯

天柱穴

在腰大筋外廉後髮際陷
中灸七壯不及針之氣發

大杼穴

項後第一椎下兩旁相去各
一寸半後第一椎下兩旁相去各

風門穴

一名熱府在二椎下各寸半頻刺
瀉諸熱氣背下痼針入一分治

肺腧穴

在第三椎下兩旁各寸半刺中肺三
日死針一分沿皮向外寸半可灸

厥陰腧穴

一名關膈在四椎下兩旁
各半寸三分七呼三壯

心腧穴

在五椎下兩旁各寸半刺一分沿
皮向外寸半可灸

督腧穴

一名高蓋在六椎下兩
旁各寸半禁針七壯

鬲腧穴

在八椎下兩旁各寸半
治血病三分七呼三壯

肝腧穴

在第九椎下兩旁各寸半刺中肝
灸三七壯治目失

膽腧穴 在十椎下兩旁各一寸半正坐取

脾腧穴 在十一椎下兩旁各一寸半正坐取

先瀉後補多治食不化腹

胃腧穴 在十二椎下兩旁各一寸半入

三焦腧穴 在背十三椎下兩旁各一寸半入

腎腧穴 在十四椎下兩旁各一寸半入

壯心虛腰痛補遺精白濁先瀉後補月經不調補

六理指書卷中

芒

氣海腧穴 在十五椎下兩旁各一寸半入

大腸腧穴 在十六椎下兩旁各一寸半入

關元腧穴 在十七椎下兩旁各一寸半入

小腸腧穴 在十八椎下兩旁各一寸半入

膀胱腧穴 在十九椎下兩旁各一寸半入

中膂肉腧穴 在二十椎下兩旁各一寸半入

十呼

白環腧穴 在二十一椎下兩旁各一寸半入

禁灸可三壯治遺精赤白濁等証腎虛腰痛先瀉後補婦人帶下赤白補月經

上膠穴 第一空挾脊陷中腰踝下直上

次膠穴 第二空挾脊陷中七分

中膠穴 第三空挾脊陷中六分

下膠穴 第四空挾脊陷中五分

會陽穴 一名利機在尾骨節為標

附分穴 第二椎下附項內廉兩旁各一寸半入

臍戶穴 第三椎下兩旁相去各三寸正坐

膏肓穴 前令正坐曲脊伸兩手以臂着膝

神堂穴 第五椎下兩旁各三寸

諛諛穴 在肩膊內廉挾兩旁正坐取之以

手案者諛諛下動一分留七呼三

壯

壯

<p>隔關穴 在第七椎下兩旁各三寸 <small>陷中正坐取之</small></p>	<p>鬼門穴 在九椎下兩旁各三寸 <small>中正坐取之</small></p>	<p>陽綱穴 在十椎下兩旁各三寸 <small>中正坐取之</small></p>	<p>意舍穴 在十一椎下兩旁各三寸 <small>中正坐取之</small></p>	<p>胃倉穴 在十二椎下兩旁各三寸 <small>中正坐取之</small></p>	<p>育門穴 在十三椎下兩旁各三寸 <small>寸義肋間五分</small></p>	<p>志室穴 在十四椎下兩旁各三寸 <small>陷中正坐取之</small></p>	<p>胞育穴 在十九椎下兩旁各三寸 <small>三寸伏而取之</small></p>	<p>秩邊穴 在二十椎兩旁相去各三寸 <small>陷中伏而取之</small></p>	<p>扶承穴 一名肉却一名陰關一名皮部在尻臀下股陰一橫文中二寸七呼</p>	<p>殷門穴 在浮郤下與委陽並 <small>有五分七呼三壯</small></p>	<p>浮郤穴 在委陽上一寸三壯 <small>膝得之五分</small></p>	<p>委陽穴 在腓中承下六寸屈身取之 <small>在腓中承下六寸屈身取之</small></p>	<p>委中穴 在腓中承下六寸屈身取之 <small>在腓中承下六寸屈身取之</small></p>	<p>痛脚 足生瘡治脚無力半身不遂</p>
---	---	---	--	--	---	---	---	--	--	--	--	---	---	------------------------------

<p>合陽穴 在膝約中央下三寸 <small>貫穿腓內六分五壯</small></p>	<p>承筋穴 一名腓腸一名直腸在腓 <small>腸中央陷中禁針灸三壯</small></p>	<p>承山穴 一名魚腹一名肉柱一名傷山在 <small>取法在腿後分肉間用線一條自委中</small></p>	<p>飛陽穴 一名飛陽外踝上七寸與承 <small>山平向前一寸入三分五壯</small></p>	<p>附陽穴 少陽後前筋間宛中分七呼三壯 <small>外踝上除踝一寸入三分五壯</small></p>	<p>金門穴 一名關梁在太陽鄰一空足外踝 <small>下丘墟甲脉前三分七呼三壯</small></p>	<p>崑崙穴 足外踝跟骨上後陷中細脉應手 <small>是橫刺五分透呂細穴灸五壯治</small></p>	<p>僕參穴 一名安耶跟骨陷中拱 <small>足取之三分六呼三壯</small></p>	<p>申脉穴 足外踝下一陷中容瓜甲白肉際 <small>骨下一橫文如新月形橫入半寸</small></p>	<p>京骨穴 足外側大骨下赤白肉際陷 <small>中按而取之三分七呼三壯</small></p>	<p>束骨穴 足小指外側本節後陷 <small>中赤白肉際三分三壯</small></p>	<p>通骨穴 足小指外側本節前 <small>陷中二分五呼三壯</small></p>
---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---

至陰穴

足小指外側去爪甲角如韭葉大二分五呼三壯

氣主病

疝氣

腰中痛

男不能便洩

女子轉胞不洩

血主病

兩外踝痛腫

癰疽痔

有餘外証

頭痛

目似晚

癩疾

有餘內証

脰似黎

臍如拆

洩如血

小便難

不足外証

洩出

偏腫

搜神書卷中

罕

不足內証

洩便不得

遺溺

本經藥

藁本

羌活

防風

薄荷

小茴香

蔓荊子

澤瀉

猪苓

瞿

麥

車前子

通草

葵子

琥珀

茵陳

扁蓄

防已

練子

葶藶

滑石

硝石

引經藥

天麻

木通

黃柏

木瓜

牛膝

栢仁

本經風升之藥

羌活

麻黃

藁本

芥

蔓荊子

威靈仙

防風

荊

本經熱浮之藥

桂枝

小茴香

本經濕化之藥

烏藥

白朮

本經燥降之藥

澤瀉

茯苓

琥珀

滑石

瞿麥

車前

猪苓

本經寒沉之藥

茵陳

黃柏

酒浸大

大經神書卷中

罕

黃防已

足少陰腎經人形穴道氣血主病本經治

藥

是經外應於齒與膀胱合為表裏為津

液之府此臟氣絕則骨肉髮不華骨先

死戊日篤已日死腎屬水其脉沉而滑

得緩而弱謂之相勝浮而耆為相生本

臟其聲呻其色黑其臭腐其味酸其液

唾其補辛其瀉鹹其積賁豚其斤重一斤一兩作強之官伎巧出焉足少陰之脉起於小指之下針趣足心出然骨之下循內踝之後別入跟中以上腠內出臍內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨俠舌本其支者從肺出絡心注心中是動則病所生病者也

太環經神書卷

聖

湧泉穴

一名地冲在脚底心陷中屈掌第指頭於後根量折斷當中是穴治脚氣紅腫入三分留三呼三壯宜瀉若治傳尸勞瘵此穴無不可療也

然骨穴

一名龍淵在足內踝前大骨下陷中有三絡俱可刺中央正絡也三分少出血血多令人立

大谿穴

內踝後跟骨上陷中橫刺崑崙穴專治牙疼紅腫宜瀉陰股內濕痒生瘡便毒先補後瀉

大鍾穴

足踝後冲中在大溪後五寸是三分七呼五壯

水泉穴

在大谿下一寸內踝下卷云水泉穴入四分五壯

照海穴

足內踝下赤白肉際橫刺半四分二七壯留六呼治偏墜木腎腫痛瀉之大便閉結不通瀉之

復溜穴

一名昌陽一名伏白在足內踝上立通但腹中氣痛瀉中瀉之

立止大回六脉補盜汗不止

交信穴

內踝上二寸少陰前太陰後穴正

築賓穴

內踝上三寸五壯素問云刺腰痛

陰骨穴

膝內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝取之四分三壯

橫骨穴

一名下極在大赫下一寸

大赫穴

一名胞門一名子戶在四滿下一寸關元旁一寸入一寸五壯

四滿穴

氣海旁一寸入一寸五壯

中注穴

在育脬下一寸

育脬穴

在商曲下一寸去臍旁五分入一寸五壯

商曲穴

一名高曲在石關下一寸入一分五壯

石關穴

在陰都下一寸

陰都穴

一名食宮在通骨下一寸五分三壯

通谷穴

在巨關旁相去各一寸五分三壯

幽門穴

在巨關旁相去各一寸五分五壯

步郎穴

在神封下一寸五分五壯

神封穴

在靈虛下一寸六分

靈虛穴

在神藏下一寸六分

神藏穴

在或中下一寸六分

或中穴

在膺府下一寸六分

膺府穴

在巨骨下直璇璣旁各開一寸半人

氣主病

喝喝而喘坐而欲起

滿引背脊腰背痛

木腎腹

血主病

咳唾則有血

有餘外証

口熱 舌乾 脊股內後廉

痛 欬則腰背痛引而痛甚則欬涎

有餘內証 脹澀

不足外証 痿厥嗜卧 腎移熱為柔痊

不足內証 目荒荒無所見 心惕惕如

人相捕之

本經藥 藿香 細辛 羌活 砂仁

吳茱萸 丁香 玄參 甘草 白朮

沉香 檀香 澤瀉 猪苓 茯苓

五味 枸杞 牡丹皮 地骨皮

黃柏 知母 烏藥 秦艽 薤白

桃仁 肉桂 兔絲 牛膝 文蛤

故紙 牡蠣 阿膠 猪膚

引經藥 獨活 小茴香 黃芪 川練

子

本經風升之藥 獨活 桔梗 牛蒡子

本經熱浮之藥 吳茱萸 益智 朴硝

砂仁 丁香 檀香 肉桂 附子

本經濕化之藥 人參 黃芪 白朮

麥芽 烏藥 地骨皮 牡丹皮 五

味 澤瀉 猪苓 栝仁 麥門冬

蘆芭 山茱萸

本經寒沉之藥 人參 熟地黃 玄參

黃栢 牡蠣 敗腎 地榆 防已

手厥陰心包絡經人形穴道氣血主病本

天璽神書卷

哭一

經治藥

是經包絡者膻中之膜氣之海也布氣
諸經以行血脉臣使之官喜樂出焉手
厥陰之脉起於胷中出於屬心包下膈
歷絡三焦其支者循其出脇下腋三寸
上抵腋腋下循膈內行太陰少陰之間
入肘中臂行兩筋之間入掌中循中指
出其端其支別者從掌中循小指次指

出其端是動則病所生病者也

天池穴 一名天會 在腋下乳後一寸着

天泉穴 一名天溫 曲腋下一寸自曲澤循

舉臂取之三

曲澤穴 肘內廉下陷中屈肘取在太筋內

痛先補後瀉心腎寒

都門穴 掌後去腕五寸

間使穴 在掌後橫文上三寸兩筋間直透

天璽神書卷

哭一

內關穴 在掌後橫文中兩筋間陷中

大陵穴 掌後橫文中兩筋間陷中刺一分

勞宮穴 一名五里 掌中在掌中央橫文動

中冲穴 手中指端去爪甲如韭

氣主病 胃肋支滿 心痛

省人事先壯治中風不

血主病 面赤 目黃

有餘外証 喜笑不休 手心熱 腋痛

有餘內証 煩心

不足外証 臂肋攣急

不足內証 心中憺憺而動

本經藥 薄荷 熟地黃 桃仁 牡丹

皮 連翹 辰砂

引經藥 牛膝

大瓊華神書卷中

羅天

本經風升之藥 薄荷 川芎 柴胡

本經熱浮之藥 麻黃

本經濕化之藥 白朮 桃仁

本經燥降之藥 牡丹皮 茶

本經寒沉之藥 熟地黃 醬青

手少陽三焦經人形穴道氣血主病本經

治藥

是經主上中下故曰三焦上焦膈已上

心肺間病中焦王膈已上脾胃間病下

焦已下腎與膀胱病決瀆之官水道出

焉手少陽之脉起於小指次指之端上

出次指之間循手表腕出臂外兩骨之

門上貫肘循臑外上肩交出足少陽之

後入缺盆交臆中散絡心包下膈偏屬

三焦其支別者以臆中上出缺盆上項

挾耳後直上出耳上角以屈下頰至頤

大瓊華神書卷中

羅天

其支者從耳後入耳中却出至目銳眥

是動則病所生病者也

關衝穴 手小指次指之端去爪甲角如韭葉上出次指之間一分呼三壯沿

液門穴 手小指次指本節後陷中入一分皮向後三分沿三焦邪熱

液門穴 手小指次指本節後陷中入一分口渴唇焦氣口宜瀉出血

中渚穴 手小指次指本節後陷中循手表針出血為妙三呼三壯

中渚穴 手小指次指本節後陷中循手表寸半治髀脊心痛先補後瀉

瀉手背紅腫宜瀉出血

正營穴 在目窻後一寸

承靈穴 正營後一寸半

天衝穴 在耳上畧向前直上三分

浮白穴 耳後入髮際一寸三分七壯

竅陰穴 完骨上枕骨下搖動有空三分七壯

完骨穴 耳後入髮四分刺

腦空穴 一名顛腦在承靈後一寸半俠

風池穴 耳後顛腦後髮際大筋外廉陷中

太璣神書卷

辛

瀉治脚軟無力宜補可灸二七壯

肩井穴 一名膊井在肩上陷中缺盆上大

下陷中是穴與缺盆骨尖相對入二寸

半甲乙經分五壯治病髀痛宜瀉腰肋

淵液穴 在腋下一寸宛宛中舉臂取之禁

肉潰者死寒熱生

輒筋穴 在腋下一寸復前行一寸

日月穴 膽募也一名神光在期門下一寸

天牖穴 在頸大筋外缺盆上天窓後天柱

可三壯七止

翳風穴 耳後尖角陷中按之引耳中痛取

治耳紅腫痛宜瀉耳

瘰癧穴 一名資脉耳本後雞足青絡脉刺

角孫穴 耳郭中向多出血多殺入角上角入

和膠穴 耳前兌髮下橫動脉

應手是三三分三壯

太璣神書卷

壬

絲竹空穴 一名巨窻在眉後陷中入髮際

一寸半瀉宜起肉當耳中缺

耳風穴 者三分留三呼三壯

氣主病 腫中氣滿 欬而氣逆

血主病 手表腕瘡

有餘外証 肘攣 耳前痛

有餘內証 欬而腹滿不欲食飲 喉閉

不足外証 四肢不收 欬而面浮 氣

滿皮膚中輕輕而不堅

不足內証 小腹尤堅 不得小便

本經藥 黑附子 沉香 麥門冬 地

骨皮 肉蓯蓉 石膏

引經藥 竹茹 黃連 茯苓 猪苓

本經風升之藥 細辛 川芎 柴胡

本經熱浮之藥 附子

本經濕化之藥 黃芪

本草綱目卷中

聖

本經燥降之藥 地骨皮 連翹

本經寒沉之藥 青皮 石膏 防已

黃連

足少陽膽經人形穴道氣血主病本經治

藥

是經與肝合為表裏膽重三兩三錢盛

精汁三合在肝之短葉間中正之官決

斷出焉足少陽之脉起於目銳眥上抵

頭角下耳後循頸行手少陽脉脉前至

肩上却出少陽之後入缺盆其支別者

聲中出走耳前至目銳眥後其支別者

皆下大迎合手少陽於頰下加頰車下

頸合缺盆下膺中膈絡肝屬膽循脇裏

出氣衝繞毛際橫入髀厭中其直者從

缺盆下腋中循臂骨委脇下合髀厭中

以下循髀太陽出膝外廉下外輔骨之

本草綱目卷中

聖

前直下抵絕骨之端下出外踝之前循

足附上入小指次指之間其支別者從

附上入大指之間循大指岐骨肉出其

端還貫入爪甲出三毛是動則病所生

病者也

瞳膠穴

一名前間在目眥外五分陷眉尖

紅痛宜瀉冷淚

聽會穴

一名聽呵在耳微前陷中上關下

口得大藥刺寸半可七壯治耳閉氣鬱
先瀉後補耳內紅腫生瘡宜瀉此穴須

下針

客主人穴一名上關耳前起骨上廉開口
有孔動脈宛中入一分吳令深

令入無

懸顴穴在曲周顙下廉
三分七呼三壯

懸顴穴在曲周顙中
三分三呼五壯

領厭穴在曲周顙上廉若刺深令
耳無聞入三分留七呼三壯

曲鬢穴正當耳尖上是鼓額有空是穴灸
耳上髮際曲陷中將耳掩向前

不遺種書卷中

毒

壯七

率谷穴在耳上入髮際寸半陷中爵而取
之云耳尖上一寸是穴入二分七壯

偏正頭宜
瀉不宜補

本神穴在曲差旁寸半直耳上入
髮際四分入二分七壯

陽白穴眉上一寸直瞳
子入二分三壯

臨泣穴目直上入髮際五分
陷中三分七呼三壯

臨泣穴足小指次指本節後陷中
去挾絡寸半二分三壯

目窓穴刺目大眇三分五壯
臨泣穴後一寸三度

陽池穴一名別陽在手表腕上
陷中二分六呼三壯

外關穴透內關穴禁灸治脇肋痛瀉手背
紅腫先補後瀉即陽淮

支溝穴在腕後三寸兩骨之間陷中直刺
透間使大便秘結不通宜瀉大治

會宗穴腕後四寸入
二後四寸入

三陽絡穴臂上廉中禁針九壯
寸外廉陷中禁針九壯

四瀆穴外並下廉其穴中決六分七呼二
肘前五寸外廉陷中

天井穴肘外大骨尖一寸兩筋間陷中屈
肘得之義手按膝取之五分七呼

清冷淵穴淵在肘上一寸神肘
三壯治小腸冷痛先瀉後補

消灤穴握拳舉臂取之六分三壯
肩下背外間破針附分下行

臑會穴一名臑會穴在肩前廉去有頭
三寸宛宛中五分三呼五壯

肩髃穴在肩端臑上斜舉
臂取之七分三壯

天髃穴在肩中直肩井後一寸八分三壯
陷中直肩井後一寸八分三壯

壯

不遺種書卷中

五

骨旁名二寸上直
兩乳七分五壯

京門穴 一名氣膺一名氣府腎之募在監
骨腰中季肋俠脊三分七呼三壯

帶脉穴 在季肋下一寸八分
陷中入六分七壯

五樞穴 帶脉一三寸一曰水道旁一寸半
環跳上五寸入背部白環腧穴相
近直刺三分五寸入背部白環腧穴相
不可忍補瀉臨時腰脚重宜瀉

維道穴 一名外樞在章門下五
寸三分入八分五壯

居膠穴 在章門下一寸三分監骨上陷中
在環跳上一寸刺三寸半甲乙經
入分灸二七至五十壯治腰腿痠疼先
瀉後補腿股風痛先補後瀉瀉多與環

環跳穴 在髀樞中側卧伸下足屈上足取
之即硯子骨腕中也一寸二十呼
五壯治與
居窮同

風市穴 膝上七寸膝外兩筋間立捶手着
腿中指點到處是穴入半寸灸五
十壯治腰腿痠疼起坐艱難先瀉後
補腿股風痠先補後瀉治頭暈脚重

中瀆穴 間陷中五分七呼五壯
骨外膝上五寸分肉

陽關穴 一名關陵一名關陽陽陵泉直上
三十續鼻外陷中五分不可灸

陽陵泉穴 膝下一寸外廉陷中膝下外央
骨前筋病六分宜留針十呼三

壯

陽交穴 一名別陽一名足窠外踝上七
寸針屬三陽分肉間六分

外丘穴 足外踝上七
寸三分七壯

光明穴 能外踝上五寸治筋疼不
能久立六分七呼七壯

陽輔穴 足外踝四寸輔骨前絕骨端向前
三分去丘墟七寸五分七呼三壯

懸鍾穴 一名絕骨外踝上三寸須要按尋
當骨前動脈中是六分七呼三壯

丘墟穴 寸外踝下如前陷中去臨泣三
寸循足附五分七呼三壯

五會穴 足小指次指之本節後陷中去俠
絡一寸入三分禁灸令人瘦三年

死

大補神書卷中

至

俠谿穴 足小指次指之岐骨間
本節前陷中三分三壯

竅陰穴 足小指次指之端去爪甲
角如韭菜一分三呼三壯

氣主病 善太息 心肋不可轉側 口
中苦

血主病

馬刀 挾嬰 缺盆中痛 腋
下腫

有餘外証

頭痛 頷腫 寒慄

有餘內証 咳而嘔吐膽汁 膽疽

不足外証 體無膏澤

不足內証 善驚恐

本經藥 柴胡

引經藥 青皮

本經風升之藥 柴胡 川芎

本經濕化之藥 半夏

本經燥降之藥 連翹 茯苓

本經寒沉之藥 青皮

龍膽草 瓜蒌

根

足厥陰肝經入形穴道氣血主病本經治

藥

是經外應於爪與膽合為表裏為津液

之府血之海此臟氣絕則窮縮舌短筋

先死庚日篤辛日死肝屬木其脉弦而

長得浮而耆謂之相勝得沉遲而緩為

相生本臟其聲呼其色青其臭臊其味

酸其液泣其補辛其瀉酸其精肥氣其

肝重四斤四兩左三葉右四葉凡七葉

將軍之官謀慮出焉足厥陰肝之脉起

於大指聚毛之上循足附上廉去內踝

一寸上踝八寸交出太陰之後上臑內

廉循股入陰毛中環陰器抵少腹挾胃

屬肝絡上貫膈布脇肋循喉嚨之後

上入顙連目系上出額與督脉會於

顙其支者從目系下頰裏環唇肉其支

者復從肝別貫膈上注肺是動則病所

生病者也

大敦穴

足大指端去爪甲角韭葉大及毛

呼五十壯治勝脫疝氣偏

行間穴 在足大指間動脉應手云虎口兩

紅腫痛瀉宜出血補膝蓋紅腫痛瀉

赤痛

大衝穴

在足大指行間上二寸兩筋間陷中直入半寸十呼三壯曰禁灸治

腫痛

無力脚跌麻木補脚背紅腫痛瀉行步難先瀉後補

中封穴

在足內踝前一寸足脘上大筋陷中直刺半寸或四分或七呼七壯

看証
瀉同
行間

蠡溝穴

在內踝上五寸入三分留三呼三壯

中都穴

在膝蓋骨下犢鼻下三寸半向裏貼骨節

膝關穴

在膝蓋骨下犢鼻下三寸半向裏貼骨節

大環經書卷

本

曲泉穴

在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝橫文頭內外兩筋間宛中

取之六分留
十呼三壯

陰包穴

氣冲下三寸陰股中動脈治腸中滿熱閉不得溺六分五壯

五里穴

氣冲下三寸陰股中動脈治腸中滿熱閉不得溺六分五壯

陰廉穴

氣冲旁一寸內股上按文中按皮肉間有核如羊矢是三分七壯

羊矢穴

大橫外直臍兩旁各六寸季肋端側卧屈上足舉臂取灸五十壯治

章門穴

側卧屈上足舉臂取灸五十壯治

腎脇痛
取積塊入六分

期門穴

在乳根下一分即乳中直下寸半各向外第二肋端縫中肝募也入

一分沿皮向外一寸半七壯治傷寒氣喘宜瀉胃腹脹滿瀉傷寒多汗補

氣至病

胸滿 肋滿痛引小便

血至病

腰痛 腦疽 吐血

有餘外証

咽乾 嘔逆 狐疝 出惡

言 目寒出淚

有餘內証

婦人小腹痛腫 筋緩不能

收持

丈夫潰疝 喉嚨痛 陰中痛

大環經書卷

奎

內癰

夢山林 如則兩肋下消不

可轉側

不足外証

面塵脫色 遺溺

不足內証

癰閉 食泄 陰縮 筋痺

氣攣

夢山林 肋脹 肋滿

本經藥

羌活 天麻 川芎 荆芥

川烏頭

吳茱萸 紅花 當歸 甘

草 白朮

龍膽草 薏苡 桃仁

皂莢 葵菜 牛膝 葛花 山茱萸

阿膠

引經藥 柴胡 青皮 蘇木 琥珀

蒲黃 艾 木瓜 酸棗

本經風升之藥 羌活 柴胡 川芎

菊花

本經熱浮之藥 吳茱萸

本經濕化之藥 白朮 當歸 甘草

本經燥降之藥

阿膠 香附

本經燥降之藥 木瓜 茶 山藥 菊

花 茯苓 芍藥 皂莢 蘇木

本經寒沉之藥 青皮 龍膽草 熟地

黃 防風 代赭石

瓊瑤神書卷中終

瓊瑤神書卷下

督脉人形穴道

督脉者起於下極之腧並於脊裏上至

風府入腦上巔循額至鼻柱屬陽脉之

海也中行

長強穴 在尾間脊骶骨尖治九痔漏九腫

腰腧穴 推一名髓空孔一名腰法在二十一

分七呼五壯正在背

陽關穴 在十六椎下伏取可作

命門穴 在二七壯治腎虛腰痛補小便立効

懸樞穴 在背十三椎節下間

脊中穴 在背九椎節下間

筋縮穴 在背七椎節下間

至陽穴 在背七壯渾身發黃汗先瀉後

屈脊骨強痛

靈臺穴 在背六椎節下間伏

神道穴 在背五推下尖伏取五分五呼

身柱穴 在背三推下脊上伏取三分

接脊穴 一名風門在背二推節下骨間相

寸半治瘰癧不密時傷風咳

陶道穴 在脊第一大椎下節骨下間陷

大觀穴 在脊第一推上陷中五分三呼

瘰癧穴 一名瘰癧在項後兩筋間宛陷中

仰頭取之入三分不可深

不環神書卷下

風府穴 一名舌本入項後髮際一寸兩筋

後項強痛頭重如石先補

腦戶穴 一名風入腦立成五

針針頭中戶入腦立成五

強間穴 一名大羽後項後寸

後頂穴 一名交衡百會後寸

前頂穴 在額會後寸半陷中前取

神庭穴 在鼻上入髮際五分禁針針令人

頭暈惡心吐痰後瀉須如

百會穴 一名三陽五會一名天滿在頂後

法用線量前眉間後於項上髮際拆斷

當中是穴入一分灸二七壯治中風不

省人事先補

上星穴 已下禁針二寸骨間中入歲

先補後瀉豆入三分三壯治鼻不聞香臭

補補多治目赤痛並頭風等証瀉亦宜

天環神書卷下

素膠穴 一名面土在鼻柱

水溝穴 一名人中在鼻柱下中央水腫唯

三壯

兌端穴 在唇上端

斷交穴 在唇內齒上斷縫

任脉人形穴道

任脉者起於中極之下以上毛際循復

裏上關元至咽喉屬陰脉之海也中行

凡二十四穴

天突穴

一名天瞿結喉下其骨如半環穴居環屈中仰取云宛宛中央灸二

七壯不及針凡針一寸直橫下不得抵予恐傷五臟之氣則令人矢治哮喘咳

承漿穴

一名懸漿頤下唇五分宛宛中三分七壯治頭項強痛不能回頭先

神後瀉下片牙痛先補後瀉

陰交穴

一名橫戶一名少關臍下一寸八分五壯

神闕穴

一名氣戶當臍中是穴禁針百壯

大聖神書卷

下腕穴

建里下一寸八分三呼五吸五七壯

建里穴

中腕下一寸入五分十呼五壯

巨闕穴

寸六分七呼七壯一

中庭穴

臍中下一寸六分

玉堂穴

一名玉英在紫宮下一寸六分

紫宮穴

華蓋下一寸六分

會陰穴

一名屏翳在兩陰間任脉別絡俠督脉衝脉之會男女尿竅皆曰前

陰糞門皆曰後陰此穴居二陰之間二寸三呼三壯

曲骨穴

在橫骨上中極下一寸五分毛際陷中

中極穴

一名王泉一名氣原膀胱之募關元下一寸去臍下四寸刺二寸半

灸五十壯治尸厥不省人事先補後瀉

專治婦人無子針灸三度立効

關元穴

正丹田也臍下三寸小腸募也入

女子藏血治下元虛損遺精白濁治

婦人經水或來不來宜補赤白帶下先

瀉後補一切虛損看証補瀉孕婦勿針

針之落胎衣不下針外崑崙

石門穴

一名利機一名精露臍下二寸入

先瀉後補婦人不可

氣海穴

一名臍下一寸半灸五十壯諸氣病

皆先瀉後補婦人

水分穴

一名中守下死下一寸臍上一寸

腹脹氣滿二寸三呼五

中腕穴

一名太倉胃募也上腕下一寸臍

齒胃吐食補痰飲先

上皖穴

一名胃皖巨關下一寸五分臍上五寸入二寸灸五十壯治心痛先

鳩尾穴

一名尾翳在臆前蔽骨下五分無中庭骨下五分此穴大難非高不可針灸刺之取氣多人天五竅等証灸瀉

心痛瀉

臆中穴

一名元兒一名胃堂在玉堂下六分兩乳中間仰臥取穴禁針灸之

璇璣穴

天突下一寸陷中仰頭取之直入三分灸二七壯治哮喘咳嗽熱瀉

華蓋穴

一名本池結喉上舌本間

廉泉穴

一名本池結喉上舌本間

拆量歌

頭部中形穴刮計一十八穴外神聰四穴

頭形北高向南下 先以前後髮際量

拆為一尺有二寸 髮上五分神庭鄉

庭上五分上星位 顙會上星一寸強

上至前頂一寸半 寸半百會頭中央

神聰百會四百取 一寸風癲主後頂

強間腦戶三相去 各各一寸五後取

髮際五分定瘰門 門上五分定風府

此為頭部最中行 督脉受邪攻即愈

偃伏二行穴刮左右一寸四穴

曲差二穴俠神庭 五處挨排挾上星

承光五處後寸半 通天絡却一勻停

玉枕橫俠于腦戶 直上當準銅人經

天柱處項後髮際 大筋外為陷中是

偃伏三行穴刮左右十四穴

臨泣有穴當兩目 直入髮際五分屬

目窓正營去一寸 承靈腦空寸五錄

風池後髮際陷中 治証諸經隨取足

當陽一寸髮之上 直上瞳人兩泓泉

原缺第八葉

面部三行穴刮左右十四穴

上下兩穴直目瞳 眉上一寸陽白宗

目下七分爲承泣 四白三分禁忌同

地倉四分俠口吻 大迎曲頷前陷中

面部四行穴刮左右十六穴

本神寸半曲差傍 頭維本神寸五量

眉後陷中絲竹空 瞳膠外眥五分詳

顴膠面頰下廉索 此爲面部第四行

六 玉璣神書卷

九

側面部穴刮左右十六穴

上關之禁不得深 下關之禁久留針

上關耳前開口取 下關耳上合口尋

前關耳後寸維半 聽會耳前陷中看

耳前有關是耳門 聽宮耳珠明可按

耳下曲頰名頰車 和窅却與禾膠差

肩膊部穴刮左右二十二穴

肩膊之穴各有名 缺盆之上肩井名

天髎正在必骨際 巨骨肩端义骨臣

肩之前廉爲臑會 肩髃肩端骨陷端

膠臑上舉臂取臑 上肩真當骨解大

骨陷中也名天宗 天宗之前名秉風

脾之前廉爲臑臑 曲垣正在肩之中

肩廉有臑名肩外 肩中臑在肩廉內

背部 長三尺 計二十一推

上七節連該九寸八分分之七

玉璣神書卷

十一

每推一寸四分

第一推自大推穴量至陶道一寸四分

之一 第二推該二寸八分分之二

第三推該四寸二分分之三 第四推

該五寸六分分之四 第五推該七寸

分之五 第六推該八寸四分分之六

第七推該九寸八分分之七

中七節連上七節總該二尺一寸

每推長一寸六分

第八推該一尺一寸四分分之八 第
九推該一尺三十分分之九 第十推該
一尺四寸六分分之十 第十一推該
一尺六寸二分分之十一 第十二推
該一尺七寸八分分之十二 第十三
推該一尺九寸四分分之十三 第十
四推該二尺一寸分之十四

天壤經書卷下

十一

下七節連上中節總該三尺

每推一寸三分八釐有奇

第十五推該二尺二寸八釐有奇 第
十六推該二尺三寸五分六釐 第十
七推下三寸七分分之有奇 第十八
推下五寸分之四有奇 第十九推下
六寸三分分之有奇 第二十推下七
寸五分分之六有奇

肺膈三推厥陰四 心膈五推下之論

督膈膈膈相梯級 第六第七次言之

第八推下穴無有 肝膈數推當第九

十推膽膈脾十一 十二胃膈取三焦

腎膈氣海膈十三 十四十五守大腸

關元處要量十六 十七推下在兩傍

十八推下小腸膈 十九推下尋膀胱

中膈內膈推二十 白環二十一推當

天壤經書卷下

十二

上膠次膠中與下 一空俠腰髀並同

俠脊四寸穴載在 載在千金君勿訝

會陽陰尾兩傍分 尺寸前篇以告君

背部三行穴刮計二十一穴

第二推下名附分 俠脊相去古法云

先除脊後量三寸 不爾炎脾能傷筋

臆戶三推神堂五 第六謔謔明可觀

膈關第七魂門九 陽岡意舍依次數

胃倉育門推要談 推看十二與十三
志室次之爲十四 胞育十九合詳叅
秋邊二十推下詳 更特爲君問膏肓
第四推下二分剩 第五推上一分量
拊法準爲六寸半 脾骨側指分明看
穴真無疾不能除 百壯至七有成筭
側頭項部穴刮左右十八穴

耳上曲頰取天容 缺盆之上尋天牖

天壤瑤神書卷下

五

腕骨之下髮際上 天柱之前容後頸
大筋前有有天窓 扶突寸半天昇雙
扶突寸半後人迎 缺盆只看肩井橫
人迎有脉動應手 結喉之旁仰面取
水突正在人迎下 夾突陷中爲氣合
膺部中行穴刮計七穴

天突結喉腕中央 一寸陷中璇璣藏
又下一寸瞻華蓋 紫宮次第至玉堂

膺中中庭上下經 四穴各寸六分

膺部二行穴刮左右十二穴
璇璣兩旁二寸許 巨骨之下尋膺府
此去各寸六分除 或中神藏至靈墟
神封步郎依一二 膺膺二行之次第

膺部三行穴刮左右十二穴
膺府之旁二寸尋 穴名氣戶主胸襟
庫房屋翳膺窓近 乳中正在乳中心

天壤瑤神書卷下

五

次有乳根出乳下 各一寸六不相侵
膺部四行穴刮左右十二穴

雲門二穴俠氣戶 兩旁二寸依經取
雲門之下一寸看 中府分明肺之募
周榮胸鄉暨天谿 食竇欲尋須舉臂
次第各各一十六 橫取乳間作憑據
側腋部四行穴刮左右八穴

腋下三寸名淵腋 腹前一寸曰輒筋

寸

穴俠幽門一寸五 是曰不容依法取

其下承滿至梁門 關元太乙從頭舉

次第挨排滑肉門 相去各寸分明數

天樞要在俠臍旁 外陵樞下一寸方

二寸大巨三水道 歸來道下二寸將

氣衝一寸歸來下 動脈應手君休訝

腹部四行穴刮左右十四穴去中行四寸

大瓊璫書卷下

七

五分

期門在膺肝之募 不容之旁寸半許

日月期下五分求 腹哀又下寸半取

大橫此下三寸半 腹結橫下三分斷

府舍三寸下復結 大橫之五衝門穴

腹部分寸尚何如 乳門九寸與膺殊

側脇部分穴刮左右十二穴

章門脾募季脇端 監骨腰中京門看

帶脉肋下寸有八 五樞脉下三寸半

五寸二分章門下 維道有穴審補瀉

居髎合取八寸三 脇堂腋下雙骨罅

十二經拆量

手太陰肺經穴刮左右十八穴

爲君試舉手太陰 少商手大指端尋

魚際大指本節後 大淵出掌後中心

經渠寸口陷中是 列缺腕上寸半針

大瓊璫書卷下

十八

孔最腕上量七寸 尺澤肘中約紋論

俠白出在天府下 去肘五分動脈應

天府腋下寸凡三 刺衄依止功可信

手陽明大腸經穴刮左右二十八穴

食指內側名商陽 手陽明經屬大腸

本節前有二間穴 本節後有三間當

岐骨陷中尋合骨 陽谿宛中上側詳

宛後三寸偏歷走 五六寸間側溫溜

屈肘曲中求曲池 池下三寸三里在
上廉里下側一寸 下廉此下一寸又
肘髁肘大骨外廉 五里肘上三寸取
臂臑肘上七寸量 肩髃之下索窠曰
手少陰心經穴刮左右十八穴

小指內廉名少冲 少府節後直勞宮
神門掌後銳骨端 陰郄掌後看脉中
腕後一寸通里各 掌後寸半靈道通

不與神書卷

九

少海肘內節後是 青靈肘後三寸容
更有極泉凡二穴 腋下筋間脉入胸
手太陽小腸經左右十八穴

手小指端為少澤 前骨外側節前索
節後盡文是後谿 腕骨陷中尋外側
銳骨之中陽骨討 踝骨上寸為養老
支正腕後量五寸 少海肘端五分巧
手厥陰心包絡經左右十六穴

中衝穴在中指端 居指勞宮取掌間
大陵掌後筋間是 去腕二寸尋內關
郄門去腕上五寸 間使三寸兩筋間
內廉陷中看尺澤 天泉腋下三寸索
手少陽三焦經穴刮左右二十二穴

關衝名指外端論 小次指間為腋門
中渚次指本節後 陽池表腕有穴存
腕後三寸外絡關 支溝腕上三寸約

不與神書卷

十

會宗三寸空中求 消息一寸無令錯
支溝上寸臂大脉 此是三陽經絡穴
四瀆肘前大骨外 天井曲肘外尋側
清冷淵肘上二寸 消爍肩下臂外索
足厥陰肝經穴刮左右二十八穴
大敦大拇看毛聚 行間指間動脉處
節後寸半或二寸 大冲有脉誠堪據
中封一寸內踝前 蠡溝踝上七寸名

中都膝關鼻下二寸餘曲泉膝輔內
骨下太上小下索筋罅陰包四寸膝
已上內廉筋骨索其當五里三寸下
氣冲有脉自動陰腓中羊矢下曰陰
廉氣冲相一寸通

足少陽膽經穴刮左右二十八穴

小指次指貼所起竅陰去爪薤葉是
岐骨節前名俠谿地五會泣一寸是

大素神書卷下

廿一

俠谿寸半至臨泣丘虛踝下如前比
懸鍾踝上三寸收陽輔四寸踝上頭
上踝五寸光明穴更有七寸名外丘
陽交斜取對一寸膝外寸半楊陵留
陽關脉上三寸是中瀆外漆五寸收
風市垂手指盡處環跳側卧細詳求
足太陽膀胱經穴刮左右二十六穴

至陰爲足膀胱井小指外側韭葉定

通骨節前束骨後大骨之下京骨應

甲脉踝下容爪甲金門踝下母指雜

僕參跟骨之下尋踝後骨上外崑崙

附陽踝上三寸正飛陽九寸或七寸

承山腓腸分肉間承筋腓中針攻禁

約紋之下尋合陽二寸上接崑崙當

卻有扶承二穴遠尻臀下骨橫紋央

更有五寸浮郄接六門却是殷門穴

大素神書卷下

廿二

再有二穴名委陽三焦下輔均須別

足太陰脾經穴刮左右十三穴

隱白大指端內側爪甲宛宛如韭葉

本節後陷爲大都核骨下中尋太白

公孫節後一寸間商丘踝下微前安

三陰交上踝三寸骨外陷中仔細看

更有三寸太陰絡一名滿骨須審約

膝下五寸尋地機陰陵泉穴宜斟酌

血海三寸上膝臚 內廉白肉之際分
魚腹上越越筋處 股內動脈爲箕門
足陽明胃經穴刮左右十四穴

陽明井穴起厲兌 大次指端應屬胃
二指外間是內庭 節後二寸陷骨位
此去三寸或二寸 衝陽有脉還相應
鮮谿更後寸半中 踝上八寸豐隆正
三里膝下三寸強 上巨虛兮三寸取

不環結書卷下

莖

中折寸半條口當 膝臚之下有犢鼻
膝上二寸梁丘的 陰市三寸伏兔六
里從膝蓋卻有七 髀關免後交分中
膝眼四穴又不同 膝頭骨下兩旁取
陷中仔細尋其宗
足少陰腎經穴刮左右十三穴

湧泉起足少陰腎 屈足捲指中心定
然骨叔上內踝前 大骨下陷宜詳正

大谿踝後跟有脉 大鍾跟後曲中折
水泉谿後下一寸 踝下即是照海穴
復溜二寸踝上叅 交信後廉筋骨間
腓分六寸築賓位 陰骨膝內取未難
輔骨之後大筋下 小筋之上曲膝安

周身折量經穴賦

手太陰肺兮大指側少商魚際大淵穴經
渠兮列缺孔最兮尺澤俠白仰天府爲

不環結書卷下

莖

鄰雲門與中府相接

手陽明大腸之經循商陽二三間而行渡
合谷陽谿之腧至偏歷溫溜之臚下廉
上廉低三里之近曲池肘髁合五里之
程臂臑肩髃穿於巨骨天鼎扶突於禾
膠迎香注於鼻根

足陽明以胃經厲兌接乎內庭過陷骨冲
陽之地見解谿豐隆之神下巨虛兮條

口陳上巨虛兮三里迎犢鼻斜引於梁
丘陰市之下伏兔上貫於髀關氣衝之
經歸來兮水道大巨兮外陵運天樞於
滑肉禮太乙於關門梁門兮承滿不容
兮乳根乳中之膺窓屋翳庫房之氣戶
缺盆氣舍水突人迎大迎地倉兮巨膠
續四白兮承泣分御頰車於下關上頭
維注額垠

天壤集卷之六

蓋

足太陰兮脾中州隱白出兮大指頭赴大
都兮膽太白訪公孫兮至商丘越三陰
之交而漏骨地機可即步陰陵之泉而
血海箕門是求衝門入兮腑舍軒豁腹
結解兮大橫優悠腹哀食竇兮接天谿
而同派胷鄉周榮兮綴大包而如鉤
手少陰心出乎小指少衝兮少府神門陰
郄通里兮靈道非遠少海清冷兮極泉

何深

手太陽小腸所宗少澤前谷後谿是通尋
腕骨陽谷於養老求支正兮少海肩貞
相從值臑腧而訪天宗乘秉風於曲垣
中肩外腧兮肩中腧啓天窓以見天容
遂觀膠而造聽宮

足太陽之膀胱貫背部之四行窮至陰於
通谷之口尋束骨於京骨之鄉申脉命

天壤集卷之六

某

僕叅以通道崑崙則金門於外踝骨之
傍奮付陽飛陽之志入承山承筋之行
至於合陽委中委陽浮郄殷門遂岐往
承扶秩而胞膏造志室兮育腧胃倉
開意舍兮振彼陽剛魂門出於膈關譴
譴乃於神堂膏肓俠四推而斜下魄戶
次附分而輒會陽上膠次膠中膠白環
腧中膂內腧之房膀胱腧兮小腸腧關

元膺兮大腸膺氣海膺三焦膺兮腎膺
旁脾膺胃膺肝膺督膺膈膺心當厥陰
膺肺膺之募風門大杼之方天柱拆兮
王枕絡却通天拆兮承光自五處曲差
而下攢竹清明之場

足少陰兮腎所屬湧泉流兮入然谷大谿
大鍾水泉綠照海復溜交信續從築賓
兮上陰谷見橫骨兮大赫麓氣海四滿

六經經氣卷下

七

兮中注育膺上通兮商曲守石關兮陰
都寧拒通骨兮幽關肅步即神封靈墟
而永存神藏或中膺府而充足

手厥陰心包之絡中冲中指之奇循勞
宮大陵而逐內關間使而馳扣却門於
尺澤天泉於天地

手少陽三焦之經起小指次指之端關冲
通乎液門中渚從乎陽池外關支溝會

宗三陽絡四瀆天井清冷淵消灤臑會
肩竅相連天竅處天牖之下翳風讓癭
脉居先顙顙定而角孫近耳絲竹空而
和髎倒懸耳門既闢夏竅聞言

足少陽兮膽經穴出初行於竅陰循俠谿
於地五會過臨泣兮丘墟平懸鍾兮陽
輔光明外丘兮陽交陽陵西出陽關兮
抵中瀆風市之近環跳居髎兮循維道

六經經氣卷下

八

五樞之名考夫帶脉曲上於京門日月
麗兮輒筋榮淵腋泄兮肩井盈臨風池
兮腦空鳴上承靈兮正榮目窓兮臨泣
陽白兮本神舉浮白放天冲登竅陰完
骨澄率骨廻兮曲髮迎懸釐下兮懸顙
承領厭兮循客主人聽會兮童子髎相
迎

足厥陰大敦行通次大冲至中封過蠡溝

中都之會見膝關曲泉之宮襲陰包於
五里兮則陰陽乃得破羊矢於章門兮
則期門可攻

督部素膠兮印堂居中神庭入髮際上星
瞳矐願會涉乎前頂百會儼然尊崇後
頂輔兮強間逢腦戶漱兮風府同啞門
接兮大推通陶道身柱神道同靈臺至
陽兮筋縮脊中接脊懸樞兮命門重重

六種神書卷下

林九

歌陽關兮舞腰脰願長強兮樂無窮

任脉水溝兮兌端斷交宮接承漿泄兮廉
泉同窺天突於璇璣揭華蓋於紫宮登
玉堂兮造臆中立中庭兮鳩尾中羽膽
巨關兮上脘中脘過建里兮下脘悠同
水分兮神闕漂渺陰交兮氣海鴻濛石
門兮關元中中曲骨兮會陰乃逢

瓊瑤神書卷下

終

大本瓊瑤發明神書二卷 浙江鄭大節家藏本

舊本題賜太師劉真人撰不著其名前有崇寧元
年序則當爲宋徽宗時人然序稱許昌滑君伯仁
嘗看經絡專專 案專專二字疑誤姑仍原本錄之 手足三陰三陽
及任督也觀其圖彰訓釋 案圖彰二字未詳今亦姑仍舊本 網舉
目張云云伯仁滑壽字也元人入明明史載之方
技傳崇寧中人何自見之其偽可知矣書中所言
皆鍼灸之法及方藥蓋庸妄者所托名也

珍珠囊指掌補遺藥性賦四卷

〔金〕李杲撰

山東省圖書館藏清光緒二十三年李
光明莊刻本

附《四庫全書總目·珍珠囊指
掌補遺藥性賦四卷》提要

雷公藥性賦原序

往嘗向學以未博醫爲欠事一日思取古
人既目醫類爲小道又謂人不可以不知
醫噫嘻醫不可以不知也亦不必於盡知
也非盡知不可也願吾所事者大其餘所
謂醫者精神有分數日月不長居也君子
於醫苟知其概以知之者付之希之者斯
固不害爲知也此吾有取於藥性賦也雖
然吾爲希於大者言也苟有奇世之人囊
小大而無不知者奚必盡守乎吾言哉曰
斯人也吾見之罕矣此吾有取於藥性賦
也元山道人識

雷公藥性賦原序

李光明莊

珍珠囊指掌補遺藥性賦目次

卷之一

寒性 六十六種

犀角	味微苦酸	羚羊角	味苦鹹	澤瀉	味苦平	射干	味苦平	括莢	味苦寒	兜鈴	味苦寒	枳殼	味苦酸	枳實	味苦酸	地骨皮	味苦寒	車前子	味苦寒	薏苡仁	味甘微	海藻	味苦鹹	薏苡仁	味甘微	地骨皮	味苦寒	枳實	味苦酸	百部	味甘微	雷公棗	味甘微	升麻	味甘平	茵陳	味甘平	石膏	味甘大	天冬	味甘大	大黃	味甘大	茅根	味甘寒	生地黃	味甘寒	牽牛	味甘寒	葶草	味甘寒	地膚子	味甘寒	旋覆花	味甘寒																						
荊芥穗	味辛微	山豆根	味苦寒	白鮮皮	味苦寒	香附子	味苦寒	金鈴子	味苦寒	熟地黃	味甘寒	淫羊藿	味甘寒	竹茹	味甘寒	滑石	味甘大	朴硝	味甘大	金箔	味甘平	犀角	味微苦酸	羚羊角	味苦鹹	澤瀉	味苦平	射干	味苦平	括莢	味苦寒	兜鈴	味苦寒	枳殼	味苦酸	枳實	味苦酸	地骨皮	味苦寒	車前子	味苦寒	薏苡仁	味甘微	海藻	味苦鹹	薏苡仁	味甘微	地骨皮	味苦寒	枳實	味苦酸	百部	味甘微	雷公棗	味甘微	升麻	味甘平	茵陳	味甘平	石膏	味甘大	天冬	味甘大	大黃	味甘大	茅根	味甘寒	生地黃	味甘寒	牽牛	味甘寒	葶草	味甘寒	地膚子	味甘寒	旋覆花	味甘寒

烏藥	味辛溫	鹿角膠	味辛溫	麝香	味辛溫	麝香	味辛溫	米醋	味辛溫	虎骨	味辛溫	紅豆蔻	味辛溫	附子	味辛溫	華澄茄	味辛溫	秦椒	味辛溫	肉苁蓉	味辛溫	雷公棗	味甘微	菖蒲	味辛溫	胡蘆巴	味辛溫	天雄	味辛溫	麻黃	味辛溫	溫內	味辛溫	華撥	味辛溫	生薑	味辛溫	川芎	味辛溫	川椒	味辛溫	生卷柏	味辛溫	丁香	味辛溫	石硫黃	味辛溫	吳茱萸	味辛溫	蓬莪朮	味辛溫	白豆蔻	味辛溫	檀香	味辛溫	紫蘇	味辛溫	五靈脂	味辛溫	當歸	味辛溫	白花蛇	味辛溫	禹餘糧	味辛溫	巴豆	味辛溫	烏梢蛇	味辛溫	麒麟竭	味辛溫	鹿角	味辛溫	鹿茸	味辛溫	乳香	味辛溫	縮砂	味辛溫	靈砂	味辛溫	胡椒	味辛溫	長蘆	味辛溫	良薑	味辛溫	白朮	味辛溫	乾薑	味辛溫	川烏	味辛溫	續斷	味辛溫	五味子	味辛溫	牡蠣	味辛溫	黃芩	味辛溫	葶藶	味辛溫	淡竹葉	味辛溫	知母	味辛溫	桔梗	味辛溫	常山	味辛溫	槐花	味辛溫	貝母	味辛溫	牡丹皮	味辛溫	地榆	味辛溫
烏藥	味辛溫	鹿角膠	味辛溫	麝香	味辛溫	麝香	味辛溫	米醋	味辛溫	虎骨	味辛溫	紅豆蔻	味辛溫	附子	味辛溫	華澄茄	味辛溫	秦椒	味辛溫	肉苁蓉	味辛溫	雷公棗	味甘微	菖蒲	味辛溫	胡蘆巴	味辛溫	天雄	味辛溫	麻黃	味辛溫	溫內	味辛溫	華撥	味辛溫	生薑	味辛溫	川芎	味辛溫	川椒	味辛溫	生卷柏	味辛溫	丁香	味辛溫	石硫黃	味辛溫	吳茱萸	味辛溫	蓬莪朮	味辛溫	白豆蔻	味辛溫	檀香	味辛溫	紫蘇	味辛溫	五靈脂	味辛溫	當歸	味辛溫	白花蛇	味辛溫	禹餘糧	味辛溫	巴豆	味辛溫	烏梢蛇	味辛溫	麒麟竭	味辛溫	鹿角	味辛溫	鹿茸	味辛溫	乳香	味辛溫	縮砂	味辛溫	靈砂	味辛溫	胡椒	味辛溫	長蘆	味辛溫	良薑	味辛溫	白朮	味辛溫	乾薑	味辛溫	川烏	味辛溫	續斷	味辛溫	五味子	味辛溫	牡蠣	味辛溫	黃芩	味辛溫	葶藶	味辛溫	淡竹葉	味辛溫	知母	味辛溫	桔梗	味辛溫	常山	味辛溫	槐花	味辛溫	貝母	味辛溫	牡丹皮	味辛溫	地榆	味辛溫

狗脊	益智	紫蘇子	紫石英	秦艽	杏仁	仙茅	薑黃	肉豆蔻	巴戟天	骨碎補	雷公藥性賦	紅藍花	艾葉	蒼耳子	陽起石	山藥	蘿藦	木香	代赭	厚朴	獨活
微毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒
溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘
平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平
菟絲子	麻仁	淡豆豉	橘核仁	檳榔	茴香	破故紙	防己	撫芎	玄胡索	藿香葉	劉寄奴	羌活	威靈仙	紫菀	阿膠	鍾乳粉	半夏	沉香	肉桂	山茱萸	白石英
無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒
溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘
平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平
馬蘭花	黃芪	大小薊	金櫻子	杜仲	訶子	宣木瓜	藥本	何首烏	欵冬花	草果仁	茵芋葉	白芷	細辛	防風	赤石脂	青鹽	蒼朮	橘皮	鯽魚	白石英	白石英
無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒
溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘
平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平

穀芽	枇杷葉	僵蠶	柏子仁	桃仁	大腹皮	麥芽	茯神	蓮肉	遠志	桑寄生	雷公藥性賦	牛蒡子	桑螵蛸	三稜	人參	龍骨	琥珀	石斛	決明	芡實	礞砂	平性
無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒
溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘
平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平
阿魏	連翹	百合	安息香	神麝	椿白皮	小麥	白茯苓	沒藥	木通	大腹子	雷公藥性賦	全蝎	鴨頭血	沒石	蒲黃	苧松	味少	商陸	天麻	木賊	龍齒	青皮
無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒
溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘
平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平
紫河車	石楠葉	赤小豆	冬瓜仁	五加皮	桑白皮	白附子	赤茯苓	郁李仁	豬苓	小兒	五	酸棗仁	蛤蚧	皂角	南星	茯苓	牛膝	覆盆子	甘草	花蕊石	青皮	青皮
無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒	無毒
溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘
平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平

薄荷葉	味辛涼	麻黃	味苦甘	厚朴	味苦辛
杏仁	味苦溫	巴豆	味辛熱	黑附子	味辛熱
蒼朮	味苦溫	秦艽	味苦平	白殭蠶	味鹹平
白豆蔻	味辛溫	地榆	味苦酸	連翹	味苦平
阿膠	味平微	桃仁	味苦平	生薑	味辛溫
石膏	味辛大	桂	味辛熱	細辛	味辛溫
梔子	味苦大	葛根	味辛平	括萎根	味苦寒
豬苓	味淡平	乾薑	味辛炮	草龍膽	味苦寒
蘇木	味甘鹹平	杜仲	味辛平	天門冬	味苦平
麥門冬	味辛平	木通	味辛平	地骨皮	味苦平
桑白皮	味甘寒	甘菊花	味苦平	紅花	味辛溫
雷公藥性賦	目錄	七	李光明莊		
赤石脂	味甘酸	通草	味辛平	烏梅	味酸平
川椒	味辛大	姜	味辛平	秦皮	味苦寒
白頭翁	味苦溫	牡蠣	味鹹平	乾漆	味辛平
南星	味苦辛	商陸	味辛平	葶藶	味苦寒
海藻	味苦鹹	竹葉	味苦辛	葱白	味辛溫
天麻	味辛平	大棗	味甘平	威靈仙	味苦平
鼠黏子	味辛平	草豆蔻	味辛溫	玄胡索	味苦辛
用藥須知	五則				
用藥法象		四時用藥法		藥本五味歌	
炮製藥歌		妊娠服藥禁歌			
卷之三					

<p>玉石部 四十六種</p>																									
金屑	味辛平	玉屑	味甘平	辰砂	味甘微	鍾乳粉	味甘溫	雲母石	味甘平	禹餘糧	味甘寒	空青	味甘酸	石硫黃	味酸溫大	輕粉	味辛冷	滑石	味甘寒	蜜陀僧	味酸辛	膽礞	味酸辛	石燕	味甘涼
石牀	味辛溫	生銀屑	味辛平	伏龍肝	味辛溫	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平
代赭石	味辛寒	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平	梁上塵	味苦溫	鐵粉	味辛
水銀	味辛寒	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平	梁上塵	味苦溫	鐵粉	味辛
朴硝	味辛大	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平	梁上塵	味苦溫	鐵粉	味辛
紫石英	味甘辛	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平	梁上塵	味苦溫	鐵粉	味辛
磁石	味辛寒	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平	梁上塵	味苦溫	鐵粉	味辛
石灰	味辛溫	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平	梁上塵	味苦溫	鐵粉	味辛
胡粉	味辛寒	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平	梁上塵	味苦溫	鐵粉	味辛
無名異	味甘平	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平	梁上塵	味苦溫	鐵粉	味辛
靈砂	味甘溫	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平	梁上塵	味苦溫	鐵粉	味辛
黑鉛	味甘溫	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平	梁上塵	味苦溫	鐵粉	味辛
花蕊石	味酸平	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平	梁上塵	味苦溫	鐵粉	味辛
信石	味苦酸	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平	梁上塵	味苦溫	鐵粉	味辛
玄精石	味鹹溫	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平	梁上塵	味苦溫	鐵粉	味辛
雌黃	味辛平	礬石	味酸寒	礬石	味酸寒	寒水石	味甘寒	食鹽	味鹹溫	石膏	味辛大	銅青	味辛酸	礬砂	味苦辛	白堊	味苦辛	黃丹	味辛微	自然銅	味辛平	梁上塵	味苦溫	鐵粉	味辛
<p>草部 一百七十二種</p>																									
葛蒲	味辛溫	人參	味甘微溫	蒼朮	味甘辛	天門冬	味甘平	車前子	味甘寒	雄黃	味甘平	井泉石	味甘寒	礬砂	味甘辛	礬石	味甘大	石燕	味甘涼	黃丹	味甘微	自然銅	味甘平	梁上塵	味甘溫
甘草	味甘平	人參	味甘微溫	蒼朮	味甘辛	天門冬	味甘平	車前子	味甘寒	雄黃	味甘平	井泉石	味甘寒	礬砂	味甘辛	礬石	味甘大	石燕	味甘涼	黃丹	味甘微	自然銅	味甘平	梁上塵	味甘溫
生地黃	味甘苦	人參	味甘微溫	蒼朮	味甘辛	天門冬	味甘平	車前子	味甘寒	雄黃	味甘平	井泉石	味甘寒	礬砂	味甘辛	礬石	味甘大	石燕	味甘涼	黃丹	味甘微	自然銅	味甘平	梁上塵	味甘溫
麥門冬	味甘平	人參	味甘微溫	蒼朮	味甘辛	天門冬	味甘平	車前子	味甘寒	雄黃	味甘平	井泉石	味甘寒	礬砂	味甘辛	礬石	味甘大	石燕	味甘涼	黃丹	味甘微	自然銅	味甘平	梁上塵	味甘溫

草撥		藥本	白豆蔻	大青	白芷	貝母	蒼耳子	葛根	丹參	肉苁蓉	雷公藥	防風	黃芪	薯蕷	羌活	續斷	川芎	剪金花	黃精	菴蘭子	柴胡	菟絲子	巴戟天	
寒無毒		寒無毒	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	味辛溫	
高良薑		前胡	華澄茄	京三稜	小薊	當歸	知母	玄參	瞿麥	芍藥	黃連	忍冬草	黃連	忍冬草	獨活	茜根	石斛	慎火草	五味子	茵陳蒿	草決明	巴戟天		
熱無毒		味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微	味苦微		
剪草		薑黃	蓬莪朮	蓬莪朮	小薊	當歸	知母	玄參	瞿麥	芍藥	黃連	忍冬草	黃連	忍冬草	獨活	茜根	石斛	慎火草	五味子	茵陳蒿	草決明	巴戟天		
無毒		味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒		

射干	何首烏	續隨子	羊躑躅	大戟	羊蹄	大黃	烏頭	甘松	胡黃連	紅花	雷公藥	縮砂	牡丹	昆布	敗醬	水萍	蘆薈	欒花	石葦	紫苑	百合	王瓜
味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微
常山	骨碎	白附子	馬兜鈴	白蘼	鶴蝩	木賊	天雄	便君子	白茅花	白蘼	狗脊	地榆	百部	酸漿	艾葉	牛蒡子	淫羊藿	防己	澤蘭	秦艽	木通	
味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微
葇荑	葇荑	白頭翁	劉寄奴	白芨	甘遂	青箱子	半夏	附子	玄胡索	石龍芮	草薢	香附	天麻	茴香	阿魏	海藻	補骨脂	肉豆蔻	紫草	黃芩	馬蘭子	
味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微	味苦平微

連翹	穀精草	藜蘆	旋覆花	馬鞭草	燈心	狼毒	天南星	仙茅	屋遊	卷之四	雷公藥	仙茅	天南星	狼毒	燈心	馬鞭草	旋覆花	藜蘆	穀精草	連翹
味苦平	味辛溫	味辛苦	味鹹甘溫	味甘苦寒	味淡寒	味辛平	味苦辛	味辛溫	味苦寒	雷公藥	仙茅	味辛溫	味苦辛	味辛平	味淡寒	味甘苦寒	味鹹甘溫	味辛苦	味辛溫	味苦平
桔梗	紫河車	貫眾	莊麻子	葫蘆巴	山豆根	稀莨	牽牛	茅根	茅根	李光明莊	李光明莊	茅根	牽牛	稀莨	山豆根	葫蘆巴	莊麻子	貫眾	紫河車	桔梗
味辛苦微	味苦微	味苦微	味甘辛	味甘溫	味甘寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味苦寒	李光明莊	李光明莊	味苦寒	味苦寒	味苦寒	味甘寒	味甘溫	味甘辛	味苦微	味苦微	味辛苦微
海金沙	商陸	草蒿	威靈仙	萱草	金星草	夏枯草	山茨菇	茵芋	茵芋	李光明莊	李光明莊	茵芋	山茨菇	夏枯草	金星草	萱草	威靈仙	草蒿	商陸	海金沙
味甘寒	味辛酸	味苦寒	味苦溫	味甘涼	味苦寒	味苦辛	味甘辛平	味苦溫	味苦溫	李光明莊	李光明莊	味苦溫	味甘辛平	味苦辛	味苦寒	味甘涼	味苦溫	味苦寒	味辛酸	味甘寒

鹿角 無毒 味鹹溫	禽獸部 十九種	人中白 無毒 味鹹平	天靈蓋 無毒 味鹹平	乳汁 無毒 味甘平	天竺黃 無毒 味甘寒	丁香 無毒 味辛溫	藿香 無毒 味辛微	秦皮 無毒 味苦寒	冬青子 無毒 味苦平	桑白皮 無毒 味甘寒	五倍子 無毒 味酸平	沒石子 無毒 味苦溫	蕪荑 無毒 味辛甘	杜仲 無毒 味辛甘	龍腦 無毒 味辛微	檳榔 無毒 味辛溫	梧桐淚 無毒 味鹹寒	楮實 無毒 味甘寒	郁李仁 無毒 味酸平
麝香 無毒 味辛溫	牛黃 有小毒 味苦平	人糞汁 無毒 味苦寒	人糞汁 無毒 味苦寒	血餘 無毒 味苦微	胡椒 無毒 味辛溫	沉香 無毒 味辛溫	乳香 無毒 味辛熱	黃藥 無毒 味苦平	蘇合香 無毒 味甘溫	大腹皮 無毒 味苦微	吳茱萸 無毒 味辛溫	益智 無毒 味辛溫	蕪荑 無毒 味辛溫	衛茅 無毒 味苦寒	黃蘗 無毒 味苦寒	厚朴 無毒 味苦溫	枳殼 無毒 味苦微	竹皮 無毒 味甘平	密蒙花 無毒 味甘平
		童男溺 無毒 味鹹寒	童男溺 無毒 味鹹寒		楓香 有小毒 味辛平	檀香 無毒 味辛熱	五加皮 無毒 味辛寒	苦菜 無毒 味苦微	安息香 無毒 味辛溫	金櫻子 無毒 味酸平	山茱萸 無毒 味酸平	川楝子 無毒 味苦寒	皂莢 無毒 味辛溫	虎杖 無毒 味苦平	紫葳 無毒 味苦寒	豬苓 無毒 味甘平	山梔子 無毒 味苦寒	樗白皮 無毒 味甘平	蘇方木 無毒 味甘平

橘皮 無毒 味辛溫	果部 十六種	白花蛇 鹹有毒 味甘溫	桑螵蛸 味鹹甘 平無毒	蜈蚣 有毒 味辛溫	蟹 有毒 味辛寒	蟬退 味鹹甘 平無毒	川山甲 有毒 味鹹寒	鰻鱺魚 味鹹甘 平無毒	蛤蚧 有小毒 味鹹平	地龍 無毒 味苦寒	雷公藥性賦 自錄	衣魚 無毒 味鹹溫	鼠婦 無毒 味酸溫	珍珠 無毒 味鹹甘	全蝎 有毒 味甘辛	蟲部 三十八種	蝮蛇 無毒 味鹹	牛角腮 無毒 味苦甘	鹿茸 溫無毒 味甘酸	溫肺臍 無毒 味鹹熱	象牙 無毒 味甘平	龍骨 溫無毒 味甘平微
大棗 溫無毒 味甘平	五靈脂 無毒 味甘溫	原蠶 味鹹溫 有小毒	土狗 無毒 味鹹寒	鯽魚 無毒 味甘溫	鮑魚 無毒 味甘溫	蛻皮 無毒 味苦平	龜甲 無毒 味鹹平	石龍子 味鹹寒 有小毒	牡蠣 味酸平微 寒無毒	蝸牛 有小毒 味鹹寒	十三 李光明莊	蛻蛇 有毒 味鹹寒	蜚蠊 有毒 味鹹寒	水蛭 平有鹹苦 有毒	斑貓 味辛寒 有大毒	瓦 無毒 味甘溫	虎骨 熱無毒 味辛平微	阿膠 溫無毒 味甘平微	熊膽 無毒 味苦寒	熊膽 無毒 味苦寒	牛乳 平無毒 味微寒	
芡實 無毒 味甘平	僵蠶 味鹹平 辛無毒	石決明 味鹹平 涼無毒	蛙 無毒 味甘寒	鯉魚 無毒 味甘平	蜘蛛 無毒 味甘平	烏賊骨 味鹹微 溫無毒	龜板 無毒 味甘平	龜板 無毒 味甘平	龜板 無毒 味甘平	龜板 無毒 味甘平	龜板 無毒 味甘平	龜板 無毒 味甘平	龜板 無毒 味甘平	龜板 無毒 味甘平	龜板 無毒 味甘平	龜板 無毒 味甘平	雄雞 無毒 味微溫	兔頭骨 寒無毒 味甘平	犀角 寒無毒 味苦酸鹹	羚羊角 寒無毒 味苦酸鹹	獾肝 有毒 味辛溫	

雷公藥性賦目錄終

覆盆子	味酸平	柿乾	味苦寒	梨實	味甘微
橄欖	味酸甘	石榴	味酸甘	藕實	味甘平
桃仁	味苦平	杏仁	味苦甘	烏梅	味酸平
木瓜	味酸溫	枇杷葉	味苦平	胡桃	味甘平
草果仁	味辛溫				
米穀部	十五種				
梗米	味甘溫	秈米	味甘微	陳倉米	味甘平
黑豆	味甘平	黃豆	味甘平	米粟	味甘微
胡麻	味甘平	赤小豆	味甘平	白藟豆	味甘微
小麥	味甘微	大麥	味甘微	麥芽	味甘微
麥麩	味甘微	萊豆	味甘寒	甜瓜	味甘寒
雷公藥性賦目錄	二十一種				
葱	味辛溫	韭	味辛溫	萊菔子	味辛溫
胡荽	味辛溫	冬瓜	味甘微	白芥子	味辛溫
冬葵子	味甘寒	香薷	味辛微	薤白	味辛溫
茄子	味甘寒	豆芽	味甘平	荊芥	味辛溫
馬齒莧	味酸寒	草薺	味甘平	蘇葉	味辛溫
薄荷	味辛溫	飴糖	味甘微	神麴	味甘溫
醋	味酸溫	酒	味甘辛	香豉	味苦寒

珍珠囊指掌補遺藥性賦卷之一

東垣李 杲編輯 金陵鳳笙濮禮儀重校

總賦

諸藥藏性此類最寒犀角解乎心熱羚羊清乎肺肝澤瀉
利水通淋而補陰不足海藻散鬱破氣而治疝何難聞
知菊花能明目而清頭風射干療咽閉而消癰毒薏苡
理腳氣而除風溼藕節消瘀血而止吐衄瓜蒌子下氣
潤肺喘今又且寬中車前子止瀉利小便今尤能明目
是以黃藥瘡用兜鈴嗽醫地骨皮有退熱除蒸之效薄
荷葉宜消風清腫之施寬中下氣枳殼緩而枳實速也
雷公藥性賦卷之一 李光明莊

療肌解表乾葛先而柴胡次之百部治肺熱咳嗽可止
梔子涼心腎鼻衄最宜玄參治結熱毒癰清利咽膈升
麻消風熱腫毒發散瘡癰膏聞膩粉抑肺而斂肛門金
箔鎮心而安魂魄茵陳主黃疸而利水瞿麥治熱淋之
有血朴硝通大腸破血而止瘀癖石膏墜頭疼解肌而
消煩渴前胡除內外之痰實滑石利六腑之滯結天葵
冬止嗽補血冷而潤肝心麥冬清心解煩渴而除肺
熱又聞治虛煩除噦嘔須用竹茹通秘結導瘀血必資
大黃宣黃連治冷熱之痢又厚腸胃而止瀉淫羊藿療
風寒之痹且補陰虛而助陽茅根止血與吐衄石韋通
淋於小腸熟地黃補血且療虛損生地黃宣血更醫眼

定霍亂之心疼橘皮開胃去痰導壅滯之逆氣此六十種藥性之熱又當博本草而取治焉

溫性

溫藥總括醫家素諳木香理乎氣滯半夏主於風痰蒼朮治目盲燥脾去溼宜用蘿藦去膨脹下氣製麴尤堪況夫鍾乳粉補肺氣兼療肺虛青鹽治腹疼且滋腎水山藥而肺溼能醫阿膠而痢嗽皆止赤石脂治精濁而止瀉兼補崩中陽起石煖子宮以壯陽更療陰痿誠以紫苑治嗽防風祛風蒼耳子透腦涕止威靈仙宣風氣通細辛去頭風止嗽而療齒痛艾葉治崩漏安胎而醫痢紅羌活明目驅風除筋攣腫痛白芷止崩治腫療痔漏

雷公藥性賦卷一 李光明註

瘡癰若乃紅藍花通經治產後惡血之餘劉寄奴散血療湯火金瘡之苦滅風溼之痛則茵芋葉療折傷之症則骨碎補蠶香葉辟惡氣而定霍亂草果仁溫脾胃而止嘔吐巴戟天治陰疝白濁補腎尤滋玄胡索理氣痛血凝調經有助嘗聞欵冬花潤肺去痰嗽以定喘肉豆蔻溫中止霍亂而助脾撫芎走經絡之痛何首烏治瘡疥之資薑黃能下氣破惡血之積防己宜消腫去風溼之施藥本除風主婦人陰痛之用仙茅益腎扶元氣虛弱之衰乃曰破故紙溫腎補精髓與勞傷宜木瓜入肝療腳氣并水腫杏仁潤肺氣止嗽之劑茴香治疝氣腎疼之用訶子生精止渴兼療滑泄之病秦朮攻風逐水

又除肢節之痛檳榔豁痰而逐水殺寸白蟲杜仲益腎而添精去腰膝重當知紫石英療驚悸崩中之疾橘核仁治腰疼疝氣之瘕金櫻子今澀遺精紫蘇子今下氣涎淡豆豉發傷寒之表大小薊除諸血之鮮益智安神治小便之頻數麻仁潤肺利六腑之燥堅抑又聞補虛弱排瘡膿莫若黃芪強腰腳壯筋骨無如狗脊菟絲子補腎以明目馬蘭花治疝而有益此五十四種藥性之溫更宜參圖經而默識也

平性

詳論藥品平和性存以礪砂而去積用龍齒以安魂青皮快膈除膨脹且利脾胃芡實益精治白濁兼補真元原

雷公藥性賦卷一 李光明註

夫木賊草去目翳崩漏亦醫花蕊石治金瘡血行則止決明和肝氣治眼之劑天麻主脾溼祛風之藥甘草和諸藥而解百毒蓋以性平石斛平胃氣而補腎虛更醫腳弱觀夫商陸治脾覆盆益精琥珀安神而消血珠砂鎮心而有靈牛膝強足補精兼療腰痛龍骨止汗住溼更治血崩甘松理風氣而痛止葵藜療風瘡而目明人參潤肺甯心開脾助胃蒲黃止崩治衄消瘀調經豈不以南星醒脾去驚風痰吐之憂三稜破積除血塊氣滯之症沒石主泄瀉而神效阜角治風痰而響應桑螵蛸療遺精之洩鴨頭血醫水腫之盛蛤蚧治勞嗽牛蒡子疎風壅之痰全蠍主風癱酸棗仁去怔忡之病嘗聞藥

寄生益血安胎且止腰痛大腹子去膨下氣亦令胃和小草遠志俱有甯心之妙木通豬苓尤為利水之多蓮肉有清心醒脾之用沒藥乃治瘡散血之科郁李仁潤腸去水去浮腫之疾神甯心益智除驚悸之病白茯苓補虛勞多在心脾之有準赤茯苓破結血獨利水道以無過因知麥蘖有助脾化食之功小麥有止汗養心之力白附子去面風之遊走大腹皮治水腫之泛溢椿根白皮主瀉血桑根白皮主喘息桃仁破瘀血兼治腰疼神麴健脾胃而進飲食五加皮堅筋骨以立行柏子仁養心神而有益抑又聞安息香辟惡且止心腹之痛冬瓜仁醒脾實為飲食之資蠶蠶治諸風之喉閉百合

金鑑卷一

六

李光前莊

斂肺勞之嗽痰赤小豆解熱毒瘡腫宜用枇杷葉下逆氣噦嘔可醫連翹排瘡膿與腫毒石楠葉利筋骨與毛皮穀蘖養脾阿魏除邪氣而破積紫河車補血大棗和藥性以開脾然而龜甲治勞瘵兼破癥瘕龜甲堅骨更療崩疾烏梅主便血瘡痢之用竹瀝治中風聲音之失此六十八種平和之藥更宜參本草而求其詳悉也

以上集諸藥品總括成章性分寒熱溫平味注抑揚身治隨症對藥詳義了然在習醫者固當審詳而保幾無天札之虞矣

用藥發明

藥性陰陽論

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味升降浮沉之

能厚薄輕重之用或氣一而味殊或味同而氣異合而言之不可混用分而言之各有所能本乎天者親上本乎地者親下輕清成象重濁成形清陽發腠理濁陰走五臟清中清者榮養神濁中濁者堅強骨髓辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰氣為陽氣厚為陽中之陽氣薄為陽中之陰薄則發泄厚則發熱味為陰味厚為陰中之陰味薄為陰中之陽薄則疏通厚則滋泄升降浮沉之辨豁然貫通始可以言醫而司人命矣人徒知藥之神者乃藥之力也殊不知乃用藥者之力也人徒知辨真偽識藥之為難殊不知分陰陽用藥之為尤難也

標本論

金鑑卷一

用藥發明

七

李光明莊

夫用藥者當知標本以身論之外為標內為本氣為標血為本陽為標陰為本六腑屬陽為標五臟屬陰為本以病論之先受病為本後傳變為標凡治病者先治其本後治其標雖有數病靡弗去矣若先治其標後治其本邪氣滋甚其病益堅若有中滿無問標本先治其滿謂其急也若中滿後有大小便不利亦無問標本先治大小便次治中滿謂尤急也又如先病發熱後病吐瀉飲食不下則先定嘔吐後進飲食方兼治瀉待元氣稍復乃攻熱耳此所謂緩則治其本急則治其標也除大小便不利及中滿吐瀉之外皆先治其本不可不知也假令肝受心火之邪是從前來者為實邪實則瀉其子然

非直瀉其火入肝經藥為之引用瀉火為君是治實邪之病也假令肝受邪邪是從後來者為虛邪虛則補其母入腎經藥為引用補肝藥為君是也標本已得邪氣乃服醫之神良莫越乎此

用藥法

夫用藥之法貴乎明變如風會有古今之異地氣有南北之分天時有寒暑之更稟賦有厚薄之別受病有新舊之延年壽有老少之殊居養有貴賤之辨用藥之際勿好奇勿執一勿輕妄切迅速須慎重精詳圓融活變不妨沉會以期必妥藥於是乎功成昔先賢未有發明後學因而弗講其誤世也不既多乎

雷公藥性賦卷一

八

李光明

夫病有宜補以瀉之之道補之病有宜瀉以補之之道瀉之病有宜寒劑者以熱劑為嚮導之病有宜熱劑者以寒劑為類從之引病在上者治下病在下者治上病同也而藥異病異也而藥同其義至微學者最宜深究用藥之忌在乎欲速欲速則寒熱溫涼行散補瀉未免過當功未獲奏害已隨之夫藥無次序如兵無紀律雖有勇將適以勇而愼事又如理絲緩則可清其緒急則愈堅其結矣

藥有君臣佐使味有輕重厚薄人而知之矣及其用藥也令人復奠其淳不知既經煎沸則輕且薄者業已無味重且厚者不減初煎君臣佐使之宜果安在哉病淺者

猶無大害病深者切勿為之

凡修丸劑須每種各為細末以末之輕重合之則分兩方準不然易細者一嚮無遺難碎者三復不盡函莽若此何怪其無功哉

凡藥苦者直行而泄辛者橫行而散酸者束而收斂鹹者止而軟堅獨是甘之一味可升可降可浮可沉可內可外有和有緩有補有泄蓋土味作甘土位居中而能兼乎五行也

凡藥之在土者中半以上為根其氣上行病在中上焦者用之中半以下為梢其氣下行病在下焦者用之藥之出土者中半以上為苗其氣味上升中半以下為身為

雷公藥性賦卷一

用藥要略

九

李光明

凡藥在上者不厭煩而少在下者不厭頓而多少服則滋榮於上多服則峻補於下

凡病在上者先食而後藥病在下者先藥而後食病在四肢者宜飢食而在晝病在骨髓者宜飽食而在夜

凡煎藥用水亦各有宜如治溼腫浮脹之疾而欲使利水道則取長流水以流長源遠其性通達直引四肢之間

也如治二便不通及足脛以下風溼則取急流水以其湍縱峻急其性速下也如治痰飲鬱滯而欲吐發升散則取逆流水以其性逆倒流洄瀾湧決也如治中氣不

足則取春雨水有陽道發生之意也如治下元不足則取井水蓋清晨井中天一之氣浮結於面以磁器輕取之殊有補陰之功也如治火熱陽證則取雪水能大退熱也如治傷寒陰證奔豚等疾則取甘瀾水蓋盛之於缸揚過千遍水珠沫液盈溢於面其性柔順其味甘溫大能和氣也如治脾胃虛弱泄瀉不食等疾則取池源水蓋土池中停蓄既久不流不動殊有土氣能助脾元也如治陰不升陽不降乖隔諸疾則取陰陽水河井各半陰陽相成可升可降而使氣平者也

古人用藥如弈之射的不第諸其理尤貴擇其道地者製之盡善不然欲以濫惡之劑冀其功驗雖扁鵲再起其可得乎

凡藥有畏惡相反所謂畏者畏其制我不得自縱如半夏畏生薑之類是也所謂惡者惡其異我不得自盡如生薑惡黃芩之類是也統而論之彼所畏者我必惡之我所惡者彼亦畏我相畏相惡之中亦有相成者在因病制方輕重多寡之間耳若所謂相反則各懷酷毒兩仇不共其則必害事也然有大毒之疾又須用大毒之藥以劫之如古方感應丸用巴豆牽牛同劑以為攻堅破積之用四物湯加人參五靈脂以治血塊二陳湯加藜蘆細辛以吐風痰丹溪治屍癰連心散以甘草芫花同劑而謂妙處在此顧良工用之何如耳

藥性升降浮沉補瀉法

足少陰肝 味辛補酸瀉所以制金氣溫補涼瀉
足少陽膽 味辛補酸瀉所以制金氣溫補涼瀉
足太陰脾 味甘補苦瀉氣溫涼寒熱補瀉各從其宜
足少陰腎 味甘補苦瀉氣溫涼寒熱補瀉
手太陰肺 味酸補辛瀉所以制木氣涼補溫瀉
手少陰心 味苦補酸瀉所以制火氣寒補熱瀉
足陽明胃 味苦補酸瀉所以制火氣寒補熱瀉
足太陰脾 味甘補苦瀉氣溫涼寒熱補瀉
五臟更相平也一臟不平則病故曰安穀則昌絕穀則亡仲景云水入於經其血乃成穀入於胃脈道乃行故血不可不養衛不可不溫血溫衛和榮衛將行常有天命矣

五臟所欲

肝欲散急食辛以散之以辛補之以酸瀉之
心欲急食鹹以收之以鹹補之以甘瀉之
脾欲緩急食甘以緩之以甘補之以苦瀉之
肺欲收急食酸以收之以酸補之以辛瀉之
腎欲堅急食苦以堅之以苦補之以鹹瀉之
五臟所苦
肝苦急急食甘以緩之 脾苦溼急食苦以燥之
心苦緩急食酸以收之 腎苦燥急食辛以潤之
肺苦氣上逆急食苦以泄之
五臭湊五臟例
燥氣入肝 腥氣入肺 香氣入脾 焦氣入心

腐氣入腎

五行五色五味走五臟主禁例

東方之木其色青其味酸其臟肝肝主筋木曰曲直作酸
酸走肝筋病人無多食酸

南方之火其色赤其味苦其臟心心主血火曰炎上作苦
苦走心血病人無多食苦

西方之金其色白其味辛其臟肺肺主氣金曰從革作辛
辛走肺氣病人無多食辛

北方之水其色黑其味鹹其臟腎腎主骨水曰潤下作鹹
鹹走腎骨病人無多食鹹

中央之土其色黃其味甘其臟脾脾主肉土曰稼穡作甘
甘走脾肉病人無多食甘

手足三陽表裏引經主治例
太陽足太陽上羌活下黃柏少陰足腎知母黃連

少陽足少陽上柴胡下青皮厥陰足肝青皮柴胡

陽明足陽明上白芷下石膏太陰足脾白芍桔梗

諸藥瀉諸經之火邪
黃連瀉心火○梔子黃芩瀉肺火○白芍瀉脾火○柴胡

黃連瀉肝膽火○知母瀉腎火○木通瀉小腸火○黃
芩瀉大腸火○柴胡黃芩瀉三焦火○黃柏瀉膀胱火

諸藥相反例
甘草反 大戟 芫花 甘遂 海藻

烏頭反

半夏 括蘂 貝母 白芨 白薇
細辛 芍藥 人參 沙參 苦參 丹參

十八反歌
本草明言十八反半萸貝蘖及攻烏藻戟遂芫俱戰草諸

參辛芍叛藜蘆
十九畏歌
硫黃原是火中精朴硝一見便相爭水銀莫與砒霜見狼

毒最怕蜜陀僧巴豆性烈最為上偏與牽牛不順情丁
香莫與鬱金見牙硝難合京三稜川烏草烏不順犀人

參最怕五靈脂官桂善能調冷氣若逢石脂便相欺大
凡修合看順逆炮製炙煎莫相依

雷公藥性賦卷一 用藥發明 十三 李光明莊
六陳歌
枳殼陳皮半夏齊麻黃狼毒及茱萸六般之藥宜陳久入

藥方知奏效奇
五臟補瀉主治例
肝虛者陳皮生薑之類補之虛則補其母腎者肝之母也

熟地黃黃柏補之如無他症錢氏地黃丸主之實則
白芍藥瀉之如無他症錢氏瀉青丸主之實則瀉其子

以甘草瀉心者肝之子也
心虛者炒鹽補之虛則補其母肝者心之母也以生薑補

肝如無他症錢氏安神丸主之實則甘草瀉之如無他
症錢氏方中重則瀉心湯輕則導赤散

症錢氏方中重則瀉心湯輕則導赤散

脾虛者甘草大棗之類補之實則黃連枳實瀉之如無他
症金氏益黃散主之則補其母心乃脾之母以炒鹽
補心實則瀉其子肺乃脾之子以桑白皮瀉肺
肺虛者五味子補之實則桑白皮瀉之如無他症錢氏阿
膠散主之虛則補其母脾乃肺之母以甘草大棗補脾
實則瀉其子腎者肺之子以澤瀉瀉腎
腎虛者熟地黃黃柏補之腎無實不可瀉錢氏止有補腎
地黃丸無瀉腎藥虛則補其母肺乃腎之母以五味子
補肺

以上五臟補瀉素問藏氣法時論
備言之矣欲究其詳再看本論

用藥凡例

雷公藥性賦卷一 用藥發明 十四 李光莊
頭角痛須用川芎血枯亦用○頭頂痛須用藁本○偏身
肢節痛須用羌活風溼亦用○腹中痛須用白芍厚朴
○臍下痛須用黃柏青皮○心下痛須用吳茱萸○胃
脘痛須用草豆蔻○脇下痛須用柴胡日晡潮熱寒熱
往來亦用○莖中痛須用生甘草梢○氣刺痛須用枳
殼○血刺痛須用當歸○心下痞須用枳實○胸中寒
痞須用去白陳皮○腹中窄須用蒼朮○破血須用桃
仁○活血須用當歸○補血須用川芎○調血須用玄
胡索○補元氣須用人參○調諸氣須用木香○破滯
氣須用枳殼青皮○肌表熱須用黃芩去痰亦用○去
痰須用半夏○去風痰須用南星○諸虛熱須用黃芪

盜汗亦用○脾胃受溼須用白朮去痰亦用○下焦溼
腫須用漢防己草龍膽○中焦溼熱須用黃連○下焦
溼熱須用黃芩○煩渴須用白茯苓葛根○嗽者須用
五味子○咳有聲無痰者須用生薑杏仁防風○咳有
聲有痰者須用半夏枳殼防風○喘者須用阿膠天門
冬麥門冬○諸泄瀉須用白芍白朮○諸水瀉須用白
朮白茯苓澤瀉○諸痢疾須用當歸白芍○上部見血
須用防風○中部見血須用黃連○下部見血須用地
榆○眼暴發須用當歸黃連防風○眼久昏暗須用熟
地黃當歸細辛○解利傷風須用防風為君白朮甘草
為佐○解利傷寒須用甘草為君防風白朮為佐○凡
諸風須用防風天麻○諸瘡瘍須用黃柏知母為君茯
苓澤瀉為佐○瘧疾須用柴胡為君隨所發之時所屬
經部分以引經藥導之

以上諸藥此大畧言之以為處方之階
欲究其精於第二卷主治指掌中求之

雷公藥性賦卷之一終

珍珠囊指掌補遺藥性賦卷之二

東垣李杲編輯 金陵鳳笙濮禮儀重校

諸品藥性主治指掌

羌活

羌活味苦甘平性微溫無毒升也陰中之陽也其用有四散肌表八風之邪利周身骨節之痛排巨陽肉腐之疽除新舊風溼之症乃手足太陽表裏引經之藥也

升麻

升麻味苦平性微寒無毒升也陰中之陽也其用有四引葱白散手陽明之風邪引石羔止足陽明之齒痛引諸藥遊行四經升陽氣於至陰之下因名之曰升麻

雷公藥性賦卷二 主治諸藥

柴胡 牛夏爲使 惡皂莢 畏女苑 藜蘆

李光明莊

柴胡味苦平性微寒無毒升也陰中之陽也其用有四左右兩旁脇下痛日晡潮熱往來生在臟調經主內血在肌主氣上行經手足少陽表裏四經之藥也

白芷 當歸爲使 惡旋覆花

白芷味辛性溫無毒升也陽也其用有四去頭面皮膚之風除皮膚燥癢之痺止足陽明頭痛之邪爲手太陰引經之劑

防風 畏葶藶 惡羌活 白薇 荒花

防風味甘辛性溫無毒升也陽也其用有二以氣味能瀉肺以體用通療諸風

當歸 畏葶藶 惡海藻

當歸味甘辛性溫無毒可升可降陽也其用有四頭止血而上行身養血而中守梢破血而下流全活血而不走獨活之使 爲

獨活味苦甘平性微溫無毒升也陰中之陽也其用有三諸風痺眩頸項難伸風寒溼痺兩足不用及爲足少陰之引經

木香 畏火

木香味苦辛性溫無毒降也陰也其用有二調諸氣不可無泄肺氣不可缺

檳榔 忌火

雷公藥性賦卷二 主治諸藥

檳榔味苦辛性溫無毒降也陰也其用有二墜諸藥性如鐵石治後重驗如奔馬

吳茱萸 惡丹麥 藜蘆 石

吳茱萸味苦辛性熱有小毒可升可降陽也其用有四咽噎寒氣噎塞而不通胸中冷氣閉塞而不利脾胃停冷腹痛而不佳心氣刺痛成陣而不止

藿香

藿香味甘性溫無毒可升可降陽也其用有二開胃口能進食止霍亂除嘔逆

川芎 惡黃芪 山茱萸 畏黃連 硝石 滑石

川芎味辛性溫無毒升也陽也其用有二上行頭角助清

陽之氣止痛下行血海養新生之血調經

黃連臣惡菊荒花荒 玄參畏

黃連味苦性寒無毒沉也陰也其用有四瀉心火消心下

痞滿之氣主腸辟除腸中混雜之紅治目疾暴發宜用

療瘡瘍首尾俱同

黃芩臣惡蔥實畏丹

黃芩味苦平性寒無毒可升可降陰也其用有四中枯而

飄者瀉肺火消痰利氣細實而堅者瀉太陽火養陰退

陽中枯而飄者除風溼留熱於肌表細而堅實者滋化

源退熱於膀胱

大黃使無所畏之

大黃味苦性寒無毒其性沉而不浮其用走而不守奪土

鬱而無壅滯定禍亂而致太平因名之曰將軍

黃蘗惡乾

黃蘗味苦性寒無毒沉也陰也其用有五瀉下焦隱伏之

龍火安上焦虛噦之蛇蟲臍下痛則單製而能除腎不

足必炒用而能補痿厥除溼藥中誠不可缺

玄明粉

玄明粉味辛甘酸性微溫無毒沉也陰也其用有二去胃

中之實熱瀉腸中之宿垢其妙不可盡述大抵用此而

代朴硝也

白朮君蒼者米泔水浸白者陳壁土炒

白朮味甘性溫無毒可升可降陽也其用有四利水道有

除溼之功強脾胃有進食之效佐黃芩有安胎之能君

枳實有消痞之妙

人參君茯苓為之使反藜蘆

人參味甘性溫無毒升也陽也其用有三止渴生津液和

中益元氣肺寒則可服肺熱還傷肺

黃芪惡龜甲白鮮

黃芪味甘性溫無毒升也陽也其用有四溫肉分而實腠

理益元氣而補三焦內託陰證之瘡瘍外固表虛之盜

汗

甘草君惡遠志反大戟芫花甘遂海藻

甘草味甘平無毒生之則寒炙之則溫生則分身稍而瀉

火炙則健脾胃而和中解百毒而有效協諸藥而無爭

以其甘能緩急故有國老之稱

半夏使惡皂莢畏雄黃生薑

半夏味辛平性寒熱溫有毒降也陽也其用有四除溼化

痰涎大和脾胃氣痰厥及頭疼非此莫能治

陳皮

陳皮味辛苦性溫無毒可升可降陽中之陰也其用有二

留白補胃和中去白消痰泄氣

青皮

青皮味苦性寒無毒沉也陰也其用有四破滯氣愈低而

愈剋削堅積愈下而愈良引諸藥至厥陰之分下飲食入太陰之倉

枳殼臣使去瓢殼炒令熟用

枳殼味酸苦性微寒無毒沉也陰也其用有四消心下痞塞之痰泄腹中滯塞之氣推胃中隔宿之食削腹內連年之積

枳實臣凡用先去瓢陳久者佳

枳實味苦酸性微寒無毒沉也陰也其用有四消胸中之虛痞逐心下之停水化日久之稠痰削年深之堅積

桔梗臣畏白芨龍眼龍麝草

桔梗味苦辛性微溫有小毒升也陰中之陽也其用有四雷公藥性賦卷二 主治指掌五李光明莊

止咽痛兼除鼻塞利膈氣仍治肺癰一為諸藥之舟楫

一為肺部之引經

知母臣若勿犯鐵器去淨毛鹽酒炒用

知母味苦性寒無毒沉也陰中之陰也其用有四瀉無根之腎火療有汗之骨蒸止虛勞之陽勝滋化源之陰生

藥本臣惡蒲葶畏青箱子

藥本味苦辛性微溫無毒升也陰中之陽也其用有二大寒氣客於巨陽之經苦頭疼流於顛頂之上非此味不除

生地黃臣當歸為之使惡貝母畏蕪荑忌鐵器犯之令人腎消亦忌食萊菔令人髮白

生地黃味甘苦性寒無毒沉也陰也其用有四涼心火之

血熱瀉脾土之溼熱止鼻中之衄熱除五心之煩熱

熟地黃臣使忌畏惡俱同生地性尤泥滯煎酒炒用

熟地黃味甘苦性溫無毒沉也陰也其用有四活血氣填骨髓滋腎水補益真陰傷寒後脛股痠痛新產後臍腹難禁

五味子臣從容為之使惡萎蕤勝烏頭

五味子味酸性溫無毒降也陰也其用有四滋腎經不足之水收肺氣耗散之金除煩熱生津止渴補虛勞益氣強陰

川烏

川烏味辛性熱有毒浮也陽中之陽也其用有二散諸風雷公藥性賦卷二 主治指掌六李光明莊

之寒邪破諸積之冷痛

白芍藥臣惡石解芒硝畏鹽甲大小蘗反黎蘆

白芍藥味酸平性寒有小毒可升可降陰也其用有四扶陽氣大除腹痛收陰氣陡健脾經安其胎能逐其熱損其肝能緩其中

白茯苓臣惡白薇蜜蒙地榆雄黃秦苑龜甲忌醋酸之物中有筋最損目宜去之

白茯苓味甘淡性溫無毒降也陽中之陰也其用有六利竅而除溼益氣而和中小便多而能止大便結而能通心驚悸而能保津液少而能生白者入壬癸赤者入丙丁

澤瀉臣畏海蛤文蛤

澤瀉味甘鹹性寒無毒降也陽中之陰也其用有四去胞
垢而生新水退陰汗而止虛煩主小便淋瀝仙藥療水
病溼腫蠱丹

薄荷葉使

薄荷葉味辛性涼無毒升也陽也其用有二清利六陽之

會首祛除諸熱之風邪

麻黃臣惡辛黃石羣凡用先煮三沸去黃沫否則令人煩悶

麻黃味苦甘性溫無毒升也陰中之陽也其用有二其形

中空散寒邪而發表其節中閉止盜汗而固虛

厚朴惡澤瀉寒水石硝石入藥去粗皮生薑汁炒用

厚朴味苦辛性溫無毒可升可降陰中之陽也其用有二

雷公藥性賦卷二 主治喘咳

苦能下氣去實滿而消腹脹溫能益氣除溼滿散

中

杏仁惡黃芩黃芪葛根凡用去皮尖炒

杏仁味苦甘性溫有毒可升可降陰中之陽也其用有二

利胸中逆氣而喘促潤大腸氣閉而難通

巴豆使惡甘草畏大黃黃連用之去皮心

巴豆味辛性熱有大毒浮也陽中之陽也其用有二削堅

積滯臟腑之沉寒通閉塞利水穀之道路斬關奪門之

將不可輕用

黑附子地膽為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黃芪人參

黑附子味辛性熱有大毒浮也陽中之陽也其性浮而不

沉其用走而不息除六腑之沉寒補三陽之厥逆

蒼朮使惡同白朮茅山產者良

蒼朮氣味主治與白朮同補中除溼力不及白朮中發汗

功過於白

秦艽惡蒲葶為之使畏牛乳

秦艽味苦辛性微溫無毒可升可降陰中之陽也其用

有二除四肢風溼若神療遍體骨疽如金

白僵蠶惡桑葉茶枯神草藤桑燥縮枯硬

白僵蠶味鹹辛性微溫無毒升也陰中之陽也其用有

二去皮膚風動如蟻行主面部野生如漆點

白豆蔻

雷公藥性賦卷二 主治喘咳

白豆蔻味辛性溫無毒升也陽也其用有四破肺中

退目中雲氣散胸中冷氣補上焦元氣

地榆惡麥冬

地榆味苦甘酸性微寒無毒沉也陰也其用有二主下部

積熱之血痢止下焦不禁之月經

連翹使

連翹味苦平性微寒無毒升也陰也其用有二瀉諸經之

客熱散諸腫之瘡瘍

阿膠君畏大黃

阿膠味甘平性微溫無毒降也陽也其用有四保肺益金

之氣止嗽獨咳之痰補虛而安妊胎治痿而強骨力

桃仁香附爲之使
勿用雙仁

桃仁味苦甘平性寒無毒降也陰也其用有二潤大腸血
閉之便難破大腸久蓄之血結

生薑使惡黃芩黃連鼠黃去皮則熱留皮則冷制半夏毒

生薑味辛性溫無毒升也陽也其用有四製半夏有解毒之功佐大棗有厚腸之益溫經散表邪之風益氣止翻胃之穢

石膏 薤子爲之使惡
莽草 巴豆畏鐵

石膏味辛甘性大寒無毒沉也陰也其用有二製火邪清肺氣仲景有白虎之名除胃熱奪癆蝕易老云大寒之

雷公藥性賦

九
半光明莊

木主用君忌生葱皮

桂味辛性熱有毒浮也陽中之陽也氣之薄者桂枝也氣之厚者肉桂也氣薄則發洩桂枝上行而發表氣厚則發熱肉桂下行而補腎此天地親上親下之道也

細辛 畏硝石滑石反藜蘆

細辛味辛性溫無毒升也陽也其用有二止少陰合病之
頭痛散三陽數變之風邪

梔子解羊躑躅及蠶蟲毒

梔子味苦性大寒無毒沉也陰也其用有三療心中懊憹
顛倒而不得眠治臍下血滯小便而不得利易老有云
輕飄而象肺色赤而象火又能瀉肺中之火

葛根
丹石
百藥毒

葛根味甘平性寒無毒可升可降陽中之陰也其用有四
發傷寒之表邪止胃虛之消渴解中酒之奇毒治往來
之溫瘧

枯蘖根枸杞爲之使惡乾

枯槁根味苦性寒無毒沉也陰也其用有二止渴退煩熱
補虛通月經

豬苓

豬苓味淡甘平性溫無毒降也陽中之陰也其用有二除溼腫體用兼備利小水氣味俱長

乾薑臣惡黃
芩黃連

雷公藥性賦

十 李光明莊

乾薑生則味辛炮則味苦可升可降陽也其用有二則
逐寒邪而發表炮則除胃冷而溫中

草龍膽貫眾爲之使惡防葵地黃

草龍膽味苦性寒無毒沉也陰也其用有二退肝經之邪
熱除下焦之溼腫

蘇木

蘇木味甘鹹平性寒無毒可升可降陰也其用有二破瘡
瘍死血非此無功除產後敗血用之立驗

杜仲凡惡蛇蛻去絲

杜仲味辛甘平性溫無毒降也陽也其用有二強志壯筋
骨滋腎止腰痛酥炙去其絲功效如神應

天門冬

君畏曾青凡用去皮亦忌食鯉魚

天門冬味甘平性大寒無毒升也陰也其用有二保肺氣不被熱擾定喘促得康甯

麥門冬

君惡軟冬花苦氣畏苦參凡用抽去心不令人煩

麥門冬味甘平性寒無毒降也陽中之陰也其用有四退肺中隱伏之火生肺中不足之金止煩燥陰得其養補勞虛熱不能侵

木通

木通味甘平性寒無毒降也陽中之陰也其用有二瀉小腸火積而不散利小便熱閉而不通瀉小腸火無他藥可比利小便閉與琥珀同功

雷公藥性賦

卷二 主治指掌

十一

李光明莊

地骨皮

去骨用根皮

地骨皮味甘平性寒無毒升也陰也其用有二療在表無定之風邪主傳屍有汗之骨蒸

桑白皮

桂心麻子爲之使忌見生蠶

桑白皮味甘性寒無毒可升可降陽中之陰也其用有二益元氣不足而補虛勞瀉肺氣有餘而止咳嗽

甘菊花

野菊花味苦者名苦薺大傷胃不宜用又白菊花亦入藥

甘菊花味甘平性微寒無毒可升可降陰中之陽也其用有二散八風上注之頭眩止兩目欲脫之淚出

紅花

紅花味辛性溫無毒陽也其用有四逐腹中惡血而補血

虛之血除產後敗血而止血暈之暈

赤石脂

惡大黃松脂畏芫花

赤石脂味甘酸性溫無毒降也陽中之陰也其用有二固腸胃有收斂之能下胎衣無推蕩之峻

通草

臣

通草味甘平性微寒無毒降也陽中之陰也其用有二陰竅瀉而不利水腫閉而不行瀉閉兩俱立驗固有通草之名

烏梅

烏梅味酸平性溫無毒可升可降陰也其用有二收肺氣除煩止渴主洩痢調胃和中

雷公藥性賦

卷二 主治指掌

十二

李光明莊

川椒

川椒味辛性大熱有毒浮也陽中之陽也其用有二用之於上退兩目之翳膜用之於下除六腑之沉寒

萎蕤

畏鹵鹹蜜水拌蒸用

萎蕤味甘平性溫無毒降也陽中之陰也其用有四風淫四肢不和淚出兩目皆爛男子溼注腰疼女子面生黑

肝皆能療治

秦皮

大戟爲之使惡吳茱萸

秦皮味苦性寒無毒沉也陰也其用有四風寒邪合溼成痺青白色幻翳遮睛女子崩中帶下小兒風熱癩驚

白頭翁

格實爲之使得酒良

頭翁味苦性溫無毒可升可降陰中之陽也其用有四
傳男子陰疝偏腫治小兒頭禿羶腥鼻衄非此不效痢
赤全賴收功

牡蠣貝母爲之使惡麻黃吳茱萸辛夷

牡蠣味鹹平性寒無毒可升可降陰也其用有四男子夢
寐遺精女子赤白崩中榮衛往來虛熱便滑大小腸同

乾漆臣畏難子又忌油脂見蟹黃則化水凡入藥搗碎妙用

乾漆味辛平性溫有毒降也陽中之陰也其用有二削年
深堅結之沉積破日久秘結之瘀血

南星畏附子乾薑生薑

南星味苦辛性溫有毒可升可降陰中之陽也其用有二
雷公藥性賦卷一 主治諸毒 十三 李光明莊

墜中風不省之痰毒主破傷如屍之身強

商陸使忌人肉

商陸味酸辛平性寒有毒降也陽中之陰也其味酸辛其
形類人其用療水其效如神

葶藶榆皮爲之使惡蠶蠶殼

葶藶味苦性寒無毒沉也陰中之陰也其用有四除週身
之浮腫逐膀胱之留熱定肺氣之喘促療積飲之痰厥

海藻臣反甘草

海藻味苦鹹性寒無毒沉也陰中之陰也其用有二利水
道通閉結之便洩水氣消遍身之腫

竹葉竹葉竹次之餘不入藥

竹葉味苦辛平性寒無毒可升可降陽中之陰也其用有
二辟除新舊風邪之煩熱能止喘促氣勝之上衝

葱白同食惡與蜜

葱白味辛性溫無毒升也陽也其用有二散傷風陽明頭
痛之邪主傷寒陽明下痢之苦

天麻其曲名定風草

天麻味辛平性溫無毒降也陽也其用有四療大人風熱
頭眩治小兒風癰驚悸祛諸風麻痺不仁主癰瘰語言

不遂

大棗殺烏頭毒忌生葱

大棗味甘平性溫無毒降也陽也其用有四助脈強神大
雷公藥性賦卷二 主治諸毒 十四 李光明莊

和脾胃

威靈仙忌麪及茶茗

威靈仙味苦性溫無毒可升可降陰中之陽也其用有四
推腹中新舊之滯消胸中痰唾之痞散疴癢皮膚之風

利冷疼腰膝之氣

鼠黏子

鼠黏子味辛平性微寒無毒降也陽也其用有四主風溼
癰瘡盈肌退寒熱咽喉下利散諸腫瘡瘍之毒利凝滯

腰膝之氣

草豆蔻麪包煨熟用

草豆蔻味辛性溫無毒浮也陽也其用有二去脾胃積滯

之寒邪止心腹新舊之疼痛

玄胡索

玄胡索味苦辛性溫無毒可升可降陰中之陽也其用有二活精血能療產後之疾調月水亦主胎前之症

以上凡藥九十品各賦以意章既明其升降浮沉復詩以君臣佐使或一味而內外兼攻各係陰陽表裏或一物而生熱互異更分暑淫風寒解簡意周幾無餘韻誠發前篇之所未盡也其可不熟讀而詳記乎之

用藥須知

用藥法象

天有陰陽 風寒暑溼燥火 三陽三陰上奉之 溫涼

寒熱四氣是也溫熱者天之陽也寒涼者天之陰也此

山公藥性賦卷二 用藥須知 十五 李光明莊

乃天之陰陽也

地有陰陽 金木水火土 生長收藏下應之 辛甘酸

苦鹹五味是也辛甘者地之陽也酸苦鹹者地之陰也

此乃地之陰陽也

陰中有陽陽中有陰 平旦至日中天之陽陽中之陽也

日中至黃昏天之陽陽中之陰也 合夜至雞鳴天

之陰陰中之陰也 雞鳴至平旦天之陰陰中之陽也

人亦應之人身之陰陽外為陽內為陰背為陽腹為陰

為陰腑為陽心肝脾肺腎五臟為陰膽胃大腸小腸膀

胱三焦六腑為陽所以知陰中之陰陽中之陽者何也

如冬病在陰夏病在陽春病在陰秋病在陽知其所在

則施鍼藥也 背為陽陽中之陽心也 背為陽陽中

之陰肺也 腹為陰陰中之陰腎也 腹為陰陰中之

陽肝也 腹為陰陰中之至陰脾也 此係陰陽表裏內

四時用藥法

不問所病或溫或涼或熱或寒如春時有疾於所用藥內

加清涼之藥夏月之疾加大寒之藥秋月有疾加溫氣

之藥冬月有疾加大熱之藥是不絕生化之源也內經

曰必先歲氣無伐天和是為至治又曰無違時無伐化

又曰無伐生生之氣此皆常道用藥之法若反其道

而變生異症矣則當從權施治

用藥丸散

山公藥性賦卷二 用藥須知 十六 李光明莊

仲景云劉如麻豆大與咬咀同意夫咬咀者古之製也古

無鐵刀以口咬細令如麻豆粗為藥煎之使藥水清飲

於腹中則易升易散也此所謂咬咀也今人以刀器割

如麻豆大此咬咀之易成也若一概為細末不分清濁

矣經云清陽發腠理濁陰走五臟果何謂也又曰清陽

實四肢濁陰歸六腑是也咬咀之法取汁清易循行經

絡故也若治至高之病加酒煎去溼加生薑煎補元氣

以大棗煎發散風寒以葱白煎去膈上病以蜜煎散者

細末也不循經絡止去膈上病及臟腑之病氣味厚者

煎服去滓但服百丸者去下部之疾其丸極大而光且

圓治中焦者次之治上焦者則極小稠糊麪丸者取其

遲化直至下焦或酒或醋丸者取其收散之意也
夏南星或去溼者以生薑汁煮糊為丸制其毒也稀糊
丸者取其易化也水浸一宿炊餅為丸及滴水為丸者
皆取易化也煉蜜為丸者取其遲化而氣循經絡也用
蠟為丸者取其難化而旋施功也大抵湯者蕩也去久
病者用之散者散也去急病者用之丸者緩也不能速
去其病用藥舒緩而治之矣

藥本五味歌

酸為木化氣本溫能收能澀利肝經苦為火化氣熱能
燥能堅心臟下甘始土生氣化溼能開緩脾從脾行辛
自金生氣帶燥能開潤瀉通肺竅鹹從水化氣生寒下
雷公藥性賦卷二 用藥須知 十七 李光明莊
走軟堅足腎道淡味方為五行本運用須知造化要

炮製藥歌 六首

芫花本利水非醋不能通萊豆本解毒帶殼不見功草果
消膨效連殼反脹胸黑丑生利水遠志苗毒逢蒲黃生
通血熱補血運通地榆醫血藥連梢不住血陳皮專理
氣留白補胃中附子救陰症生用走皮風草烏解風痺
生用使人蒙人言燒燉用諸石火燉紅入醋堪研末製
度必須工川芎炒去油生用痺病攻炮燉當依計方能
奪化工

知母桑皮天麥門首烏生熟地黃分偏宜竹片銅刀切鐵
器臨之便不馴

烏藥門冬巴戟天蓮心遠志五般全並宜剔去心方妙
則令人煩燥添

厚朴猪苓與茯苓桑皮更有外皮生四般最忌連皮用去
淨方能不耗神

益智仁麻柏子仁更加草菓四般論並宜去殼方為效不
去令人心痞增

四物加味湯炮之蒼朮半夏與陳皮更宜酒洗亦三味從
蓉芍藥及當歸

妊娠服藥禁歌

斑貓水蛭及蝨蟲烏頭附子配天雄野葛水銀并巴豆牛
膝薏苡與蜈蚣三稜芫花代赭麝大戟蟬蛻黃雌雄牙
雷公藥性賦卷二 用藥須知 十八 李光明莊
硝芒硝牡丹桂槐花牽牛皂角同半夏南星與通草瞿
麥乾薑桃仁通硝砂乾漆蟹爪甲地膽茅根都失中

雷公藥性賦卷之二終

珍珠囊指掌補遺藥性賦卷之三

東垣李 呆編輯 金陵鳳笙濮禮儀重校

玉石部

藥能治病醫乃傳方當明藥品貴賤良毒之異須管氣味
取鹹苦辣辛甘

切以金銀珠玉之貴白堊石灰之賤藥性之良則丹砂

鍾乳氣毒則信石礞砂至於五味酸入肝鹹入腎苦入

心辛入肺甘入脾辣則有溫涼寒熱之異

功力有急緩性質有溫涼

其如朴硝之性急若煎作芒硝性乃緩慢矣

本草之作肇始炎皇

南公藥性賦卷三 玉石部

肇即始也炎皇神農氏也本草之爲書由神農嘗百草

一日而遭七十毒始與醫藥相救謂之本草

水言草木之品彙且提玉石之紀綱

倣本草圖經以玉石部爲先而草木之品次之

金屑玉屑辰砂石牀能驅邪而通鬼祟可定魄而制顛狂

止渴除煩安鎮靈臺明目補精益氣依經鍊服壽延長

金屑味辛平有毒處處有之梁益靈州最多出水砂中

得屑謂之生金若不鍊服之殺人○玉屑味甘平無毒

生藍田○丹砂一名硃砂味甘微寒無毒惟辰州者最

佳故謂之辰砂生深山石崖間穴地數十尺始見其苗

乃白石耳謂之硃砂牀即石牀也砂生石牀上亦有淘

土石中得之非生於石者又按本草石牀自有本條味

甘溫無毒謂鍾乳水下凝積生如筍狀漸長久與鍾乳

相接爲柱出鍾乳室中謂之石牀人心謂之靈臺金屑

玉屑辰砂石牀四品之性主治相同皆可依圖經法鍊

服食則延年不老

生銀屑鎮驚安五臟鍾乳粉補虛而助陽

銀屑味辛平有毒生銀屑當取見成銀箔以水銀消之

爲泥合硝石及鹽研爲粉燒出水銀淘去鹽石爲粉極

細用之○石鍾乳味甘溫無毒道州者佳須煉服之不

然使人病淋治咳嗽行乳道補髓添精強陽益肺家

代赭石能墮胎而可攻崩漏伏龍肝治產難而吐血尤良

雷公藥性賦卷三 玉石部

代赭石用火煅醋淬七遍研水飛味甘寒無毒出代州

其色赤故名代赭石養血氣強精辟邪畏天雄附子○

伏龍肝竈中土也味辛溫微毒消癰腫催生下胞止血

崩

雲母補勞傷兼明目水銀除疥癬與瘡瘍

雲母石味甘平無毒安五臟堅肌止痢局方有法煎雲

母膏治癰疽惡毒等瘡○水銀即硃砂液能消化金銀

使成泥味辛寒有毒一名汞畏磁石難產可用催生

治喉風理鼻息功全礬石止漏下破癥結用禹餘糧

礬石味酸寒無毒出晉州者佳化痰止咳攻陰蝕諸瘡

漏煨過謂之枯礬亦可生用○禹餘糧火煅醋淬七次

搗細水飛味甘寒平無毒出潞州形如鷲鴨卵外有殼
重疊者是其中有黃細末如蒲黃者謂之石中黃
朴硝開積聚化停痰煎作芒硝功御緩硝石止煩燥除熱
毒鍊之須掃地邊霜

朴硝味苦辛大寒無毒生益州初採掃得一煎而成故
曰朴硝再取朴硝淋汁煉之有細芒者謂之芒硝專治
傷寒○硝石味辛苦寒無毒即掃地霜淋汁煉成者
打破墮人得空青而依然復舊胎宮乏孕紫石英有再弄
之璋

空青味甘酸寒無毒生於有銅處銅精氣熏則生今信
州時有之其腹中空破之有漿者絕難得大者如雞子
雷公藥性賦卷三 玉石部 李光明莊

小者如豆子治眼翳障為最要又有曾青出銅處色理
亦無異但其形纍纍連珠相綴其中不空與空青功效
不相上下○紫石英味甘辛溫無毒專治女子風寒在
子宮絕孕十年無子又有白石英治風溼痺安魂魄強
陰道黃赤黑色皆不入藥

熱渴急救寒水石壯陽須索石硫黃

寒水石一名凝水石味甘寒無毒出汾州及邯鄲即
之精也治火燒丹毒能解巴豆毒畏地榆○硫黃味酸
溫大熱有大毒出廣州治疥蟲蠱瘡堅筋療老人風秘
腎臟既衰煅磁石而強陽道勝脫不利妙食鹽以熨臍傍
磁石味辛鹹寒無毒有鐵處則生惡牡丹皮畏黃石脂

能吸鐵補益勞傷兼治耳聾○食鹽味鹹溫無毒解州
者勝治霍亂痰癖可用吐之

水銀飛煉成輕粉殺諸疥癬善治兒疳石灰風化方為勝
不堪服食可療金瘡

輕粉即水銀粉味辛冷無毒畏磁石忌一切血○五月
五日採百草搗汁調煅過石灰末作團陰乾專治金瘡
刀斧傷處不堪入藥

石膏發汗解肌去風寒熱滑石除煩止渴快利、腸

石膏味甘辛大寒無毒與方解石相類須用細理白澤
者真治頭痛解肌發汗黃色者服之使人淋○滑石味
甘寒無毒用白色軟嫩者佳能益精除熱療女人產難
雷公藥性賦卷三 玉石部 李光明莊

殺三蟲破癥結胡粉一名為粉錫斂金瘡淘眼暗銅青銅
綠竟無雙

胡粉一名粉錫一名定粉俗名光粉即今化鉛所作婦
人容面者味辛寒無毒○銅青銅綠以醋沃銅上即生
乃銅之精也微有毒不可入藥

吐痰抵痔蜜陀僧兼抹野斑隨手沒生肌止痛無名異折
傷可理并金傷

蜜陀僧即煅銀爐底也味酸辛有毒○無名異味甘平
無毒金傷謂刀斧傷也

硼砂攻喉痹止嗽消痰真有理膽礬除熱毒諸癰痰氣盡
消詳

礪砂一名蓬砂味苦辛煖無毒出南番者色重褐其味和共效速出西戎者其色白其味雜其功緩不堪入藥作金瘡摻藥用之○膽礪圖經作石膽味酸辛寒有毒信州有之生於銅坑中採得煎煉而成消熱毒療諸風癰瘰可吐風痰

伏火靈砂辟鬼邪安魂魄明目鎮心通血脉藏泥白堊除洩痢破癥瘕潰精止漏又爲良

靈砂一名二氣砂用水銀一兩硫黃六銖研細二味先同炒作青砂色後入水既濟爐中抽之如束計紆者成就也惡磁石畏酸水○白堊卽白善土味苦辛溫無毒處處有之採無時

雷公藥性賦卷三 玉石部

五 李光明莊

石燕治淋催難產黑鉛安鎮髮蛇瘡

石燕產零陵州形似燕其實石也性涼無毒女人產難兩手各握一枚胎立出○黑鉛味甘無毒有銀坑處皆有粉錫胡粉光粉皆化鉛所作又鉛白霜以鉛雜水銀煉作片置醋甕中密封經久成霜謂之鉛白霜性極冷

髮蛇創傷也與瘡同

黃丹乃是熬鉛作生肌止痛礪石特生非常熟養就丹房黃丹圖經作鉛丹又名黃丹用時炒令赤色研細味辛微溫無毒止吐逆療癰腫傳金瘡良○礪石俗呼鎮風石味辛甘大熱有毒寒置水中令水不冰性堅硬而拒火燒之一日夜方解散攻擊積聚癰冷之病最良須

眞者必取鵲巢中團卵而助煖氣者方眞乃修眞煉丹之藥品

血暈昏迷法鍊廣生花蕊石折傷排膿火燒醋淬自然銅花蕊石出陝州閿鄉縣性至堅硬保金瘡止血局方以硫黃合和花蕊石如法鍊成專治產後血暈去惡血○自然銅味辛平無毒出銅處有之形方而大小不等似銅實石也不從礦鍊自然而生故曰自然銅也

礪砂能破癥瘕積聚若還生用爛心腸信石可吐膈內風痰倘中其毒促人亡

雷公藥性賦卷三 玉石部

六 李光明莊

石味苦酸有大毒主諸瘡風痰在胸膈可作吐藥用不宜多服能傷人命若誤中礪砂砒霜二毒急宜冷水調菜豆汁飲之可解

梁上塵消軟癰通喉噎橫生立產并泉石性寒涼攻火熱除翳神方

梁上塵一名烏龍尾性微寒無毒凡使須去烟火遠高堂佛殿上者拂下篩而用之○并泉石性大寒無毒處

處有之以饒陽郡者爲勝得菊花梔子最良療癰冷止頭疼無遺太陰玄精石安心志制頭狂証知鐵粉和鐵漿

玄精石出解州解縣今解地積鹽倉中方有之其色青

白龜背者良味鹹溫無毒○鐵味辛有毒取鐵浸之經久色青沫出可染皂者為鐵漿治頭狂鐵挺作片段置醋糟中積久生衣刮取為屑鐵粉能安心志

雄黃雌黃同山所生向陽處生雄黃山陰有金處金精

煉服久則轉身可入仙家
金石之品味治病得以推詳
總括上文諸藥悉可對證而施治也

雷公藥性賦卷三 金石部 七 李光明莊

草部上

觀夫天生蒸民地生百草人生不無札瘥之常以致病於

蒿蒲開心明目去溼痺風寒菊花消溼散痺風主頭眩

甘平無毒主解百毒為眾藥之王故號國老反大戟荒

花甘遂海藻

白朮益脾止瀉嘔若動氣不宜蒼朮平胃壓山嵐用米泔

白朮味甘辛無毒主風寒濕痺益脾胃補虛勞消腫傷

生地黃能行血兼止吐衄折傷熱地黃能補血更治虛勞

地黃淨洗酒浸蒸兩三次焙乾味甘苦溫無毒熟乾則

天門冬鎮心止吐血衄血性寒而能補大虛麥門冬解渴

平微寒無毒二味並抽去心焙乾用

地膚子車前子除熱去風明眼目能使膀胱水道通菟絲

土酒浸一宿蒸過乘熱搗成膏焙乾再入藥方可研末

牛膝補虛藥膝痛月經若閉亦能通柴胡去熱治勞傷主
療傷寒功到

牛膝味苦酸平無毒○柴胡味苦平辛微寒無毒治溼

痺拘攣可用煎湯浴之下氣消痰止渴傷寒為要藥

草決明瀉肝熱明目驅風兼治鼻淵草龍膽益肝虛驚惕

無憂疳蟲可掃

草決明味鹹苦甘平微寒無毒○草龍膽味苦寒無毒

益肝明目最治疸

菴蒿子性苦寒風寒溼痺水皆寬茵陳蒿性苦冷時氣發

黃淋可導

菴蒿處處有之味苦微寒無毒人服輕身明目○茵陳

苗公藥性賦卷三 草部上 九 李光明莊

蒿味苦平微寒無毒治淋難小便閉澀不通

遠志一名小草堪收夢裏遺精黃精俗字山薑久服延年

不老

遠志要去骨以甘草湯浸黃炒乾味苦溫無毒苗名小

草一似麻黃但無節能令人生智慧定心驚○黃精俗

呼山薑味甘平無毒然與鈎吻相似但一善一惡要仔

細辨認切勿誤用鈎吻則傷人至死故謂之鈎吻

北五味補虛下氣止嗽強筋麻木香止痢健脾氣疼是實

五味子味酸甘鹹苦辛故名五味性溫無毒止渴消酒

毒○木香形如枯骨者佳不見火味辛溫無毒去膀胱

冷氣除癥瘕止瀉痢

金瘡止血王不留行是名剪金花風癰赤丹本草景天即
是慎火草

王不留行味苦平無毒可催生產利月經○景天味苦

酸平無毒主勞煩大熱瘡女人漏下用花良

絡石治癰瘡消熱毒苗似龍鱗川芎醫頭痛主筋攣形如

雀腦

絡石為君即石鱗又名龍鱗辟荔味苦溫微寒無毒畏

貝母菖蒲○川芎一名芎藭明目瘡家止痛味辛溫無

毒靡蕪即其苗也白芷為之使

金釵石斛能使元陽壯腰疼膝痛並皆驅鬼臉升麻用解

百毒消癰疽斑瘡靈可效

雷公藥性賦卷三 草部上 十 李光明莊

石斛草味甘平無毒入腎壯陽平胃氣○升麻味苦平

微寒無毒能解一切毒除溼去風為傷寒時氣之要也

煙塵續斷安胎產療金瘡速不可遲染絳茜根理風寒止

吐蟲須宜乎早

續斷味苦辛微寒無毒最能接骨因名續斷○茜根一

作蒨即今染絳茜草根也味苦微寒解中蠱毒

虺蛇蛇牀同一種治風溼癢及陰瘡羌活獨活本來同頭

痛筋攣風氣攣

虺牀即蛇牀味苦辛甘平無毒○羌活獨活本同類但

紫色而節密者為羌活黃色而作塊者為獨活味苦甘

平微溫無毒並出蜀漢功用相同惟猛烈之氣則羌活

過之

細辛苦積能溫中下氣仍主腦腰疼意以萎蕤治痺弱筋

細辛味辛溫無毒主拘攣風痺明目治痿破婦人血閉

○薯蕷俗名山藥味甘溫平無毒補心氣不足鎮心神

○薏苡仁味甘寒無毒主肺氣肺癰○萎蕤葉似黃精

味甘平無毒切勿誤用鈎吻則傷人

止渴補虛收盜汗黃耆奏莫大之功消癰散腫有高能忍

冬是至賤之草

黃耆味甘微溫無毒主虛勞強筋治耳聾止痛排膿○

忍冬草即驚驚藤又名金銀花其蔓左纏亦名左纏藤

味甘溫無毒今處處有之

澤瀉會除諸般瀉弭渴疏淋防風主治一切風仍獨頭痛

澤瀉味甘寒鹹無毒止洩精逐膀胱水多服令人眼病

○防風味甘辛溫無毒能解附子毒明目止汗療崩

疾藜陰煎湯頭痛煎酒黃行血用生止血用炒

疾藜味苦辛溫微寒無毒破血催生若風瘡陰瘡煎湯

作浴頭痛煎酒服○蒲黃味甘平無毒生則味滑炒熟

則味澀

從蓉扶女子陰絕與男子陽絕補精養腎生自馬精黃連

理大人諸熱却小兒疳熱止痛厚腸胃稱馬爪

肉從蓉味甘酸鹹微寒無毒言是馬精落地所生生時

似肉作羹補虛最佳○黃連味苦寒無毒點眼可除熱

更治消中口瘡良

漏蘆行乳汁消癰癰腸風丹參補胎氣利月經為吉

漏蘆味苦鹹寒無毒醫瘡癰癰眼目理損傷續筋骨○

丹參味苦微寒無毒除積聚破癥瘕益氣去煩滿一名

赤參

更分佐使君臣是曰神聖功巧

望而知之謂神聞而知之謂聖問而知之謂功切而知

之謂巧望聞問切是謂醫家之四診也

草部中

抑又聞芍藥苦平赤者破血通經而白者可安胎止痛辛

薑大熱生則嘔家聖藥而乾者除霍亂肚疼

芍藥為臣味苦酸平微寒有小毒惡石斛芒硝畏硝石

反藜蘆芍有赤白二種白者補虛止汗赤者除熱明目

○辛薑為使有生用有乾用乾者味辛溫大熱無毒溫

中止血逐痺風溼生者味辛微溫無毒處處有之用熱

即去皮用冷即留皮發散傷寒下氣為嘔家聖藥

葛根止渴解醉發散傷寒消熱毒聖藥開通關格宜癰腫

子更催生

葛根味甘寒無毒○葛麥止用實殼不用莖葉味苦寒

無毒

栝實曰天瓜實治乳癰根可止渴唇耳即葉耳子能明目

藥解風纏

枯葉根名天花粉味苦寒無毒即瓜蔓。蒼耳味甘溫有小毒今處處有之主學癰瘰風寒。

玄參攻喉痛苦參攻腸風並可消癰破癥結貝母人面瘡知母潤心肺皆能止嗽理傷寒。

玄參即山麻味苦鹹微寒無毒今處處有之除風溼明眼目。○苦參味苦寒無毒殺疥蟲治瘡毒。○貝母味苦辛平微寒無毒專治腿膝人面瘡及諸癰毒。○知母味苦寒無毒除熱止渴。

白薇本消淋露更治風狂并除溫瘧白芷能除血崩諸攻頭痛亦用排膿。

雷公藥性賦卷三 李光明莊

白薇味苦鹹平大寒無毒如葱管者佳。○白芷味辛溫無毒專治蛇咬研末搽咬處或搗汁浸傷處並效。

當歸主補血虛勞止血用頭破血用尾麻黃發散攻頭痛發汗用葉止汗用根。

當歸酒浸焙味苦辛溫無毒。○麻黃味苦溫無毒大劑功同小劑治癰腫血崩吐衄小劑不如大劑療傷寒熱毒時行。

大劑小劑味甘溫今處處有之。○小青大青味苦大寒無毒處處有之古方只用大青。

京三稜蓬莪朮破血消癥脘心脾腹痛白荳蔻寧澄茄溫脾健胃能消食寬膨。

三稜味苦平無毒。○莪朮又曰莪艾味苦平溫無毒。○白荳蔻味辛大溫無毒。○草澄茄味辛溫無毒。

鬱金勝似薑黃行經下氣川芎貴乎藥本頭痛皆痊。○鬱金須用蜀中如蟬肚者佳味苦辛寒無毒薑黃說見下文。○川芎解見草部上芎藭下。○藥本俗曰土芎味辛微溫寒無毒主風入四肢畏青箱子。

前胡柴胡功無優劣通醫熱病主療傷寒。○前胡味苦微寒無毒下氣消痰推陳致新安胎止嗽。○柴胡見草部上。

薑黃烈似鬱金功下氣消癰通經破血薑撥味如良薑辣轉筋霍亂心痛連翹。○連翹即頭。

雷公藥性賦卷三 李光明莊

薑黃處處有之味辛苦大寒無毒鬱金解見前。○薑撥味辛大寒無毒溫中下氣。○高良薑味辛溫大熱無毒剪草入疥瘡之氣王瓜導乳汁之泉。

剪草味苦平無毒婺州產者最良根名白藥治金瘡。○方以剪草末蜜和九蒸九曬成膏可醫一切失血。○王瓜一名落鴟瓜一名土瓜結子如彈丸生青熟亦可噉。○閩俗謂之毛桃其根止渴散癰除疽消癥下血。

通草元來即木通治淋退疸鯨魚一名馬蘭子去溼醫崩。○通草味辛甘平無毒除寒熱出音聲治耳聾。○馬蘭子味甘平溫無毒去風寒溼痹。

百合甯心可除欬痰有血秦艽治疸時行勞熱猶能。

子 41-110

百合味甘平無毒除熱欬攻發背癰腫消脹利大小便

○秦艽味苦平微溫無毒消浮腫利小便

黃芩解熱通淋女子崩因熱者紫苑化痰定喘欬嗽吐有紅涎

黃芩味苦平大寒無毒治黃疸止痢女子血崩本性熱者用良虛寒者不可用○紫苑茸味苦辛溫無毒補虛

止渴安五臟通結氣掃胸中紅涎痰中有血膿也

澤蘭行損傷之血紫草制痘疹之偏

澤蘭味苦甘微溫無毒消四肢浮腫攻癰腫排膿○紫

草味苦寒無毒通九竅退腫通淋

石葦透膀胱之便防已治風熱拘攣

雷公藥性賦卷三

十五 李光明莊

石葦味苦甘平無毒去熱除邪臨用刷去毛不然令人咳嗽不已○防已味辛苦平溫無毒治水腫風腫退產

止嗽

肉豆蔻補脾治痢猶調冷瀉欬冬花洗肝明目勞嗽宜

肉豆蔻用麩裹煨熟味辛溫無毒解酒消食調中兼治

霍亂○欬冬花味辛甘溫無毒定喘消痰

淫羊藿即仙靈脾補腎虛興陽絕不起補骨脂名破故紙

扶腎冷絕夢洩精殘

淫羊藿味辛寒無毒主治冷風寒氣○補骨脂味辛大

溫無毒主血氣勞傷

紫驚熱殺疳蟲蘆薈俗呼為象膽解風纏宣痘疹牛蒡元

來號鼠黏

蘆薈味苦寒無毒以其味苦故名象膽主癰癤瘡痔○

牛蒡一名惡實又名鼠黏明目消瘡毒手足筋攣味辛

平處處有之

海藻海帶一般疝氣癰瘤同有效水萍雖分三種熱風隱

疹並權衡

海藻洗去鹹水焙乾用味苦鹹寒無毒○水萍有三種

止渴治火瘡通小便消水氣味辛鹹寒無毒

艾葉可生可熟漏血安胎嘔吐衄紅還可止阿魏有真有

假殺蟲破積傳屍亦可保天年

艾葉處處有之味苦溫無毒生者治下痢止吐血取汁

雷公藥性賦卷三

十六 李光明莊

用之熟者治漏血可為丸灸百病○阿魏味辛平無毒難得真者氣極臭而能止臭氣

敗醬婦人產後用酸漿催產易於生

敗醬味苦鹹平無毒因作敗腐豆漿氣故名敗醬陳豆

甫作婦人科方說是苦薺菜仲景方治腹癰○酸漿味

酸平寒無毒處處有之即酸漿草也主熱除煩通淋止

崩產難胎衣不下者吞其實即出

茴香治霍亂轉筋更通氣昆布消癰瘰結硬水腫為先

茴香一名懷香子味辛平無毒開胃調中得酒良○昆

布味鹹酸性冷寒無毒與海藻同科治癰瘰

百部除肺熱久年勞嗽天麻逐諸風溼痺拘攣

百部味苦微寒無毒治疥癬去風○天麻味辛平無毒益氣強筋骨名赤箭

牡丹可行經下血地榆止血痢宜然

牡丹味辛苦寒無毒止痛除邪氣療驚癇中風續筋補骨破癰○地榆味苦甘酸微寒無毒惡麥門冬止痛排膿治金瘡女人帶下良

香附縮砂消食化氣煖胃溫脾皆婦人要藥狗脊草薺扶老補虛腰疼腳弱與溼痺牽纏

香附子即莎草根味甘微寒無毒處處有之○縮砂去皮取仁用味辛溫無毒止瀉痢炒過除妊娠婦腹痛○

狗脊味苦甘平微溫無毒○草薺川中者為道地味苦

甘平無毒

紅花本能行血白鮮瘡疥利便

紅花本草作紅藍花味辛溫無毒主產後血暈昏迷可作胭脂治小兒疳耳○白鮮皮味苦鹹寒無毒除疸通淋主風癰手足不舉調經水療陰痛

風寒溼痺腎冷與遺精當知石龍芮勞熱骨蒸兼兒疳驚痢須用胡黃連

石龍芮味苦平無毒長蛇蛻茱萸平胃氣主關節不通

○胡黃連味苦平無毒折斷起烟塵者是

白茅花能止吐衄血玄胡索可截腹心疼

白茅根味甘寒無毒處處有之通血除煩渴治淋利小

便花止吐衄血茅針搗傅金瘡良○玄胡索味辛溫無毒治女人月水不下行腎氣

甘松香浴體令香專辟惡氣使君子乃醫蟲藥疳瀉如仙

甘松味甘溫無毒下氣治心腹痛○使君子用熱灰中和殼炮去皮殼取肉用味甘溫無毒因郭使君用此故名使君子

斯酒稱為中品是誠玄奧之術

草部下

因知性甘大熱附子烏雄可回陽而逐冷祛風溼而建中

附子國圓平正重一兩以上者佳主心腹冷痛攻欬逆

破癥結墮胎止痢除風寒溼痺強陰道○烏頭與附子

雷公藥性賦卷三 草部下 李光明莊

同種以原種之母為烏頭破積除寒溼及中風邪惡風

墮胎攻腹痛消積飲○天雄似附子但廣身長三四寸

許有鬚性烈一如烏附逐痺除風助陽○附子烏頭天

雄味並辛甘溫大熱有毒出三建故名建中

半夏止吐去痰有毒必須薑製大黃通腸滌熱快駿因號將軍

半夏味辛平生微寒熱溫並有毒五月夏至生故名半

夏健脾止嘔去痰涎今病除生令人吐合生薑和煎

方制其毒○大黃味苦寒無毒黃芩為之使無所畏宣

氣消癰除結熱通瘀血瀉燥屎推舊致新性至快

木賊青箱開眼翳羊蹄鶴蝩殺三蟲

木賊味甘微苦無毒攻積塊腸風下痢止女人赤白帶下○青箱子味苦微寒無毒即白雞冠花子主皮膚熱濕肝熱去風除癢殺蟲○羊蹄俗呼爲禿菜根味苦寒無毒攻疥癬治女人陰蝕瘡痔殺諸蟲○鶴蝮味苦平有毒即火欬草主蛔蟲咬心痛

與甘草相刑甘遂能消腫破癥大戟通利水道兼除蠱毒與烏頭相反白藪治腸風癰腫白芨能破癰疽并台跟破

非東裂也

甘遂大戟味並苦甘寒有毒治病之功不相上下故並反甘草○白藪與白芨味並苦辛甘平無毒同反烏頭療疾大同小異

雷公藥性賦卷三

草部下

十九 李光明莊

風攻皮膚羊躑躅熱主嗽喘馬兜鈴

羊躑躅味辛有毒羊誤食其苗葉則躑躅而死故得名

消蠱毒攻諸癰賊風○馬兜鈴味苦寒無毒治肺熱咳嗽喘促兼癢瘡血痔其根名土木香又曰青木香結子

如鈴狀故名兜鈴

劉寄奴破血行經金瘡最妙續隨子消癥蕩滯蠱毒尤攻

劉寄奴味苦溫治湯火傷及金瘡最妙因劉裕小名寄奴取此草以療金瘡得效故名○續隨子即聯步味辛

溫有毒最治蛇傷

祛風逐瘀白附子刮磨腸垢白頭翁

白附子味甘平溫無毒能行藥勢主心疼腹痛○白頭

翁處處有之謂之翁者鬚根有白茸故名之仲景以此治溫瘧又治金瘡蝕血

何首烏久服延年可消瘡腫骨碎補折傷克效及耳鳴聾何首烏味苦澆微溫無毒背有老人姓何見藤夜交遂採其根食之白髮變黑因此名之○骨碎補味苦溫無毒一名猿孫薑根生緣樹上能補骨碎折傷因名之

瀉肺消痰下水去浮亭慈子通經散腫開喉明目射干功

亭慈味辛苦寒無毒生道旁處處有之有甜苦二種○射干味苦平微溫無毒一名烏扇俗曰仙人掌

常山吐涎截瘧瘧若止搖攔風良苦音浪湯

常山味苦辛有毒形如雞骨者佳苗名蜀漆○葦君子處處有之味苦辛有毒一名天仙子雖云有毒得甘草

雷公藥性賦卷三

草部下

二十 李光明莊

升麻即解連翹除心熱破癰瘡堪行月水桔梗瀉肺癰清喉痛止嗽

寬胸連翹味苦平無毒分大小二種利小便治癰疽發背

○桔梗味辛苦微寒有小毒又有一種名苦梗藥性相

同

海金沙用日中收攻傷寒熱病穀精草從田中採破翳膜遮睛

海金沙俗名竹園葵處處有之收金法以紙襯之日中曬熱以杖擊之其枝葉自然有沙落紙上旋收之當利

小利得蓬砂梔子馬牙硝最良○穀精草一名鼓槌草

又曰帶星草生田中味辛溫無毒治咽喉痹止齒痛

紫河車即蚤休癰瘡至聖商陸根名樟柳退腫之宗

紫河車名金線重樓味苦微寒無毒主治癰疽驚熱○

商陸味辛酸平有毒赤白二種白者消水腫和如人形

者有神赤者不入藥

紫蘆為瘡疥之藥買眾殺寸白諸蟲

紫蘆味辛苦寒有毒俗名山櫻反細辛芍藥可吐風痰

不入湯藥尚主疥蝨瘡瘍○貫眾味苦微寒有毒治金

瘡破癥結止鼻紅

草蒿一本作青蒿滅骨蒸勞熱旋覆花草名金沸消痰嗽

雷公藥性賦卷二 草部下

二十一 李光明莊

之疾

草蒿味苦寒無毒處處有之根苗子葉皆入藥但各自

有用用子勿用葉用根勿用苗四者若齊用則有損無

益得童便浸尤良亦可煎湯洗瘡除疥蝨○旋覆花味

鹹甘溫微冷有小毒通膀胱水去風溼止嘔

此麻子善主催生搗膏敷脚版威靈仙能消骨鯁髮汁灌

喉嚨

莊麻子味甘辛有小毒瘡癢研榨油搽敷水燉研服良

○威靈仙味苦溫無毒主宣氣去冷消痰癢折傷治諸

風

馬鞭草能通月水不行破癥瘕之癖葫蘆巴善補元陽腎

冷癰疔氣之癰

馬鞭草味甘苦寒有小毒其草穗類鞭梢因名之俗謂

之鐵掃帚治溼癰陰瘡○葫蘆巴得茴香桃仁同用逐

膀胱疝氣得硫黃附子同用補腎經

萱草治淋孕婦其花生男子燈心去熱燒灰善止夜啼童

萱草一名鹿葱其性涼而無毒處處有之孕婦佩帶其

花即生男子故又名宜男草○燈心性涼破傷處搗敷

最良

山豆根療咽喉頭瘡五痔金星草治丹毒發背諸癰

山豆根味甘寒無毒消腫毒止熱嗽○金星草至冬時

則背有黃星點點成行味苦寒無毒解硫黃毒

雷公藥性賦卷二 草部下

二十二 李光明莊

狼毒驅九種心痛癰毒掃溼痺諸風

狼毒味辛平有大毒重而沉水者良主咳逆治蟲疽瘰

癧結痰○稀莨即火欬草味苦寒有小毒形似鶴蝩昔

有知州張詠嘗進此方治諸風

夏枯草最治頭瘡癰癭癰同可覓天南星能下氣風

痰腦痛止怔忡

夏枯草至夏即枯故名味苦辛寒無毒○天南星處處

有之味苦辛有毒散血墮胎消癰腫

退腫消風牽牛子第一諸瘡解毒山茨菰最雄

牽牛子炒過用味苦寒有毒處處有之下氣通腸利大

小便墮胎治腰疼脚痛○山茨菰即鬼燈檠又名金

燈花瘡腫癰疽瘰癧消毒良

仙茅伸風者之腳癰補虛堅骨芋根涼小兒之丹毒安護

胎宮

仙茅味辛溫無毒治虛勞逐冷氣益陽堅骨生長精神

○芋根補血安胎止渴兼小兒母毒

茵芋理寒熱似瘡屋遊斷國紐縱橫

茵芋味苦溫有毒止心腹痛通關節主風寒溼痺○屋

遊即瓦上青苔味苦寒無毒逐膀胱水止皮膚寒熱

本草編成斯賦發醫家初學童蒙

雷公藥性賦卷三

李光明註

雷公藥性賦卷之三終

珍珠囊指掌補遺藥性賦卷之四

東垣李杲編輯 金陵鳳笙濮禮儀重校

木部

豈不以勞傷須桂肉斂汗用桂枝俱可行經破癖炒過免

墮胎兒

桂味甘辛大熱有小毒得人參熟地黃紫石英畏生

葱

五痔傷風稱槐角瘡瘍煞疥疥松脂

槐角質味酸鹹寒無毒今處處有之除熱氣主火燒瘡

皮灌漱風疔齒○松脂味甘溫無毒處處有之道家

服餌輕身延年○松子味甘溫無毒可供果品葉與根

雷公藥性賦卷四

李光明註

白皮味苦溫無毒主辟穀不飢○松節溫治歷節風

柏葉止吐衄崩帶安五臟鎮驚悸去殼取仁於柏子枸杞

益精氣明目退虛勞寒熱須用其根地骨皮

柏葉味苦微溫無毒四時各依方向採取陰乾用柏白

皮主火燒爛瘡○枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒處

處有之惟陝西甘肅者最良

茯苓有赤白二種赤者通利小便白者可補虛定悸乾漆

有生熟兩般生則損人腸胃炒熟通月水愆期

茯苓味甘平無毒多年松根之氣薰炮而生有赤白二

種並除寒熱止渴消痰而赤者諸主利小便分水穀白

者尚補虛定悸○乾漆味辛溫有毒須炒熟用則無毒

去癥續骨殺蟲除心氣血痛

茯神則生志收驚開心益智琥珀則鎮心定魄淋病偏宜

多益心脾主風虛○琥珀味甘平無毒是松脂入地中

多年則化成

職掌虛煩斂汗必須酸棗性行通利消浮當用榆皮

酸棗仁味酸平無毒安五臟除風痺能堅骨補中寧心

定志○榆皮味甘平無毒性滑通行大小便消浮腫治

小兒白禿下婦人胎元

攻赤口清頭風堅齒輕身蔓荊子斂金瘡除腰痛治風桑

上寄生枝

雷公藥性賦卷四 木部 李光明註

蔓荊子味苦辛微寒溫無毒通關竅去寸白蟲除筋骨

中寒熱○桑寄生一名寓木味苦甘平無毒并治崩中

補內傷胎前產後皆宜用

蒿痢有功訶梨勒同名訶子頭眩鼻塞木筆花乃是辛夷

訶子味苦溫無毒開胃進食清痰治崩漏及腸風下血

兼上奔豚冷氣○辛夷味苦辛無毒處處有之南人謂

之迎春木久服輕身奈老二月開花色白帶紫花落無

子至夏復開花出初如筆故北人呼為木筆花主頭眩

鼻塞最良

烏藥主寬膨順氣沒藥主跌腳金瘡血氣相攻諸疼共理

秦椒能明目通喉蜀椒能消精止癖溫中下氣風痺同醫

烏藥味辛溫無毒處處有之惟天台產者為勝俗名旁

箕主心腹痛補中益氣攻翻胃利小便○沒藥味苦平

無毒按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也破血止

痛為產後最宜推陳致新理內傷良○秦椒味辛生溫

熟寒有毒攻腹痛治風邪溫中除痹醋煎灌漱口牙疼

○蜀椒去閉口者味辛大熱有毒出成都逐冷風核名

椒目利水道

牙痛乳癰求莽草腸風崩帶索櫻欄

莽草為臣性有毒味辛溫善開喉痺理諸瘡癰○櫻

欄性平無毒止痢養血消鼻紅用燒存性入藥

巴豆破結宣腸理心膨水脹芫花消浮逐水治瘡毒當知

雷公藥性賦卷四 木部 李光明註

巴豆味辛溫生溫熟寒有毒生巴郡故名巴豆性急通

利因名剛子用去皮心膜及油然後可畏大黃黃連○

芫花味辛苦溫有小毒治咳逆喉鳴痰睡腰腹心痛

木鼈治瘡瘍腰痛有準雷丸殺三蟲寸白無疑

木鼈子其形似鼈故名味甘溫無毒治乳癰肛門腫兼

療疥傷○雷丸味苦鹹寒有小毒白者良赤者有毒能

殺人

養腎除風石楠葉漱牙洗目海桐皮

石楠葉味辛苦平有毒利皮毛筋骨病○海桐皮味苦

平無毒主痢除疥蝨治風痺痛

杜仲子酒搗敷乳腫郁李仁蕩浮腫四肢

牡荊子味苦辛無毒即黃荊今官司用作笞杖處處有之主頭風目眩○郁李仁味酸平無毒俗名唐棣通關格去浮腫根皮治齒痛風蛀

密蒙花總皆眼科之要領蘇枋木當調產後之血通

密蒙花味甘平微寒無毒○蘇枋木味甘酸平無毒專能破血消癰及撲損

栝實補虛明目葉洗瘡風樹癰塗癰疥竹皮刮下止嘔吐葉解煩燥燒瀝禦風痰

栝實味甘寒無毒主塗水腫及陰痿不起○竹皮多種

取皮止嘔吐者南人呼為江南竹味辛平甘寒無毒肉薄今人取作竹瀝者又謂之淡竹其葉解煩除咳逆今

雷公藥性賦卷四 木部

四 李光明註

方中用淡竹葉又是一種叢小葉柔嫩有毛其根生子如麥門冬

栲白皮止痢斷疳葉汁洗瘡除疥蝨胡桐淚殺風牙蛀腹膨脹滿吐堪施

栲白皮與椿白皮性同良但栲木臭椿木香味苦有毒

栲木根葉俱良南北皆有之兩木最為無異俗呼作虎目樹○胡桐淚味鹹寒無毒形似黃蘗得水便消如硝

石也

結胸散痞寬膨逐水調風宜枳殼煩悶通淋解熱赤辟黃疳川山梔

枳殼味苦酸微寒無毒能攻痔漏消癰癖○山梔味苦

寒無毒生於山間者為山梔人家園圃種蒔者為黃梔形肥壯可染物惟緊小者為山梔方可入藥

檳榔攻腳氣殺三蟲宜通臟腑厚朴乃溫中除霍亂膨脹

檳榔味辛溫無毒生南海向日曰檳榔形尖如雞心者佳向陰曰大腹子平坐如饅頭檳榔下氣除風宣利臟

腑逐水消痰破結○厚朴去粗皮薑汁炒過味苦溫無毒須用中厚有紫油者佳通經下氣厚腸胃消穀食安

腹中蟲

豬苓消渴利水治傷寒中暑龍腦清頭明目主驚搐小兒

雷公藥性賦卷四 木部

五 李光明註

豬苓味甘苦平無毒生土底皮黑作塊似豬糞故名治

咳瘧消腫利水止遺精○龍腦味辛苦微寒一云溫平無毒其香透腦攻耳聾消風氣通九竅即梅花片腦若服餌過多至一兩許則身冷如醉氣絕而非中毒蓋性寒故也

明目涼肝解熱毋遺黃蘗磨癥下乳行經休缺紫葳

黃蘗俗名黃柏味苦寒無毒除血氣去黃疸治癰瘡祛脾胃熱治女人熱崩○紫葳花一名凌霄花味鹹微寒

無毒處處有之治風熱毒及癰症

杜仲堅筋補損傷兼主腎虛腰脊痛衛茅殺鬼決經閉陰人崩帶也能醫

杜仲味辛甘平無毒折斷多白絲用薑汁和炒去絲良

除風冷強心志○衛茅即鬼箭羽味苦寒無毒攻腹痛
破癥結

避瘟瘴癰憑虎杖殺蟲砥疔問蕪莢

虎杖俗名班杖根微溫味甘平無毒治傷損消疔毒○

蕪莢味辛平無毒逐冷除心痛兼治皮膚骨節風殺疥

蟲治癰攻腸風

蕪仁搗膏點眼科輒除熱赤皴為末搐鼻嚏應釋妖迷

蕪仁味甘溫微寒無毒通結氣治鼻紅○皴莢味辛鹹

溫有小毒亦有數種或長至一二尺者惟如豬牙者良

消痰除嗽塗腫痛去頭風

沒石子主痢生肌染烏髮益智子滴精益氣止小便

頻數

沒石子即無食子味苦溫無毒出西番用有竅者良治

陰瘡陰汗○益智子味辛溫無毒主安神定志故謂之

益智

川棟子號金鈴冷氣膀胱能作主五倍子名文蛤腸氣五

痔效端殊

川棟子味苦寒有小毒處處有之蜀中者良根皮最殺

蛇蟲○五倍子味酸平無毒除齒齬及瘡膿亦可洗眼

去風熱

吳茱萸下氣消痰提轉筋霍亂山茱萸添精補腎治風痺

無疑

吳茱萸味辛溫大熱有小毒處處有之除咳逆逐風邪
主腳氣攻心○山茱萸一名石棗味酸平微溫無毒療
耳聾調女人月水

桑白皮瀉肺補虛益氣大腹皮通腸健胃開脾

桑白皮味甘寒無毒即桑樹根皮利水道消浮腫殺寸

白蟲○大腹皮即檳榔大腹子之皮微溫無毒專下氣

分冷熱攻心痛

金櫻子冬青子養精益腎輕身調和五臟蘇合香安息香

辟惡去蟲殺鬼蠱毒消除

金櫻子味酸溫平溫無毒採實搗汁熬膏久服輕身奈

老○冬青子又名女貞實味苦平無毒治病與金櫻子

同功○蘇合香味甘溫無毒油能辟惡除溫瘧久服令

人不生夢○安息香味辛苦平無毒辟邪煖腎止遺泄

秦皮洗眼磨昏男子添精婦人收帶下黃藥通喉豁痹蛇

傷取效醫馬是神樞

秦皮味苦寒無毒治風寒溼痹○黃藥味苦平無毒治

惡腫

苦菜主頭疼痢疾腹痛同薑煎服鈎藤蠲癰癰兒生客忤

勝神祇

苦菜即茶茗味甘苦微寒無毒除痰下氣消宿食○鈎

藤味甘苦平微寒無毒其形如鈎故得名主舒筋活血

止痛生肌麒麟竭舒筋展痹五加皮

麒麟竭一名血竭味鹹平無毒除血暈○五加皮味辛苦溫微寒無毒治風寒溼痹止心痛益精神通疝氣治陰瘡小兒幼弱不能行服之良

丁香下氣溫中能益脾止嘔沉香調中順氣宜療肝鬱痰丁香味辛溫無毒散腫除風更治齒痛風牙○沉香味辛溫無毒療腫除風去水止霍亂轉筋壯元陽辟惡氣檀香霍香止霍亂吐嘔痛連心腹乳香楓香專消風止痛瘡毒流連

檀香性熱無毒消風腫腎氣攻心○藿香味辛微溫無毒消腫止吐逆○乳香味辛熱無毒辟惡除邪補精益腎治諸瘡攻血氣○楓香楓樹脂即白膠香也治癰瘡

風搔齒痛去虛浮水氣味辛平微有毒
兼除霍亂昏迷
空黃理天弔止驚風更會清心明目胡椒能下氣逐風冷

天竺黃味甘寒無毒生天竺國故名○胡椒味辛溫無毒去痰止痢治心腹卒然作痛
此木部之藥性為後學之繩規

人部

看方猶看律意在精詳用藥如用兵機妙輕發草木之性既陳人物猶宜立訣

律法度也齊之以刑用藥猶用兵謂醫者乃人之司命天靈蓋最主傳尸久病虛勞熱蒸在骨

天靈蓋乃死人頂骨十字解者此骨是天生蓋壓一身之骨節陽人用陰陰人用陽味鹹平無毒主傳尸鬼疰熱病及陽毒發狂當求人糞汁打撲損傷并新產快索重男溺

人糞一名人黃性寒無毒專治天行時熱勞氣骨蒸燒末水服解諸毒為末湯調治熱病發狂絞糞汁飲之○童男溺童子小便也女子者不宜用主寒熱虛勞頭疼溼氣

乳汁有點眼之功視襠救陰陽之易

婦人乳汁味甘平無毒能安五臟悅皮膚音張倉管服享壽百餘年衍義云乳汁治眼之功何多蓋人心生血

肝藏血肝受血則能視婦人之血上為乳汁下為月水用以治目不亦宜乎○視襠即視襠之當陰處剪取方圓六七寸許燒為末服男子新病瘥而婦人與之交則

男病陰易女人病新瘥而男子與之交則女病陽易小腹絞痛攣手足目中生花頭重不能舉若不急治則死男子病用婦人視襠女人病用男子視襠以水調服

調諸淋破瘀血亂髮元來即血餘止吐衄理肺痿溺垢便是人中白

血餘乃常人亂髮燒灰味苦微溫無毒治癰疽及轉胞○人中白即尿桶中澄底垢積之結白者火上燒灰最治虛熱及勞熱傳尸

圖經行義無虛醫者可知端的

禽獸部

蓋言走者屬獸飛者屬禽

禽屬陽身輕故能飛而上獸屬陰身重惟能走而不能

上飛
鹿角煎膠補瘦羸又安胎止痛麝香辟邪而通竅安客忤

痼驚
鹿角味苦辛依法煎煉成膠及霜入藥用止泄精遺尿

○麝香味辛溫無毒攻風疰墮胎救產難
定魄安魂牛黃治風癰驚熱生肌止汗龍骨攻洩痢遺精

牛黃味苦平有小毒除狂躁治天行○龍骨味甘平微
雷公藥性賦卷四 李光明莊

溫無毒治女子崩帶止小便遺洩療陰瘡龍齒鎮驚治
癲癇

牛乳補諸虛益氣通腸須求牛酪獺肝開熱脹傳尸勞嗽
有驗堪憑

牛乳味微寒性平無毒止渴○獺肝為君味辛溫有毒
凡人素有冷氣虛膨者此二味皆不宜服

象牙出肉中之刺熊膽瘳痔痢之靈
象牙味甘平無毒生黃汁飲之利小便瘳末止遺精磨

屑敷肉中刺凡骨鯁者磨水服即下更祛勞熱止風癰
○熊膽味苦寒無毒然難分真偽取一粟許滴水中一
道如線不散者為真治天行熱症諸疳惡防風地黃

羚羊角明目去風可保驚狂心錯亂腦膈溫中補腎何

憂夢與鬼交情

羚羊角味鹹苦寒無毒可活胎易產益氣安心辟邪○
腦膈膈味鹹性熱無毒主驚癇消宿血除痰癖氣

阿膠止血安胎兼除嗽痢犀角涼心解毒殺鬼聞名
阿膠味甘平微溫無毒出阿縣城北井水煮取烏驢皮

以阿井水煎成膠為真須用一片鹿角同煮不然不能
成膠也養肝虛勞極止四肢酸疼○犀角味苦酸鹹寒

無毒驅風明目除心熱狂言又治時行疫癘
鹿茸益氣補虛男治洩精女止崩漏虎骨驅邪辟惡男去

風毒女保胎驚
雷公藥性賦卷四 禽獸部 十一 李光明莊

鹿茸用茄形連頂骨者味甘酸溫無毒一云味苦辛○
虎骨性平味辛微熱無毒治惡瘡及風痺拘攣

兔頭骨主頭疼和水燒灰催產難牛角腮治崩帶燒灰入
藥效如神

兔頭骨味甘平寒無毒治頭昏痛兔骨治熱中消渴肉
不可多食損人陽氣孕婦食兔肉生子缺脣不可與雞

肉及生薑同食○牛角腮味苦甘無毒消血閉便血攻
冷痢

瓦雀肉則益氣卵則強陰白丁香可潰癰療目雄雞烏青
補中赤者止血黃胫脰止遺尿難禁

瓦雀肉味甘溫無毒雀戴直立者名白丁香○雄雞肉

微溫無毒烏者補中止痛赤者止血治崩諸雄雞膽微寒主目不明心主五邪血主損傷筋主耳聾腸主小便數不禁肝及左翅毛主陰痿不起冠血能行乳汁

蝙蝠經名伏翼能開黑睛青眼
伏翼即蝙蝠別名味鹹無毒主淋目昏久服則忘憂驚
名夜明砂可治疳

藥是伐病之斤醫實司人之命
醫藥之治病猶斧斤之伐木也

蟲魚部
抑又聞蠶者為蟲潛者為魚堪行入藥貴賤何拘
蠶動也潛藏也

全蠭有毒須當去能透耳聾療諸風驚搐驚熱炒不
生通淋墮孕宜療癰之疵

全蠭宜緊小者佳味甘辛須去毒方可用○蟹螯去足
翅以米同炒至米黃色去米用若生用即令人吐瀉味

辛寒有大毒
消水氣去癰瘤無如海蛤安心志磨翳障大喜珍珠

海蛤味苦鹹平無毒治浮腫除咳逆定喘消煩○珍珠
味寒無毒出廉州主潤澤皮膚悅人顏色綿包塞耳可

治聾
水蛭吮癰疽通經破血田螺去目熱反胃堪除

水蛭即螻蛄生水中名水蛭生草中名草蛭生泥中

名泥蛭並能著人及牛馬腹脰間嘔血入藥當用水蛭
之小者佳此物極難得死雖炙過經年得水猶可活必
炒令極黃熟不然入人腹生子為害○田螺性寒無
毒不可多食其肉敷熱瘡壳主翻胃汁能醒酒止渴田
中取者為佳

鼠婦通月閉利便癰仲景將來醫久瘡廣蠱破堅癥磨血
積傷寒方內不曾無

鼠婦味酸溫無毒生人家地上處處有之○廣蠱即土
鼯味鹹寒有毒處處有之

搜瘰癧驚風明目催生稱蛇蛻止渴斜口眼墮胎點翳捉
衣魚

蛇蛻味鹹苦平無毒主纏喉風攻頭瘡癰癰○衣魚味
鹹溫無毒今處處有之多見於書卷中小兒淋閉用以

摩臍及小腹溺即通仍可摩瘡
出箭頭入肉醫附骨鼠瘻蛇蛻便是推車客補打撲損傷

療兒疳昏眼蝦蟆本草即蟾蜍
蛻蝦蟆味鹹寒有毒療兒驚癇癰風癰臨用當炙過勿置

水中令人吐入藥去足翅○蝦蟆肉味辛寒無毒主邪
氣堅癥惡瘡鼠漏

殺伏尸鬼疰三蟲地龍俗名蚯蚓正風邪斜喎脫肛蝸牛
本是蛞蝓

地龍味苦無毒須用白頭者良傷寒狂熱須用汁治痢

消丹毒用蕤○蝸牛俗名蜚螺處處有之生砂石垣牆下溼處亦治背疽用涎塗抹

蟬點眼翳雜科割金瘡出肉中刺蛤蚧堪傳尸止嘔兼補肺邪鬼咸驅

蟬蟾味鹹甘無毒處處有之以背行反駢於腳即諸朽木中蠹蟲但潔白者佳○蛤蚧一名守宮味鹹平有小毒功力全在尾梢人捕之即自咬斷其尾用以法取之行常一雌一雄相隨入藥亦當用成對者良

牡蠣固漏血遺精補虛止汗蠱蟲破癥瘕血積經閉通渠

牡蠣味酸平微寒無毒主瘡疾寒熱除驚恐○蠱蟲味

苦溫寒有毒啞食牛馬背血者用須炒熟除去足翅方

可入藥

鰻鱺魚退勞熱骨蒸殺蟲愈痔石龍子除血淋止血蜥蜴殊途

鰻鱺魚味甘有毒處處有之雖有毒而能補五臟虛損

消項顯白駁風熱燒心薰蚊蝨則滅○石龍子與蜥蜴

蝦蟇蝦蟇守宮五種相近

烏賊骨是海螵蛸退翳殺蟲治崩攻痢鯨鯢鱗為穿山甲

堪醫疥癬鬼魅遺鋤

海螵蛸味鹹微溫無毒療陰瘡治耳聾其血似墨能吸

波嘆墨以潤水所以自衛有八足聚生口旁浮泛於水

面烏見謂其必死欲啄之則聚足抱烏拖入水中食之

故名烏賊魚○穿山甲性涼有毒主邪驚治瘰

勞熱骨蒸尊鼈甲脫肛狐臭尚蜘蛛

鼈甲味鹹平無毒處處有之治崩瘰癧主癥瘕疔瘵不

可與雞子同食合莧菜食則傷人○蜘蛛性冷無毒處

處有之然多種身有毛刺及五色并薄小者並不可用

主瘰癧惡瘡蛙牙兼治口斜啞僻喜忘者七月七日取

網著衣領中勿令人知

蟬退消風斷小兒夜哭之品蝟皮主痔提腸風下血之徒

蟬退味鹹甘寒無毒亦治婦人產難小兒驚癇○蝟皮

味苦甘無毒治疝氣陰蝕瘡

鯉魚寬胎脹骨止赤白之崩膽抹清盲赤目蟹主熱結胸

雷公藥性賦卷四 蟲魚部

黃能化漆為水殺燒集鼠招胞

鯉魚味苦甘寒無毒止渴消腫腹有癥瘕之人不可食

○蟹味鹹寒有毒爪能破血墮胎

鯽治湯風下血宜作鱠又宜作藥治痢無分赤白蛙能補

損祛勞一種水雞為羹專補產婦之虛

鯽味甘溫無毒燒灰治諸瘡補胃和中○蛙味甘寒無

毒殺疰邪治腹脹極效

蜈蚣開小兒口禁墮孕婦之胎制諸蛇毒土狗催產難之

生出肉中之刺退腫須臾

蜈蚣味辛溫有毒用當炒熟主殺三蟲生則令人吐瀉

不堪入湯藥○土狗即螻蛄味鹹寒無毒處處有之下

腫利大小便解毒潰爛

石決明瀉肝黑障青盲終可決桑螵蛸補腎洩精遺精竟無虞

石決明味鹹平涼無毒除肝經風熱○桑螵蛸味鹹甘平無毒即蝗蝦子也用炒黃色不然令人洩瀉

原蠶蛾主洩精好強陰道白蛆蠶治諸風口禁難呼

蠶蛾雄者有小毒炒去翅足補腎療血風痺風癰瘡用蠶砂○殭蠶炒去絲嘴味鹹平辛無毒療驚癇崩漏病

又除口禁及喉風

白花蛇主諸風溼痺拘攣兼疥癩五靈脂行經閉昏迷產婦早來沾

雷公藥性賦卷四 蟲魚部

十六 李光明莊

白花蛇味甘溫鹹有毒主諸風喎斜口眼并大風瘡與烏稍蛇同功○五靈脂即寒號蟲糞也治腸風并冷氣

炒熟治崩中

著意要行斯道潛心細下工夫

果品部

且如果品數端亦分優劣

以果品言之如柿有數種紅者只可生噉烏者可焙乾入藥用其蒂功力且優白者力薄而功亦劣

入藥當知刑反忌宜性情要辨苦甘冷熱

大棗與生葱相刑不宜合食烏梅與黃精相反豈可同餐如桃杏有雙仁者毒能殺人安石榴味酸者方可入

藥苦甘者不宜多食主損齒傷肺又如橘味辛溫柚味苦冷棗味甘熱柿味甘寒之類

橘皮則理氣寬中消痰止咳更可止嘔定吐大棗則養脾扶胃助藥成功又能補氣調脈

陳皮味辛溫無毒主溫脾胃者破積聚○大棗味甘平溫無毒

雞豆肉名為芡實輕身長志好止腰疼覆盆子即是蓬蘽益氣強陰養精最烈

芡實味甘平無毒補中治瘵煎和金櫻子最益人○覆盆子味酸平鹹無毒處處有之補中益腎調和臟腑治風虛損

雷公藥性賦卷四 果品部

十七 李光明莊

柿乾止痢瀉腸生宜解酒渴止噦須教用蒂良梨實除煩引飲漿可吐風痰乳婦金瘡如仇賊

柿乾味甘寒無毒最潤喉通耳鼻○梨實味甘微酸溫無毒可止嗽不宜多食成冷痢乳婦及金瘡尤不可食

橄欖止渴生津口唇乾燥研敷核中仁石榴舒筋止痢去腹中蟲根皮煎汁噉

橄欖味酸甘溫無毒消酒毒○安石榴味甘酸無毒殼入藥治筋攣腳痛攻痢良

藕實止痢補心垣節除嘔衄葉堪止渴安胎桃仁通經破瘀結仍輟腰疼花主下痢膿血

藕味甘平寒無毒處處有之○桃仁去皮尖味苦甘平

無毒其花通利大小便

杏仁不用雙仁通腸潤肺治欬清音烏梅卽是梅實上渴化痰痢中莫缺

杏仁去皮尖及雙仁者味酸甘無毒治驚癇腹痹及產

乳金瘡○烏梅味酸平無毒下氣調中止渴治骨蒸勞熱咳嗽痰涎

宜木瓜治霍亂轉筋調理腳氣溼痺伸舒枇杷葉能止嘔和胃專掃肺氣功全口渴

木瓜味酸溫無毒消腫強筋骨止渴并腳氣攻心○枇

杷葉用布拭去毛炙用味苦平無毒主肺風

胡桃肉肥肌潤肉撲傷和酒搗來嘗草果仁益氣溫中好

雷公藥性賦卷四 果部

十八 李光明莊

件常山攻瘧發
胡桃肉味甘平無毒去痔瘡消癰癥○草果仁味辛溫無毒溫脾胃消宿食解酒毒攻冷氣

若能熟此作筌蹄可洗下工之漏拙

六穀部

精明米穀豆麥粟麻雖民生之日用充藥料於醫家

穀入脾豆入腎麥入肝粟入肺麻入心

粳米溫中和胃秫米能解漆瘡止渴除煩須陳倉米黃豆

殺鬼辟邪黑豆乃堪入藥若問黃卷便是豆芽

米味甘溫無毒粳卽常時所食之米秫卽造酒之糯米

其種數甚多不可盡述主除煩斷痢○豆惟黑者入藥

宜炒熟用味甘平無毒其他俱不堪用

祛胃熱養腎虛通利小腸米粟可長生填精髓巨勝子卽胡麻

粟味鹹微寒無毒治消中○巨勝子久服之可長生不

老利大小腸堅筋快產主心驚味甘平無毒處處有之

卽黑麻子

赤小豆消水腫虛浮研塗癰疽消熱毒白蘊豆治筋轉霍

亂葉敷蛇蟲咬最佳

赤小豆炒過用味甘平酸無毒治消渴攻腳氣○白蘊

豆味甘微寒無毒消暑解毒下氣和中

小麥止汗養肝堪除燥熱大麥生肌消渴長胃榮華

雷公藥性賦卷四 米穀部

十九 李光明莊

大麥味甘微寒無毒
麥蘖入藥湯真個溫中可知消食麥蘖若調醋敷撲損處

愈後無瑕

麥蘖卽麥芽也麩皮也

去丹風解一切之毒霍亂吐翻取粉於菜豆除浮腫吐一

切痰涎閉胸膈病摘蒂於甜瓜

菜豆味甘寒無毒除熱氣主頭疼目暗○甜瓜味苦寒

有毒處處有之蒂入藥瓜有赤白二種入藥當用赤者

言之有準用之無差

蔬菜部

既以言之五穀又當取用蔬菜葱主頭疼堪發散通大小

腸白可安胎止痛非專補腎益元陽溫中下氣子收夢洩遺精

葱味辛溫無毒○韭味辛溫微酸無毒葱韭皆不可多食昏人精神又不可與蜜同食

搗汁止頭疼喘嗽風痰萊菔子酒煎噴痘體自然紅潤說胡葵

萊菔即蘿蔔也味辛甘無毒根腦及嫩葉俱可食煮熟消食和中下氣去痰癖肥健人○胡葵味辛溫無毒消

殺通心竅補五臟不足利大小便辟邪

白冬瓜去躁煩止渴白芥子寬胸膈痰拘

冬瓜味甘溫寒無毒治淋利小便解熱散癰除小腸熱

雷公藥性賦卷四 藥部

李光明註

醒脾用子中仁尤良○白芥子味辛溫無毒青白紫數

種惟芥子稍大色白者入藥除冷氣攻反胃治上氣

婦人產難好催生滑臟利泄冬葵子霍亂轉筋小腹痛減

煩墜_子葵香薷

冬葵子味甘寒有毒處處有之其子是秋種覆養經冬

至春作子故謂之冬葵子除寒熱治疳用根○香薷味

辛微寒無毒下氣除煩熱消腫止渴

發病生蟲又敗陽便是藁薤菜生瘡長痼精神損少吃水

茄兒

藁薤菜味辛溫有毒不宜多食敗損陽氣生腹中長蟲主破癥瘕通血除丹毒消乳癰○茄子有紫白二種味

甘寒性冷不宜多食茄根煎湯洗凍瘡蒂燒灰治湯風婦人惡血能令下溼痺筋攣取豆芽黃卷瘡疥傷寒最得宜血風血暈向荆芥假蘇

大豆黃卷以黑豆大者為芽藥生便曬乾名黃卷入藥

用味甘平無毒○假蘇即荆芥味辛溫無毒下氣除勞

兼治頭痛

馬齒莧散血敷瘡敷火丹殺蟲磨翳草藜蘆發背瘡瘍丹風起爛搗堪塗

馬齒莧處處有之味酸寒無毒止渴攻血痢磨眼翳利

便難○草藜蘆味酸平無毒名雞腸菜

消痰定喘寬膨當求蘇葉風氣頭疼發散切要薄荷

雷公藥性賦卷四 藥部

李光明註

紫蘇味辛溫無毒葉紫色而氣香者佳消痰下氣開胃

用葉風氣頭疼發散用莖寬喘急治咳嗽用子○薄荷

味辛苦溫無毒發汗消食寬脹除霍亂傷寒可發散

飴糖欹汗建中補虛羸不小神麴養脾進食使胃氣有餘

飴糖味甘微溫無毒以糯米煮粥候冷入麥芽澄清再

熬成飴糖以淨器盛貯夏天沉於井中免令酸諸米可

作飴惟糯米者入藥止渴消痰治嗽○神麴味甘消食

下氣

調理產人去瘀生新猶用醋通行血脉助添藥勢酒同途

醋一名苦酒治癰除癥消疽退腫○酒味苦甘辛大熱

有毒辟惡除邪破癥結

香豉本食中之物醫傷寒切不可無

淡豆豉味苦寒無毒治頭痛發汗止痢解熱以酒浸爛

患腳敷之良

不揣愚衷而作賦是爲藥性之斤銖

揣量度也

雷公藥性賦卷之四終

雷公藥性賦卷四

李光明莊

珍珠囊指掌補遺藥性賦四卷

侍郎金簡
購達本

舊本題金李杲撰考珍珠囊爲潔古老人張元素

著其書久已散佚世傳東垣珍珠囊乃後人所僞

托李時珍本草綱目辨之甚詳是編首載寒熱溫

平四賦次及用藥歌訣俱淺俚不足觀蓋庸醫至

陋之本而亦托名於杲妄矣

張子和心鏡別集一卷

〔元〕常德輯

中國科學院圖書館藏明萬曆二十九年新安吳勉學刻古今醫統正脈全書本

附《四庫全書總目·傷寒心鏡一卷》提要

張子和心鏡別集

鎮陽常德編

新安吳勉學校

傷寒

傷寒論雙解散

守真制雙解散通聖益元各七八分入生姜葱白煎解傷寒三二日間以其初覺亦傷寒疑似之間解表恐傷於內然攻裡恐傷於表故制雙解以其表裡齊見俱解甚為得法然間有不解猶未盡善也子和增作法亦用前藥煎一碗令飲其半探引出風痰次服傷心鏡

論發汗

世人只知桂枝麻黃發汗獨不知涼藥能汗大有盡善者執藥汗不出者反益病涼藥發之百無一損素問云辛甘發散為陽白粥配葱食之便能發汗益元加薄荷亦能發汗承氣用姜棗煎以辛甘發散之意守真雙解子和演為吐法豈非涼藥亦能發汗也

論攻裡

攻裏之藥當用寒涼世人畏之是不知藥隨病而俱

出何曾留於中乎桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡此語惑人久矣鮮有解者因有知幾窮理偶於守真醫書註中稍見其意此陽實陰實陽實發散陰實宣泄不同實謂不受病也陰實本不受病何用承氣宣泄反之則有斃亡之失也此二句蓋謂傷寒之設也

論攻裏發表

素問云攻裏不遠寒發表不遠熱啓玄子云世人直疑攻裏合用寒藥發表合用熱藥似是而非也蓋攻裏不遠寒是不遠司氣之寒雖嚴疑盛寒之際若合攻裏不可畏天寒而不用寒藥發表不遠熱者是不遠司氣之熱雖流金燦石炎蒸盛暑合用發表之藥不可畏暑而不用熱藥此不遠寒熱之理也

搏衣撮空何臟所主

搏衣撮空許學士說作肝熱風淫末疾故手爲搏衣撮空此論雖當莫若斷之爲肺熱以爲愈矣其人必譫語妄言經曰肺熱必爲譫語兼上焦有病肺心主之手經者上焦也二者皆當其理果何如哉天地爲體用肺爲體肝爲用也肝主諸血者陰物也此靜體何以自動蓋肺主氣氣所鼓舞故靜得動一說肝之

用者一說肺之用者此天地互爲體用二者俱當也是知肝臟血自寅至申行陽二十五度諸陽用事氣爲肝所使肺主氣自申至辰行陰二十五度諸陰用事肺爲所用

傷寒口傳足經不傳手經論

傷寒只傳足六經仲景本論無說古今亦無言者惟龐安常謂主生故太陽水傳少陰少陰傳足少陰水水傳足厥陰水爲厥陰水爲厥陰水不觀內經陰陽雜合論云太陽根於至陰名陰中之陽少陽根於隱白名曰陰

中陰少陰根起於湧泉名曰陰中之少陰厥陰根起於大敦名曰陰中之厥陰其次序正與此合大抵

傷寒始因中風得之於陰是以正傳足經者陰中之陽陽中之陰也又以六氣考之厥陰爲初之氣少陰爲二之氣太陰爲三之氣少陽爲四之氣陽明爲五之氣太陽爲終之氣此順也逆而言之正與此合緣傷寒爲病逆而非順也

亢則害承乃制

假令水爲母木爲子當春旺之時冬令猶在即也水既亢極則木令不至矣木者繼冬而承水也

既亢則害其所承矣所以木無權則無所制土土既旺則水受制意夫人必自侮然後人侮之旨哉木長春之令也水受土制熱尅其寒變而爲濕

心鏡別集

傷寒心鏡一卷

通行本

一名張子和心鏡別集舊本題鎮陽常德編德不知何許人亦不詳其時代考李濂醫史張從正傳後附記曰儒門事親十四卷蓋子和草創之麻知幾潤色之常仲明又據其遺爲治法心要子和卽從正之字知幾爲麻草之字仲明字義與德字相符常仲明者其卽德歟若然則金興定中人也書凡七篇首論河間雙解散及子和增減之法餘亦皆二家之緒論

河間傷寒心要一卷

〔金〕劉洪輯

中國科學院圖書館藏明萬曆二十九年新

安吳勉學刻古今醫統正脈全書本

附《四庫全書總目·傷寒心要

一卷》提要

附河間傷寒心要

都梁 劉洪 編

新安 吳勉學 校

傷寒心要論

夫傷寒者前三日在表法當汗 可用雙解散連進
數服必愈若不解者病已傳變後三日在裡法當下
殊不知下之太早則表乘虛入裡遂成結胸虛痞
懊憹斑疹發黃之証輕者必危危者必死但當以
平和之藥宣散其表和解其裡病勢或有汗而未
愈或無汗而愈常用二小柴胡涼膈天水三藥合
傷寒心要

而服之

病若半在表半在裡法亦當和解三小柴胡涼膈主
之

若裏熱微者則當微下 四大柴胡合解毒湯主之熱
勢未退 又以大柴胡合三一承氣下之兩除表裏
之熱病至七八日裏證已甚表熱漸微脉雖浮數
則以三一承氣合解毒下之

其病胸膈滿悶或喘或嘔陽脉緊甚者 可用瓜蒂
散涌之

汗吐下三法之後別無異証者 涼膈散調之

病熱已去微熱者 以益元散服之無令再病此傷寒治法之大要也

或傷風自汗脉浮緩者 雙解去麻黃以汗之

其病半表半裏 白虎湯和解之

病在裏脉沉細者無問風寒暑濕或表裏証俱不見

或內外諸邪所傷有汗無汗心腹滿滿謔語煩躁畜

熱內盛但是脉沉者並用 承氣合解毒下之

或中暑自汗 解以白虎湯 直格云夏至前為濕夏

用白虎宜乎局方云立秋後不用白虎子和

云若有白虎証亦不用乎却用詳審之耳

白虎解後 以五苓合天水調之多進數服無妨

傷寒心要

或腹脹滿脉沉者 亦當承氣合解毒微下之

或發汗之後熱不解脉尚浮者 白虎加蒼朮再

解之

或裏熱內盛陽厥極深皆因失下而成此証以致身

冷脉微昏憒將死切不得以寒藥下之誤下即死又

一革庸醫妄言是陰厥便欲易換用玄武四逆溫熱

之劑投之下咽立死殊不知此証乃陰耗陽竭陰氣

極弱謂之耗陽厥極深謂之竭畜熱拂鬱將欲絕者

當此之証寒劑熱劑俱不可投但進涼膈解毒 以養陰退陽宣散畜熱脉氣漸生得大汗而愈有無

汗氣和而愈者

未愈却解毒合承氣 十八下之次以解毒涼膈天水

合而為一 十九調和陰陽洗滌臟腑則其他別証自

不生矣

有大下之後熱不退再三下之熱愈盛若下之不愈

脉微氣虛力弱不加以法則無可生之理若輟而不

下則邪熱極盛陰氣極衰脉息斷絕必不可救似此

之証是下之亦死不下亦死醫者到此活人殺人一

彈指間其不至手足失措者幾希矣 直格云傷寒汗

反不汗脉尚浮白虎加蒼朮再解之

傷寒下後自汗虛熱不已白虎加蒼朮人參一服如

傷寒心要

神汗止身涼此通仙之法也如此則汗下之後熱不

退不問有汗無汗宜白虎加蒼朮解之又加人參

亦妙仍服涼

經云三下而熱不退者即死後人有四五次下以十

行而生者此乃誤中耳活者未一二死者千百後

學切不可以為法但當依前田解毒合涼膈調之使

陽熱徐退陰脉漸生庶不失人命

若傷飲不解散成結胸之証臨時擇用 大小陷

胸湯丸累下之脉浮者不可下是表証未出小柴胡

合小陷胸湯 投之脉雖浮而熱大極者 承

或有留飲過度濕熱内生自利不止其熱未退 二十三
解毒湯治之

陽毒生斑 二十四 涼膈加當歸

佛鬱熱盛在表燥而無汗濕熱在裡不能發於外相
搏遂成發黃 二十五 茵陳湯調五苓散甚者 二十六 茵陳

合承氣下之

煩心不得臥 二十七 梔子湯

悞下太早遂成結胸虛痞 二十八 涼膈加枳殼桔梗剛

柔二症譫語發狂踰垣赴井 二十九 陽熱極盛者 二十九 承

氣合解毒下之

傷寒心要

汗下之後煩渴飲水則 三十 涼膈減桂五苓甘露益

元選而用之小便不通五苓泄之大便閉結承氣下

之更有外證加減通聖散方內隨證用藥

婦人證治皆然惟孕婦三四月并七八月不用硝其

餘月分用之無妨

小兒減劑服之

此中有古人治傷寒不傳之妙後之學者其慎寶

第一雙解散

防風通聖散

防風 去蘆 川芎 當歸 赤芍藥

大黃 麻黃 連翹 芒硝 半兩

石膏 黃芩 去腐 桔梗 一兩 甘草 二兩

滑石 三兩 荆芥 白朮 梔子 半錢

右為散每服三錢水一盞薑三片煎六分溫服大

黃芒硝麻黃三味對証旋入自利去大黃芒硝自

汗去麻黃

天水散 益元 六一

滑石 六兩 甘草 一兩

右為末每服三錢溫蜜水調暑月冷水亦可和解

傷寒心要

傷寒傷風發汗葱白五寸豆豉五十粒煎一盞調

四五錢并三服解利為度加薄荷尤妙

通聖合益元

右七兩和勻每服三錢水一盞半葱白五寸豆豉

五十粒姜三片煎一盞溫服

第二小柴胡涼膈天水合服

小柴胡湯

北茈胡 三兩 黃芩 人參 半夏

生薑 甘草 大棗 一兩

右為散每服五錢

涼膈散

連翹 二兩 梔子 大黃 薄荷

黃芩 一兩 甘草 芒硝

右為散每服三錢水一盞煎七分入蜜少許竹葉五片

第 涼膈合小茈胡

第 大柴胡合黃連解毒湯

大柴胡湯

柴胡 去苗 大黃 半兩 黃芩 白芍藥 一分

半夏 炮七次二錢 枳實 錢三

傷寒心要

右為散分三服水一盞半生薑二片大棗一枚煎

半錢溫服

黃連解毒湯

黃連 黃蘗 黃芩 梔子 等分

右為散每服二兩水一盞煎五分溫服

第 大柴胡合一一承氣湯

三一承氣湯

大黃 芒硝 厚朴 枳實 各半

甘草 一兩

右剉每服二錢半水一大觔姜三片煎六分入硝

再煎一二沸

第 承氣合解毒湯

第 瓜蒂散

瓜蒂 赤小豆 等分

右為末豆豉湯調下一錢未吐再服

第 涼膈散

第 益元散

風

第 雙解散

第 白虎湯

傷寒心要

知母 兩半 甘草 一兩 梗米 一合 石膏 四兩

右剉每服五錢水一觔煎六分溫服

第 承氣合解毒湯

暑

第 白虎湯

第 五苓散合天水散

五苓散

猪苓 伏苓 三錢 官桂 一分 澤瀉 一兩

白朮 一錢 活人書 三分 煎 半錢

右細末

第十五承氣合解毒湯

第十六白虎湯加蒼朮

第十七涼膈合解毒湯

第十八解毒合承氣湯

第十九解毒涼膈天水合

結胸

第二十大小陷胸湯丸

大陷胸湯

大黃 芒硝 三錢 甘遂 三字七

右剉四錢水一觔煎大黃六分內消再煎一二沸

傷寒心要

內甘遂溫服未利再與

小陷胸湯

半夏 四錢 生姜 切 黃連 二錢 栝婁實 半箇

右剉水三盞煎栝婁至盡半內藥煎至一盞分作

兩服

大陷胸丸

大黃 半兩 葶藶 二錢 芒硝 一錢

杏仁 十二枚 去皮尖

右大黃為末研葶藶杏仁為膏團如彈子大甘之

末三字蜜半匙水一觔煎半觔溫服一九一宿乃

下未利再與

第二十一小茈胡合小陷胸湯

第二十二承氣湯

大黃 三錢 芒硝 三錢 枳實 各半

右剉如麻豆大分一半用水一碗下生姜三片煎

至六分納硝煎一二沸絞去滓熱服

第二十三解毒湯

發斑

第二十四涼膈散加當歸

發黃

傷寒心要

第二十五茵陳湯調五苓散

茵陳湯

茵陳 一兩 大黃 半兩 梔子 十

右剉水二盞煎一盞溫服利為度

第二十六茵陳合承氣

煩心不睡

第二十七梔子豉湯

梔子 七箇 豆豉 二合

右水二盞先煮梔子盡半內豉等

第一十八五苓空腸煎涼膈加桔

剛柔二症

第二十九 承氣合解毒湯

汗後煩渴

第三十 涼膈減桂 五苓 甘露 益

甘露飲

茯苓 澤瀉 甘草 石

寒水石 白木 桂枝 猪苓 半兩

滑石 四兩

右為末每服三錢湯調或新汲水薑湯尤妙

右共十八方如無大承氣係第五十二承氣代之

傷寒心藥

亦妙通五十九件藥味調理身其盡其妙百發

百中後之學者詳辨脈證審而用之起沉痾於指

掌策奇功以活人方知其妙也

新增病後四方

小半夏湯治汗下後嘔吐不已

半夏 五兩 赤茯苓 三兩

右剉每服半兩水二盞煎至一盞以姜汁更煎一

二沸

五味子湯治汗下後氣閉咳嗽

五味子 兩 麥門冬 人參 杏仁

陳皮 生薑 一錢 棗子 二枚

右剉每服二錢水二盞煎一饅作二服

大橘皮湯治汗後胃虛

陳皮 甘草 一兩 人參 二兩

右剉每五錢水盞半姜二片煎至一盞溫服

赤茯苓湯治胸膈滿悶頭痛已得汗者

陳皮 甘草 人參 半夏

川芎 白木 等分

右剉每服五錢水盞半姜三片煎一盞溫服

傷寒心要餘論

傷寒心藥

五臟六腑應五運六氣凡病微則當其本化甚則兼

其鬼賊之化亢則害承乃制微則是其本經本臟之

本化造化之化也病甚則如金衰不能制木木則生

火木火者皆陽也故風火多兼化則風熱相搏賊其

金也

臟腑之氣應乎三陰三陽實則行乎本化之氣瀉之

衰則行其勝口之氣瀉之是為殺其鬼賊也

如諸陽畜熱以涼膈合解毒服之解散極熱

如瀉火熱解毒調胃承氣是也

如吐法用二仙散

理傷寒白虎涼膈合服解之

傷寒三日以裡連進雙解如無汗必是傳變待三四日之間以小芩胡解表裏之熱仍間服白虎涼膈蘊熱七八日之間欲下而表證猶在以大承氣湯大芩胡湯雙行并煎攻裏發表最為穩當若是溫熱內甚自利者止涼膈却進解毒間白虎服之或惡心乾嘔吐者白虎大作一劑調解毒末五錢服之即止大小便不通併有腹痛不能忍者以無灰酒煎朴硝三兩熱服即愈亦按從治之法也熱中伏寒下之矣或大承氣湯加木香瀉之尤妙

傷寒心要

十一

傷寒失下始病時又誤服麻黃熱劑入甚必致熱極或有陽厥極深身冷脉微陽極似陰之證庸醫以為陰證是也須當急救其陰以白虎涼膈日進三服脉氣漸生身體漸溫然後以大承氣下之夫大承氣救急之妙劑如咽膈吐逆不利當今熱服開其鬱結利而即愈也

如傷寒汗下之後自汗虛熱不止於白虎湯加人參蒼朮一服如神汗止身涼此法至妙不容詳盡

如赤白痢先服黃連阿膠丸次服解毒湯

傷寒瘧瘍破傷風與傷寒治法一同但以雙解涼膈

白虎承氣臨時斟酌用之雙解涼膈白虎瀉心此理傷寒之妙劑

孕婦臨月可服益元涼胎產後仍服如血不盡則以涼膈與四物合煎調理經血甚者大承氣合四物乃為妙劑也

涼膈同四物名五芩散婦人產後之妙劑

涼膈四物合大承氣湯名三和湯

大承氣合四物治婦人一切血積血聚等症加紅花尤妙初生小兒五七日有熱證不得已只以益元散

時時灌之如小兒啼用涼膈調之吐餓臨睡服

傷寒心要一卷

通行本

舊本題都梁鑑洪編洪始末未詳大旨數演劉完素之說所列方凡十八又有病後四方與常德傷寒心鏡皆後人裒輯附入河間六書之末者然掇拾殘剩無所發明

如宜方二卷

〔元〕艾元英撰

北京圖書館藏明初刻本

附《四庫全書總目·如宜方二卷》提要

原缺序及第一至二十二葉

如風寒伏留頭腦偏正疼眩及痰厥宜如聖餅子二百五十九
○如頭久疼痛作苦及偏正頭疼宜川芎一兩香附
二兩為末茶清調下○如偏頭疼宜芎芷辛良薑為
末右搗右左搗左仍先含冷水方搗藥宜大芎辛湯五十三
小芎辛湯如聖餅子二川芎茶調散甚酌冷熱服之五十二
○如氣虛痰飲腎氣諸厥頭痛宜大芎辛湯五十三○如體
虛痰腎諸厥頭痛服大芎辛湯無効宜黑錫丹二百七十六
如頭眩暈頭目動搖不能舉頭開目宜小芎辛湯五十二
如頭暈舉頭似屋宇旋轉如在舟中此有風痰虛三
證宜大芎辛湯五十三○如腦滿鼻常出涕或清或濁或臭宜
黑錫丹二百七十六其病由腎氣虛腦髓不固亦有
名鼻淵者宜川芎茶調散一百一十加辛夷
咽喉附口舌唇澀
如風熱上壅咽喉腫痛有似肉齶宜牛蒡子湯五十五○如
咽喉熱腫語聲不出似物梗宜三聖散一百二十三一方加牛
蒡子薄荷川芎煎○如熱上攻咽喉閉痛嚙物有碍

宜^{玉膏無憂}○如無熱咽痛喉閉宜辣桂半夏甘草
 等分咬咀水煎至壹半候冷呷緩服○如卒然咽閉
 不能語言宜^{小續命湯}加製杏仁七粒煎○如喉風宜
 宜巴豆肉針線穿嚥入喉牽出○如喉閉宜巴豆十
 箇去殼將皮紙槌巴油在紙上將紙作大條子撚繩
 燈上燒着吹滅濃烟棒入喉中得吐妙○如喉痛有
 礙宜腦子牙硝各半錢鵬砂壹錢朱砂寒水石各二
 錢共末入口津嚥下又治口舌生瘡亦妙○如口臭
 心脾熱宜^{雞蘇圓二}又川芎白芷甘草等分為末密
 圓如彈大噙嚥○如口舌生瘡牙宣心熱宜^{甘露飲}
 九口瘡宜五倍子黃蘗為末付之又黃連胡椒等分
 為末搽之舌上腫硬宜百草霜鹽等分并花水調付
 腫硬出血宜海螵蛸蒲黃等分為末付○如口瘡宜
 清開湯

諸氣

肺宜浮緊弦急不宜虛弱○如忽然心腹撮痛
 忤宜^{蘇合香圓}氣鬱撮痛宜^{四磨湯}○如傷寒腹痛
 身熱脈洪數宜^{小柴胡湯}去黃芩加芍藥不大便宜^{桂枝湯}
 十二加大黃○如伏暑氣痛不可忍宜^{黃連香薷散}
 冷服小便不利宜^{胃苓湯}○如傷瓜菓宜^{香桂圓二}
 如諸氣痞滯不通腹脇刺痛連肩背宜^{木香流氣飲}
 ○如七情氣結積聚似杯心腹刺痛發時欲死宜^{七氣湯}
 四十○如事不遂意怒氣傷神氣滯不散心腹悶
 痞刺痛宜^{分心氣飲一}○如脾胃不和氣滯心腹痞
 痛痰逆惡心宜^{八味湯}○如脾胃虛冷攻築
 心腹脇刺痛胸膈痞悶宜^{蠅薤散}○如胃虛不和早
 辰心腹疼痛宜^{胃沅湯}冷者宜^{勝五積散一}○如陰
 陽壅滯氣不升降痞塞腹痛宜^{沉香降氣湯}○如諸積氣
 不通流入背脊右脇刺痛宜^{神保圓二}○如七情所
 傷心脇腹痛不可悅仰及疝氣宜^{聚香圓一}○如疝
 氣偏墜絞痛外腎腫硬濕痒生瘡宜^{星斗圓二}○如

小腸奔豚疝氣脈腎腫痛偏墜宜三黃圓二○如元
 臟久虛陰囊濕痒膀胱腎氣宜百七十五○如腎虛
 為邪氣搏陰囊偏墜痛連臍腹宜百三十四○如膀
 胱蘊熱風濕相乘陰囊腫痒小便不利宜百三十二
 ○如疝氣即小腸氣皆由腎虛當利小便寒疝則川
 烏薑桂面香藥中加牽牛澤瀉木通宜黑陽卅二圓
 丹二百熱疝宜五茶散增味導赤三白散一之類○
 七十五熱疝宜八十八散九十五百一十二之類○
 如心脾痛或背連心壹點痛宜百十三加良薑
 蒲生薑烏梅煎○如心脾疼宜白薑貳錢炒蚌粉肉
 桂各壹錢為末飲湯下又香附良薑每貳錢重陳米
 飲下又宜柚刀散有痰加南星肉桂○如氣滿下墜
 乏膈間如有碍此是氣實也當用香附枳殼攪即
 蘇等藥大便不利挨之又宜三和散流香降氣四
 湯之類○如氣短呼吸不足或久病困重宜參用湯
 接續真氣黑錫卅二鎮墜上盛下虛痞膈氣短宜附
 湯二喘急氣短宜六十一加人參○如氣舊開口擡

有吐氣非氣滿是氣喘有外邪治外邪其喘自定有
 宿疾宜九飲一肺受傷宜白芨末貳錢空心米飲
 下
 腰痛
 脈沉弦而緊為寒沉弦而浮為風濡者為濕實者氣
 滯○如腎虛弱風濕凝滯攣腰疼宜獨活卅○如
 寒濕傷腎氣滯腰疼不可悅仰宜五散八十一加桃仁煎
 ○如腎虛腰疼筋骨少力宜百四十八兼濕又腎氣
 宜百七十五○如肝腎風虛腰脊疼痛宜思仙
 七○如氣滯腰疼或悅仰越悶宜為藥順氣散少挑
 仁溫酒服○如腰下冷痛重若負錢不渴者宜腎着
 四○如元臟久冷上盛下虛腰膝冷痛宜黑錫卅
 炒桃仁酒下○如腰膝無力大腸閉則痛發膝冷似
 水宜順氣圓二○如腎虛腰痛宜茴香破故紙等分
 為末批開猪腰子入藥紙裹水濕煨熟細嚼酒下又
 桃仁去皮尖麩炒為末熱酒下得汗愈又製在仲末

空心酒下又炒黑牽牛取頭末入麪作常食麪如花
椒煮食之小便數者宜葶藶杜仲枸杞根等分咬咀
好酒漬納甕中密封入銅器中煮一日服取醉為度
腰脚冷宜酒中煎酒水漬腰膝上

心志

如思慮傷心心血不足怔忡悲憂不寐宜益榮湯五十八○

如心熱語亂煩渴眼溢口舌唇焦宜洗心散一○如神

砂末服○如風虛冷濕閉塞諸經恍惚妄言宜湯八

○如諸虛不足精神昏倦夢寐怔忡宜十四友圓一

調妙香散下○如七情復損心氣神不守舍精不能

固故精清而滑宜神丹二○如虛入夢多驚悸怔

忡不寐宜素肉薑砂丹二○如驚憂失心閑談亂語怔

忡健忘宜寧志膏二○如虛弱驚悸怔忡語言不節

宜育神散百十八吞雄朱圓二○如驚悸失心氣結痰迷心

竅顛走強言宜雄朱圓二○如顛狂走妄語見鬼無

問冷熱宜藥丹二又宜牛黃清心圓二○如

癰卒倒搐搦吐沫時發時甦作猪羊牛馬雞聲隨聲
得名五獸應五臟宜六珍丹二

補益

如諸虛百損榮衛不和飲食無味宜十全大補湯五十○如

諸虛損情思不樂兼七情氣滯宜參香散一○如諸

虛損無風冷腰膝筋骨疼痛宜大防風湯六十四○如精勞

虛損氣血衰弱四肢倦怠盜汗宜養榮湯六十二○如諸虛

不足口渴唇焦盜汗宜黃耆建中湯六十三○如肝腎俱虛精

氣耗散宜益智五味圓二○如心腎俱虛七情喪志睡

卧不安宜十四友圓二妙香散下○如脾元虛弱每

食飽臍腹膨易泄腸鳴腰痛宜固真肥腸圓二○如脾

腎父虛停積瀉冷飲食無味宜補皮煎圓二○如脾

腎虛弱不進飲食不生榮衛不養精血宜厚朴煎圓二

三孫地云補腎不如補脾○如腎虛帶諸疝氣脹痛

精滑便濁宜固真丹二○如陽虛難以峻補只滋養

心血血生氣氣生精宜固本圓二○如精氣虛

顏色顛悴下冷無熱宜雙補圓二○如少年夢遺
 下水瀉行似踏空宜百四十四○如元陽虛憊精氣
 不固夢泄白濁宜百四十四○如精血虛耗不固溺
 遺及夢泄宜百四十四○如真陽不足上氣喘急
 自汗氣短頭暈宜百四十四○如上盛下虛氣不升降
 胸痞氣急宜百四十四○如五臟俱虛陰陽衰損上盛
 下虛痰生頭眩宜百四十四○如真氣不足元陽
 虛精滑盜汗陽事不舉宜百四十四○如真氣虛憊
 寒邪攻衝四肢不舉自汗體厥宜百四十四○如腰理不
 密易感風邪宜百四十四○如體衰飲
 酒易醉或欲多飲難醉宜百四十四○
 消渴
 脉宜洪大○如傷寒身熱發渴在表宜升麻葛根
 裏宜小柴胡並加瓜蒌根○如伏暑煩渴飲水宜五
 寒及大病後病欲差而渴者宜濃煎獨參湯旋飲冷

入朱砂末服○如病後脾虛津液燥或有餘熱虛渴
 者宜參苓白朮散加烏梅天花粉煎上膈熱宜羅維
 百五○如酒後煩渴或傷生冷或吐或泄宜六和湯
 加乾葛又宜百八十八○如腎水枯竭不能運上
 消渴恐生癰疽宜百八十八○如腎
 虛不足消渴小便反數宜百八十八○如腎
 子○如腎虛水火不升降患三消渴宜百八十八○
 熱宜百八十八○如消渴宜百八十八○又宜朱砂大黑
 豆天花粉等分為末糊圓如梧桐子大每有圓黑豆
 湯下○如三消宜百八十八○用烏梅肉遠志肉製成
 殼等分加茅根煎夏月加黃連連志○如三消上盛
 下虛諸藥不効宜百八十八○消渴良方宜黃連瓜蒌
 根一分生冬瓜十分煎湯常服渴則飲之
 癰疽
 如癰疽惡瘡丁腫有熱者先宜百八十八○如二
 二日宜獨蒜切錢片當頭灸無蒜錢代者癰疽至不

痛不痛至痛三四日則不宜灸○如一二日宜銀
 器內煎芝麻油壹斤十餘沸入好酒二椀煎分作五
 服日夜服之又宜^{內托散}○如一二日宜大黃水
 煎服得利為度有熱者用之如常喜服丹石灸燭之
 人宜粉草節熬膏臨卧服五更服○如二三日宜遠
 志洗淨為末酒調清服仍濃調傳瘡上熱則涼痛則
 止又宜灸足三里穴○如三四日已用前法合用香
 藥透達經絡宜^{玉香連翹散}無熱去大黃○如已潰
 血熱宜^{十奇散}一虛冷未潰亦服蓋未潰不可用熱
 藥已潰不可用涼藥○如癰疽人有證為難治宜
 證治之渴治渴泄止泄汗治汗則宜黃芪白朮小麥
 等○如疽發背先用箍藥宜^{活調傳散}一箍住瘡氣
 潰後洗宜^{蘇湯石}○如疽已潰不可使用膏藥恐封
 閉毒氣遲則宜之欲結口宜^{修末}○如肺癰
 出膿血神悶咽渴大小便^宜六十五^{先宜}草散
 八十後服^{防已}又紅棗煎等分燒灰存性為

飲下○如乳癰初作腫痛宜瓜蒌子忍冬草以水
 濃煎服又宜貝母天花粉等分為末酒調服
 腫病
 肺宜浮大○如諸氣痞滯遍身虛浮膨脹喘急宜^木
 流氣飲^一小便少則^{分心氣飲}一○如脾受風濕氣
 血凝滯面目四肢虛腫宜^{五皮散}○如脾衰不能
 制腎水浸漬脾土陰水作腫宜^{實脾散}○如脾腎
 俱虛四肢浮腫不渴小便澀少宜^{復元丹}此丹八
 分補益二分去水○如通身浮腫煩渴引飲喘急大
 小便不利不宜服熱藥宜^{疎鑿飲}○如血氣俱熱
 遂生瘡疥為腫煩渴小便澀宜^{赤小豆湯}○如積久
 水攻面目氣急腰已上俱浮腫宜麻黃二兩甘草一
 兩咬咀水煎空心溫服汗出而愈○如水腫大小便
 不利宜^{神助散}又宜^{溫白丸}遇夜服二拾圓次早
 大便利則如前圓數不利則加圓數○如濕氣留滯
 腳腿腫浮早輕晚重宜^{四金丸}○如遊風走攻頭

面或四肢作腫塊宜知母湯六十七○如春月少年坐卧濕地兩脚腫痛宜敗毒散八十六加蒼朮服

脚氣

如三陽經脚氣踝上赤痛寒熱往來宜敗毒散八十六加蒼朮熱多加大黃芒硝○如常履濕地風濕攻脚緩縱痺痛宜五積散八十一加檳榔○如血氣不和脚氣頻發不問冷熱宜行氣散一百九○如肝腎虛履濕地濕毒攻內兩脚攣痛痺弱宜獨活寄生湯二○如風濕脚氣痺弱不能轉側宜續命湯一筋骨攣痛宜虎骨散八十四○如脚氣作吐飲食不進大便不通手心熱口舌燥宜推氣圓一百一十二煎半麥湯下○如脚氣欲發大便先閉虛老人難服推氣圓宜順氣圓二一百一十一○如腎虛風毒下注脚膝不可踐地小便微澀宜思仙續斷丸二百四十七○如虛老人脚氣上攻牙齦腫痛口舌生瘡宜黑錫丹二百七十六○如脚氣皆因脾胃虧損血弱筋虛因四氣或飲食而發發則先宜調利後調理宜嘉禾散一百一十六及補藥云脚氣無補法者

非也大宜疏通前行氣散一百九最妙又宜順氣丸一百一十一防墮之又方設則脚骨痛甚著宜用烏白散一百三十三其方

失血

脉宜沉細○如傷寒汗下不解或衄吐血面黃大便黑者宜犀角地黃湯二十○如飲酒傷胃及啖炙煖食熱動血發衄吐血宜理中湯二十四○如積熱咽隔不利吐血衄血宜三黃湯六十八○如夏月伏暑鼻衄不止宜五苓散八十八同百草霜末茅根煎湯下○如心氣虛耗不能藏血五心煩熱咳嗽唾血宜伏苓補心湯一百七十七○如鼻衄宜葱汁磨墨滴入鼻中令人含水噴衄者不令衄者知却衄者以鼻吸新冷水到至處又宜生羅蔔自然汁滴入鼻中仍服少許又宜畫筆蘸龍煤深塗入鼻中又宜綿裹蟬皮灰半錢塞鼻或吹蟬皮灰入鼻中又宜亂髮燒灰水服仍搗之又宜葱白汁和酒滴三四滴入鼻如體氣虛人宜四物湯三十一加側柏葉又宜水調服○如吐血又各血衄勞動傷肺則吐血有熱

着宜雞蘇圓二無熱者宜四物湯香蘇散煎服熱甚六十八○如齒牙痛皮煎湯漱服又每旦捻鹽入口熱湯含齒漱百遍效又宜五倍子燒灰擦去血穴中妙○如血自皮膚藏出宜煮黃連紙貼之愈

大便

如風秘腸胃熱結裏急後重小便數宜麻仁圓二○如三焦伏熱煩燥津液中乾便閉宜大黃散子一○如七情氣結五臟不能流通脾胃不和大便閉澀宜三散一百○如虛老人氣虛秘結宜橘香圓二又宜葱白煎湯去葱入阿膠二錢蜜三大匙化開食前溫服又宜蘇子麻仁等分研爛水瀝取汁煮清米粥服之○如臟寒天腸絞結滯宜金液丹麻仁杏仁煎湯下○如大腸乾燥宜蜜導法○如氣不下降大腸秘澀宜寬快湯輕則小烏沈湯重則穀散一服○如大腸每閉澀即諸風病發或諸氣發宜順氣圓二○如

無故便血宜百藥煎為末溫水服又宜濃煎艾湯入生薑汁服之又宜槐花京芥等分末酒服○如虛老人陽氣虧脫血不能存走失大腸宜鹿茸圓二○如傷酒大便下血宜酒連圓二又宜香蘇散加黃連京芥枳殼服○如臟毒宜烏荊圓二○如痔病下血宜圓二宜煮牛脾如常食之尤効

小便

通利小便宜車前子澤瀉瞿麥木通連翹絕子麥門冬燈心赤茯苓滑石通草蜀葵子之類淋有氣石血膏勞名五淋○如下焦有熱淋秘數尿出則莖痛宜地黃子湯○如伏暑小便赤澀宜五苓散○如加車前子又宜益元散○如心虛積熱小便閉澀或成淋痛宜增味車前散九十五○如腎氣不足膀胱有熱澀或尿如豆汁宜五淋散一○如腎虛七情勞心上盛下虛煩渴小便赤澀宜蓮子飲百又宜琥珀散○如思慮過度陰陽不分小便白濁宜四七湯吞白九

九子二百 ○如精氣不固夢泄白濁宜 百四十二 又
 五十四 ○如精氣不固夢泄白濁宜 百四十二 又
 宜 百八十六 又宜 百九十九 ○如氣不固精滑
 尿遺白濁宜 百五十一 夢遺 百五十一 ○如腎虛
 腰疼夢泄白濁小便頻數宜 百五十一 甚則宜
 圓 ○如淋是小便點滴來時多痛是心與小腸兩經
 病有熱有冷有腎虛氣虛熱者利小便藥中加涼劑
 冷者利小便藥中加熱劑虛者補腎藥中加通利小
 便劑如 八味丸 是也如氣宜利小便藥中加氣藥
 如沉香檳榔紫蘇之類如 木香流氣飲 氣降則自通
 利必須緩加調理斯疾不可峻速善矣
 瘡疥
 如四肢瘡疥痒痛不常或增寒發熱宜 升麻和氣飲
 ○如心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥宜 歸
 飲一百 ○如風熱濕氣血虛生瘡宜 百三十一 又宜
 九十五 ○如風熱濕氣血虛生瘡宜 百三十一 又宜
 體虛遍身瘡疥 ○如血氣不順癰疹風瘡瘡疥宜
 圓二百諸瘡宜油藥膏塗 ○如血熱氣滯皮膚遍身
 五十七

生瘡痒癢出血宜 百五十六 ○如腫瘡先宜溫藥湯
 洗後用聖若葉貼又宜木香貝母五倍子白芷等分
 為末搽脚瘡水流延湯漸大宜 雄毛散 ○如癰瘡宜
 輕粉雌黃等分為末猪脂調瓜破捺又宜韭菜煎湯
 洗蛇床海桐皮末臘月猪脂調 ○如瘰癧宜烏雞子
 七箇斑猫四十九箇去頭足翅淨每雞子壹箇去頂
 用筋攪勻入斑猫七箇用紙糊頂口飯上蒸熟取碎
 去斑猫食雞子每食一箇煎 五錢散 下已破者生
 肌未破者消散又方宜 法製皂角子 服之又宜 壯効
 八十二 ○如瘰癧宜煎五倍子湯洗又宜生蠟黃付
 之又宜羊乳付之又宜乾荷葉煮洗 ○如丁瘡宜嫩
 蒼耳紅根搗爛酒調服又宜蟬蛻殭蚕為末酒調塗
 四圍留瘡口根出長拔去之
 婦人
 如榮衛虧損經水愆期不時腹痛益血補虛宜 四物
 湯三
 十 ○如血氣虛損四肢倦怠頭眩自汗飲食不思宜

湯六十三如氣盛血衰頭暈滿痛怔忡宜抑氣散一百四十
 ○如氣盛經水不調腹痛膨脹惡心宜養附圓二治一百六十一
 婦人百病○如未孕生產及久斷不產血手積冷穢
 物合去宜溫胎湯及坐導藥七十二同七十二○如血弱子臟風冷凝
 滯榮衛相乘令人少子宜紫石英圓二一百六十二○如脾血受
 病經水不通血化黃水流入肢體浮痛宜參歸丸一百六十五
 名血分病○如血崩月水前期天暑地熱經水沸溢
 宜黃芩壹錢秤銀燒滓酒調服又黃連三錢黃柏煎
 參壹錢炒阿膠半錢再煎作三次溫服又宜湯三
 一加大艾炒阿膠黃芩煎又只加炒黑香附子又宜
 蓮房殼夏香爾為藥同燒灰存性為末入鹽五更并
 水服又宜雞蘇丸一百五十八已上皆是血遇熱則行者○如
 崩漏經水後期天寒地凍水凝成冰宜養宮丸一百六十四又
 宜白芍藥一兩乾薑二兩咬咀炒冷黃色為細末空
 心米飲下服半月見効又宜當歸建中湯六十三加附子乾薑
 參黃散服或芍藥子理云服歲丹愈者蓋歲丹非能

止血但固元陽使勝陰氣血陰氣也無陽則不安經
 云陽虛陰必走是也○如血虛竭經閉不調腹痛腰
 重又治室女月水不通宜紅花當歸散一百四十一○如月水不
 通身熱減食腹脹如鼓宜麥花散一百四十二血鼓兼宜桃仁圓
 圓二百○如似癥瘕血積不通體疼腰痛宜桃仁圓一百九十一
 ○如血虛勞倦五心煩熱盜汗嗜卧寒熱似瘧宜通
 散一百○如血風勞氣寒熱盜汗口乾痰嗽精神不
 爽體瘦淹延漸成骨蒸宜人參刺芥散一百四十四○如諸虛不
 足心腹疼痛及一切血氣宜不換金圓二一百六十六又宜雞蘇
 三○如出血過多心神不安睡卧不得語言失志宜
 寧志膏二燈心湯調琥珀末下○如妊娠感風寒身
 熱不可輕投湯劑發散宜芎藭散一百四十五又宜葱白生薑
 煎湯服以得汗為愈○如妊娠惡阻心中憤悶吐逆
 倦怠喜酸酸物體疼身宜半夏茯苓湯七十三○如妊娠三
 月惡阻為痛及氣鬱生疼宜四七湯四十四○如妊娠心驚
 膽悸煩悶名于煩宜麥門冬湯七十四○如妊娠有熱口乾

煩渴上焦壅熱口瘡^{知母散百}○如妊娠成形胎
息未實勞力驚觸或食毒物致令下血名曰漏胎宜
桑寄生散一○如妊娠壓墜動胎腹痛下血宜縮砂
炒熱透去殼取仁為末貳錢重熱酒下○如妊娠大便
閉澀宜^{枳殼散}小便秘宜用赤伏苓木通冬葵子煎
湯調下○如妊娠腰腹脹兩脇虛鳴臍下冷痛大便滑
泄小便頻數宜^{安胎和氣飲}○如妊娠遺尿白帶白
芍藥等分為末二錢空心酒下又宜桑螵蛸十二箇
為末作二服米飲下○如妊娠胎氣不和湊上心腹
脹滿疼痛名曰子懸宜^{紫蘇飲百}胎病多宜此藥加
減○如妊娠七八月胎氣肥盛預合瘦胎宜^{枳殼散}
臍寒體弱者不可服○如催生宜^{五積散}加杏仁南
星阿膠酒水煎又宜^{佛手散百}又宜風化朴硝入朱
砂同研如桃花色童子便下二錢亦下死胎又宜^金
十^{散百五}又方清油^{和蜜等分}入湯煩服又蜀葵子炒
米酒湯任下又宜^{香桂散百}又右手持馬嘶鐵左手

持石燕對合手坐死胎即下又新汲水濃磨京墨
服又吞雞子清壹箇諸方亦治死胎○如胎衣不下
宜^{花葉名散}三宜麻子十四枚去壳研紙裹臍足下
男左女右衣下即去又炒服熟地又吞雞子清一
箇又宜好京墨末酒服又宜^{黑神散一}又宜燒鐵斧
通紅投酒中沸定則出飲之○如產後宜即燒乾漆
烟^{醋炭}於產婦傍防有血暈○如產後惡露不盡
攻衝心腹作痛血暈眼花宜^{黑神散一}酒下○如產
後發熱自汗肢體痛名^{烏豆散百}勞宜^{羊肉湯}宜猪腰粥宜
五十四^{熱入血室宜湯}○如產後勞傷血氣
相尅陰陽不和乍寒乍熱宜^{增損四物}○如產後下
血過多暈悶不知氣息欲絕宜^{清血散一}○如產後
勞風邪垂虛而入四肢痠癢反張宜^{小續命}有熱京
芥末炒烏豆淋酒下○如產後心志不寧心血耗散
亂言見鬼宜^{寧志膏二}研琥珀麝香燈心湯下○如
產後勞傷腸胃虛怯腹痛泄瀉腸鳴宜^{安胎和氣飲}

加附子當歸人參煎○如產後傷血津液暴竭大便
閉澀宜百七十一二六七日腹消痛宜一百一十又宜食
蘇麻粥

小兒

小兒有病皆憑脉一指關上定準側浮洪風盛數攸
驚虛冷沉遲實有積○如脾胃不和體氣怯弱不思
飲食飲食易傷宜四君子湯洩瀉加肉豆蔻○如風
熱頭痛鼻塞咳嗽清涕或疑瘡疹宜惺惺散○
寒邪潮熱煩渴痰實咳嗽壯熱仍疑瘡疹宜羌活散
○如寒邪風熱心經蘊熱小腸閉澀宜當歸連翹散
○如夫驚夫食疳熱似瘡煩渴冷汗日夜發熱體瘦
腹大宜脫甲散○如血脈壅滯臟腑生熱類赤發
渴五心煩燥四肢驚鬱宜清涼飲○如因吐利
驚風胃虛神昏困乏搐搦欲成慢脾宜全蝎散
如急驚風熱盛潮作搐搦宜利痰圓○金銀薄荷
下又杏珠圓○如乳癖食積氣滯積聚腹大神

腎五疳體瘦宜百六十八○如五疳煩熱燥渴腹大
脹滿面黃羸瘦宜百六十九○如諸虫腹痛疳食氣
積肚緊痞氣宜百七十○如久病胃虛虫動面黃
髮直羸瘦肚大發熱宜百七十一○如脾胃虛或
吐洩病後津液枯燥渴欲飲水宜百七十二○如脾
虛胃弱腹痛洩瀉不思乳食嘔吐不止面黃困乏宜
益黃散○如病後脾胃不和四肢浮腫宜百七十三
桑白皮湯調服○如稟氣虛弱七八歲不能行立宜
八味圓二服一料自愈功在澤瀉○如久病體虛
柱骨倒宜白殭蚕末三歲用半錢薄荷湯服宜木鱉
子草麻子研細唾調摩兒頂上令熱貼之○如解額
骨應合而不合宜細辛桂乾薑為末乳汁和傳額上
乾再傳兒面赤即愈○如百日內咳嗽宜天南星末
薑汁調傳額門又宜一百二十四薑汁調傳額上此
病蓋因乳母鼻風吹而成○如鵝口瘡宜煎汁
半服半用亂髮蘸指舌又宜朱砂枯礬等分末付舌

上又吳茱萸炒赤末醋調塗脚心効即洗去○如大
舌重舌宜刺舌下去血即愈又宜吳茱萸末醋調貼
脚心又宜白芨末乳汁調傳脚心○如氣不足齒
久不生骨隨不充宜^{四物湯}加山薯蕷甘草服○如
丹疹宜蜜調土朱入酒服仍研搽之又梔子仁末水
調付又蕎麥粉醋調付又赤小豆末和雞子清塗乾
即易之

雜病

如有縊宜解不可截斷繩心溫者以衣物塞兩耳將
竹筒口中重吹氣入口仍閉其邊莫令氣出可活又
將大雄雞先撚其頸閉氣以甬入縊人口中放熱頭
手令鷄氣入口人即活又半夏末吹鼻中又灸臍中
百壯又葱黃心刺鼻入五寸男左女右目中血出即
活○如溺水宜解去衣灸臍中即活又取牛一頭
將溺人肚腹覆在牛背上兩人扶策徐徐牽牛行腹
水出醒時將^{蘇合香圓}二百四或生薑擦齒無牛則以人卧

檟上將溺人如前法肚腹人背又灸臍中百壯又半
夏末吹鼻中又皂角末綿裹納下部出水即活○如
蛇傷宜續隨子半生半炒為末酒下三月九箇四月
十二箇五月十五箇作三服隨月加減又方宜細辛
白芷白芨雄黃末麝香酒下又方貝母末多服少頃
酒自傷處出盡作効仍以貝母末付之妙又方熟傷
熱灸又方傷處四面用大糞圈之又先宜冷水洗後
用茱萸二合研水一梳服將滓付傷處又方用帛布
片縛住兩頭手按擦去毒氣水搗槐葉傷處四圍
○如大傷宜麝香沉香防風等分為末以生杏仁研
酒下又方細辛白芷雄黃加虎骨麝香酒下又宜斑
蝥七箇去頭翅足為末水研豆豉四十九粒為膏圓
如梧子大白湯下去小便於桶中氣疑結如狗形則
愈如不下再服以見形為度後服^{益元散}九十三又方初咬
破時用胡桃殼一邊填滿人糞卷傷處縛定灸殼上
三七壯永不發○如蜈蚣傷宜山胡椒加鹽擦又方

以汗垢擦又方汗垢加嫩楓葉擦又方蘇葉擦又方
 麻油燈烟薰之甚妙○如火傷宜香油白水相等成
 膏調寒水石末塗之又方藏鹽外灰擦又方大黃末
 水調付又黃芩末水調付若傷火悶絕宜小便又鄧
 白皮爛研傅乾則易定痛去火毒無疤瘢又方生蜜
 塗上痛妙○如赤爛熱痛宜赤石脂寒水石大黃新
 水調付○如湯傷宜金櫻葉研爛入鹽付之又方水
 花曬乾油調付之火瘡通用又赤石脂末擦乾則雞
 子清調付又生栢葉攪爛塗又用前柳白皮末藥妙
 ○如金傷宜五月五日撞手草和石灰搗爛曬乾
 末擦又方蚌蛭屑擦又方黃連爛即等分煮
 之又^{花藥石散}末又宜五月五日以墨同煮藥
 汁調石皮令乾為末擦之又炒石灰令沸後溫入
 黃末抄勻要如桃花色名利水桃花散又方臘月
 膽入龍骨金毛狗脊毛懸當風處用○如竹木傷
 白鹽梅肉食之其尖自出又方磨象牙梳末傳之又

牛膝搗塗之又烏羊屎攪爛○如骨鯁宜^{平胃散}
 十一錢^粉二錢順流水大呷嚥下又貫衆煎濃汁
 一盞半作三服大呷服將教授得効曰管仲之力也
 又嚼伏苓一錢白礬湯下又縮砂仁甘草為末綿裹
 一錢噙時咽津液又醋煎飛蟬蛻細啜飲之又薤白
 煮半熟綿繫定手牽嚼薤熟度至鯁處牽粘鯁出或
 用蜜煉塊子如此法○如誤食桐油宜乾柿炊食鮮
 之○如誤食樹氣閉不通宜食京棗三枚○如誤食
 鉅錢宜勒齋汁呷服錢自化又硬炭末水調服○如
 蟲在頭宜水銀茶末調涎擦細擦髮內又藜蘆末擦
 之○如打撲出血悶絕宜小便灌之又宜童便和酒
 調^{花藥石散}百五十三○如傷折墜打撲瘀血凝積痛不
 可忍宜熟大黃一兩去皮尖杏仁三七粒研酒一椀
 煎六分去滓雞鳴服取下瘀血即愈如氣絕不能言
 先灌熱小便又宜服^{花藥石散}百五十三童便下如傷處出
 血用上藥擦如折骨先服當歸炮草烏白芷等分末

濕酒下二錢略身後整療搗接用糯米粥調牡蠣
 末塗傷處以杉木板夾之縛定卻宜服乳香沒藥
 藥川芎川椒當歸各半兩火煨自然銅三錢為末煨
 黃臘二兩入藥不住手攪勻圓如彈子大好酒煎開
 熱服隨痛處卧少時連進數服又宜南星防風等分
 為末濕酒入薑汁調一錢服傷處仍以此藥敷貼蓋
 大治破傷風○如女人痲病宜白獨活荆芥甘草松
 花煎湯服仍宜朴消菊花煎湯熏洗○如血鼓宜香
 肥橫圖二加琥珀麝香飲湯下

如宜方卷之一

如宜方卷之二

東平艾 元夫編輯

三山張 士寧校正

小續命湯

防己 麻黃 人參 肉桂 黃芩

甘草炙 白芍藥 杏仁 川芎各一兩 附子半兩

防風半兩

咬咀每肆錢薑七片棗貳枚煎不拘時溫服

獨活寄生湯

桑寄生 獨活各二兩 白芍藥 當歸 杜仲製

防風 熟地黃 牛膝 白茯苓 細辛

秦艽 桂心 芎藭 人參 甘草各二兩

咬咀每四錢水煎空心服

十神湯

川芎 甘草炙 麻黃 升麻 白芷

赤芍藥 香附子 陳皮 紫蘇 乾薑各一兩

咬咀薑五片煎頭痛加連根葱實加枳殼

小柴胡湯_四

黃芩 人參 甘草_{各二兩} 半夏_{製二兩半} 柴胡_{八兩}

咬咀薑五片棗一枚煎

大柴胡湯_五

柴胡_{八兩} 枳殼_{五兩} 赤芍藥 黃芩_{各二兩} 大黃_{二兩}

半夏_{製二兩半}

咬咀薑五片棗一枚煎食後溫服凡與此藥者且

宜先與小柴胡湯

四逆湯_六

附子_{生五兩} 乾薑_{兩半} 甘草_{炙二兩}

咬咀水煎服附子乾薑等分名薑附湯

二陳湯_七

半夏_{六兩} 陳皮_{五兩} 白茯苓_{三兩} 甘草_{炙一兩}

咬咀薑七片烏梅一箇煎熱服加丁香砂仁治過

心

排風湯_八

白朮 白鮮皮 川芎 白芍藥 當歸

肉桂 防風 杏仁_製 甘草_{各一兩} 川獨活

麻黃 茯苓_{各二兩}

咬咀四兩姜七片棗二枚煎溫服

三建湯_九

天雄 附子 川烏_{各炮去皮臍等分}

咬咀四錢薑十片煎服加木香五錢沉香磨入名

二香三建湯

五痺湯_十

羌活 防己 白朮 當歸 片子_黃

海桐皮 白芍藥_{各一兩} 甘草

咬咀薑十片煎病在上食後服在下食前服

麻黃湯_{十一}

麻黃_{兩半} 桂枝_{一兩} 甘草_{半兩} 杏仁_{製五十個}

咬咀每五錢水煎不拘時溫服得汗爲度

桂枝湯 十二

桂枝 芍藥各二兩 甘草一兩

咬咀每五錢薑棗煎春初正方春末夏至前加黃
芩半兩夏至後加知母升麻各半兩石膏貳兩無
汗不宜服

升麻葛根湯 十三

升麻 白芍藥 葛根 甘草 各等分

咬咀水煎溫服

葛根葱白湯 十四

葛根 芍藥 知母各半兩 葱白一把

川芎 生薑各一兩

咬咀水煎

三拗湯 十五

麻黃 杏仁 甘草 各不製等分

咬咀薑煎溫服加升麻苦梗又名五拗湯

竹葉石膏湯 十六

石膏 四兩 半夏 七錢 人參 甘草 各五錢

麥門冬 一兩半

咬咀生薑青竹葉各六片粳米百粒煎去石膏加
附子名既濟湯體虛寒服之

養胃湯 十七

半夏 厚朴 蒼朮 藿香 草菓

伏苓 人參 陳皮 甘草 各半

咬咀薑七片烏梅一枚煎服

白虎湯 十八

知母 七兩 甘草 炙四兩 石膏 二十兩

咬咀二錢加糯米三十粒煎溫服煩渴加入人參

梔子豆豉湯 十九

梔子 肥大者四枚 香豉 半兩

先煎梔子至水一盞入豉煎至七分溫服得吐

即止後藥

犀角地黃湯 二十

犀角^{一兩} 生地黃^兩 芍藥^{三兩} 牡丹皮^{二兩}

咬咀水煎如潮熱發狂加黃芩大黃

大承氣湯^{二十一}

大黃^{各二} 芒硝^{各二} 厚朴^{各四} 枳殼^{半兩}

咬咀水煎朴殼至一盞入大黃至七分去入芒

硝煎一二沸溫服得利為度未利再服又大黃

兩芒硝一兩二錢半甘草一兩半名調胃承氣

小陷胃湯^{二十二}

半夏^{六分} 黃連^{二分} 枳實^{一個} 枳殼^{四分之一}

咬咀水二盞煎枳實至半入半夏黃連至八分

溫服

大陷胃湯^{二十三}

大黃^{二兩} 芒硝^{八分} 枳實^{一兩} 枳殼^{一字}

咬咀作三服水二盞煎大黃至八分入硝一二沸

入甘草末煎溫服

理中湯^{二十四}

人參 乾薑 白朮 甘草^{等分}

咬咀每四錢水煎服加附子名附子理中湯去人

參加伏苓名腎著湯加青皮陳皮各治中湯

梔子仁湯^{二十五}

梔子仁 赤芍藥 大青 知母^{各一兩} 甘草^{半兩}

升麻 黃芩 石膏 杏仁^{各二兩} 柴胡^{半兩}

咬咀每四錢薑三片豉三十五粒煎不拘時溫服

薑瀉心湯^{二十六}

生薑^{二兩} 人參 黃芩 甘草^{各一兩} 乾姜

黃連^{各半兩} 半夏^{製一兩二分}

咬咀棗一枚煎

溫膽湯^{二十七}

半夏^製 竹茹 枳實^{各一兩} 陳皮

甘草^{一兩} 茯苓^{兩半}

咬咀薑棗煎食前服

艾樞湯^{二十八}

桃仁	槐子	艾葉	各等分
咬咀棗一枚煎			
沉附湯二十九			
附子炮	乾薑各半	沉香	白朮各一甘草兩
咬咀薑五片煎空心服又大附子炮作二服薑干片煎磨沉香入藥			
三豆湯三十			
赤小豆	黑豆	菽豆各一	甘草半兩
淨淘豆入甘草水煮熟逐日空心任意食豆飲汁七日痘瘡自不發			
四物湯三十一			
當歸	白芍藥	熟地黃	川芎等分
咬咀水煎又去熟地黃加乾薑人參各增損四物湯			
六和湯三十二			
砂仁	半夏製	杏仁製	人參甘草各二兩
赤茯苓	藿香	綿豆炒	木瓜各二兩

香薷	厚朴	製各四兩
咬咀薑棗煎		
滲漏湯三十三		
蒼朮	白朮	甘草各一赤茯苓乾薑各兩
陳皮製	丁香各半	
咬咀薑棗煎		
茵陳湯三十四		
茵陳半兩	山梔子	十大大黃半兩
咬咀水煎		
桂枝湯三十五		
桂枝四兩	白朮	附子各三甘草各二兩
咬咀薑五片棗二枚煎空心服小便澀加赤茯苓腹痛加芍藥		
四君子湯三十六		
人參	白朮	茯苓甘草各等分
咬咀薑棗煎乾薑二兩霍香木香各一兩		

氏白不散常服加山藥心神不定加辰砂酸棗仁
渴加乾葛木瓜胃冷加丁香砂仁嘔吐加藿香薑
汁吐瀉加扁豆陳皮霍香豆寇痰嗽加杏仁桑白
皮半夏邪熱加前胡薄荷黃芩渴加天華粉乾
葛盜汗加陳麥大便滑加訶子天花粉細辛桔梗
各等分薄荷薑煎名惺惺散前方皆治小兒
胃風湯 三十七

人參 伏苓 川芎 肉桂 當歸

白朮 甘草 白芍藥 等分

咬咀粟米百粒煎

七葉湯 三十八

附子一个炮以水浸再炮再浸凡七次去皮擠一方用川烏蓋有風者宜

咬咀作二服薑十四片棗七枚煎當發日五更先

食薑三五箇乃服之藥餽餽用吳茱萸良薑胡椒

等分為末入猪皮細碎為餽作小餽餽以好肉

常法作大餽餽而食以吞小者蓋小者辛辣難

食故吞之

十八味丁沉透膈湯 三十九

丁香 肉豆蔻製 木香 白豆蔻 圭皮

麥牙各半 香附子 人參 砂仁各壹兩 藿香葉

陳皮製 厚朴製 沉香各半 白朮 半夏製

神麴 草薢貳錢半 甘草 壹兩半

咬咀薑棗煎

七氣湯 四十

半夏製 人參 甘草 肉桂 各壹兩

咬咀薑煎空心熱服加玄胡索乳香各加味七氣

大七氣湯 四十一

三稜 義木 青皮 陳皮製 桔梗

薤香 肉桂 益智仁 香附 甘草各

咬咀水煎

出著六一湯 四十二

甘草 壹兩

咬咀事煎	導痰湯 <small>四十三</small>	半夏 <small>製兩</small> 南星 <small>各壹兩</small>	赤茯苓 <small>各壹兩</small>	咬咀薑十片煎	四七湯 <small>四十四</small>	半夏 <small>五兩</small> 伏苓 <small>厚朴 <small>三兩</small> 蘇葉 <small>二兩</small></small>	咬咀薑七片棗一枚煎加白芍藥桂心三兩人參	橘皮貳兩名橘皮七氣湯	大半夏湯 <small>四十五</small>	半夏 <small>製</small> 人參 <small>津錢</small>	咬咀薑七片煎一方入蜜煎	息貫湯 <small>四十六</small>	半夏 <small>製</small> 吳茱萸 桂心 人參 甘草 <small>各等分</small>	蘇蘇 赤白皮 <small>各等分</small>	咬咀每四錢薑七片棗二枚食前服
------	------------------------	--	------------------------	--------	------------------------	--	---------------------	------------	-------------------------	--	-------------	------------------------	---	---------------------------	----------------

奔豚湯 <small>四十七</small>	甘草根皮 <small>焙乾</small> 乾薑 <small>各壹兩</small> 當歸 川芎	甘草 <small>炙</small> 白芍藥 黃芩 半夏 <small>製兩</small>	咬咀每四錢水煎	細辛五味子湯 <small>四十八</small>	細辛 半夏 <small>製各</small> 甘草 <small>炙</small> 烏梅 <small>各壹兩</small> 五味子	粟穀 <small>各壹兩</small> 赤白皮 <small>貳兩</small>	咬咀薑十片煎	杏子湯 <small>四十九</small>	人參 半夏 <small>製</small> 伏苓 細辛 乾薑	肉桂 杏仁 <small>製</small> 白芍藥 五味子	甘草 <small>炙各等分</small>	咬咀薑五片煎	十全大補湯 <small>五十</small>	伏苓 人參 當歸 <small>製</small> 白朮 黃耆 <small>製</small>	川芎 肉桂 白芍藥 粉草 <small>炙</small> 熟地黃 <small>分</small>
------------------------	--	---	---------	---------------------------	---	---	--------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------	-------------------------	--	--

咬咀薑棗煎服

小烏沉湯 五十一

香附 二十兩重 烏藥 二十兩 甘草 炙壹兩

爲細末湯點服對平胃散未名胃沉湯

小苦辛湯 五十二

川芎 一兩 細辛 二錢 白朮 二錢 甘草 炙壹錢

咬咀薑棗芽煎

大芎辛湯 五十三

附子 烏頭 天南星 乾薑 指 川芎

細辛 甘草 各等分

咬咀薑五片茶芽煎食後服二方云附子乾薑并

草加石膏白芷並菲汁圓如梧桐子大嚼生芍藥下

名七生圓治人般頭風諸厥頭疼

沉香降氣湯 五十四

不附 淨岸西 沉香 壹錢 砂仁 伍錢 甘草 炙壹兩

爲末沸湯點服

牛蒡子湯 五十五

牛蒡子 玄參 升麻 桔梗 甘草

犀角 木通 黃芩 等分

咬咀薑三片煎

紫蘇子湯 五十六

紫蘇子 兩 大腹皮 草果仁 半夏 製 厚朴 製

橘 絲 製 木香 木通 白朮 枳實

人參 甘草 各半兩

咬咀薑棗煎不拘時服

枳實湯 五十七

枳實 厚朴 製 各一兩 甘草 炙 大黃 各貳錢

桂心 貳錢半

咬咀薑棗煎加半夏壹分

益榮湯 五十八

當歸 黃芪 炙 小棗 酸棗仁 柏子仁

麥門冬 伏神 白芍藥 紫石英 各一兩 木香

子 41—160

赤小豆湯 六十六

赤小豆 當歸 商六 澤瀉 赤芍藥

連翹 豬苓 桑白皮 防已 各等分

咬咀薑煎熱者加犀角

知母湯 六十七

知母 二兩 麻黃 製 黃芪 多 甘草 炙 羌活

白朮

咬咀入枳殼牛蒡子搥碎煎冷則去牛蒡子

三黃湯 六十八

黃連 黃芩 大黃 煨等分

咬咀水煎空心服

檳榔湯 六十九

檳榔末 三錢 紫蘇 二葉 陳皮 三箇

水煎熱服

寬快湯 七十

香附 二兩 烏藥 枳殼 各兩 砂仁 七錢五分

甘草 炙七錢 蘇子 炒半兩 青木香 三錢

為末陳皮煎湯調下

地膚子湯 七十一

地膚子 兩 知母 黃芩 瞿麥 枳實

升麻 木通 葵子 海藻 猪苓 各

咬咀薑五片煎不拘時溫服忌甘草

盪胎湯 七十二

朴消 牡丹皮 當歸 大黃 桃仁 各

細辛 厚朴 赤芍藥 桔梗 人參

茯苓 肉桂 甘草 牛膝 橘皮 各

附子 蜜虫 水蛭 各四十個

咬咀酒水共煎至六分日三服夜一服覆得少汗

必下積血赤膿斟酌其下盡力弱少服恐不盡用

坐導藥用皂角吳茱萸當歸各一兩細辛五味子

乾薑各二兩六黃卷石鹽川椒各半兩為細末以

絳袋盛如大指長三寸餘盛藥令滿繫定納婦人

陰中坐臥入意勿令行走小便去之更與一日一
易新者必下青黃藥汁盡止若未見病出可十
日一次安之本為子宮有冷惡物故令無子值天
陰冷則發痛漢候病出盡方止不可中輟每早晚
用苦盤來煎湯薰洗

半夏伏苓湯 七十三

枝覆花 陳皮 桔梗 白芍藥 人參

甘草 川芎各一 熟地黃 赤伏苓 各半兩

半夏 製二兩半

吹咀薑煎

麥門冬湯 七十四

麥門冬 白伏苓 防風 各一兩 人參 半兩

吹咀薑五片淡竹葉十皮煎不拘時溫服

羊肉湯 七十五

當歸 人參 各七 黃芪 炙一 生薑 半兩

用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入藥煎至

四盞去滓作三次服又宜豬腰粥用腰子一對去
白膜切作柳葉片鹽酒過先用粳米一合入葱椒
煮粥鹽醋調和將腰子片鋪盞底用熱粥蓋作食
生粥空心服

胃苓湯 七十六

平胃散 末 五苓散 末 各等分

沸湯調服

參附湯 七十七

人參 半兩 附子 製一兩

吹咀分作三服薑十片煎食前溫服

蘇子降氣湯 七十八

當歸 甘草 厚朴 製 前胡 各二 陳皮 製

桂各二兩 蘇子 半夏 各五兩

吹咀薑煎

清脾湯 七十九

黃芪 白芷 升麻 人參 甘草 各

半夏製各等分

咬咀每服四錢薑五片棗二枚煎食後服

純陽真人養臟湯八十

人參 當歸 白朮煨各六錢 肉桂去輪皮

甘草炙各八錢 肉豆蔻麝香煨半兩 白芍藥

木香不見火各一兩六分重 訶子去核一兩二錢

罌粟殼製各三兩六錢

咬咀爲麤末每服二大錢水盪半煎食前服老人

孕婦小兒暴瀉急宜服之立愈忌酒麪生冷魚腥

油膩如臟腑滑泄夜起久不瘥者可加炮了附子

三四片煎服此藥的有神効不可具述一本不用肉豆蔻

五積散八十一

陳皮製六兩 麻黃三兩 枳殼六兩 白芍藥 川芎

當歸 甘草炙 茯苓 半夏製 肉桂

白芷各三兩 厚朴 乾薑各四兩 桔梗十二兩

蒼朮製二十四兩

咬咀慢火炒令色轉續入肉枳殼薑葱煎去麻黃

名和氣散八十二

白朮 茯苓 白芷 陳皮製 烏藥一兩

人參一兩 甘草炙半兩 青皮壹兩壹錢

細末每服錢水煎不拘時溫服

稀涎散八十三

腎礬壹兩 牙皂四個

右末輕者半錢重者三七字溫水灌下一方半夏

十四箇皂角一條咬咀水煎入薑汁少許不飲灌

之亦名稀涎散

犀骨散八十四

虎胥骨一兩 白花蛇 天麻 自然銅 防風

白附子 檳榔 肉桂 當歸 羌活

牛膝製 白芷 川芎 僵蚕各一兩 全蝎

地龍 乳香 沒藥 雄黃各半兩 麝香一分

右末二錢食前以煖豆淋酒下

金沸草散 八十五

剝茶穗 四兩半夏製

甘草 各一兩 麻黃 製

前胡

旋伏花 各參兩

赤芍藥 膏兩

咬咀薑棗煎熱服

敗毒散 八十六

人參 伏苓

甘草 炙

前胡

川芎

羌活 獨活

桔梗

柴胡

枳殼

咬咀薑薄荷煎熱服加陳米名倉廩散加地骨皮

天麻名羌活散

附子散 八十七

附子 炮壹錢 肉桂

當歸

白朮 各五錢

半夏 製

乾薑 各半錢

咬咀薑煎熱服衣覆取汗又煮薑法葱白一束長

二寸線纏如餅餠大以火煨一面令通熱其以熱

者用熨斗熨之金餅熱氣透入腹中更

麥三四餅候手足溫有汗乃差更服四逆湯

五苓散 八十八

澤瀉 二兩 肉桂 一兩

白朮

猪苓

赤伏苓 各壹兩半

右末熱湯調下加辰砂名辰砂五苓散

燒桐散 八十九

婦人棍襠燒灰

右末水調服以小便利陰腫則愈

木香散 九十

木香

大腹皮

赤伏苓

訶子 炮

陳皮 製

肉桂

人參

半夏 製

甘草 炙

丁香

前胡 各等分

咬咀薑一片煎服

異功散 九十一

丁香

木香

肉豆蔻

厚朴 製

陳皮 製

當歸

桂 各貳錢半

附子 炮壹兩半

白朮

茯苓

人參 <small>各貳錢</small> 半夏 <small>製壹錢半</small>	咬咀薑三片棗五枚煎	二香散 <small>九十二</small>	香薷散 香蘇散	右等分水煎腦痛加連翹煎又方二香散對霍	香正氣散名正氣二香散	益元散 <small>九十三</small>	滑石 <small>六兩</small> 甘草 <small>一兩</small>	為細末并水調服夏月常服利小便解暑一方入	蜜服	霍香正氣散 <small>九十四</small>	厚朴 <small>製</small> 陳皮 <small>製</small> 白朮 桔梗	半夏 <small>製各二兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 大腹皮	白芷 茯苓 紫蘇 霍香 <small>各三兩</small>	咬咀薑煎	增味道赤散 <small>九十五</small>
--	-----------	------------------------	---------	--------------------	------------	------------------------	---	---------------------	----	--------------------------	---	---	--------------------------------	------	--------------------------

黃芩 車前子 山梔子 川芎 赤芍藥	生地黃 木通 甘草 <small>炙等分</small>	咬咀竹葉薑煎	大霍香散 <small>九十六</small>	霍香 木香 青皮 神麴 人參	肉豆蔻 <small>製</small> 良薑 大麥蘗 訶子 <small>製</small> 白茯苓	甘草 <small>炙</small> 厚朴 <small>製</small> 陳皮 <small>製各一兩</small> 乾薑 <small>炮半兩</small>	右末每二錢陳米飲入鹽調熱服	六柱散 <small>九十七</small>	茯苓 附子 <small>炮</small> 人參 木香	肉豆蔻 <small>製</small> 訶子 <small>等分</small>	咬咀薑五片鹽煎去肉豆蔻訶子名四柱散	麻仁散 <small>九十八</small>	厚朴 <small>製</small> 枳殼 白朮 粟米仁 <small>製</small> 粟 <small>製</small>	人參 赤芍藥 陳皮 <small>製</small> 木香 黃連	當歸 甘草 <small>炙</small>
-------------------	------------------------------	--------	-------------------------	----------------	---	--	---------------	------------------------	------------------------------	---	-------------------	------------------------	---	----------------------------------	------------------------

吹咀每三錢陳米百粒水煎一方加地榆一方加

大麻仁蜜煎

交加散 九十九

敗毒散 五積散

右等分薑連煎

秦光散 一百

北柴胡 常山 秦光 甘草 各半兩

吹咀酒水童便各半煎服五更服

丁香煮散 一百

丁香 乾薑 紅豆 青皮 陳皮 製

甘草 川烏 良薑 胡椒 二兩

益智仁 五兩半

吹咀薑鹽煎

五膈寬中散 百二

白豆蔻 砂仁 丁香 青皮

陳皮 製各 木香 二兩 香附 十六 封草 炙五兩

原朴 製六兩

為末鹽湯點服

蟠葱散 百三

蒼朮 甘草 肉桂 乾薑 蓬莪朮

三棱 伏苓 青皮 砂仁 檳榔

丁皮 玄胡索 炒三兩

吹咀葱白煎空心熱服

訶子散 百四

訶子 甘草 厚朴 乾薑 草薢

陳皮 良薑 伏苓 神曲 麥牙 等

為末入鹽沸湯調服

理脾散 百五

肉桂 良薑 陳皮 青皮

甘草 訶子 草豆蔻 川烏 炮一个

吹咀薑煎空心服又名進食散

香薷散 百六

白扁豆 <small>炒</small> 厚朴 <small>製各八兩</small>	吹咀水煎服一方去扁豆加薑製黃連二兩名黃連香薷飲入酒半煎一方加良薑霍香檳榔木瓜蘇蘇赤伏苓各二兩名卻暑飲薑棗煎	橘蘇散 百七	陳皮 <small>製</small> 蘇葉 杏仁 <small>製</small> 半夏 <small>製</small> 白朮	桑白皮 五味子 貝母 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	吹咀薑五片煎	華蓋散 百八	蘇子 <small>炒</small> 陳皮 <small>製</small> 杏仁 <small>製</small> 赤伏苓 桑白皮	麻黃 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	吹咀水煎	香蘇散 百九	紫蘇 香附 <small>各二兩</small> 陳皮 <small>製</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	吹咀薑葱煎熱服內加川芎白芷名芎芷香蘇散內加三棱莪朮丁皮史君子苦練根皮名君子香
---	---	--------	---	---	--------	--------	---	---	------	--------	--	--

蘇散治小兒虫氣痛內加木瓜檳榔蘇木烏藥	活蒼朮名行氣散熱多加大黃治脚氣	川芎茶調散 百十	薄荷 <small>八兩</small> 川芎 荊芥 <small>各四兩</small> 羌活 甘草 <small>炙</small>	白芷 <small>各二兩</small> 防風 <small>半兩</small> 細辛 兩	為末茶清服	菊花散 百十一	石膏 防風 枳殼 甘草 <small>炙</small> 甘菊花	蔓荊子 捉覆花 羌活 <small>等分</small>	吹咀薑五片煎	三白散 百十二	白牽牛 白朮 桑白皮 陳皮 <small>製</small> 木通 <small>各半兩</small>	為末薑湯空心下	平胃散 百十三	蒼朮 <small>製八兩</small> 厚朴 <small>製</small> 陳皮 <small>製五兩</small> 甘草 <small>炙二兩半</small>	吹咀薑葱煎沸湯點服又方陳皮八兩蒼朮厚朴
--------------------	-----------------	----------	--	---	-------	---------	----------------------------------	------------------------------	--------	---------	--	---------	---------	--	---------------------

各二兩名對金飲子

玉屑無憂散 百十四

寒水石 兩三玄參 貫衆 滑石 縮砂仁

黃連 伏苓 甘草 主用 山豆根 荆芥 各

鵬砂 二錢

爲末搽舌上後以新水嚥下此藥除痰去八邪殺

九蟲辟濕

烏藥順氣散 百十五

白僵蚕 製 川芎 白芷 枳殼 桔梗

甘草 各一兩 麻黃 製 陳皮 製 烏藥 各二兩 乾薑 兩

爲末薑棗煎或酒煎頭寒加葱白煎

嘉禾散 百十六

枇杷葉 意苡仁 伏苓 人參 縮砂仁

甘草 各二兩 大腹子 杜仲 石解 隨風子

木香 藿香 沉香 丁香 陳皮 各

穀芽 桑白皮 白豆蔻 青皮 各半 半夏 製

神曲 各一 五味子 檳榔 各半 白木 一兩

咬咀薑棗煎一乾柿一枚煎療氣膈吐逆入薤

白煎

洗心散 百十七

白木 一兩 麻黃 當歸 芍藥 甘草

荆芥穗 大黃 麝香 煨 各六兩

爲末生薑薄荷湯下加桑白皮杏仁半夏各

飲子

育神散 百十八

人參 白木 伏苓 伏神 去木 當歸

乾薑 炮 遠志 製 紫苑茸 赤石脂 桂心

紅芍藥 龍骨 各半錢

咬咀薑棗煎食後服

天華散 百十九

天花粉 生地黄 各 交閉冬 五味子 甘草

乾葛 各半兩

吹咀糯米煎

人參消風散 百二十

荆芥穗 甘草 炙 芎藭 羌活 人參

伏苓 僵蚕 製 霍香 蟬蛻

防風 各參 厚朴 製 陳皮 製 十兩

爲末沸湯或茶清服

星星散 百二十一

半夏 製 南星 常山 草果 陳皮

厚朴 製 檳榔 秦艽 柴胡 蒼朮 製

烏梅 良薑 等分

吹咀酒水各一盞挑柳枝各七寸甘草一寸煎去

浮露一宿散日雞鳴時服又方用常山生煨草果

各一錢東方挑枝七寸煎入生薑汁半盞一宿

五更服

橘葉使散 百二十二

木通 同巴豆炒去 川練子 同巴豆炒去

青皮 陳皮 製 三稜 莪朮 檳榔

甘草 製 已上各等分

吹咀橘葉皮煎文宜蒸耐軟氣法用烏藥荆芥蒼

朮茵陳五月蚕砂松毛樟根樟葉大黃橘葉板目

烏豆赤小豆爲麤末炒熱布絹袋盛熨腫處則再

炒熨三四十度又以此藥煎水洗腫處

三神散 百二十三

荆芥穗 桔梗 各兩 甘草 半兩

吹咀薑煎又方桔梗一兩甘草二兩水煎食後服

名甘桔湯治咽痛

玉屏風散 百二十四

防風 一兩 黃芪 炙 白朮 各二兩

吹咀水煎食後熱服或爲末沸湯調服多服取効

爲度

八僊散 百二十五

白豆蔻 砂仁 丁香 各半 粉草

百藥煎各二分半

炒鹽

木瓜

鹽裁者木佳各一兩

為末熱飲酒時先嚼一錢熱酒頻頻嚼咽飲酒

不醉

參苓白朮散

百二十六

白扁豆

薑汁浸炒去皮

山藥

伏苓

甘草

蓮肉

砂仁

桔梗

人參

薏苡仁

炒各二兩

白朮

為末棗湯調服又加乾葛沉香各八兩名沉香散

治渴疾

內托散

百二十七

豉豆粉

一兩

乳香

半兩

為末濃研甘草湯調服時時呷服令藥常在胸膈

間嘔逆尤宜服

十奇散

百二十八

薤白

羅參

當歸

厚朴

桔梗

桂心

芎藭

防風

甘草

炙白芷各製等分

為末熱酒調下不飲酒者水香湯下一方以亦麻

易括梗

活調傳散

百二十九

乳香

沒藥

白芷

白欬

南星

赤小豆

天華粉

芙蓉葉

黃連

貝母

寒水石

地榆

黃蜀葵葉

或華或子

白芨

百合

為末調傳瘡留口如瘡腫硬而掣按之方痛如瘡

烏失狼毒蜜醋調傳如紅腫加朴消芎根生地黃

生薑自然汁和蜜調傳如常用井水和蜜調傳又

方明硫黃蕎麥粉等分井水調作餅子日乾用時

為末井水調敷又宜滌湯用新桑白皮白芷蔥白

蘇葉苦參露蜂房為籠末水煎待溫淋洗又糝末

用經霜桑葉乾為末散瘡口又宜紅玉散用飛國

丹寒水石等分為細末糝之能生肉瘡已潰欲結

口者方可用糝末

青靈圓 二百十六

靈砂 青州白圓子

薑汁糊為圓薑湯下又方靈砂一兩丁香木香胡椒各半錢為末棗肉拌圓如棗豆大每服六十圓

薑湯下名藥靈砂丹

利痰圓 一百十七

明礬 枯 半夏 製 南星 滑石

白附子 各半兩 巴豆 去殼油成霜三錢

為末麪糊圓如蘇子大棗白皮湯下

杏珠圓 二百十八

朱砂 三錢半半入藥 半夏 製 杏仁 各一

巴豆 二十一个去殼心膜出油成霜

薑汁糊為圓如粟米大棗白皮湯下

消痰圓 二百十九

南星 干夏 各製 牙皂 去 白附子 枳殼 製

全鷄 去尾 朱砂 各二錢

薑汁糊為圓如粟米大薄背棗白皮湯下

消暑圓 二百二十

半夏 一斤醋五 伏苓 甘草 各半斤

生薑自然汁不見水者煮清糊圓如梧桐子大每服百圓熱水下

肥氣圓 二百二十一

當歸頭 蒼朮 各一 蛇含石 煨醋淬三錢 青皮 炒

義木 三稜 各三 鐵厚粉 三兩同三枝義木入醋煮一復時久

為末醋糊圓如棗豆大每四十圓用川當歸浸酒吞下

伏梁圓 二百二十二

伏苓 厚朴 製 人參 枳殼 製 白朮

半夏 製 三稜 煨等分

右末麪糊圓如梧桐子大每服二十圓米飲下或作散酒調服亦得

痞氣圓 二百二十三

痞氣圓 二百二十三

痞氣圓 二百二十三

痞氣圓 二百二十三

<p>大烏頭<small>製</small>附子<small>燉</small>赤石脂<small>製</small>川椒<small>製</small></p>	<p>乾薑<small>炮各桂心半兩</small></p>	<p>為末蜜圓如梧桐子大朱砂為衣每服十圓米湯下</p>	<p>千金養脾圓<small>二百二十四</small></p>	<p>枳殼<small>製</small>茴香<small>神麴</small>胡椒<small>紅豆</small></p>	<p>肉豆蔻<small>製</small>白薑<small>木香</small>丁香<small>砂仁</small></p>	<p>三稜<small>義水</small>陳皮<small>製</small>藿香<small>麥蘗</small></p>	<p>甘草<small>伏苓</small>桔梗<small>人參</small>白朮</p>	<p>厚豆<small>山藥</small>良薑<small>薏苡仁</small></p>	<p>益壽仁<small>已上各等分</small></p>	<p>右為末煉蜜圓如彈子大空心白湯嚥下</p>	<p>佐木圓<small>二百二十五</small></p>	<p>白朮<small>脾兩</small>肉桂<small>乾薑</small><small>炮各二兩</small></p>	<p>為末蜜圓如梧桐子大每二十圓米湯下</p>	<p>胡椒紅圓子<small>二百二十六</small></p>	<p>三稜<small>陳皮</small><small>製</small>青皮<small>義水</small><small>各一兩</small></p>
---	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---	--	---	---	--	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-------------------------	----------------------------------	---

<p>胡椒<small>乾薑</small><small>各二兩</small></p>	<p>為末醋糊圓如梧桐子大朱砂為衣每三十圓空心薑湯下</p>	<p>勝紅圓<small>二百二十七</small></p>	<p>陳皮<small>製</small>青皮<small>三稜</small><small>醋炙</small>義水<small>醋煮</small>乾薑<small>炮</small></p>	<p>良薑<small>各一兩</small>香附子<small>二兩</small></p>	<p>為末醋糊圓如梧桐子大每三十圓薑湯下</p>	<p>朴附香<small>二百二十八</small></p>	<p>附子<small>炮</small>厚朴<small>製各</small>神麴<small>四兩</small>乾薑<small>半斤</small></p>	<p>為末酒糊圓如梧桐子大每三十圓空心米湯下</p>	<p>以厚朴附子各製等分薑棗水香同煎各朴附湯</p>	<p>四神圓<small>二百二十九</small></p>	<p>破故紙<small>炒四兩</small>肉豆蔻<small>製二兩</small></p>	<p>附子<small>炮一兩半</small>木香<small>一兩</small></p>	<p>煮棗肉為圓如梧桐子大每五十圓薑湯下或</p>	<p>用神麴糊圓亦可</p>
--	--------------------------------	--------------------------------	--	---	--------------------------	--------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	---	---	---------------------------	----------------

固真肥腸圓 二百三十

肉豆蔻 製 蒼朮 各三 乾薑 製 良薑 薑香

破故紙 炒 胡蘆巴 各一兩 當歸 二兩

為末糯米糊圓如梧桐子大每服五十圓空心飲下

四金圓 二百三十一

草烏 生薑 半斤 研薑同草烏 蒼朮 製

葱 六兩 同 研蒼朮 交感過一宿

為末酒糊圓如梧桐子大每五十圓空心服

星斗圓 二百三十一

吳茱萸 一 四兩 醋浸四兩 酒浸四兩 湯浸四兩

澤瀉 二兩 酒浸焙乾

為末酒糊圓如梧桐子大每服五十圓空心溫酒下

三黃圓 二百三十三

山茱萸 吳茱萸 石茱萸 各二兩 青皮

青鹽 各三 黑牽牛 一兩 茴香 破故紙 一兩 十錢

川練子 一兩 重用 玃猫 一十 四枚 同川練子 炒焦去貓不用

右麩糊圓如梧桐子大每服五十圓空心細嚼桃仁十五个溫酒鹽湯下

內消圓 二百三十四

吳茱萸 馬蘭花 山茱萸 川練子 共陳六

青皮 山藥 肉桂 茴香 各二 木香 一

為末糊圓如梧桐子大每服三十圓鹽湯下

四炒枳殼圓 二百三十五

枳殼 四兩 重淋浸半日去穢分作四畧

一兩用蒼朮同炒黃色去蒼朮

一兩用乾漆同炒黃色去乾漆

一兩用茴香一兩重同炒黃色去茴香

一兩用羅蔔子同炒黃色去羅蔔子

右為末將元炒藥四味用水二碗煮至一挽去滓用汁打麩糊圓如梧桐子大每服四十圓未飲下

氣鉞圓 二百三十六

金錫 木香 丁香 胡椒

肉豆蔻 各二 片子薑黃 青皮 各二 為末羅蔔子炒退殼取仁四兩研爛和藥令均紅

酒薑汁煮糊圓如梧桐子大每服四五十圓紫蘇陳皮湯下

三稜前圓 二丁三十一

蘿蔔子 乾漆 神麴各一 麥芽 杏仁製

青皮各三 硃砂一兩 三稜酒三升石器內熬膏

為末三稜膏圓如梧桐子大每服十五圓至二十

圓飲湯食後下又方木香黑牽牛蘿蔔子炒檳榔

等分為末滴水圓薑湯羅子湯下此藥大消

葶澄茄圓 二百三十八

葶澄茄 白豆蔻仁 縮砂仁 青皮 蘿蔔子

木香各三 肉豆蔻製 茴香 肉桂

丁香各一分半

右末麪糊圓如梧桐子大每服三十圓陳橘皮煎

湯下

小七香圓 二百三十九

丁香 香附子 甘草各十 莪朮

砂仁各二 甘松八兩 益智仁 六兩

為末糊圓如葶豆大每服三十圓溫酒薑湯下內

加烏藥霍香陳皮麥芽肉桂各六七香圓以蜜圓

如彈子大鹽湯嚼下

小兔絲子圓 三百四十

兔絲子 五兩酒浸一 石蓮 二兩

山藥 二兩 白伏苓 一兩

右為細末用山藥糊搜和為圓如梧桐子大每服

五十圓溫酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜

湯下此方熟地黃遠志龍齒各二兩各洗洗兔絲

子圓

十四友圓 二百四十一

熟地黃 白伏苓 白伏神 酸棗仁製 阿膠製

遠志製 當歸 黃芪 栢子仁 各一兩

辰砂二分 龍齒二分 紫石英 一兩

為末蜜圓如梧桐子大每服三十圓食後棗湯下

一方用朱砂為衣

威喜圓 二百四十二

黃臘四兩 白伏苓四兩重去皮切塊以伏苓一分同煎於瓷器內煮至二十餘沸

取出

右伏苓為末熔蠟搜勻為圓如彈子大空心細嚼

消口生津徐徐服以小便清為度仍忌食醋

雙補圓 二百四十三

熟地黃 兔絲子各製等分

右為細末酒糊圓如梧桐子大每服三十圓空心

鹽酒下

青春圓 二百四十四

人參 白伏苓 牛膝 地骨皮 熟地黃

當歸等分

為末蜜圓如梧桐子大每三十圓鹽湯酒下

八味圓 二百四十五

牡丹皮 伏苓 澤瀉各三兩 山茱萸 山藥各

附子製 杜各二兩 熟地黃

末蜜圓如梧桐子大每十五至二十五圓溫酒

空八日二服

玉霜圓 二百四十六

天雄十四重 酒浸七日掘地坑以炭火燒坑通赤

熱便投天雄在內以盆合

上雄之經宿出皮去淨

白龍骨一分 括去者細研 用水飛過三度日中製

肉從蓉製 巴戟 澤瀉酒浸一宿焙乾 牛膝製

石斛各二兩 茴香炒 肉桂各一兩 兔絲子製

家茱萸五兩 鹿茸半兩 連頂骨者先擦去毛令淨

右末酒蜜圓如梧桐子大每服三四十圓空心溫

酒下

思仙續斷圓 二百四十七

川烏炮去 杜仲製 防風各一兩 薏苡仁炒

牛膝各四兩 續斷 草薢各六兩 木瓜二兩

右為末酒糊圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓空心溫酒鹽湯下

青娥圓 二百四十八

故紙 八兩 胡桃肉 四兩去膜爛研

為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十四圓食前鹽湯酒下一方加製杜仲二兩

固木圓 二百四十九

生地黃 熟地黃 天門冬 製 麥門冬 兩入參 兩

為末密圓如梧桐子大每服三十四圓空心鹽酒

鹽湯下

秘真圓 二百五十

龍骨 黃耆 炙 朱砂 栗蠔蛸

白伏苓 各一兩 白梅霜肉 半兩

家韭子 三兩

為末醋糊圓如梧桐子大每服四十圓空心鹽湯下 活蝦蛤粉等分為末滴水圓如梧桐子大

燈心湯空心下柏苦降心火粉鹹補腎水各相圓 家韭子圓 二百五十一

韭子 六兩 鹿茸 四兩 肉苁蓉 製 牛膝 製 熟地黃

當歸 各三兩 杜仲 製 石斛 各一兩 巴戟 去心 肉桂

乾薑 各一兩 兔絲子 半兩

為末酒糊圓如梧桐子大每服五六十圓食前空心鹽酒鹽湯下能治遺尿

摘皮煎圓 二百五十二

三棱 製 陳皮 十五兩 當歸 製 萆薢 厚朴 製

肉桂 肉苁蓉 吳茱萸 附子 炮 巴戟 去心

石斛 牛膝 各四兩 鹿茸 製 兔絲子 製

杜仲 製 各三兩 陽起石 一兩 乾薑 各三兩 甘草 炙 一兩

為末用酒五升於銀器內將摘皮末煎熬如錫入諸藥末和勻入臼內杵千百杵丸如梧桐子大每

服三四十圓空心鹽湯下

圓 二百五十三

茴香

四兩 川椒 一兩 附子 二兩 去皮

厚朴

半斤 去粗皮 剉如指大 用生薑半斤 水三升 煮取一升 分三服

乾薑

四兩 剉如指大 用生薑半斤 水三升 煮取一升 分三服

同炮用

右為末 生薑煮棗肉圓如梧桐子大 每服五十圓

米飲下

青州白圓

二百五十四

半夏

七兩 南星 二兩 川烏 半兩 白附子 二兩 生用

為末 以生絹袋盛於井水內 撈出 更以手揉令

出 以滓更研細入袋 須攪盡 再却盛於甕盆中 日

曬夜露 每日一換 新水攪攪澄 春五日 夏三日 秋

七日 冬十日 去水 晒乾 糯米粉糊為圓 如京豆大

薑湯吞下 若加天麻 白僵蚕 全蝎 各加味 白圓子

雄朱圓

二百五十五

朱砂

雄黃 各二兩 白附子 一錢

為末 猪心血圓如梧桐子大 別用朱砂為衣 每二

十圓入參薑蒲湯吞下

苦參圓

二百

苦參

八兩 淨荆芥穗 四兩

為末 糊圓如梧桐子大 每服三四十圓 白湯食後

吞下

烏荊圓

二百五十七

川烏

二兩 荆芥穗 二兩 不見火

為末 醋糊圓如梧桐子大 每服三四十 酒飲湯

任下

雞蘇圓

二百五十八

柴胡

二兩 麥門冬 製四兩

黃芪 炙一兩 阿膠 製二兩

生地黃末

六兩 后入膏

蒲黃 微

雞蘇 一斤 煎

甘草

炙一兩 人參 二兩

木通 三兩 同柴胡 煎湯

后入

右除別研藥后入外 並搗羅為細末 將好二斤光

煉一二沸 然後下生地黃末 不住攪時時入絞下

者不通柴胡汁慢慢熬之勿令焦然後將其餘藥末同和為圓如碗大每二十圓嚼破熱水下不嚼亦得吐衄麥門冬湯下熱淋車前子湯下虛煩消渴參湯下

如聖餅子 二百五十九

防風 天麻 半夏生各半兩 南星

川烏生去 乾薑各一兩 川芎 甘草各二兩

為末酒水調作餅子每服五餅同荊芥茶酒下

益智五味圓 二百六十

益智仁 大蓰蓉 巴戟去心 人參 五味子

骨碎補 茴香炒 鹿茸 覆盆子 龍骨

熟地黃 當歸 兔絲子製等分

為末酒糊為圓如梧桐子大每服三十圓空心湯下

香附圓 二百六十一

香附子一斤沙盆中除去毛醋浸過半日許用用磁器慢火煮乾

右為細末醋煮糊圓如梧桐子大每五十圓淡醋湯下一方加大艾四兩四物湯四兩為圓一方淨香附子一斤重四兩重便浸四兩火炒四兩醋煮四兩羅蔔子炒去蘿蔔子為末如前圓常服除病進食抑氣經不行時常服紅花浸酒下腹痛按殺前香湯下腫疾大腹皮乘白皮伏苓皮煎湯下又方一兩生用一兩酒煮一兩醋煮一兩同槐角水煮為末醋糊為前圓酒吞下治崩中下血不止

紫石英圓 二百六十二

紫石英 禹餘糧醋研各七兩 紫葳 熟地黃

辛夷仁 桂心 菴柘 牡蠣 續斷

石斛製 栢子仁 川烏炮去 牛膝製 苘子

海螵蛸燒 當歸 牡丹皮 甘草各一兩 桑寄生

山藥 食鹽製 細辛 乾薑各半 人參三

厚朴製 天門冬製三兩

為末每圓如梧桐子大每服七十圓空心用米湯下

秦桂圓 二百六十三

秦光 桂心 杜仲 防風 厚朴各七

附子生 白伏苓 各一兩半 白薇 乾薑

沙參 牛膝 半夏 各半 人參 一兩 細辛

蜜圓如梧桐子大每五十圓空心醋湯下

煖營圓 二百六十四

生硫黃 兩六 禹餘糧 兩六 赤石脂 兩六 附子 兩六

海螵蛸 各三兩

醋糊圓如梧桐子大每二十圓空心溫酒下

參歸圓 二百六十五

人參 當歸 大黃 瞿麥 赤芍藥

苦葶歷 製 白伏苓 桂心 各等分

蜜圓如梧桐子大每三十圓空心米飲下

不換金圓 二百六十六

當歸 沒藥 玄胡索 川芎 藁本

人參 白伏苓 牡丹皮 甘草 白芍藥

白朮 熟地黃 各等分

右為細末麪糊圓如梧桐子大每服二十圓至三

十圓熟湯送下

香桂圓 二百六十七

肉桂 不見火 射香 別研一

右為末用飲圓如棗豆大大人十五圓小兒七圓

熟水送下

褐圓子 二百六十八

薤白子 炒一兩 陳皮 青皮 檳榔

黑牽牛 取仁半 五靈脂 赤伏苓

義木 煨各 木香 二兩半

右為末飛羅麪糊圓如棗豆大每服十五圓紫蘇

白皮煎湯吞下

苦練圓 二百六十九

鶴虱 去土 胡椒 檳榔 白礬 半生半枯

香練根皮 各半兩 蕪荑 黃連

酸石榴皮 各一兩

右為末以糊圓如麻子大一歲兒三圓發水入香油三五滴下其虫小老化如水大者自下加雷丸

或用猪瘦肉湯下

肥兒圓 二百七十

黃連 神麴 使君子 麥芽

肉豆蔻 製各二兩 檳榔 木香 二錢

右為末麴糊圓如小豆大三歲三十圓用米湯下

橘杏圓 二百七十

橘紅 杏仁 各等分

右為末蜜圓如梧桐子大每服七十圓空心米湯

下

氣寶圓 二百七十

黑牽牛 頭末二兩 大黃 一兩 檳榔 青皮

川芎 陳皮 茴香 木香

半兩

右為末熬皂角膏圓如梧桐子大每服百圓生薑

鹿茸圓 二百七十

鹿茸 製七兩 熟地黃 十斤 附子 製百斤 牛膝 製二斤

山藥 四斤 五味子 二斤 肉蓯蓉 三斤 杜仲 製二斤半

各製為末蜜圓如梧桐子大麴香末為衣每服二

三十圓鹽湯益酒吞下

智苓丸 二百七十

益智仁 九兩 酒浸 茯苓 去皮為末

用伏苓末煮酒糊為圓如梧桐子大每服三十圓

小烏沉湯薑棗煎空心服

固真丹 二百七十

蒼朮 一丁 米泔浸透 日換春五日 夏三日 秋七

四兩 好醋酒各半升 一外 四兩 用面香一兩 益一

四兩 川椒去目并合者一兩 破四兩 川烏一兩 製

子川練一兩 去皮拔 劈開同炒木黃為度

右共為末煮藥酒打糊圓如梧桐子大每服三十圓溫酒溫湯下

黑錫丹 二百七十六

沉香 葫蘆芭 附子製 陽起石 肉桂

破故紙炒 茴香炒 肉苁蓉製 金鈴子 木香各

錫硫砂子 四兩

為末同砂子末酒糊圓如梧桐子大陰乾布袋繫

令光瑩每四十粒空心薑湯下

藥肉靈砂丹 二百七十七

靈砂 四兩 人參 一兩 酸棗仁 二兩

為末藥肉圓如梧桐子臨時時藥湯吞下五七圓

歸神丹 二百七十八

大朱砂 三兩鎚碎 獐猪心大者一枚去筋膜批開將朱砂入

右以朱砂入猪心用密麻線縛定入銀石器用煮

麴酒醱醋各一升煮令乾去心緩收朱砂微烘乾

乳鉢研細以煮藥酒醋打清麴糊圓如梧桐子

每服九圓藥湯下半空心服陽事漸興不可洩服他藥補藥後方可又方加白伏神末同圓

寧志膏 二百七十九

人參 酸棗仁 各一兩 辰砂 半兩

為末蜜圓如彈丸每一圓薄奇湯下

礬丹 二百八十

國丹 晉礬等分

右作磚爐一窠可容三兩許安丹在下礬在上以

炭五斤燒令盡取出細研以不經水猪心血為圓

如綠豆大每十圓或二十圓用陳皮湯吞下

六珍丹 二百八十一

雄黃 雌黃 母真珠 各一兩 鉛 二兩熬成屑

朱砂 半兩 水銀 兩半

為末研細蜜和杵二三萬下方圓如梧桐子大每

服五圓薑湯下

洞陽丹 二百八十二

一附子 鍾乳粉 天雄各二 川烏四 朱砂

陽起石各一

為末酒煮神麴糊為圓如梧桐子大每五十圓空
心鹽湯酒下

來復丹 二百八十三

硝石同流黃末入定器微火炒不可太過研細 硫黃一 五靈脂入青皮

陳皮各三 玄精石一

右各研同靈脂陳皮末次入玄精石末及二氣炒

末醋糊圓如豆大每三十圓食前空心米飲湯下

復元丹 二百八十四

附子二兩 木香 茴香 川椒 獨活

厚朴 陳皮 吳茱萸 白朮 肉豆蔻

枳殼 桂心各半 澤瀉兩半

為末麴糊圓如梧桐子大每服七十圓空心紫蘇

湯下

養王丹 二百八十五

水銀 黑錫 硫黃 朱砂各一兩

用黑盡一隻火鎔黑錫成汁次下水銀以柳枝攪

勻再下朱砂攪不見星子放下多時方入硫黃末

急攪成汁和勻如有酸以醋洒之候冷取研細用

糯米糊圓如菉豆大每服二三十圓鹽湯下

玄兔丹 二百八十六

兔絲子製十兩 五味子七兩

蓮肉 伏苓各三兩

以山藥末六兩將所浸酒餘者漆酒煮糊和搗

千杵圓如梧桐子大每五十圓空心用米飲湯下

蘇子化痰圓 二百八十七

半夏 南星 白礬 皂角剉

生薑剉各二兩

已上同水煮至南星無白點去皂角將南星薑晒

乾或焙乾用加

陳皮 紫蘇子炒 蘿蔔子炒 杏仁製

香附子

為末生薑汁打神麴末為糊圓如梧桐子大臨卧

食後服薑湯下

牡蠣圓 二百八十八

牡蠣十兩炭煨通赤取心於濕地 玄參 三兩

為末糊圓如梧桐子大食後臨卧時酒下三十圓

又製牡蠣四兩甘草二兩為末茶清服

法製皂角子 二百八十九

好皂角子 一百枚

右用醋一升硃砂二錢同煮醋盡炒令酥每生瘰

癧一箇細嚼一枚飲湯送下量所患瘰癧幾個則服

此藥如瘰之數

桃仁圓 二百九十

桃仁製 朴消 大黃各一兩 蟬蛻半兩炒

右各為末以好醋二升半於銀石器內慢火煎至

一半入桃仁大黃蟬蛻末不住手攪却入朴消更

揀良父出之圓如梧桐子大至更溫酒下五圓至

午取下如赤豆汁雞肝等類惡物

草葉平胃散 二百九十一

草葉仁一兩 檳榔一兩 陳皮兩半 厚朴去白 薑汁去鹿皮

蒼朮二兩半 甘草一兩

右為劉散每服五錢重用水二盞姜炙三片棗一

枚煎至七分去渣空心食前時溫服

黑九子 二百九十二

烏梅七個 百豆霜三 杏仁去皮尖另 巴豆去油

半夏易包七次九枚 砂仁三七枚

右為末用酒糊為圓如黍米大每服十九加至二

十九用熱水送下姜湯亦得看虛實增損丸數

醉鄉寶屑 二百九十三

陳皮去白 甘草一兩 縮砂仁兩半 丁香皮二兩半

茴香一兩 三賴半 薄荷葉一兩

右為末每次不拘多少細嚼嚥下

椒附散 二百九十四

治腎氣上攻項背不能轉側亦治冷痺不仁

川附子 正川椒

每服附子末二錢重川椒二十粒用白麴塞滿水

浸半生薑七片煎至一半去椒入鹽少許通口空

心服

都梁丸 二百九十五

香白芷 大塊白色新潔者不以多少先

右一味為細末煉蜜為圓如彈子大每服一大丸

細嚼用荆芥茶送下

牛黃清心圓 二百九十六

白芍藥 一兩 柴胡 二兩 麥門冬 二兩 桔梗 二兩

乾山藥 七兩 甘草 二兩 神麴 二兩 蒲黃 二兩

杏仁 一兩 當歸 二兩 人參 二兩 白伏苓 二兩

白欬 七兩 阿膠 二兩 白伏苓 二兩

芎藭 一兩 阿膠 二兩 白伏苓 二兩

防風 二兩 羚羊角末 一兩 肉桂 二兩

乾姜 五兩 犀角末 二兩 白朮 一兩

牛黃 二兩 麝香 一兩 雄黃 一兩

龍腦 一兩 杏仁 一兩 大豆黃卷 一兩

大棗 一兩 金箔 一百張 去衣 一百張

右除棗杏仁金箔二角末及牛黃麝香龍腦四味

外為細末入餘藥和勻用煉蜜與棗膏為丸每兩

作二十九丸用金箔為衣每服一丸溫水化下食後

服之小兒驚癇斟酌大小以竹葉湯溫溫化下

猪肚圓 二百九十七

黃連 二兩 梁米 四兩 桔梗根 四兩

茯苓 四兩 知母 二兩 麥門冬 二兩

右為末用大猪肚洗極淨入藥亦縫定甑中炊極

爛出藥別研猪肚為膏搜前藥得所乾即漆少蜜

杵數千下丸如梧桐子大飲服五十九食前服

金液丹 二百九十八

硫黃

淨揀去沙石十兩研細飛過用礬各子盛以水和赤石脂封故以盆泥固濟懸乾地內先埋一小罐子盛水令滿安合子在上用泥固濟乾勝火養七日七夜候足加頂上火一片煨候冷取出研為末右藥末一兩用蒸餅一兩湯浸握去水脉為丸如梧桐子大每服三十九多至百九溫米飲下空心服之

暖腎圓 二百九十九

暖水臟理腰痛便澀多

川草薺

益智仁

蓋水浸

茴香

杜仲

生薑

龍骨

各三兩

五味子 二兩

兔絲子

酒蒸

山藥

二兩重

右為細末酒煮山藥末為丸如梧桐子大每服七八十元用鹽湯送下空心食前服

蜜煎導方

生蜜不以多少銅器內用微火煎之候稍凝如飴狀攪之勿令焦乘熱併手捻作錠子令頭銳大如指長二寸許納入穀道中良久當下燥糞

瓊珠圓末詳所出然類在咳嗽證中局方有金珠化痰圓

金珠化痰圓

治涕唾稠粘痰實咽嗑不利

皂莢仁

天竺黃

生白龍腦

半兩

白凡

半夏

四兩

生薑

二兩

去皮

辰砂

另研

金箔

二十片

為衣用

右以半夏皂莢仁為末與諸藥同拌研勻生薑汁煮糊為丸如梧桐子大以金箔為衣每服十元至十五元生薑湯下食後臨睡服

黃已圓末詳恐傳寫之誤然類在癰疽証中又云後服此元是補虛安肺藥局方有黃耆元療諸虛不足

黃耆圓

黃芪

杜蒺藜

炒去刺

川練子

茴香

炒

川烏

炮去
皮并

赤小豆

去土炒

防風

去若火已上
各一兩重

地龍

去土炒

烏藥

二兩

右為細末醋糊為元如梧桐子大每服五六十丸

空心姜湯下

雄毛散闕

如宜方二卷

浙江巡撫
採進本

元艾元英撰元英東平人始末無考此本為三山

張士寧所刊前有二序一為至正乙未林興祖作

一為至治癸亥吳德昭作其書首列藥石炮製總

論不過數十味未免簡畧第一卷述證自中風至

雜病凡三十類第二卷載方凡三百有餘其曰如

宜者如某證宜用某湯某證宜用某圓散是也其

說一定不移未免執而不化焦氏經籍志高氏百

川書志俱不著錄然相其板式猶元代間中所刊

非依託也

泰定養生主論十六卷

〔元〕王珪撰

北京圖書館藏明正德六年冒鸞刻本

附《四庫全書總目·泰定養生

主論十六卷》提要

重刊泰定養生主論序

醫仁術也其言五運六氣可以使民養生而免札瘥夭折之患先聖王贊助之一道也君子仁天下苟可利物者爲之弗愆而獨廢於醫乎後世長民者務深文慘刻於醫道漫不之省是無意於民不仁殆有甚焉非用心至仁如閩藩少叅冒公者其何能是耶公維揚人也少擢進士高第累官兵部正郎才名拔出乎同列焉

上知眷文學醞藉考試南宮貢士知武舉皆著聞而尤留意於醫凡諸方書日事旁索而購致之得泰定養生論一編蓋出元人手也匿民間久之公旣得輒用蒐獵知其利於民謀鋟梓未果是歲以公務留衢頗以醫相聞遂緘屬校理而序述以傳余家舊蓄醫自先君尚志翁典科三世矣余不類蚤以易試于鄉累

不偶退而易業以爲不能行道濟時當
醫以利世殫弊心神究竟數載僅闕門
戶厥今耄矣精力弗逮重辱嘉命紬而
讀之細加參詳庶幾有得廼竊嘆曰公
之一念大造茂育之心也醫始於軒岐
內經歷漢魏來方書不傳近時立言惟
仲景東垣河間丹溪四家最著爲內經
羽翼又其各暢一義難備急用孰若此
編兼總條貫辨數標不著論則主乎內
經纂方則括乎四家而又鉤隱摘漏以
參錯傳益之簡而當稍而切使窮鄉下
邑乏名醫之所人人得之猝有恙者對
證檢方按方施藥不必遠秦楚之路而
良醫在篋笥矣無復病於倉卒不濟者
利澤之仁不亦博乎夫公敷歷滋久尋
且當路以吾道砭劑於生爬創痍起廢
痼而賴以全活者多矣奚假此爲然而
政施於一時不能流云曰世道濟於所及

不能編幽遐是書果行播千古之芳馨
周九垓於無外所活而仁之者未可逆
數其仁之大小遠近又何如耶抑古人
有言治國如治病況今天下之病久矣
凡爲吏者獲公奇方以療之亦豈非公
之仁哉因忘固陋僭弁數語俾觀者不
待句檢而生識此編之妙與夫公之所
存

正德四年歲次己巳孟冬吉日浙間化

七十七翁指卷徐繁謹序

泰定養生主論序

卷一

物生於天而養於天然天不能司其養
非天不司養也人爲嗜欲所勝聲色之
蠱寵榮勢利之徇雨暘燠寒之觸冒匿
薄情炎于中形索于外至是而養於天
者天始不能司養於天者天不司則其
生於天者亦戕矣聖人憂其戕也而醫
道行焉內經數萬言或防於未然或抹
於已然無非補天養也後賢有作敷暢

養生主論序

五

演繹而其書益汗牛充棟於世洞虛王
中陽制行高見道明壯歲屏世累隱吳
之虞山居環堵三十年目矐炯然身不
踐屢間著書若干卷采莊周氏宇泰定
者發乎天光及養生主之語題曰泰定
養生主論自婚孕幼壯以至於老期節
宣各有宜順者以安違者以疾也自運
氣標本脉症方劑以至病家之當務醫
者之所存罔不究極論列派析縷分其

用心亦仁矣嗚呼生者人之至願也生
我者天而養生者我也知養生之在我
則知養生主之說不知養之在我恣情
縱慾迷而不返者天且不能司於是書
也何有至元後戊寅長至日從仕郎江
浙等處行中書省照磨段天祐序

養生主論序

五

中陽立是清淨幽居將二十載以靜待
動備見正邪其爲枉病枉死育醫瞎矣
莫知所由故澄心適興信筆而書或一
日得數千言或迤邐連月不欲措一辭
中間論不避嫌語其害生者方不貴多
載其必效者今年六月峻絕人事謾編
成卷一家之說未能盡善故泄二教之
機與引九流之緒餘殊謬之辭固不足
取信於人盡其在我庶可杜門然則是
書之於世也如郵亭之於歧路而示人
曰此去則有虎狼出沒彼去則爲驛程
大道征人感念曰此蹊徑也懂懂往來
者莫非行役乎彼大道也行役幾希而
我獨進之耶或者一旦遇害則征人唯
曰命矣夫彼之大道又烏知其爲果無
狼虎乎余故知世人之情聞鵲聲則衆
喜之如有所得殊不知鵲亦能噪凶聞
鴉聲則衆惡之如有所失殊不知鴉能

使人避凶而亦能報吉故鴉純吉而鵲
半凶而終不惡鵲終不喜鴉嗚呼凶乎
吉乎喜乎惡乎事在於彼不在此而鵲
不得不噪鴉不得不報咻人自裁之雖
欲勿用養生其舍諸故首以原心爲發
明之始次序婚合孕育嬰幼童壯衰老
宜攝避忌以禦未然之病次論運氣標
本陰陽虛實脈病證治以爲全生去病
之法然後類方對證以爲規矩之用備
述痰證一條以爲方書補闕拾遺之式
更類雜治活法常驗之方並無毫髮苟
簡穿鑿之妄存幸乏醫之處雖不能明
脉問疾用藥井井有條外選肘後秘寶
諸家備急數門續抄古今明訓二道自
省一篇以爲閑邪存誠之要用質高明
非敢固望人人共爲枯槁幽棲然後盡
善但於一切據方用藥之時知有所主
之心耳或曰吉人之辭寡而子之辭無

乃喋喋乎余曰吾聞晉書云平蜀之後其將問蜀士曰孔明言句何其瑣碎士曰簡辭惟聖與聖則可彼師旅之衆故當詳喻於是余之反復而言正欲人人共曉之也始作於泰定政元又莊子云宇泰定者發乎天光故命曰泰定養生主論莊子亦有養生主篇養生而有主則不惑於二三說也逸人洞虛子王中陽自序

養生主論前序

人

泰定養生主論目錄

卷之一

養生主論

論婚合

論孕育

卷之二

論嬰幼

論童稚

論衰老

卷之三

素問節要叙論

論病家

論醫家

卷之四

正訛

公論

卷之五

論運氣

論標本

卷之六

論陰陽

論虛實

論脉

論病

卷之七

論證

論治

病機司屬六氣本標證治通例

卷之八

類方叙畧

婚合門

戊巳圓補虛

腎氣圓治男子

如聖丹治赤白

當歸散治月水來

蠶沙散治血崩

雙和散治病後氣

鼈甲地骨皮飲治男子婦人骨蒸寒熱

坐宣散治子宮不潔帶

孕靈圓治無子

增損四物湯治血虛

假鼠麴湯治男子病新差

燒棍散治女病新差交感而病

三分湯治婦人至女月水

滋血湯治崩漏

分心氣飲治男子婦人

孕育門

安胎飲治胎動

榆白皮散治胎前下漏

滑胎枳殼散治胎前下漏

三物湯治懷孕

枳殼檳榔圓治男婦瘦瘠

百花散治孕婦

護胎法

獨服散治孕婦

靈根湯治孕婦

小柴胡湯治孕婦

佛手散治胎死口

局方催生靈驗神符常用

蒲醋膏治產後

飲陰法治產後玉

烏金散治產後

產後一十八證病形歌

入藥醋煮大黃膏并治諸血證

卷之九

嬰幼門

小兒變毒

小兒唇口形狀

乳哺法

養子十法

保養嬰幼法

不宜服涼藥七證

不宜服熱藥七證

疹痘瘡三者形候

痘瘡不用服藥例

痘瘡合用服藥例

嬰幼痘瘡輕者六證

嬰幼痘瘡重變輕者六件

痘瘡急服藥三證 嬰幼痘瘡五種不治證

痘瘡未出已出之間救裏證

痘瘡不起發救表證

表裏俱有證

痘瘡將出已出瀉渴等證

痘瘡始出一日至十日表裏無病例

痘瘡禁食生冷例 痘瘡發熱未見是否例

痘瘡曾經瀉後失津諸證難治例

痘瘡四五日不大便治法

痘瘡六七日後身壯熱不大便證

痘瘡二三日大小不等例

痘瘡四五日形候例

痘瘡六七日惡候俱全例

痘瘡八九日輕重形候例

痘瘡十日十一日當盛諸證

痘瘡十二日十三日瘡癰凹凸眼内生瘡

痘瘡既盛壯熱證

痘瘡盛後口瘡咽痛等證

風熱咳嗽咽膈不利證

涕唾稠粘身熱鼻乾證

痰實壯熱大便堅實證

前後已曾誤飲食水密鹹腫痺蝕等證

身熱小渴證 身熱大渴證

木香散性味主證 腹脹等九證渴證例

異攻散性味主證

痘瘡苦痒搔之膿出治法

痘瘡盛後燥痒治法

卷之十

嬰効門

土黃散治赤毒

葛根白朮散治一色赤白

長生圓治七種 五和湯治七種

惺惺散治嬰効 五和湯治七種

凹凸癰瘰治法 龍粉散

痘瘡盛後母蝕瘡治法

雄黃散治牙疳 綿團散治牙疳

升麻葛根湯治痘瘡

十一味木香散治痘瘡

十二味異攻散治痘瘡

七味肉豆蔻圓治痘瘡

人參麥門冬散治痘瘡

柴胡麥門冬散治痘瘡

消毒散治痘瘡 射干罌粘子治痘瘡

桔梗甘草防風湯治痘瘡

人參清膈散治諸 前胡枳殼湯治風

人參白朮散治痘毒

穀精草散治痘毒

小兒斑疹形候

葛根麥門冬散治痘毒

生地黃散治痘毒

又惺惺散治時行

小兒痘瘡論例

宜服七味人參散證

宜服六味人參散證

宜服十一味木香散性味例

痘瘡雖屬忌熱湯洗浴法

烏豆麥門冬湯治痘毒

痘瘡出後忌燒香法

延壽丹治小兒急慢驚風

合順散治小兒驚風

又天竺黃散治小兒驚風

蘆薈散治小兒驚風

消腫散治小兒驚風

卷之十一

童壯門

分氣補心湯治男女事不遂

分心氣飲治七情方

欬冬花飲治勞瘵

青蒿煎治男婦一切勞瘵

紫苑圓治男婦百種酸棗仁湯

孔子枕中方治學問易忘

益智散治心

北平太守八味散治補益精神

別離散治男女

治童壯下元不固遺精

治童壯血氣太過三法

衰老門

衰老門

熟地黃圓治男婦一切虛損

治肝虛明目方

七氣圓治男婦一切氣

麻豆散治男婦一切

乾薑散治男婦一切

百效圓治男婦一切

家菊散治男婦一切

竹葉黃芩湯治男婦一切

丹參圓治男婦一切

不換金摩安囊治男婦一切

琥珀圓治小便

又方車前草法

又方治淋瀝

又方治胞轉

又方治轉胞

又方阿膠湯

治血淋砂痛

又方治血淋

又方白朮湯

又方大豆葉湯

治遺尿小便難

治遺尿不覺

治遺尿冬法

腎腸散治虛氣

又方治滑泄

又方治腎泄

卷之十二

傷寒

六經證定例

太陽證

陽明證

少陽證

太陰證

少陰證

厥陰證

六經類證治法

太陽傷寒黃

太陽傷寒桂枝

太陽傷寒大青龍

太陽傷寒大青龍

陽明證麻黃

陽明證桂枝

陽明證麻黃

陽明證大柴胡

少陽證小柴胡

三陽合病證

太陽合陽明四法

脾約圓證

升麻葛根湯證

白虎湯證

調胃承氣湯證

太陽合少陽一方

小柴胡湯

少陽合陽明一方

調胃承氣湯

三陽合病下利

太陽陽明合病下利一法

葛根湯

太陽少陽合病下利一法

黃芩湯

少陽陽明合病下利三法

小承氣湯

四逆湯

理中圓

少陽證一法

小承氣湯

大承氣湯

麻黃細辛附子湯

四逆湯

又四逆湯

甘草乾薑湯

猪膚湯

厥陰證六法

桂枝麻黃各半湯 承氣湯

大承氣湯 茯苓桂枝白朮湯

烏梅圓 或用理中圓

陰證陽證陰毒陽毒陰陽二厥辯

陽毒證三法

升麻湯 玄參升麻湯

水漬法

陰毒證三法

陰毒甘草湯 著艾法

射葱湯 又續添手握法

陽厥證二法

大柴胡湯

小承氣湯

大承氣湯

陰厥證四法

四逆湯 理中湯

通脈四逆湯

當歸四逆加茱萸生薑湯

略論小柴胡湯 略論五積散

卷之十三

五運時行以病證治

六壬年方一道 蒼湯

六戌年方一道 麥門冬湯

六甲年方一道 附子山茱萸湯

六庚年方一道 牛膝木瓜湯

六丙年方一道 川連茯苓湯

六丁年方一道 茯苓牛膝湯

六癸年方一道 黃耆茯苓湯

六巳年方一道 白朮厚朴湯

六乙年方一道 紫苑湯

六辛年方一道 五味子湯

六氣時行 治

辰戌之歲方 靜順湯

卯酉之歲方 審平湯

寅申之歲方 升明湯

丑未之歲方 備化湯

子午之歲方 正陽湯

巳亥之歲方 敷和湯

卷之十四

痰證

痰證叙引

聚痰圓歌括

袞袞圓服法

痰論

痰形

痰味

痰證或問

痰忌

藥無所忌

卷之十五

雜治活法

敗毒散治法

四時瘟疫

斗門散治法

小便不通

豁痰湯治法

加減略例

扶毒治血

龍腦膏治法

合用略例

黃連解毒圓治法

合用略例

還魂散治法

五寶略例

婦人失心治法

智述略例

卷之十六

歷用得效名方

驅癰湯治法

通神圓治一切

金黃散治法

桃仁法

治蛇虎病狗毒蟲所傷

通關散治一切

愈風散治一切

鶴虱圓治大

大戟圓治一切

治一切氣腫

桃溪方氣實圓治一切

局方小七香圓治

治腫

神效五食湯圓治

水鼓通身

葶藶木香散治

濕熱腫脹泄

朝貴秘授神效紫金

圓治諸寒濕風

控墨證苗香練實圓

治小腸

治外腎腫大三法

麒麟竭膏治一切

瘰癧

地扁竹散治

背脊痛

長生小金丹

宋理宗御書賜寧海錢主簿之

九似圓

杭州李國醫家傳方後受李

驅邪散

杭州李國醫家傳方後受李

古今明訓二道

中行寅罪大祝

毗陵石刻劉漫塘先生尊天敬神文

自省一篇

原術

泰定養生主論目錄終



養定養生主論卷之一

凡人同虎子

養生上論

甚哉墳素之書以心爲身中君主之官神明出焉以此養生則壽沒齒不殆主不明則道閉塞而不通形乃大傷以此養生則殃故莊子有養生主篇蓋有心者必有身故人我交相勝而物欲蔽其明也昔者太王之去國也召其耆老而告之曰君子不以其所以養人者害人故逾梁山而居岐山之下養生之爲道莫大於此而身外瑣瑣又何足以累吾之靈府哉是

養生上論卷之二

則人心之病如面不同混厚之辭難爲通治故述方內之道以正其心方外之道以廣其志百氏之言以返其流游談之論以攻其蔽或因激怒而憤排或因隨喜而接機使其各有所入則庶不溺於常見也試請論之夫一心萬慮其義有三有天理有人情有五行仁者愛松栢義者愛金革此五行之所役也其饑寒取甚飽憂與非人情之使然乎夫天理者何一言以蔽之曰上帝臨汝毋貳爾心故由仁義行非行仁義也不獲已者如達磨大師云外息諸緣內心無喘莊子云宇泰定者發乎天光故黃帝赤水求玄珠非

罔象無由得之此道甚易人自爲難從淺而言唯息奔競黜聰明涵智慧而已是故余常有言曰世人不必聰明不必愚魯是必愚魯者下愚也是必聰明者上智也其餘察察皆繫禍福之門故嵇康從孫三三登未嘗出一言康欲辭去登乃曰子識火乎火生而有光而不用其光果在於用光人生而有才而不用其才果在於用才故用才在乎得薪所以保其耀於今之世矣子無求乎康不能用果遭非命乃作幽憤詩曰昔慚柳下今愧孫登如莊子寓言祖習老列證引孔顏爲仁義而顯仁義出世間而居世間固非明倫蒞政之言實出諸子百家之表下學者竊其文華而爲筆力誦其汗漫而爲高談中才以上者絀繹之如人之美食美器可以玩可以味能虛心能實腹上達者觀之則如程孔目擊而已矣故太乙真人破迷歌云道傍逢一魚猶能掉紅尾子若欲救之急須送於水道傍逢一人性命將淪委若欲救之急須與道理黃帝陰符經云上有神仙抱一之道中有富國安民之法下有強兵戰勝之術故以身爲國以心爲君精氣爲民抱一守中心不妄用故精氣充健則

如物阜民繁然後陰虎陽龍烹煉三苑而戰退百邪
川田有寶四大輕安情之不已內功外行乃證真仙
丹歷真空果位無備可備則與佛同體故名萬法之
尊心之靈妙有若是者上為三界諸天之祖下為六
道四生之源然則何為然而霄壤之間乎所謂天理
也人情也五行也五行人情交戰於物欲之私者小
人也故有刑災異類之差人情天理相與於顯微之
機者君子也故無寵辱若驚之患若夫仰鑽瞻忽之
道顏子心齋日至孟子浩然難言心也遂源之士超
出乎理路之表者強名曰佛亦名大覺金仙此非一

養生論卷一

三

曲之士之所知再請數露夫天地之道因地之利謹
身節用以養父母此孔子已嘗許為庶人之孝也既
孝矣又何加焉故當體認喜怒哀樂未發之先毫髮
無間之地此即心君之實相號曰本來面目以是了
了常知言之不可及故神而明之存乎其人倘居上
而驕為下而亂在醜而爭思無不邪言必縱欲竊仲
尼之冠佩掩盜跖之忍殘荷僥倖而免於刑戮則於
災危昏夢之間游魂為變之際意光業鏡心事闇王
不待六審三推自然依欵承伏故沉而為地獄餓鬼
從而為胎卵濕化惡趣將盡次第因緣再託人身而

又私計人我戕賊天真報緣既盡新業已成復入輪
迴備償宿債不失人身則幸矣余嘗有詩曰天地鎔
金作一爐鼎鍾孟鑑總由吾他年要識方圓器各自
而今現造模其有志趣不凡者因而步入道環則朝
市山林空手把鋤頭步行騎水牛而游戲三昧也

論婚合

蓋聞人法天天法道道法自然故自然生一氣一氣
生二儀二儀生五行五行生萬彙故知物無巨細而
自然在其中矣上古之俗淳淳全全妙合自然男子
三十而婚女子二十而嫁故精滿血盈純子本始是

養生論卷一

四

為父稟母受而有天命之初也故孕育成人而安且
壽然而一歲之中矢運推移地氣順布其或土勝則
木復以救水而裸蟲不育人為裸蟲之長則安危成
壞無非自然也反此而論道者是經造化也建平孝
王無子遂擇良家未笄女入御又無子問澄曰求男
有道乎澄對曰夫合男女必當其年男雖十六而精
通必三十而娶女雖十四而天癸至必二十而嫁皆
俟其陰陽克實而交合則孕孕而育育而為子堅壯
強壽今未笄之女天癸始至已近男子陰陽早洩未
完而傷未實而動是以交而不孕孕而不育育而不

壽元氣孕毓始於子自子推之男左旋積歲三十而巳男左旋十月而生於寅女右旋十月而生於申申為三陰寅為三陽故男女之形定於此矣是故聖人體道立教脩身存神而男女配合以時是為悠遠之計安樂之元也三十之男縱有踈逸而二十之女自有閨門之禁何遲之有哉吁世短人浮惟圖眼底以病男羸女為不了而畢姻則不唯有無後之憂而恐有子夏之戚也亦有以吉日之迫而以病新產者結婚則又不惟有勞瘵之疾而又恐遺累世之患矣夫病蛾無能繭之蠶破蓋無結實之果况少年子女三關情逸五神搖蕩房中分外業種成胎或侏儒不振或巨首瞎目雖具人形而實無聰慧其次學道行姪執法無戒咤鬼驅神產女生男望之不似余實見之每為憐憫不孝之罪此莫大焉天地之委形為人倫之大本故揭此數端以警同志養生者觸類而長則又不止於此也孫真人云交合之法當避丙丁日及弦望晦朔大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地晦暝日月薄蝕虹霓地震不然則損人神不吉損男百倍有子必癩癡頑愚瘡癰疔瘻跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月星辰火光之下神廟佛

寺之中并竈圍廁之側塚墓屍柩之旁悉皆不可交合有法則有福德大智善人降託胎中仍令父母性行調順所作和合家道日隆祥瑞競集不然則有薄福愚癡惡人來託胎中仍令父母性行凶險所作不成家道日衰破產房室雖生長成人家國滅亡若欲求子者但待婦人月經絕後一日三日五日擇其旺相及月宿在貴宿日以生氣時夜半後施洩有子皆男必壽而賢明高爵也以月經絕後二日四日六日施洩有子皆女過六日後勿得施洩既不得子亦不成人更宜交合旺相日辰于後

旺相日
春甲乙 夏丙丁 秋庚辛 冬壬癸
月宿日
正月一六九十一十二二十四二十一二十四二十九
二月四七八九十二二十四十九廿五二十七
三月一二五六七八十十七二十二二十五
四月三四五六八十五十八二十一二十八
日

五月	一三三四五六七	八二十九三十	三十三三十八	二十三二十六二十七	二十八二十九	七月	一八十一十六三十一	二十四二十五二十六二十七二十九	八月	五八十三三十八	二十一二十二二十三二十四二十五二十六	九月	三六十一十六十九	二十二二十三二十四	十月	一四九十四	四十七十八十九二十二二十三二十九	十一月	一六十一十四十五十六十七十九二十	十二月	四九十二	三十三十四十五十七二十四	若春甲寅乙卯	秋庚申辛酉	與上件月宿日合者尤益	黃帝雜禁忌法日人有所怒血氣未定因以交合令人發癰疽又不可忍小便交合使人淋瀝莖中痛而
----	---------	--------	--------	-----------	--------	----	-----------	-----------------	----	---------	--------------------	----	----------	-----------	----	-------	------------------	-----	------------------	-----	------	--------------	--------	-------	------------	--

失血色及遠行疲乏入房為五勞虛損少子

論孕育

觀夫古人制字良有以也以婦人有身為有孕孕之為字謂乃子也子既形於內而父可得而媾之乎此亦禮也又曰妊娠夫妊者任也娠者展也女當之則宜禁任保護而毋致憂憂惡日以犯之精而既疑之時月經不至之後子宮已閉血已榮胎則當異後始終無犯則胎壯而安起居運動不失其常則易產而少病所以世無二產者因之禁而反風馬牛之不可也馬牛除乘禁乘及乘禁乘之禁如馬牛之不可

再感之傷人而無一產者因之禁而反風馬牛之不可也馬牛除乘禁乘及乘禁乘之禁如馬牛之不可過喜過怒久行久立憂勞憂勞崩漏下血上衝等證輕則病苦之憂重則性命之危若久坐久臥及矮女懷妊胎不能轉側臨產難產甚至死腹中或胎衣不下胎禁云食鷄鴨子多則令子失音食雞多則令子橫生食鳥多則令子倒生其餘所食不便更不抄入但食煎炒燒炙辛酸厚味醃醃過多則令子胎毒惡疾風熱抽搐瘡疽癰腫丹癰癰癰等病臨月交合則令子頭戴白被而出則有如疳疔瘡白禿異證怪疾大槩無犯則胎氣真純忽有靈光入夢或有瑞氣

相憑而生聖賢君子是以古今史傳分明且以近代言之則五祖山誠禪師慕蘇老泉而為東坡學士武夷丹士投真漆匠之家而產西山先生嵩道者受史衛王之供而出嵩之丞相凡投胎奪舍之靈常有神童茂異之士故文王設胎教之法使孕婦常觀良金美玉瑚璉簠簋之器山川名畫之祥而遊目適懷又聽講誦經史傳集而使秀氣入胎欲其生而知之是乃仁術也若無真靜志思相棄則徒為矯揉不若朴素直常母聞惡聲毋見惡事如持滿執盈以吉合吉為善佛氏有胎骨經道教有三浩九氣司命監生等文鄭重尊貴不可勝言及醫書種種禁忌愛護之嚴唯有力之家可以奉行故不抄入大抵少艾初生臨月切勿令姦薄侍女市嫗尼師告之以利害恐之以異端使其致期畏忍痛縮開闔參差而氣血乖張家人無措常以老成長上主管之仍使溫厚老嫗三二人與之劇談給之以容易則使其安帖無憂俟子胞下垂玉戶流津蹉跎再四方至草上則如瓜熟蒂落而脫然分解矣既產畢不可即使仰臥且半靠高枕使其氣順血盡方可翻復偃臥頻進疏通溫平活血之藥蕩滌清利為妙庶無貽物停留日後為患所以

世俗不諳斯義於是婦人血病十常八九不為苦病而且濁敗子宮至絕孕故產病十八雖未有不因停滯而然也方類千後

泰定養生主論卷之一

養生主論卷之一



論嬰幼

嬰兒初生重簾襁褓各隨風俗大槩厥初下地之時勿待其出聲急以帛裹指展去舌上青泥惡血用手一遲啼聲一出卽入腹中斯爲患矣如下地少頃不能出聲者急以溫水一口許灌之卽能啼也久不出聲者以其臍帶倒捋元氣入腹仍以口頻頻進氣於兒口中則自能啼也方洗後斷臍則不傷水生病臍帶留長一寸長則傷臍短則傷臍捋汁不盡則寒濕

入腹仍作瘧風衣勿新綿暖則生風其飲臍之法寬急則中常於無風處掀開看覷未愈燒絳帛灰敷之一月外臍上有汁并腫者輕則當歸末同韶粉和傳炙絮尉之重則炙數壯初斷臍了綳畢用甘草一小寸煮汁一合許用綿蘸與兒吮約服一蜺殼許得吐出去胸中惡物妙未則再與吮之半日內三五次服盡藥汁一合得吐出惡水則兒神氣爽無病一合服盡不吐則胸中無惡物也當先以菜葉包明淨生硃於飯內蒸菜熟爲度研極細末當以一豆許蜜和令抹入口服之日一次三日止服多則傷也凡冬夏添

兒久易傷寒熱癘病等證不浴亦不可但初浴時以猪膽汁一箇入湯溫浴之則不生瘡疥次用桃李梅根或枝各二兩許咬咀煎湯浴之則去不祥富室能以金一斤虎頭骨一箇煎湯浴之則厭驚辟惡妙兒初落地浴罷臍帶了畢卽看口中舌下并脣上兩頰但有白泡相連去處卽便用指摘出惡汁無令熱下爲病則無重舌語病此其大畧凡嬰兒六十日後瞳人將成而能應和人情自此爲有識之初便當誘其正性父母尊長漸漸令其別之母勿令其側目視父父勿教其指抵其母親族長幼隣里待妾皆不可訓

其手舞足蹈無禮罵人時間聊發一咲則爲日後不禁之端高舉放手閃避猛出扶起放倒兒雖強咲而面無人色乖張惡性自此萬端驚氣入心觸機而發乳母嗜噉厚味酒醪燒炙煎燂兒亦愛食其酸菓炭異味是以有驚風積癖吐瀉之疾唯恐兒啼恣其所以及其成病又不忍忌其所好猶不忍餌以辛苦之藥借使病危則鍼刺火灸莫甚於此況或不料愛亦徒然大抵愛子之偏盡出於母其說有四正室則姑息其嬌妾寵輩各私其庶有父愛長子母憐幼嬰纔有所偏則所聞不正偏食至病偏愛無尊習以性成

戕賊忠孝其出乎此余自思襁褓之時酷嗜食甜一日得飴意而欲食中有蚯蚓引頸而出自此不敢見飴直至長大方悟長上為之然食之亦疑矣夜卧聞鍾聲則長上必教令則卧今雖為無礙則亦不能不上心幼習之義善惡之種也可不警之哉余開田圃大師經云其國有伏法重囚對主者曰吾死無詞但今吾母一見死而無憾即令見之囚曰我生時食母乳我今死也亦欲食母乳全我始終既食其乳即嚙死其母官責其故囚曰我今死於不法是母教我我也未曾會言語時母即教我罵人及其能行也教我瞞

養主論卷之三

三

人我取得物歸家則愛我喜我我積漸至於今日所以恨之也蓋此等習氣乃閭閻之風天下之通患也大抵庠序之教禮義節文之誨幼雅初學道字未真須自千文蒙求調其句讀俟其舌便語通始可學孝經令其熟知孝行然後學論語必試其日課使其備曉綱常大體外則師友教授內則父兄訓習令其耳聞心解觀其資質強弱利鈍然後授以科業抑揚其性縱不成才則亦不至失身於分外也今也家庭妄誕加以怙恃使其先有所恃而藐視其師且不自本至末而學即欲多讀詩書廣聞小傳以為兒能善言

不記惡事染心遂致助桀為虐文過飾非而恕已責人聰明自負更無以為制之者構長篇賦短策嘲諷為能精神錯謬不能自持一旦染患則病疾遽起原其所自則過在其親蓋幼雅無知而善惡繫乎有識之初故正大先入其心者他日縱有鴟鵂狡狠則亦畏首畏尾而回向之地矣是故嬰幼攝養其習其父母之習也大槩治法除顛顛驚癇疳疔各類其次外諸余服餌並為通法

論童壯

養主論卷之四

四

未弱冠為童過三十為壯夫養天養富天也去就邪正人也共叔段以母偏愛而失身於不法孟母三遷而孟子終為亞聖今夫少者甜處着背穩處着脚不趨過庭之訓復厭舞雩之風護師使親左右矚亡蕭牆夾壁沽酒市脯困極告醫惟務速效怨天尤人莫知反躬孟子曰學問之道無他在乎收其放心而已心神守舍則飢渴寒溫之外自不多事也孔子曰人之少也血氣未定戒之在色古法以男三十而婚女二十而嫁又當觀其血色強弱而抑揚之察其稟性淳漓而權變之則無曠夫怨女過時之弊也孔子曰及其壯也血氣方剛戒之在聞夫聞者非特聞很相

持爲聞胸中纔有勝心卽自傷和學未明而傲養未成而驕志不行則鬱而病矣自暴自棄言不及義而狂矣孟子曰由仁義行非行仁義也如欲行仁義以求安樂者吾見其爲不安樂也必壯攝養之道棄此大道而別求傍蹊曲徑以資分外名必致廢事蕩家而怪誕無耻也大抵血氣盛旺之時難以制抑凡事當先知心是吾之靈明主人一切好欲欺侮凌奪肆恣皆是血氣所使倘犯刑名災害則是靈明主人自受苦等也常作此想者自然漸成調伏古今脩性養命之術恐名利之士難行並不抄入凡陰夏日之外

養生論卷之二

五

五日一沐十日一浴若類浴則外覺調暢而內實散氣泄直也年二十者必不得已則四日一施泄三十者八日一施泄四十者十六日一施泄其入弱者更宜慎之母恣生樂以貽父母之憂而自取枉天之禍而雷同衆人也能保始終者卻疾延年老當益壯則名曰地行仙雖有貧富之異而榮衛冲融四時若春比之抱病而富且貴則已爲膏壤之間矣况能進進不已則非常人所可知也但於名利場中得失任命知止知足則漸入道鄉也道者非特寂寥枯槁之謂也如所謂素富貴則行此道於富貴素貧賤則行此

道於貧賤耳關尹子曰圓爾道方爾德平爾行歸爾事孔子曰志於道據於德依於仁游於藝故內外二聖之言未嘗不契蓋藝爲應世之術故能統利乃事仁爲泛愛之常故曰平爾行德方則不移其有所得於心有所據於事道圓則通而不執故無所不容而德行廣大志無不在也何嘗盡廢諸事而後謂之攝養哉特消息不忝而行之藏之量其才能而負之荷之以不流於物故謂之攝以安其分故謂之養抱朴子云若才不逮而強思力不勝而強舉深憂重患悲哀憔悴喜樂過度汲汲所欲戚戚所患談笑不節

養生論卷之二

六

臥寢失時擲弓引弩沉醉嘔吐飽食卽卧跳走喘乏懽呼哭泣皆爲過傷此古人所戒之節文况夫風前月下竹徑花邊俯仰傷懷杯餘踈散或進退惟谷而干祿或衝烟冒瘴以求榮呼吸維邪停留寵辱飲食異味荏苒暴患各有治條當斯之時卽回光返照少駐元神以行藥力毋復縱聰明以凌燦粗工而自取多事也嗚乎三皇大聖日總萬機而又能拳拳於天下民瘼下禮折節於方外士而講道論醫以廣其傳今之學者一身未知所以自治而以人治之則孰爲多乎而况又欲爲治人者難矣哉余嘗作返朴論其

辭有云儵與忽欲報混沌之德而相與謀曰人皆有七竅以爲食息而混沌獨無嘗試鑿之曰鑿一竅七日而混沌死有客對余曰吾有術以起混沌之死但一年修一竅七年而混沌復生余曰固哉之學也何以爲誇尚乎吾能以一法回混沌之生而息與之俱生故視斯明聰斯聰言斯辯而余未嘗以有視聽與言而人亦未嘗以余爲聰明與辯故不補其鑿而混沌自全夫是之謂聰明與辯高明之士能於此處具眼則養生必有主也今採之方並類其次

論衰老

少壯既往歲不我與孔子曰及其老也血氣既衰戒之在得蓋因馬念車因車念蓋未得之慮得之既得之慮失之趨趨焉而不決寤寐驚悸而不安夫二五之精妙合而凝兩腎中間白膜之內一點動氣大如筋頭鼓舞變化開闔週身薰蒸三焦消化水穀外禦六淫內當萬慮晝夜無停八面受攻由是神隨物化氣逐神消榮衛告衰七竅反常啼號無淚咲如雨流鼻不覺而出涕耳無聲而蟬鳴喫食口乾寐則涎溢洩不利而自遺便不通而或泄由是真陰妄行脉絡踈澁晝則對人瞋睡夜則獨臥惺惺故使之導引

按摩以通徹滯固漱津燕液以灌溉焦枯若扣齒集神而不能欽念一曝十寒而徒延歲月雖云老者非肉不飽肥則生風非人不暖暖則多痿僂倖補藥者如油盡添油燈焰高而速滅老子云以其厚生所以傷生也況有明脩禮貌暗伏姦雄麤藥腐其腸胃脂粉惑其清真孤陽獨盛水穀易消自恃飲啖過人恣造欺天之罪宿緣既盡惡報臨頭其或厭飲沉酣身居勤儉志益貪婪方聚髮毛之德忽作玄子之夢宋齊丘化書云慳貪者化爲狗暴勇者化爲虎雖然身未遷謝業已成行矣先賢詩云克己工夫未肯加各驕封閉縮如蝸試於靜夜深思省剖破藩籬即大家先賢戒曰積金以遺子孫子孫未必能保積書以遺子孫子孫未必能識不如多積陰德於冥冥之中以爲子孫無窮之計龐居士詩云北宅南莊不足誇好兒好女眼前花忽朝身沒一坏土又屬張三李四家張紫陽詩云人生雖有百年期壽夭窮通莫預知昨日街頭方走馬今朝棺內已眠屍妻財遺下非君有罪業將行難自欺大藥不求爭得遇遇之不鍊更迷癡蓋年老養生之道不貴求奇先當以前賢破幻之詩洗滌胸中憂結而名利不苟求善怒不妄發聲色不

因循滋味不耽嗜神慮不邪思無益之書莫讀不急之務莫勞三綱五常現成規模貧富安危且據見定邵康節云美酒飲教微醉後好花須看半開時又云爽口物多終作疾快心事過必爲殃與其病後求良藥孰若病前能自防又詩云慮少夢自少言稀過亦稀簾垂知日永柳靜覺風微但看花開謝不言人是非何須尋洞府度世也應遲龐居士云但願空諸所有慎勿實諸所無余亦有詩云世人用盡機關祇爲貪生怕死我有安樂法門直須顛倒於此晉有祁孔賓夜間讀書忽聞隙外云祁孔賓隱去來脩飾人間事甚苦不堪偕所得未毫銖所喪如山嵯晃文元公法藏碎金云衆所好者虛名客氣尤具美財予所好者天機道眼法要變明又云觀身無物從幻化緣生觀心無物從顛倒想生又云身有安全敗壞者事之報也卽世而可見性有超升淪墜者行之報也異世而不知譬如形聲之有影響必然之理也又云人有疾苦或多偶爾非因所作無如之何歷觀幻化之軀而有甚於此者能推此理足以自寬又云仕宦之間暗觸禍機祗席之上密涉畏途輪迴之中枉入諸趣古人云心死形方活心強身卽亡金剛經云云何降

伏其心川老子頌云你喜我不喜君悲我不喜鴈飛思塞北思憶舊巢歸秋月春花無限意箇中只許自家知唐靜天師云靈臺皎潔似冰壺只許元神裏面居若向此中留一物平生便是不清塵老子云虛其心實其腹是皆融智慧黠聰明而宅天和以卻百邪者也豈比夫三千六百傍門小法加之於萬境煎熬之心而頭上安頭又以金石草木剛烈之劑餌之於喪津枯涸之體而求補益哉歷觀前人以不仁成家以仁而保家者有之矣如以不仁而得復以不仁而守者禍不旋踵也晉書傳云石季龍僭稱帝號發近郡男女十六萬車十萬乘運土築華林園揚州送黃鵠雛五頸長一丈聲聞十餘里泛舟於玄武池命子石宣祈於山川因而游獵乘大輅羽葆華蓋建天子旌旗十有六軍戎卒十八萬出自金門季龍從其後宮升凌霄觀望之嘆曰我家父子如是自非天崩地陷當復何愁但抱子弄孫日爲樂耳宣所過三州十五郡資儲靡有遺季龍復命子石韜亦如之出自并州游于秦晉宣素惡韜韜是行也嫉之彌甚於是相圖之計起矣俄而宣使刺客殺韜于佛舍又欲謀不軌事發季龍殺之季龍旣死其後殲焉嗚呼季

龍之富貴而不足恃而今之碌碌者十百之幣又奚足以作威福而造業因哉余雖枯槁幽棲而衣冠出處未嘗用餽餉故事以孔子之性與天道不可得而聞也故託佛以言性耳佛云一切山河大地皆從如來性中流出然則佛之一字乃一切有情之覺靈也實爲大羅空劫先天之祖氣卽元始天尊是也人人皆抱此靈而不自覺故佛經云一切衆生本來成佛以不覺故名曰衆生以覺故名曰佛今之地獄變相乃唐太宗以入冥境界命宰相關立本圖畫以示世人余少年滑稽之時未嘗不在安樂之下一日在外因病困極恍惚所是與吾家骨肉所夢同日境界因緣無有少異遂絕口不敢戲笑常讀史傳語錄文字始知近代以來王公卿士於佛言而獲大安樂者不可枚舉故韓昌黎排之最甚而終得法於大顛歐陽文忠公惡之如讎敵而自號爲六一居士豈非自有所得而翻然而改者歟悲夫世人不明佛心而溺於佛事故梁武帝之禍侯景至而不知秦始皇欲仙徐福去而不返况夫瑣瑣馬事而能勝其業障乎夫業障之心以酒爲漿以妄爲常念念遷謝晝夜呼吸共一萬三千五百息一息脉行三寸元氣週身脉行八

百一十丈寒來暑往知誘物迷神明流之遠矣養生之士以此爲主則是認賊爲子豈不謬哉故岐伯曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危易云精氣爲物游萬爲變是也昔有二人就余以辯生死事大者一曰人之有生也賦性於天養命於地百年之身仁義而已及其終也清魂歸天濁魄歸地夫復何疑一曰人之生也以貴爲貴以得爲強以妄爲常蟲穢之倉慈慮之囊或爲之讓或爲之攘均爲孽孽一名殘忍一名忠良拘之則痛自外寇縱之則血氣內戕欲持其要竟知所長業識茫茫一息不來烏知其何往余各以一詩遣之其一曰原始要終理不訛四非莊敬怕蹉跎平生不踐中庸地一曲陽關沒奈何其二曰超凡一句絕商量說破教君也斷勝一切順違生死事莫令厭戀作心王有人能如此便見養生主也大抵桑榆之景勞逸不同蓋勞心者甚於勞力者耳善爲心王者勞亦如是逸亦如是如魚飲水冷暖自知也人年五十者精力將衰大法當二十日一次施泄六十者當閉固勿泄也如不能持者一月一次施泄過此皆常情也不足爲法凡肥盛強密者自壯至老衣食與藥並用疎爽肉雖多不使勝食氣果宜

棗柿藕菜宜韭與蘿服飲食飢時先進熱物然後並
宜溫涼及時勿恣食粘滑燒炙煎博辛辣燥熱之味
防有內鬱風痰外發癰疽之證雖清瘦而素稟強實
燕有痰證者與此同法清癯虛弱者自壯至老衣服
與藥皆宜溫厚性寒傷胃腥膾鱠炙生冷油膩並宜
少食如肥而素稟滑泄虛寒易感者與此同法其餘
扶衰潤槁之方各類于後

泰定養生主論卷之二

養生主論卷之二

十三

泰定養生主論卷之三

素問節要叙論

墳素之書聖聖相傳歷代所尚輔教濟生其道大明
於天下學者厭於研窮方書充塞乎世間好事者溺
於苟且於是目擊無端之蔽獨夜蕭蕭愈昏愈昭而
心口相喻曰雖醯雞蟻蝶之微亦能聚形接翅於大
空之中而鼓舞造化之妙况我齒髮之屬而無寸補
於天地之間得無愧乎故推管見以陳其畧誠非專
門之學是必行不由徑復稽難素照對或有未盡之
義各入全文一段譬如偃草之風雖不能使萬籟俱
鳴或可蕩滌乖穢而道達靈氣耳倘能階麓以入細
則岐黃之奧期日可得也養生之家不可不知如從
事於斯者遠取諸物近取諸身博覽群書約歸於理
朝於是夕於是精思熟察慈應廣惠疑證勿暨重病
勿避進不以私退不以慚終身期於古人並駕而無
耻惡衣惡食冠冕倘來則受得時行道普施群靈
不亦大丈夫乎若夫不下克己工夫先競鬪勝負
胸中茅塞口耳聰明銷磨岐黃之風網羅龍蟄之利

及乎對證生疑則慰之以開胃補虛偷安苟幸取媚人情實既爾病勢漸危患家感其過從而沒齒無恨醫者自以為穩而反有德色常態如此識者為之慘然或素無受授之資剽竊單方輕行峻劑不顧虛虛蓋虛虛實實損不足益有餘正犯醫經之條款冒昧既久遂成忍人或怪形異服行頭擊帳雖小夫賤隸皆得為之醫之為道從此下矣由是士大夫耻言醫術士大夫耻之余亦耻之也嘗聞士大夫以一物不知為耻而不敢醫則不亦耻乎捨至親者身而榮至疎者名及惟病疾則頓委於庸人之手悲夫趙起嘯嘯之榮樹塞反玷之僭君子是謂斗筭未聞以醫而害名者也與其託興於婉辭綺語之間游燕於翰墨博奕之事則未若閉心斯道以事君親若不明其梗槩而命醫者曰吾抱某病當服某藥是教玉人雕斲也苟聽其命則台台則未免為奴顏婢膝之悞不合則取短舍長而有道者飄然矣余曩因多病漸染成習故矜知憂患情况頗究醫學淺深岐伯曰病為本工為標故首論病家次論醫家欲病者安養醫者安行各祇乃事次正訛公論則取其是去其非而通治異治可用不可用其理自明然後運氣標本

陽虛實脈病證治次第十卷蓋六氣如醫者之司屬也標本如事之先後也陰陽如事之彼此也虛實如事之可否也診脈乃醫者之審委也故百病所屬之氣如網之在綱對病處方則如綱之於網而理明證定治乃無誤矣不然則如東坡跋楞伽經云譬如里俗醫師不由經論直授方藥以療病非不或中至於遇病輒應懸斷死生則與知經學古者不同日而語也其是之謂歟

論病家

原夫天地之靈為陰陽之神而人心之靈為血肉之神也其體不同而其神不異故人之心也與天地合其德與日月合其明以口體所累則或勞心或勞力而為治人事人之所役也致昧其德與明也血肉之軀安得無病夫鳥獸亦血肉也巢居穴處飽而後已則未聞其有病而馬牛鷹鷄亦鳥獸也以其鸞繫在人乃亦有病焉然而人之情也可謂甚矣鳥獸習其習而病况其傾天下之色不足止其欲徧天下之財不足愈其貪名輒利鑽蠅藥輕肥富貴者過之貧賤者不及其情可勝言哉及其病也嗜好不能瘳其疾情慮不能使其安故當遷善改過息榮返神則藥餌

易效重病即輕而輕病即愈也人之百病其義有五
一曰稟受之病與生俱生者是也二曰果報之病伯
牛之癩袁盎之瘡者是也三曰六淫之病風寒暑濕
燥火外邪所侵者是也四曰七情之病喜怒哀樂憂
恐思者是也五曰金瘡癰瘡外傷者是也外傷等證
顯而易曉其所謂七情者責當在誰六淫則亦以此
而召之耳况其果報之病前生今世莫非我乎若覺
之早也故袁盎遇鴆足山尊者而釋其冤西施山居
癩愈而成九女之容不然則醫如扁鵲之才亦望齊
侯之疾而却走矣其與生俱生之病亦父母之流

卷之三

流也其可盡除之乎今之官門巨室務要便佞藥須
香其事必如意稍聞逆耳之言則必遷怒於人故仲
景傷寒論序云方今居世之士但競逐榮勢企踵權
豪孜孜汲汲惟名是務崇飾其末而棄其本華其外
而悴其內皮之不存毛將安附焉卒然遭邪風之氣
嬰非常之疾患及禍至而方震慄降志屈節欽望巫
祝告窮歸天束手受敗實百年之壽命持至貴之重
器委付凡醫恣其所措嗟嗚呼厥身已斃神關既
遷變為異物幽潛重泉徒為啼泣痛夫舉世昏迷莫
能覺悟不惜其命若是輕生彼何榮勢之云哉而進

不能愛人知人退不能愛身知已遇災值禍身居厄
地蒙蒙昧昧蠢若游魂忘軀徇物危若冰谷至於是
也孫真人曰嵇康云穠歲多病饑歲少疾信哉不虛
是以關中土地俗好儉嗇厨餽散饌不過茹醬而已
其人少病而壽江南嶺表其處饒足海陸鮭鱣無
所不備土俗多沃而人早夭北方士子將宦至彼遇
其豐贍以為福祐所臻是以暮早長幼恣口食噉夜
長醉飽四體熱悶赤露眠臥宿食不消未逾月大
小皆病或患霍亂脚氣脹滿或寒熱瘧痢惡核丁腫
或癰疽痔漏或偏風癱瘓不知醫藥以至於死凡如

卷之三

此者比有皆是惟云不服水土若不知得病之由靜
言思之可太息者也是故醫書云富貴之人從生
至長無敢逆其意者及其病也亦然故曰難治况夫
閭閻之家不諳服餌投藥幾幾或謬傳變或藥病
相攻便言有隔即從事乎異端不根之說而中道而
廢明明易治之病翻成不救之危大抵暴病不可在
再沉痾不可速療欲速則更醫必驟醫衆其論必繁
荏苒則邪氣入深用藥未必即差故可以急則急可
以緩則緩至誠待士則賢者進而而不肖者退也至
醫之處必也擇其謹愿者從其所畏而用之若求奇

信勝則市井之風起矣且醫人臧否各有聲迹觀其所由察其所安則人馬瘦哉蓋昧理之士劑繁而語雜明理之士劑簡而論詳昧理之士自求進退則慚明理之士不奔趨敬而直入門不問證切脉便知源然後問之聞之望之參之六經內外無差按藥即有寸進故知其可用也然進之效亦有說焉藥病相投時間似愈病勢進退當論後先若事游談泛論竊聽旁人廣引方書誣合轉變舉措謬謫情懷鹵莽暴病難愈久患轉增者故知其不可用也然而轉增之病亦有說焉如藥病相攻則時間反倒不日病痊又在人消息且富貴之人有病則薦醫者多而進者雜主病之人悅同好局見聞去取不公則病者之不幸也孫真人云大家有病用醫切不可令真偽一處藥味中間防有差迭可不慎乎

論醫家

孔子曰學也祿在其中矣人之託身從事業雖不同貴賤溫飽皆可謂之祿未有求祿而不學者也況醫者之學藝兼尤流其學豈有窮極哉世俗云學醫貴人命雖出戲談不可不戒孔子曰知之為知之不知為不知是知也故當臨病用藥則度吾所長而為之

難明之證則退而思之幸而得之則當勇於義不冒昧強為網羅世利聖人之道贊成化育豈為細人作無厭之計哉故曰醫者人之司命任大責重之職也凡當臨病之際不見其貴賤親疎但自知病證治義然後取尚嫌有心况可作色用情需以帛帳彩乎一懷利心則進退惑亂也求醫之急解倒懸一時輕諾未免寡信孰若止吾之心術之定見其道之大行也則心亦如是其道之不行則心亦如是榮枯得失定以天緣公伯察其如命古者稱醫為師今也視醫如戲孔子所謂夫人必自侮然後人侮之又曰機也慾焉得剛是故人能剛慾者必不為此俗態也經目之事既驗紀錄之文已明孫真人惠及昆蟲休官學道而隱顯神仙最從速醫逢媼婦誠意存仁而子孫仕宦或因醫行媼或傷胎孕鬼神之禍定難逃仲景書云陰陽虛實之交錯發汗吐下之相反醫術淺狹為治乃誤使病者殞歿自為其分至今竟東塞於冥路死屍盈於曠野仁者鑑此豈不痛歟又曰智者之舉措也常審以慎愚者之動作也必果而速安危之變豈可詭哉此古人之告戒至切者學者甚勿忽之嘗見醫者診脉不

識寸開放手妄言虛實不問得病之由今經幾日是表是裏曾無傳染只據所見便言其證證且未的不顧汗下次第或病人勞復便毀前醫為誤甚至子談父過者有之弟掩兄長者有之及其治療本無所長原其所以則志在於利前人有言曰醫人乘急取財者甚於盜賊且莊子曰盜賊亦有仁義禮智信今也廢其天倫而公懷奪榮利則不若盜賊矣是可忍也孰不可忍也

卷之三

一

湖漢江浙亦未有目之者及至淮之邵伯鎮旅于僧舍亦然無聞於人又將顧而之他主僧聞之曰子若不設肆人誰之知市有寺屋吾給子器具請試為之既而醫道大行妻子具而家產豐一日主僧將化召其來前密語曰子前生在此鋪街鑿井今享此報更宜積德他生後世又非今日之比也言訖而化是知學者未有不遇無學者遇之無術以濟人則誤傷惡行之報緣盡當償古語有云醫不三世勿服其藥蓋讀伏羲神農黃帝之書非獨三世為醫也傳茶之子不可恃為家學而守死寡聞悞已不妨人命為重賢

賢易色不耻下問尚恐不及況是已非人乎口給之才足以欺人不足以欺天蓋實字在乎貫穿該博深涵厚蓄得魚忘筌得兔忘蹄則自然其用不繁而履踐閑雅也歌誦難素記問之能也圓散精妙脩合之能也湯液生熟煎煮之能也套類加減市貨之能也廣收博聚料劑之能也輕財尚義濟利之能也乃至於博覽群書深明本草皆醫之事非醫之道夫何故蓋天下紛紛之事理一而已明諸理而學醫則思過半矣天下昏昏之情因果而已明諸心而行醫則其過蓋鮮矣

卷之三

九

泰定養生主論卷之三

正訛

方書云夏月陰氣在內原夫聖人以天地為法象明人身之安危天地之氣一歲十二卦一卦六爻共七十二爻半陰半陽以候三百六十日康節云天根月窟閑來往三十六宮俱是春蓋陰消陽長暑往寒來故十一月復卦坤下陽生泉即溫至於正月三陽陽氣平地故云內陽而外陰及乎四月六陽將盡陰

氣下生則井底寒泉至大七月三陰平地故曰外陰而內陽也天地之氣相去八萬四千里日月週天動經一歲故陰氣在內有三月之爻康節云一物各具一乾坤是則人於天地具體而微心腎之氣相去僅八十四分元氣週身盤旋百刻故以子為一陽生午為一陰生七十二爻半陰半陽盈虛消長比之天地之氣特倏忽耳且盛夏之非可以結米人而如之則當身半已下三月無陽也其何以為榮衛乎夫一年卦氣自五月行陰符至七月則為天地否卦其陰而外陽人居大地之上與金流石峙少壯

非吾氣衛血榮則立為焦腐矣所以不焦腐者可見吾身之天地與其天地義同而體異乎是以善攝生者吾之天地陰陽無愆則榮衛周密而六淫無自入也不善攝生者六淫之邪相侵而醫藥之道作矣古方治伏暑中暈用白霜五苓柴胡益元以墜滲清利其熱毒也近世好事者穿鑿古人糟粕不明天人大夫例謂盛夏陰氣在內不用寒涼又醫書云春主發生陽氣在上可行湯法湯者瀉也蓋人之血氣本無寒暑因天地之寒暑而為舒發凝滯之氣酒家溢飲則雖窮冬亦嘔噦終宵傷寒藥難治大癘則雖盛夏必用硝黃矣且傷寒內熱者必欲寒涼今夫夏月安居之人小便尤其赤澀也故養生家法春夏養陽秋冬養陰王太僕註曰春食酸夏食甘秋食溫冬食熱所以調平天人之氣也若耽食涼食寒食涼食寒食涼食寒挑商走販篙子車夫奔馳勞務之人柴饑飲水食寒傷脾泄瀉霍亂轉筋四肢厥逆嘔吐清水始用薑桂木附之藥方今世俗平居盛夏例以五苓大順合服之是所謂引賊歸家者也蓋燥熱相從物之性也以其治暑不亦謬乎以此觀之則執經不通者雖不誤

醫亦能誤事據方之士雖或悞中多致誤傷仲景傷寒論一百一十二方小柴胡湯居其一也專主少陽一證而於三百九十七法中凡六十餘法用之清裏解表第一藥也則活人書中戒曰近世多行小柴胡其性寒厥意慮人妄投於六脉遲細表裏無熱者遂使後人是非然而或因好事者增於其書亦未可知養胃湯辛甘燥熱之劑專主內傷生本外感風寒之暴證三日已前則可以發表溫中近世士夫庸醫不問日數傳染是表是裏始終服之遂成陽毒而不救或熱厥入深在甚成瘵者有之醫書云諸痛為寒

蓋太陽寒水本寒而標熱至於腹痛桂枝加大黃則

三

其可執如諸痛為寒乎故經云有治其本而得者有治其標而得者故標本先後緩急之活法也近歲夏秋之間酷暑鬱熱人多伏熱痰涎流注脾胃遂為腹痛方書不載醫者不通便謂感寒遽用烏附薑桂抱薪救火立為燥卒矣蓋寒熱之義在乎標本經不盡言人不盡義執經為證紅紫亂朱醫書云寒熱往來頭疼乾嘔胸膈悶腹脇痛小柴胡湯主之或者不拘春夏皆無飲食之傷類云停食感寒即用薑附治之至於日月之乂更醫數四仍曰停食感寒往往如是

故壞證頗多亦有以結核為瘵瀝者指風毒為脚氣者方書云上盛下虛者是必心腎不交火炎水溢神情煩貴房事陰痿者是也近年不問壯年煩壅或老而氣血未衰纔見痰多耳鳴不解中脫關格即服僭燥丹藥名曰鎮墜久則陽元陰消果為下虛矣醫書以脾為中州胃乃水穀之海變化五味薰蒸肺經肺氣風氣週流百脉接續金帝為日生之元故平居七日不食則元和逝矣人之有疾則脾不轉輸故不食而不飢但治其病胃氣自固故仲景三百九十七法不言開胃補虛蓋虛者難復也惟虛寒脫泄病後食

不復常者可以燥脾今之病家貪生醫人把穩急於

四

開胃故經云舊病未去新病又來藥作崇也標本者醫道之法則也多見醫者指人之肥瘦為標本若然則是臆本矣是何言歟今人名為病者古方謂之滯下滯者乃不利之義也今之痢字古方無之蓋利者不滯之謂傷寒法中之瀉證也義既不明則用藥大有徑庭矣况道聽途說無非臆論謂某人久痢百藥不效忽日思某物喫一餐而愈後人效之多致強為殊不知其滯下之積將盡腸胃之氣已清脾元頓回而一旦思食故食之而愈也世人云回痰勝服藥莊

子云既以爲物欲服歸根不亦難乎蓋痰以敗津所結入脾胃不復爲津矣但母今遠噤傷氣可也大凡世俗之傳差誤用藥之士難明蓋傷寒者三日已前無汗惡寒不惡風傷風者三日已前有汗惡風不惡寒若不傳經則數日亦然已傳入內者肌膚不熱亦不惡風寒也壯熱者表裏實熱寒熱者或先寒後熱或先熱後寒寒熱往來者寒熱間作晝夜無定發熱者始終無寒有時作熱潮熱者日晡一作依時而至內熱者小便赤澀舌上白胎表熱者大小便如常亦不煩渴發熱者五內拂勃而不暢骨熱者坐卧如蒸蓋寒聲重不惡風寒身體不熱不痛者上壅肺實伏痰氣閉因風因寒因天色陰晴交變濕熱內鬱或涕唾稠粘而噴嚏或痰涎壅塞而氣急發作日久而不愈則亦能頭疼身痛自汗惡風寒也特小便多且頻元與傷風寒異矣舉世不明此證但見鼻塞聲重俗云傷風或云感冷或云風發古今方書不載其詳所以學者一例爲人發表而肺氣愈實甚至有成水腫者有成肺癰者也亦有素稟者或有因風因寒而然者但無外證者並用清中理肺肺既停痰日久其氣不能衛護週身故有流汗如雨今人妄名虛汗誤

矣虛汗乃傷寒病後虛弱動身汗出不動身者不出也此實肺癰而然亦與傷寒自汗義標同而本異不可發汗重泄真氣也本草謂石膏者以體質如猪脂膏手擘可碎並有東鍼紋今之所謂軟石膏者是也寒水石者又名凝水石水寒而凝卽爲冰故其堅白晶潔狀若明礬鵬砂之質或有碎之而粒粒大小皆四方者又名方解石今所謂硬石膏者是也又如驚管石則似驚翎管馬牙硝則如馬牙皆名物之義也集錢氏小兒方者以未師藥市爲憑則欠格物矣雖誤無妨蓋藥性大同小異不可不別也今人謂小便白濁者爲虛寒蓋虛寒漏精則溲多而滑者是也其少而頻澀而痛者膀胱蓄熱而謂之五淋證也世人云因顛倒而中風乃是因中風而顛倒也中古之世多以鍼砭補瀉榮衛近代罕得正傳故圓散之道大行春秋至漢藥論兩水論升唐宋以來始定以大劑不過五錢用水皆以甌蓋故藥劑大小甌盞淺深宜自消息當以一盞爲十分煎去二三分名曰七八分若令用水二盞煎八分者是該一盞八分則誤矣若煎成一盞中八分者藥性過熱而無效也此皆市貨之風以多爲貴服餌之家以少爲嫌世人好術醫者

趨時習以成風縱一齊人傳之則衆楚人咻之矣蓋
訛舛之弊實害養生好事者不可謂古人皆賢而今
人皆愚且如方中云脈吳者皆因按腋下之毛爲機
氣入肺而然試請驗諸腋氣者曾按腋毛否且肺以
鼻爲出入之門百毛孔竅皆爲開闔之應而獨於腋
毛竅中入之耶又曰石藥須研極細不然則爲砂淋
石藥極細於脩合之法理所當然蓋沙淋自膀胱與
洩同出膀胱者溲囊也其帶耆於小腸幽關之次其
尿必而滲之有出而無入也使其有出有入則清濁
混矣相襲之謬則舉萬一格物致知者推而廣之則

名正言順而利己利人也

公論

天下之情苦乎似是而非也聖人之道一以貫之
故是是非非爲君子之公論是非非是乃小人之私
心明斯二者則廢事成錄斯二者則急務敗夫藥之
於病如救頭然俗諺相乘則吾誰適從大抵聖人立
言不離金木水火土治病不離溫涼寒熱濕故黃帝
問曰醫之治病也一病而治各不同皆愈何也岐伯
對曰地勢使然也故東方之域天地之所始生也魚
鹽之地海濱傍水其民食魚而嗜鹹皆安其處美其

食魚者使人熱中鹽者勝血故其民皆黑色踈理其
病皆爲癰瘍其治宜砭石故砭石者亦從東方來西
方者金玉之城沙石之處天地之所收引也其民陵
居而多風水土剛強其民不衣而褐薦其民華食而
脂肥故邪不能傷形體其病生於內其治宜毒藥故
毒藥者亦從西方來北方者天地所閉藏之域也其
地高陵居風寒水冽其民樂野處而乳食藏寒生滿
病其治宜灸焫故灸焫者亦從北方來南方者天地
所長養陽之所盛處也其地下水土弱霧露之所聚
也其民嗜酸而食附故其民皆綬理而赤色其病率
痺其治宜微鍼故九鍼者亦從南方來中央者其地
平以濕天地所以生萬物也故其民食雜而不勞故
其病多痿厥寒熱其治宜導引按蹻故導引按蹻者
亦從中央出也故聖人雜合以治各得其所宜故岐
伯舉五方之俗發明九州之內高下之宜則一郡之
間郊郭之異也風土寒燠不齊則隨方受氣唯疫癘
時行之有差耳所謂四方之病則處處有之詎可以
辭害義哉蓋道聽塗說疑似之間聖師答問不可戶
曉假令有人於此病癰瘍疔腫者以東方砭石之法
治之如今之火鍼之類是也病七情內疾者以西方

毒藥之法治之如今之羌活大戟甘遂巴豆礪烏
附常山等藥是也病寒積中滿者以北方之法治之
如今之灸是也病癰痺者以南方之法治之如今之
鍼刺是也病痿寒熱者以中央之法治之如今之呼
吸按摩搖筋攢骨者是也所以察病人之勞逸疎密
強弱之法也故王太僕註曰西方北方之有冷病則
以熱方溫方之法而治之東方南方之有熱病則以
寒方涼方之法以療之此即如經云以熱治寒以寒
治熱以涼治溫以溫治涼之義也故岐伯曰假者反
之此之謂也豈有浮薄之俗不學病家求水濟火之

素生論卷之四

九

急需熱散寒之害動之江南北附會聖人所謂天
下之南北執經迷旨誤衆傷生此東家之西為西家
之東何足以知異義哉且如江南楊豫之分豈無高
陵山谷河北青薊之野豈無海濱污下養生之士當
一振耳目之新首觀全文一段而出入方宜異治循
環標本後先據仲景扁鵲之通論則知余非好辯也
試舉一二一日有士人聞一醫者之名則疾首人頰
而怒曰此人可殺余將謂其有大惡行也遂從容扣
之則曰惡其鴻人也再詢其所以且知此醫為人治
傷寒大便七日不通謔妄狂亂法當承氣湯下之或

曰因瀉而死或曰不得瀉而死余即謂人曰法當下
而下之下之而不愈者不可治也下之而不瀉者於
醫何罪識者皆曰然也又余嘗過一人官之藥肆長
揖就座未久即愀然謂余曰北人何故但用硝黃余
即領應之徐徐問曰市貨之藥共有幾品醫官曰不
過日用常行者耳余歷數大小麻仁圓三黃圓涼膈
散碧雪紫雪之類而斯人躍然起座曰此等皆日消
貨也余即一笑而別所謂硝黃果害人耶則宜市貨
乎果不害人耶則臨證用藥必有以也何其人哉
前所謂是非非是小人之私心者是也紫蘇香附氣

素生論卷之五

十

藥之不可無者醫書以香附為婦人仙藥而御製熟
水為上品沉香熟水次之近代以來不原本草藥性
而妄加其過名曰耗氣謂某藥泥血其藥是吐藥某
藥泥脾及其自用却稱其德謂本草云能散結氣者
能滋榮衛者能治瘧疾者能補虛勞者由是平地風
波而致使病者在再為沉痾札瘥者矣又有一證登
牙之事不可不知昔有一富貴老人中風日久一日
託相知數輩力有於余既至彼乃見曰流列坐試問
其故則曰十日不得便洩百法無效敢望料理余問
服麻仁圓否主者曰連日所服不下二升矣余笑曰

可謂多乎哉。利藥雖多，內清而後秘，當用下取。今作密兌礪阜，萊細末於上，內後部。又今炒鹽研細，用翎筒挑，益末吹入水道中。卽時前後皆通，洩如墨汁，糞似鐵圓，仍有薄糞津津然出，殊未痛快，則中有不悅者。余見機而變，遂謀脫身。次早，轎馬疊至，哀懇不已，故再赴患者，以兩手握余兩手於其胸而仰顧余曰：「某年老身肥，不幸中風，秘鬱幾死，昨以先生之故，稍寬三分，更乞用情，遲則不濟也。」余令患者於市肆取益元散一小貼，入麝麥穗一捻許煎服，未幾，衆醫拂袖而去，余出於掣肘也。豈得已哉！次早再招，既至，見其內人喜曰：「夜來服藥後，得小洩，如墨汁半桶，誅則大便津津之泄卽止，洩行瀉佳藥之功也。」余疾聲應曰：「不然，不然，內有結糞阻之，非比水瀉證也。」遂託故辭之。次日不去，忽甲醫至，曰：「子之飄然，誠爲高尚，今早患人小腹腫痛，寒室無措，未免乙醫諸子用滑石性寒而爲冷氣痛也，愴惶無以解紛，衆醫慚退，余卽對甲醫詭罵乙醫曰：『愚不可及也。』夫中風便秘，大堅大滿，內外如灼，五實之證備矣，寒從何來？此乃日前利藥攻透臟腑，夜來小便頻通，下部空闊，則清薄藥糞驟然注下，其間結糞相雜，磊塊幾梗於直腸，宛轉

不行，致使小腹腫痛也。甲醫既退，乙醫亦至，備如甲醫之言。子亦如對甲調乙之說，遂扣其所以，則曰：「如子所論，果得結糞三二十塊，藥糞數升，恬然無事，別議招醫，不勝悶抑，故來相告，遂別此段猥瑣，卽非是已，非人臨病活法，方書不載，醫者譏譏，患家無斷，舛訛錯綜之時，未有以明決之者，故害其畧以爲不測，辯惑之端，養生者幸勿以爲當論而忽之也。」

泰定養生主論卷之四

論運氣

運氣者何十幹之五運十二支之六氣也五運也者木火土金水也故氣交變大論篇黃帝問曰五運更始上應天基陰陽往來寒暑迎隨直邪相傳內外分離六經波蕩五氣傾移太過不及專勝兼并願言其始而有常名可得聞乎岐伯稽首再拜對曰昭乎哉問也是明道也此上帝所貴先師傳之臣雖不敏往

素定養生主論卷之五

聞其旨帝曰余聞得其人不教是謂失道傳非其人慢泄天寶余誠非德未足以受至道然而衆子哀其不終顧夫子保於無窮流於經極余司其事則而行之奈何岐伯曰位天者天文也位地者地理也通於人氣之變化者人事也故太過者先天不及者後天所謂治化而人應之也帝曰五運之化太過何如岐伯曰歲木太過風氣流行脾土受邪歲火太過炎暑流行肺金受邪歲水太過少陽火燔燔水泉涸物焦槁歲土太過雨濕流行腎水受邪歲金太過燥氣流行肝木受邪歲水太過寒氣流行邪害心火帝曰善

素定養生主論卷之五

其不及何如岐伯曰悉乎哉問也歲木不及燥乃大行歲火不及寒乃大行歲土不及風乃大行歲金不及炎火乃行歲水不及濕乃大行是故運氣有勝復勝復之作有德有化有用有變變則邪氣居之故非其位則邪當其位則正邪則變甚正則微當其位者木運臨卯火運臨午土運臨四季金運臨酉水運臨子所謂歲會氣之平也是謂太乙天符非其位者歲不與會也土運之歲上見太陰火運之歲上見少陽少陰金運之歲上見陽明木運之歲上見厥陰水運之歲上見太陽所謂天之與會也一者天會二者歲會三者運會故太過而同天化者三不及而同天化者亦三故曰無失天信無逆氣宜無翼其勝無養其復是謂正治熱無犯熱寒無犯寒以平爲期故岐伯曰時必順之犯者治其勝也故犯熱治以鹹寒犯寒治以甘熱犯涼治以苦溫犯溫治以辛涼養生之關繫正於此故曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可爲工矣岐伯曰天氣不足地氣隨之地氣不足天氣從之運居其中而常先也夫五運之政猶衡也高者抑之下者舉之化者應之變者復之此生長化成收藏之理氣之常也失常則天地四塞故五運

生歲之紀各有先天後天正化之法太過不及鬱極乃發各待時而作故曰知其要者一言而終不知其要流散無窮此之謂也六氣也者風暑火濕燥寒也上以此六氣而為司天下以此六氣而為司地運居其中而為天地萬物安危之造化也故天元紀大論篇黃帝問曰天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五臟化五氣以生喜怒憂思恐論言五氣相襲而皆治之終替之日周而復始余已知之矣願聞其三陽三陰之候奈何合之鬼吏區稽首再拜對曰昭乎哉問也夫五運陰陽者天地之道也萬物之綱紀變

卷之三

二

化之父母生終之本始神明之府也可不通乎故物生謂之化物極謂之變陰陽不測謂之神神用無方謂之聖夫變化之為用也在天為玄在人為道在地為化化生五味道生智玄生神神在天為風在地為木在天為熱在地為火在天為濕在地為土在天為燥在地為金在天為寒在地為水是故木火土金水神在其中而命曰少陰君火是為六氣故自歲前大寒至春分厥陰風水為初之氣春分至小滿少陰君火為二之氣小滿至大暑少陽相火為三之氣大暑至秋分太陰濕土為四之氣秋分至小雪陽明燥金

卷之三

為五之氣小雪至大寒太陽寒水為終之氣而定於四序故曰終期之日周而復始者也居歲運之下而謂之司地歲運之上者謂之司天故辰戌之歲太陽寒水司天太陰濕土在泉卯酉之歲陽明燥金司天少陰君火在泉寅申之歲以陽相火司天厥陰風水在泉丑未之歲太陰濕土司天太陽寒水在泉子午之歲少陰君火司天陽明燥金在泉巳亥之歲厥陰風水司天少陽相火在泉故天之六氣動而不息居於歲運之上故五歲而右遷以應地之五氣蓋大氣不加臨於君火而以六加五則五歲而餘一氣故右遷加臨相火也故曰上者右行以六替為一備經下者左行以五歲為一周天餘而復會故動靜相召上下相臨陰陽相錯而變由生也歲運於中位相得則和不相得則病故治病者必明天道地理陰陽更勝氣之先後人之壽夭生化之期乃可知人之形氣矣運氣所主民病治法古方一十六道備載於十三卷中其所謂以熱治熱無犯司氣以寒用寒無犯司氣溫無犯溫涼無犯涼之劑也若夫氣春病涼夏病寒秋病溫冬病熱則當依六氣本標內淫之法治熱以寒治寒以熱治溫以涼治涼以溫而平之司天之氣

有南政北政之異其詳以具脉論中大抵司天者主
初之氣至三之氣司地者主四之氣至終之氣氣交
互變歲運舉抑或和病上應五星中合五音下應
五穀五味五虫歲物災眚生長化成收藏九宮分野
所向不同災祥各異善推其方如指諸掌岐伯曰身
半已上其氣三矣天之分也天氣主之身半已下其
氣三矣地之分也地氣主之以名命氣以氣命處而
言其病故上勝而下俱勝者以地名之下勝而上俱
病者以天名之天氣主勝地氣主復無勝無復則無
常數病衰迺止且六氣之過六勝也手足厥陰風木
手足少陰君火手足太陽相火手足太陰濕土手足
陽明燥金手足太陰寒水六脉外也與六氣相應則
百病之所屬也故五運之與六氣猶六十四卦之於
八宮也其為要道乎請試論之且以今歲泰定三年
丙寅少陽相火司天厥陰風木在泉言之地氣擾動
風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時應
火木同德上應熒惑歲星民病熱鬱欬逆嘔吐胸臆
不利頭痛身熱昏憤膿瘡鼈膜血溢衄衄噴嚏呵欠
喉痺目赤善暴死如是諸証悉皆有之特隨方受氣
微甚不同一家一身勞逸強弱之異故大暑前後暑

藥絕市棺木斷行有一村一巷同日暴卒一十七人
少年者目見耳聞數千里之內莫不皆然至於洋海
舟居之人亦不免其災厄况運居二六之氣之中歲
水太過耶害心火民病身熱煩心躁慄是歲也則當
治熱以寒無翼其勝以平為期也或者以熱用熱而
犯司氣以致枉天矣悲夫已上歲時水旱民病藥謬
衆共見聞此當歲司氣之驗也大抵運氣之用假令
太陽司天之歲患者病少陽之證者只以少陽之法
治之余皆倣此於是平運氣之旨醫工日用不可須
臾離也粗工不得其傳患家其識斯誤併入此卷用
曉後昆

論標本

標本者猶言枝幹也故素問六氣司天云標在上本
在下蓋每歲司天六氣加臨於地之六氣之上也標
本之義其用不一有六經之標本者六淫之來者謂
之本六經之受者謂之標有化氣之標本者太陽寒
水標熱而本寒是亦標在上本在下也陽明燥金不
從標本而從乎中也少陽相火標本皆熱太陰濕土
標本皆陰少陰君火標陰而本熱厥陰風木不從標
本而從乎中也有內外之標本者皮毛血脉肌肉筋

骨謂之標心肝脾肺腎謂之本有醫人病人之標本者以醫人爲標病人爲本有五行制化之標本者風爲標火爲本有脉候之標本者手經爲標足爲本推而廣之則無所往而不在余故言標本者如長短輕重之權衡尺度也讀醫書而不明此則義無以通也治百病而不明此則無以識先後也况乎名實內外彼此之異散見諸書據方之士不得其傳而以爲虛文由是逆從緩急先後之治不能不惑矣惑而不敢妄治則是也而其奈妄治何岐伯曰有其在標而求之於標有其在本而求之於本故治有取標而得者有取本而得者有逆取而得者有從取而得者故知逆與從正行無間知標本者萬舉萬當不知標本是謂妄行夫陰陽逆從標本之爲道也小而大言一而知百病之害少而多淺而傳可以言一而知百也以淺而知深察近而知遠言標與本易而勿及此岐伯之嘆辭也又云先病而後逆者治其本先逆而後病者治其本先熱而後生者治其本先熱而後生中消者治其標先病而後泄者治其本先泄而後生他病者治其本必且調之乃治其他病先病而後生中消者治其標先中消而後煩心者治其本人有客氣

有固氣大小不利治其標大小利治其本病發而有餘本而標之先治其本後治其標病發而不足標而本之先治其標後治其本喻如所感之病輕而變爲重則治其標也所感之病重而別增微外之疾則治其本也病勢進退則標本互施矣

素定養生主論卷之五

素定養生主論卷之五

八

泰定養生主論卷之六

逸人明子撰

論陰陽

陰陽之義其說有三有陰毒陽毒之陰陽有陰盛陽盛之陰陽有六經表裏之陰陽病在腑者為表三陽經也病在臟者為裏三陰經也陰盛陽盛者謂邪在表而惡寒謂之陰盛邪在裏而發熱者謂之陽盛所謂陰毒陽毒者陰毒則絕無一點陽陽毒則絕無一點陰又有陰中之陰者臟受寒邪也陽中之陽者腑受熱邪也藥性之陰陽者五苦為陰六辛為陽鹹味為陰淡味為陽又有上陽下陰背陽腹陰寸陽尺陰晝陽夜陰氣陽血陰以通義理之用若夫陰厥陽厥中風風痙等證之陰陽並屬表裏之陰陽也陰陽既明不可不知虛實

論虛實

醫書云虛虛實實損不足益有餘殺人也故虛實之義為醫工之關鍵緊病者之死生嗚呼流俗之士例以因病不實為虛而不以因虛而病病者為實醫書云寒之所湊其氣必虛虛久則實實者言病實也虛

者言衛虛而寒邪湊泊於膚理之間也既而衛氣又不能勝之邪氣傳入乎肌肉之分則其病也實矣故傷寒論云桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛而亡蓋言以汗藥攻裏而以下藥攻表虛者愈虛而實者愈實是以曰當汗而下則死當下而汗則死也故當病實而宜汗宜下者為人因病不實為虛而不下不汗可乎攻其實者是救其虛者也若補其虛則是亦實其實矣此據方之士之通患也岐伯曰五虛者死五實者亦死五實者脈盛皮熱腹脹前後不通腎悶五虛者脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入然則前後若止飲粥可入亦可回生前後不通者問者前後通腹脹減亦可回生其為死病痼疾雜病人壯病重者可攻人壯病輕者易散人弱病輕者易調平人弱病深者先輕後重而取之標本不相得者已之蓋病為本工為標議論不合信聽不一則如之何其可也慎哉

論脈

脈者元和之氣象榮衛之安危也其道且於素問而其訣明於脈經前聖後賢推論詳悉無非楷式造進者可以知其大綱久學則庶幾融會故唐人許學士

云思慮精則得之吾之所解口不能言蓋自得之妙
青出於藍而青於藍者矣必也圓機之士始能精到
若夫庸醫粗工急急於勢利者奪志分心雖未明諸
錯綜輕重之妙亦須於二十四道留意消息則不為
病隱而不為心惑也蓋脈之於病不能掩其惡得之
於手應之於心得之於心發言為辭脈病相應標本
相得病氣無不服古今脈訣精微言外之意則非道
弘人夫七表八裏九道二十四脈各主諸證此學者
之共知及乎浮洪相類弦緊似疑短與動同形結與
代俱止若非平日用意體認臨證未免自惑至如浮

素問主論卷之六

三

而帶弦或數或如乳如實之緊之洪以至於長短虛
促者皆陽也以其浮為陽而帶諸陽也則所主諸證
皆屬腑也乳實滑弦洪又帶如上脈氣者亦然也沉
脈為陰而帶諸陰脈象病在臟也必矣至若沉為陰
而帶諸陽則為易治浮為陽而帶諸陰則為治也頗
難故經云陰病見陽脈者生陽病見陰脈者死又於
失血下利暴泄證內脈細則生脈大則死蓋細雖陰
脈而生衰弱病勢既衰故曰生也經無明文學者不
可不知大抵學診脈者如學切字切字者母隨韻轉
而韻歸於母若欲切字須先認其三十六字母真的

則切天下之字未有不識者倘或道字不正則所切
皆訛矣切脈之法但體認二十四道脈形端的則於
諸錯綜之間自然心領意會若按圖索駁則畏首畏
尾妄意臆度則無繩墨譬如獵者說遇雖日獲十禽
猶作者之所不取况司命之職乎百藝不精則不過
誤身惟醫不明脈則誤人性命或者三部九候尚不
知十二經證美為暑證云脈虛弱者熱傷形而氣
消燦此言久病暑氣則然暴病暑氣之脈與熱病同
經不盡言不可但據經而疑證也况人之脈氣往往
不同長人脈長短人脈短瘦人脈羸肥人脈深性偏

素問主論卷之六

四

急者脈弦浮性明快者脈沉利凶狠者脈勁實慈祥
者脈和緩反此者不凶則吉不攝之人病輕脈重有
養之士病重脈輕忠厚之脈往來調暢詭譎之脈乍
浮乍沉其餘素稟暴變之不同指外盈虛消息鯁遊
雀啄代止之脈故名死證須知痰氣關格者時復有
之若非諳練駁歷未免依經斷病而貽笑大方也蓋
病勢消燦殆盡者其氣不能相續而如鯁遊水動屋
漏點滴而無常至者死脈也其或痰凝氣滯關格不
通則其脈固有不動者有三兩路亂動時有時無者
或尺寸一有一無者有關脈絕骨不見者或時動而

大小不常者有平居之人忽然而然者有素稟痰病而不時而然者有僵仆暴中而然者皆非死脉也又岐伯曰必察四難而明告之者謂春得肺脉夏得腎脉秋得心脉冬得脾脉其至皆懸絕沉澁者命曰四逆又甲巳之歲二運南面論脉則寸在南而尺在北少陰司天兩寸不應少陰在泉兩尺不應乙丙丁戊庚辛壬癸之歲四運面北論脉則寸在北而尺在南少陰司天兩尺不應少陰在泉兩寸不應乃以南為上北為下正如男子面南受氣尺脉常弱女子面北受氣尺脉常盛之理同以其陰氣沉下故不應指也

六氣之位則少陰在中而厥陰居右太陰居左此不可易也其少陰則主兩寸尺厥陰司天在泉當在右故右不應太應司天在泉當在左故左不應依南政而論尺寸也若覆其手診之則陰沉於下反沉而濡細為大故當知年之氣左右應見若不當沉而沉不當見而見故經云尺寸反者死陰陽交者死也有病熱而脉數按之不利乃寒盛格陽非熱證也有形證皆寒而脉氣鼓擊於指下之盛者熱盛拒陰非寒證也又曰病在中脉實堅病在外脉不實堅皆不可治其餘斷病並無脉訣之法人能弘道得魚忘筌不惟

託身鳴家抑亦有處於采薪之憂也

論病

病之為言猶言並也邪正並行於榮衛之間則為病矣欲識其病先診六經察其表裏外六內七則風火暑濕燥寒之本定矣病者百疾之總名也六淫所傷者自腑而臟也七情鬱發者自臟而腑也病有事於表者有事於裏者有出入內外者大抵表裏即陰陽陰陽即臟腑臟腑即榮衛榮衛即血氣也血氣者正氣也病氣者邪氣也血氣不及者邪自外來則六淫之氣侵之血氣內使者七情諸證起矣故書云天作孽猶可違自作孽不可追蓋七情者孰能使之無惟智者制之而病常少而輕愚者縱之而病常多且重故素問云上工治未病中工治已病已病者六淫外感七情內侵六淫司天之時氣七情百病之所作氣本病形各有經證未病者望聞問切知其病之將作則迎而奪之也

泰定養生主論卷之六

泰定養生主論卷之七

此本原書

論證

證者正也百病之名也名正則言順不然則望一男子皆可以檢方用藥而何以醫為蓋古之作者各自鳴家科目名義紛無醫義後是受授執以終身開卷瞭瞭對病還迷故古人有云不怕不會醫只怕不識證今所謂證何也乃素問六氣百病之機是也不識此者雖汗牛充棟之方不足以供一朝之用然則方書無用乎孟子云吾於武城取二三策而已是故明六氣推標本者臨病觀色聽聲切脉三五同參則五運太過不及大氣司天民病仲景三百九十七法風火暑濕燥寒之標本雜證得矣

論治

既明運氣標本陰陽虛實脉病與證則治在其中矣岐伯曰病為本醫為標標本相得病氣無不服故五臟則論曰拘於鬼神者不可與言至德惑於鍼石者不可與言至巧雖親戚兄弟亦無如之何況夫氣燭滔天聰明自用五神失位六賊內戕者不別賢愚驚

猶共器水炭同爐則吾何有於病哉是必六淫不侵七情頻已聽信無惑鍼砭藥餌適宜而可以言治也岐伯曰上古聖人雖作湯液備而不用中古以來道德稍衰故服湯而愈病况今浮薄之世乎是以握病機推標本者經云萬舉萬當據方藥迷標本者經云是謂妄行蓋病者必謀於醫醫者必謀其術岐黃問答醫之法也臨機應變醫之意也以意用法非妄意也故望聞問切以知其內外淺深虛實而藏諸用則四方中央之病於鍼砭藥灸按蹻之法正治反治標本互施故經云此治之大體也若得其體則雖茱萸可以療疾失其體則雖金玉亦不能愈病故桂枝承氣誤投則虛者愈虛而實者愈實矣可不慎乎故當臨病之時深窮表裏是久是新聞問詳曲病之內外藥之汗下應病即止不須過劑辛甘發散外邪酸苦湧泄內病過則傷和未已者各依經證清利滲潤以平為得如脉靜人病內虛之故攻之則峻補之則熱宜禁宜忌定志寧神屏好惡養陰陽飲食入胃則穀氣乃生也觀夫貪婪之士冒險無厭神明已去形器孤立當斯之時雖巫咸扣鼓和緩操鍼於治何補哉孫真人云有亡國之政者危邦不入亂邦不居此也

墳素治法聖師各問反復詳備唯其詳備故逆順正
反之義散在諸篇久學尚有疑驟觀則未有不望
涯而退者既無措手足之地則於是乎競趨於雜方
而以熱犯熱以寒犯寒而莫知逆從正反之妙也今
舉其要庶使釋然素問云春溫夏熱秋涼冬寒是謂
四順反此者謂之四逆三部九候之脈春弦夏洪秋
毛冬石謂之從反此者謂之逆以寒攻熱以熱攻寒
謂之逆治逆其病氣而名曰正治也以寒治寒以熱
治熱謂之從治從其病氣而名曰逆治也故熱不遠
熱者辛甘發散之陽治六腑之淺邪也酸苦湧泄爲
陰治五臟之深邪也熱因寒用者寒不納藥而熱劑
令服也寒因熱用者熱勢拒寒而寒劑熱服也通因
通用者下利譫語脈實而數用大小承氣湯瀉結止
利也塞因塞用者胸滿惡食泄瀉脈虛而遲用辛甘
溫熱之劑開上補下也故曰其始則同其終則異可
使破積可使潰堅可使氣和可使必已病熱脈數而
按之不利者乃寒盛格陽則治以辛熱也形證皆寒
而脈氣鼓擊於指下之盛者爲熱盛拒陰則治以寒
涼也外似其從而內實逆治其餘四序治法熱無犯
熱寒無犯寒溫無犯溫涼無犯涼故寒者熱之熱者

寒之溫者涼之散者收之抑者散之燥者潤之急者
緩之堅者與之脆者堅之衰者補之強者瀉之岐伯
云亢則害承而制制生則化外列盛衰害則敗亂生
化大病故知風病至極則似燥金之證而絛揭燥症
熱病至極則似寒水之證而戰慄厥逆土病至極則
似風木之證而濕鬱熱發金病至極則似二火之證
而爲三消癰疽瘡瘍水病至極則似濕土之證而爲
胛腫肉泥故推本至標則知其元從標至本則識其
所承故醫不惑於證病不惑於藥則可與言治矣
故辯證在於六氣六氣在於六脈故曰內脈外色色
脈之道審察之要也除六經傷寒有標本化氣定法
其餘風火暑濕燥寒並以六氣爲本百病爲標治標
無翼其本治本必推其標以寒治熱之方寒藥爲君
甘苦爲臣酸爲之使以熱治寒之方熱藥爲君甘溫
爲臣苦辛爲使奇方君一臣二君二臣三大劑佐使
至於七與九偶方君三臣六大劑佐使至於八與十
補上治上奇偶方制以緩且少而數服補下治下奇
偶方制以急且多而疎服急者氣味厚緩者氣味薄
奇之不去則偶之偶之不去則反佐以取之故治
熱以寒溫而行之治寒以熱涼而行之治溫以清涼

而行之治清以溫熱而行之以順病氣也汗藥不以
奇下藥不以偶取用古方者以此為式對證族藥者
秘訣云君多臣半佐使者三之一寒溫熱涼有毒無
毒之藥各以對本氣者為君佐君者為臣應臣者為
使此非本草藥性之君臣佐使也今更采集問病機
司屬六氣百病及處方對證之法用為醫學通例

風屬本標

足厥陰風木肝膽之氣為本

諸暴強直支痛痙攣及裏急縮及諸瘰癧為標

治法 經云風淫於內治以辛溫佐以苦以甘緩之

以辛散之

熱屬本標

手少陰君火之熱真心小腸之氣為本

諸喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁諸脹腹大之

如鼓癰疽瘍疹瘡氣結咳吐下霍亂痞滿腫脹鼻塞

衄衄血溢血泄淋悶身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄

衄衄血汗及諸痛痒瘡瘍為標

治法 經云熱淫於內治以鹹寒佐以甘苦以酸收

之以苦發之

濕屬本標

足太陰濕土脾胃之氣為本

諸瘧強直積飲痞膈中滿霍亂吐下體重肘腫肉如

泥按之不起及諸濕腫滿為標

治法 經云濕淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥

之以淡泄之

火屬本標

手少陽相火之熱心包絡三焦之氣為本

諸執瘕瘕暴瘕胃昧躁擾狂越驚悸驚駭肺腫痰痰

氣逆衝上禁慄如喪神守噤嘔瘡瘍瘰癧耳鳴及聾

嘔涌溢食不下目昧不明暴注瀉瀉暴死為標

治法 經云火淫於內治以鹹冷佐以苦辛以酸收

之以苦發之

燥屬本標

手太陰燥金肺與大腸之氣為本

諸澀枯涸乾勁絛揭氣瞢瞢病痿為標

治法 經云燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦下

之

寒屬本標

足少陰寒水腎與膀胱之氣為本

諸病上下所出水澄澈清冷癥瘕癰疽堅痞膈滿急

痛下利清白食已不飢吐利腥穢屈伸不便厥逆禁固及諸寒收引為標

治法 經云寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之

泰定養生主論卷之七

養生主論卷之七

泰定養生主論卷之八

逸本固本有標

類方叙畧

古今方書皆以風為百病之先者蓋一年六氣厥陰風木為初火暑土金水之勢為之次也養生主論既以夫婦為先則當自婚合孕育嬰幼童壯衰老次第類方庶與前後桴鼓相應至於傷寒疫癘惟載六經常用調理數法五運立歲六氣司天各具時行民病之治然後備述痰證一條陸續內外應用有驗之藥倘未足用更采名方依本治標無翼其勝無替其復以平為期更能推步精微則自然縱橫妙用

婚合門

戊巳圓 治新婚男子女人素稟虛寒滑泄飲食無味肌肉不生多睡少寤終日昏蒙夜多異夢畏寒喜熱喫食嘔吐清水狀如翻胃養脾開胃滋血氣長肌肉化精益髓補暖丹田老幼當人皆可服之
茴香 三兩 甘草 一兩 浮椒 五兩 揀淨
人參 一兩 白朮 二兩 硃砂 半兩 細研
白茯苓 三兩 香附子 三兩 去毛

右為細末生薑汁打糊為圓如梧桐子大每服二三十圓空心食前白湯送下日二服

腎氣圓 治男子素稟虛弱或病失將理五損六極等傷駐顏益壽溫補下元

生地黃八分 肉桂三分 白茯苓去皮

澤瀉三分 大附子炮去皮 乾山藥四分

山茱萸去核 牡丹皮三分

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓溫酒塩湯空心任下忌生蘿蔔牛肉生葱

如聖丹 治婦人赤白帶下月經不來不能成孕

白礬 蛇床子

右二味等分為末醋糊為圓如彈子大臙脂為衣薄綿裹留綿帶六尺許打一大結長留在後只以綿裹藥圓深入玉戶中定坐半日熱極再換大抵月水不通赤白帶下多因子宮不潔服藥難效下取易痊又且效速而無傷臙氣明理信士自識其要也

當歸散 治婦人月經將來或將盡前後數日腹痛

當歸 玄胡索 沒藥 乾紅花

右等分為細末溫酒調下二錢日再進

驚沙散 治血山崩

驚沙不拘多少揀淨

右一味為末每服三錢溫酒調服

又方貫衆去鬚毛剉碎每服三錢酒煎服立效

雙和散 治一切大病之後虛勞乏力補血益氣

黃耆 熟地黃 當歸 川芎

肉桂 白芍藥 甘草

右為咀咀每服四錢水一盞薑三片棗二枚煎七分去滓溫服男子婦人同法

驚甲地骨皮飲 治病後食力未復邪熱未除房勞

唐損及一切骨蒸盜汗服之即效男女皆可服

驚甲 秦艽 柴胡 枳殼

知母 當歸 地骨皮

右七味等分共為咀咀每服三錢至四錢水一盞薑三片烏梅一箇桃柳頭各七箇煎七分去滓空

心午前臨睡各熱服滓再進並忌色慾食發酒醋魚腥燒炙煎炒芋頭山藥熟菱胡椒性熱等物童

男室女同法不禁忌雖效亦為徒然此藥親用三十餘年入口即效以瘥為度不拘年月久服成功

孕靈圓 治婦人子宮久冷無子

杜仲 大附子 石菖蒲 秦艽

細辛 苦桔梗 川牛膝 厚朴

半夏 肉桂 沙參 川椒

右件並為末煉蜜為圓如梧子大空心溫酒下五圓午前再服漸加至二三十丸一月後見驗此藥親用多效

坐宣散 治婦人血氣不壯子宮不潔月水不調成赤白帶下不能成孕或孕而半產不收者

硃砂二錢 枯白礬五錢 紫葳乾者二錢 山慈姑乾者一錢

大蘇合一錢 小蘇合一錢 山慈姑乾者一錢

當門子一錢 猪牙皂角木小錢

右件為末和勻研一半同猪猪肉二錢重細研入藥末在肉再研令極細如泥用細蜜輕生絹一二尺以一頭縫作一小囊兒長五寸許大如食指以肉藥盡入於內緊實以線縫口餘絹及餘打一大結令婦人內玉戶令深留一大結餘絹在外勿令縮上為害即坐半日許勿動身仍先用舊布帛盛之俟其惡水自下未下日夜再用以効為度未效用前半劑更自消息方便然後多服增損四物湯及大黃膏則自然產成無傷一切赤白帶下諸藥

不效皆宜大黃膏方見孕育門

增損四物湯 治婦人稟受虛弱或月水過多或血

少氣多服駐顏勻經養陰或胸脇微脹腹中疝

痛經水愆期崩漏下面色青黃安胎止痛補虛

益血胎前產後暴患久疾婦人室女並皆治之

當歸洗去蘆 熟地黃酒浸 白芍藥

芍藥四味等分

右四味名四物湯入地骨皮牡丹皮白朮名增損

四物湯下血不已者更入黃芩每服四錢水一鍾

煎八分去滓溫服不拘時候日三服

假鼠蜚湯 治男子大病新差女感而病者名陽易

燒視散 治婦人大病新差婚合男病者名陽易

三分湯 治婦人室女月事不調寒熱往來痰嗽虛

損狀若勞證遷延歲月不能成孕勻經消痰去熱

和表裏養陰陽倍飲食

小柴胡湯方見傷寒門

四物湯方見上右二藥內加白茯苓

右件每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎八分去

滓食前食後各溫服

滓食前食後各溫服

滋血湯 治婦人勞傷過度衝任氣虛不能約制其經崩中暴下或鮮或瘀連連不止淋瀝累月形羸氣劣困乏之極並皆治之

赤石脂

海螵蛸去殼

側柏去枝已上

右爲細末每服二錢熱飲調下不拘時候一日連進三服功效如神平生多用有准仍服增損四物湯滋榮養衛如因七氣所傷血無以攝而崩者燕服後藥

分心氣飲 治男子婦人一切氣疾或臨食憂患或事不遂意喜怒哀樂之情停留不散心胸痞悶脇

張腹滿噎塞不通

六

脹腹滿噎塞不通噯氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢無力口苦舌甘飲食減少大便或秘或泄但是男子婦人因氣致生諸疾者除本科醫治外並用此藥升降陰陽調順膈常服尤妙

陳紫蘇四兩

羌活洗去

半夏洗去

桑白皮

肉桂去粗

青皮去白

大腹皮

陳皮

赤茯苓

川木通去節

赤芍藥

赤甘草已上各

右爲咀咀每服四錢水一盞薑五片棗二枚燈心二十莖煎七分去滓食後溫服

孕育門

安胎飲 治胎動不安下血腰痛疼痛四肢沉重懈怠及妊娠一切疾病並皆治之

當歸洗

川芎

人參去蘆

白芍藥

白木去蘆

甘草去皮

阿膠炒

熟地黃

黃耆

白茯苓去皮

桑寄生

右等分爲咀咀每服四錢水一盞煎八分去滓溫服食前日再進

膠艾湯 治妊娠將攝失宜胎動不安腹疼下墜或勞傷脫絡漏血腰痛悶亂或因損動胎上搶心奔

衝短氣及因產乳衝任氣虛不能約制經血淋瀝

七

不斷延引歲月漸成羸瘦

芎藭二兩

阿膠剉碎

甘草炙二兩

艾葉微炒

當歸去蘆

白芍藥四兩

熟地黃酒浸再

熟地黃酒浸再

右爲咀咀每服四錢水一盞酒半盞煎八分去滓熱服空心食前日夜連進

榆白皮散 治妊娠曾因胎漏去血或因臨產驚動太早穢物先下致使胎胞乾燥臨產艱難並宜服之取效爲度

榆白皮

葵根

瞿麥 各一兩

川木通

大麻仁 三分

牛膝 去苗酒浸切焙三分

右為咬咀每服三錢水一盞煎八分去滓溫服

滑胎枳殼散 治胎孕一切惡疾滑胎易產妊娠至

五月已上者當服養胎益氣安和子臟

枳殼 去穢炒

甘草 鹽

右為細末每服一錢空心食前沸湯調下日二服

黃芩白朮散 治婦人內熱胎孕不安神妙

白朮 去蘆

黃芩 去腐等分

右為細末每服二大錢至三錢當歸一撮同煎數

沸去滓不拘時候溫服日三進能護胎清中消痰

進食

枳殼檳榔圓 治妊娠癥瘕瘕塊及二者疑似之間

者久服能養胎氣消散癥瘕調經進食

枳殼

檳榔

黃連

黃柏

黃芩

當歸

阿膠

木香

右為細末水和圓如梧桐子大不拘時溫飲下三

十圓日二三服

三物湯 治孕婦下痢膿血赤白

白朮

黃芩

當歸

右為咬咀每服三錢至四錢水一盞煎八分去滓

食前溫服日夜三次服嗽者加桑白皮食後服之

百花散 治孕婦咳嗽不止

黃柏

桑白皮

右二味為細末每服二錢水一盞糯米二三十粒

煎七分款冬花燒存性灰為末五錢入前藥調勻

食後臨睡溫服

獨勝散 治孕婦瘧疾

帶皮老生薑

右淨洗薄切搗爛取自然汁一中盞用紗帛裹定

露一宿發日天將明時分攪勻頓服之立效男子

亦可服

護胎法 治孕婦一切有熱內外諸證

伏龍肝

井底泥

靈根湯 治孕婦傷風寒頭疼身痛發熱或自汗或

無汗但在表不渴者並宜發散

九節菖蒲 去毛

蒼朮 米泔浸焙乾刮去皮

甘草

右三味上二味各一錢半甘草一錢共四錢作一

服水一盞薑五片棗一枚煎八分去滓執服滓連

進蓋被取微汗入帶鬚葱白一根同煎尤妙一切

生冷油膩粘滑等物

產後一十八證病狀歌

第一胎死生不下

因纏熱病近經旬壯熱蒸胎子有也臍下痛時看頃
刻口中沫出命遂巡唇青甲黑推三命眼瞤筋抽喚
四隣賴有烏金功力妙酒調三服却安神

第二產難

腸痛連明至夜時醫人無路救難危千般湯飲施無
計萬種書符效驗遲痛楚徹心何法免昏迷忍苦沒
人知試將酒服烏金散必定平安更莫疑

第三胎衣不下

子路衣猶在腹中居家愁悶一心同須知血返衣間
聚結脹衣囊在子宮摸腹無醫行取次無過黑藥有
神功連將溫酒調三服須臾血散自然通

第四產後眼花

血犯肝時眼見花誰人不道是風邪狂言似鬼安知
次亂語如神莫測遲恍惚情知看不定驚忙愁慮恐
悲嗟只消三服烏金散定保全生不是誇

第五產後口乾心悶

因傷熱物口還乾積聚心頭悶不安迷悶昏沉遭敗

執驚忙困乏有憎寒唇乾口溢咽喉急噎吸神情語
較難性命斯須看必盡烏金試服兩三錢

第六產後寒熱似瘧疾

敗血流經毒一般腑羸臟氣變多端殘紅痛血連心
肺擊逐風邪即入肝頭痛腰疼身壯熱口乾體戰更
憎寒神功自有烏金散入口遂巡便自安

第七產後敗血入肢浮腫寒熱不定

血氣油然又入肢皮膚脹悶欲何為還因壅滯三焦
出積惡功尋五臟衰出氣喘鹿加痢泄血腸均熱莫
能知神功自有烏金散解救臨危保不疑

第八產後血邪如鬼神顛狂言語無度

言辭無度豈堪聞親眷來看尚不分無事向時神鬼
使空中瞻見道神君時時喘息多煩悶往往憎寒敗
血迫發動風魔綠氣血烏金頻服命長存

第九產後失音不語

失音不語有何述敗血流連悞損人羸瘦過時如本
患參差性命必沉淪滿胸奔注失方寸流塞心王悶
五鬼莫喚中風邪作氣烏金三服定通神

第十產後腹痛

腹中疼痛幾千般噎吸精神語不安冷水熱茶為動

病分飛相擊血餘殘朝朝米穀無消化日日虛羸五臟寒自有烏金收篋內須知療病不為難

第十一產後百節酸疼

百節酸疼胸脇開血流無處不經來或時癱腫人難辨癆痛猶如百刃摧迴轉舉身無處忍四肢抽縮叫冤哀只緣五臟皆虛弱服取烏金命不衰

第十二產後敗血似雞肝

頻頻惡下似雞肝日食辛酸療更難腹痛收如刀疔刺虛羸四體熱蕪寒有時奔注常煩絕恍惚昏沉命轉難但進烏金三兩服立時見効保全安

第十三產後咳嗽寒熱不定

餘殘敗血積成逆性命須更慎殺人多因熱類來相擊往往憎寒喘急頻虛乏昏沉長在枕形骸常被痛纏身如何不遇烏金散便是泉臺下世人

第十四產後胸脇氣滿嘔逆

腸中血敗已成病氣喘奔添嘔逆多惡物傷脾衝胃膈遠心虛氣汗流戈憎寒頭痛兼口苦兩腳如劍豈奈何若要氣消除脹悶烏金功力更無過

第十五產後小便澀

血入腸中誰得知小便亦澀大便遲下寒下熱頭流

汗顏若芙蓉向日暉花發目前如碎錦絲懸手足亂擦衣須更待服烏金散莫信凡愚取次醫

第十六產後舌乾鼻中血出絕頂生斑

繞項斑斑血點初漸凝殘血逆流餘敗血橫流傷七竅口鼻經過似決渠難結四體黃似赤不然如壓上皮膚若能更戀人間住服取烏金命必甦

第十七產後腰疼如角弓

目澀腰疼困復眠多因敗血致如然此狀緣由邪血入昏沉恍惚睡綿綿牙關緊處筋還急腰脊攣時手脚攣世號多風蕪血藉烏金服取効能全

第十八產後喉中如蟬聲

喘息喉中不可堪血傳肺臟熱相蕪頑涎與血相搏擊來往徐徐漸漸添富貴此時何所戀親姻滿座不相瞻神功自有烏金散靈驗難思不再三

余嘗食此劑所在濟人歷有年矣但古方元有重蟲水蛭鯉魚皮余平生不忍用肉藥由是以大薊小薊紫葳代之又去芫花巴豆而入鸞散紙血竭別撰醋煮大黃膏臨證加減妙不可言自得之妙未嘗語人今既集方故盡發此秘

醋煮大黃膏

錦紋川大黃不拘多少米泔浸

宿去粗皮為細末

右一味用陳年米醋酌量多少熬成稠粘旋入大黃末不住手攪令極勻以磁器貯之紙糊封口毋致蒸發臨用量輕重虛實入在烏金散內服之人壯病實者半彈子大已下漸少或以膏子圓如小彈子大或如圓子大或如皂子大陰乾收之密器臨用旋看虛實以一圓令患人嚼破以烏金散送之或以熱醋浸化入藥服之如常產後內熱惡露作痛俗名兒枕痛者及大便秘結者並煎四物湯浸化一圓同服如發熱如瘧內熱者煎小柴胡湯浸化一圓服之未效者再進並不損人大能活血蕩穢潤燥清神開胃倍食兼男女老幼血疾除傷寒大病表未解者一切服之如神

定養生主論卷之八

素定養生主論卷之九

逆本

嬰幼門

小兒變蒸俗云長意又云牙生骨長

嬰兒初生至三十二日為一變生癸腎臟氣屬足少陰經

六十四日為二變一蒸生壬膀胱腑氣屬足太陽經

九十六日為三變生丁心臟氣屬手少陰經

一百二十八日為四變二蒸生丙小腸腑氣屬手太陽經

陽經

一百六十日為五變生乙肝臟氣屬足厥陰經

一百九十二日為六變三蒸生甲膽腑氣屬足少陽經

二百二十四日為七變生辛肺臟氣屬手太陰經

二百五十六日為八變四蒸生庚大腸腑氣屬手陽

明經

二百八十四日為九變生巳脾臟氣屬足太陰經

三百二十日為十變五蒸生戊胃腑氣屬足陽明經

外心胞絡為臟屬手厥陰經三焦為腑屬手少陽經

二者一臟一腑俱無形狀故不變不蒸也

前十變五蒸已訖又有三大蒸相繼於後

六十四日為一大蒸計三百八十四日

又六十四日為二大蒸計四百四十八日

又六十四日為三大蒸計五百一十二日

直至五百七十六日變蒸俱畢兒始成人所以變者

變換五臟也蒸者蒸養五臟也故血脈方榮骨脈

始長情性有異故當蒸變之時常見兒子唇口微

腫如卧蠶形或如珠泡子者是也即火與乳食不

可妄投藥餌亦不可近火拜鍼灸但候其候自過

則安好也

變蒸唇口形狀

變生五臟 上唇有白珠泡子身熱驚悸或嘔噎

變生五腑 始得一日至十日變訖 上唇微腫如卧蠶身熱面熱或乍涼口鼻變氣

蒸主其表 吐逆脈亂汗出時驚多夜啼始得一日至十三日變蒸訖

三通主 唇口乾燥咳嗽悶亂哭氣腹痛及

大表裏 身體骨節皆疼或目上視時驚悸

如上證形並如前說不可妄作病治大抵人生不問貴賤人人必須如此變蒸然後成人世人不識皆曰見病貧者不治不妨富貴者治之所以誤也但知病

變多端甚至不救者有之矣述一扣前日數的非變蒸之時然後隨證服餌始為穩當

乳哺法

小兒百日内或嘔吐乳汁或瀉青糞者

少壯婦人乳汁一盞 丁香十枚

陳皮 去白一錢

右三味用磁器於慢火上煎二十沸去滓乘兒

饑時溫服未效再服乳汁前所服之量兒大小一

盞作五次進

養子十法

養子十法

一要腰背暖則不傷風寒咳嗽嘔吐胸膈憎寒

二要肚暖則免腸鳴腹痛嘔噎泄瀉等疾

三要足暖則寒氣不傷脾胃

四要頭涼則頭顱腫起頭縫開解頭瘡目疾

五要心胸涼則免口乾舌燥頰紅面赤喘呼驚掣

六者精神未定勿看非常異物牛馬踢跳羣獸縱橫

大聲戲嚇之事

七者慢驚多因母食生冷滑腸動氣之食及餵冷乳

氣如傷兒脾胃或因變蒸之時服涼藥或妄投汗

劑或宣泄食積或用涼水綴口過多寒傷其胃及

其吐瀉發搐或誤服急驚涼藥

八者嘔奶糞色青多因兒啼號氣噴未定便喫乳汁

氣奶相搏致傷脾胃

九者不可煩服單劑生硃輕粉墜痰藥內合和不妨

十者因煩洗浴生赤白丹毒

保養嬰幼法

喫熱

喫軟

喫少

頻擦肚

稀洗浴

忍三分寒

喫七分飽病自少

喫冷

喫硬

喫多病常魔

不宜服涼藥者七證

養生論卷七

足脛冷

服虎脹

香青色

面晄白

嘔乳食

眼珠青

脈微沉并虎口紋青黑者

不宜服熱藥者七證

足脛熱

兩腮紅

大便秘

小便黃

渴不止

上氣急

脈紫數并虎口紋紅紫者

小兒疹痘瘡三者形候

小兒疹痘瘡三者輕則名疹重則名瘡痘如豆狀此

三者皆由五臟六腑皮膜筋肉氣血骨髓等處胎受

穢液之毒人人有所不免各稟輕重不同故借語謂

天瘡其始增寒壯熱身體疼痛狀若傷風傷寒特眼

慢鼻辣多噴嚏耳輪冷即其證也或好或惡作休不

常大槩如此亦有輕重不等若疑似之間唯可以輕

輕發散服升麻葛根湯如是風寒即便解利如是痘

證元不相妨今人訛傳但是痘瘡即用此藥則誤矣

余遍覽古方小兒一科少得專門雖有專書則於嬰

幼疹痘疹候往往自惑况用藥一差死不復生於是

不敢試用晚得宿州陳君手集嬰幼攝養痘瘡疹方

詳備有法證有驗每濟人一如方所說今及三十載

矣起死回生端如反掌其方不多准東浙右有印本

但未能廣傳於世今撮其精粹要妙類入此卷用為

小兒痘疹方

五

全書然則此方皆治痘瘡表裏不足者耳又有名醫

用硝黃為末者皆治痘瘡表裏毒氣太過者也養生

者不可見其用藥相背而惑之余并書於此以曉後

昆余見一種毒移頭面遍身渾如朱砂始出即成一

片不分箇數悶亂煩躁大便鮮血日夜無度又見一

種毒痘出至十二三日口鼻閉塞氣無出路耳眼亦

然漸次口鼻清血點水逆然而出此二者固為死証

如敢以硝黃下之則或可回生倘一疑慮則禍不旋

踵里俗云痘瘡不可服藥者又為一蔽詳說于后

痘瘡不用服藥例

嬰幼痘瘡始出之時及未出之前大便如稠黃小便如常或發驚或不驚渾身壯熱或進退溫熱三兩次其瘡透快根紅頭蠟色次第肥滿自見瘡為始至七日皆次第成膿胞七日後次第收斂乾淨至二七日後次第成靨續續剝落別無他候者並不用服藥

痘瘡合用服藥例

嬰幼痘瘡將出之先無故泄瀉或因發熱而畏服發汗藥或清涼解利藥或不因畏服諸藥但將出至已出已出至退剝始終如有痒塌搖頭咬牙腹脹氣促渴瀉寒戰及瘡出不透快或正出忽然平隱不發或

養正生肌散

六一

瘡痘灰色或過一臘後不能成泡或成泡至第三臘不能結痂或膿或血或濕或爛或九竅閉塞皆有表裏虛實之分並宜急急對病選用方用藥救療不可展轉商量則緩不及事也余平生所用實效不敢以此誤人性命亦不可略服少許即慮藥熱中輟其事必如方說以效為度如欲事神亦不可廢藥如神言不許服藥即是誣妄腥臊馬家之言非真神也至祝至祝

嬰幼痘瘡輕者

作三次出 大小不一 頭面稀少 眼鼻中無

根紅頂黃 肥滿光澤

嬰幼痘瘡重者

一發並出 身溫腹脹 頭溫足冷 如瘡透快

灰白色 稠密 瀉渴

嬰兒痘瘡輕變重者

先曾瀉 飲冷食冷 不忌避 服涼藥

行房事 燒香 飲酒 穢氣觸冒

嬰幼痘瘡重變輕者

避風寒 常和緩 忌食辛 不瀉渴

大便稠 急服藥

養正生肌散卷之九

欲治痘瘡證候當分表裏虛實

治裏虛者十一味木香散

治表虛者十二味異功散

治表裏俱虛者二藥兼服

嬰幼痘瘡五種不治證

瘡場寒戰咬牙瀉不止

瘡紫黑色喘渴不寧

灰白色頂陷腹脹喘渴

頭溫足冷悶亂飲水

咬牙氣促泄瀉煩渴

此五証各犯二三者急依法用藥則尚可回生

痘瘡未出已出之間或瀉瀉或腹脹或氣促謂之裏

虛速與十一味木香散以和五臟之氣

痘瘡已出之間其瘡不光澤不起發根裏不紅謂之

表虛速與十二味異攻以助六腑之氣二証無有

則二藥參服

痘瘡將出已出之間其瘡不光澤不起發根裏不紅

或瀉瀉或腹脹或氣促是表裏俱虛速與十二味

異攻散送下七味肉豆蔻圓以救臟腑表裏之虛

痘瘡始出一日至十一日渾身壯熱大便稠黃其表

裏俱實也其瘡必光澤必起發又肥滿又易壓而

無損傷也
大抵痘瘡發熱口乾煩渴不止者以不可食紅柿西
瓜柑橘水蜜清涼劑總有所犯即成變壞也倘曾
有犯急依前表裏之藥救之
痘瘡未見先覺發熱進退疑似之間只服升麻葛根
湯輕輕解利如見瘡後一切諸証並一不可用
痘瘡如經瀉後津液內耗血氣不榮瘡雖起發必不
能壓急服表裏之藥以救之如身溫腹脹咬牙喘
渴不止者難治

痘瘡四五日大便不通者用肥嫩雄猪腰一塊白水

煮熟如豆大或如皂子大與兒食之腸臟自潤瘡

痂易落切不可用涼藥宜利為害

痘瘡六七日後身壯熱不大便肺盛者與三味消

毒散大便得利即止

痘瘡至二三日如粟如黍如豆大小不等漸漸似

水珠光澤明淨者佳

至四五日瘡根仍紅明淨成泡者輕細亦無害

至六七日頂陷灰白色瀉瀉者重急宜服藥如身溫

氣促口乾腹脹足指冷俱全者難救急服藥

至十日十一日瘡乾飲成痂漸漸退剝也若當發時
及腹脹煩渴者切不可與水蜜冷物與之轉渴而
死者急用十二味木香散救之如欲壓未壓之間
頭溫足指冷或腹脹瀉瀉氣促或搖頭咬牙等證
速與十二味異攻散救之或與木香散間服更加
丁香數粒為妙或於異攻散內更加木香當歸以
救陰陽表裏緩則不及事
至八九日瘡長足肥滿瘡色者輕如寒戰悶亂腹
脹煩渴氣急搖頭咬牙俱全者難治急服藥
至十二十三日瘡痂已落其瘡猶黯或凹或凸肌肉

尚嫩不可燥治亦不宜食炙博五辛性毒之物恐傷腹中痘瘡如有翳障宜服穀精草散

若瘡盛之後身壯熱不止別無他證者服六味柴胡麥門冬散不住者服七味人參白朮散

若瘡腐之後身壯熱大便堅實或口舌生瘡或咽喉腫痛皆瘡氣餘毒未盡服四味射干鼠粘子湯如未愈七味人參白朮散

若風熱咳嗽咽膈不利者服三味桔梗甘草防風湯如未愈服七味人參白朮散

若涕唾稠粘身熱鼻乾大便如常小便黃赤者服十

六味人參清膈散如未愈者七味人參白朮散若瘡實壯熱胸中壅悶大便堅實則喘急者服五味前胡枳殼散

若前後誤飲食水蜜冷物瘡加蓬落或生癰腫鍼之則成癰蝕瘡膿水不絕甚至面黃唇白以致難愈者蓋因冷濕損脾津液不生榮衛滯滯氣血不能週流凝結不散故瘡難落身生癰腫也故陽盛則補陰木香散丁香官桂陰盛則陽虛異攻散加木香當歸陰者膿也表也非水也若身熱小渴者六味人參麥門冬散治之不愈者七

味人參白朮散

若身熱大渴者七味人參白朮散治之不愈者服十

一味木香散

若腹脹渴者

或瀉渴者

或驚悸渴者

或身溫渴者

或寒戰渴者

或身熱面脫白色渴者

或飲水

轉渴不已者

已上九証

即非熱也乃脾胃肌肉

虛損津液耗少故也

並宜服十一味木香散如不

愈者更加丁香官桂

及煎服丁香攻裏官桂攻表

表裏俱實而瘡不變壞也

十一

木香散性溫平能和表裏通行津液津清上實下扶

陰陽之藥也治小兒腹脹瀉渴神效

異攻散能除風寒濕痺調和陰陽滋養榮衛使痘瘡

易出易斂此宿州陳君世世用之方今士大夫之

家無不知其神驗者余用之亦有年矣士庶養生

毋自惑之其為累驗如神之事不再布

痘瘡若痒難任搔之成瘡或膿或血出者宜用敗毒

散療之此物經閉閉霜雪露雨之靈氣善解瘡毒

收膿滋濕斂瘡妙又且爭於牛糞灰矣

蓋屋欄草隔一二年者牆上者亦可用

子 41-243

右一味晒乾研為細末糝於患處如遍身損漏不堪坐卧者可以二三升攤於席上令兒坐卧其效如神

痘瘡既壓欲落不落而燥癢者

白沙蜜不拘多少

右一味塗於瘡上其癢即止不令癢痕紫黑妙

泰定養生主論卷之九

泰定養生主論卷之九

十三

泰定養生主論卷之十

洗

土黃散 治嬰幼赤流丹毒重者用小鈹鋒刺去流

頭赤暈惡血然後敷藥輕者不用鈹鋒

上硝一兩 大黃末一錢

右件二味合和新汲水濃調厚敷患處効為度

葛根白朮散 治一切赤白丹腫者

白朮一錢 茯苓三錢 去皮 木香錢半

赤芍藥一錢 枳殼三錢 去殼 甘草

葛根三錢

右吹咀每服三錢水一盞煎七分去滓無時服

長生圓 治嬰兒七種寒證面生皸白氣血衰弱大

糞青色腹胃虛冷嘔吐乳食諸疾甚者兼服痘瘡

條內青木香散更於一藥中加丁香十枚或加厚

朴或加陳皮寬上突下補脾去痰

木香半兩 檳榔一兩 丁香三錢

半夏洗三錢 全蝎去毒二 內豆寇三錢 濕

縮砂仁三錢

右為細末稠米飲和圓如黍米大一週歲兒每服

五十圓米飲下乳汁下亦得空腹服過半箇時方可喫乳食再進更量大小加減圓數

五和湯 治嬰幼七種熱證五臟積熱或腑臟內外遍身實熱顯赤口乾小便赤少大便焦黃

當歸 去蘆半兩 茯苓 去皮半兩 甘草 半兩

大黃 濕紙包灰火 枳殼 去穢炒七錢

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓稍熱不拘時五歲已上者作一服暮歲已上者作三服

惺惺散 治嬰幼未邪發熱或有汗或無汗不拘小便清利者

茯苓 去皮 白朮 去蘆 人參 去蘆

甘草 炙 苦桔梗 去蘆 細辛 去苗

川芎 洗各等分

右咬咀每服三錢水一鍾蒸煎七分去滓不拘時通口服一二歲者作二次進

羊酥煎膏

羯羊髓骨髓 即羊酥

右煉一二沸入真輕粉少許研成白膏瓷合盛之每用塗於瘡上

瘡瘡纔愈而毒氣尚未全散瘡癰雖落而癰痕黯及

黑或凹或凸用滅癰痕藥塗之

韶粉一錢 輕粉一字

右二味研細入煉了猪胎油和成膏塗瘡上

痘瘡已屬未愈之間五臟未實肌肉尚虛血氣未平復忽被風寒外邪搏於膚湊之間則津液澀滯故成疔蝕瘡宜用雄黃散綿蕪散等藥治之如不愈者潰骨傷筋以傷人也

雄黃散 治小兒牙斷生疳蝕瘡

雄黃 十分 銅綠 二錢

右二味同研極勻細以少許貼患處

綿蕪散 治小兒遍身上下等處疳蝕瘡膿水不絕

空壁蕪須是出壁曉了者

右一味不拘多少入研細白礬令滿炭火上燒令

白礬汁盡取出研細每用乾貼瘡口

升麻葛根湯 治小兒痘瘡未出發熱不已解利風寒

白芍藥一兩 川升麻一兩

甘草一兩 葛根一兩半

右為咬咀每服三錢水一盞半煎六分去滓不拘時溫服更量兒大小加減

時溫服更量兒大小加減

木香散十一味

木香三錢 大腹皮三錢 肉桂去粗皮

前胡去蘆 陳皮去白 丁香

訶子肉 人參去蘆 半夏薑製

赤茯苓去皮 甘草炙已上各二錢

右為咬咀每服三錢水一盞薑一片煎六分去滓
稍熱空腹服量見大小加減

異攻散十二味

木香二錢 肉桂去粗皮 當歸去蘆二錢半

人參去蘆二錢半 茯苓去皮 陳皮去白二錢半

厚朴去皮 白朮去蘆 半夏洗一錢半

丁香二錢 肉豆蔻半錢 附子炮裂去皮

右為咬咀每服三錢水一盞薑三片棗五枚煎七
分去滓稍熱空腹服三歲兒分作三次服五歲作

二次一週二歲作三五次服

肉豆蔻圓七味

木香三錢 縮砂仁三錢 白龍骨半兩

訶子肉兩 赤石脂半錢 枯白礬半錢

肉豆蔻兩

右為末麵糊圓如黍米大一週歲兒服三五十圓

三歲兒服百圓並不拘時溫飲湯下

人參麥門冬散

麥門冬去心 人參去蘆 甘草炙半

陳皮去白 厚朴去皮 白朮去蘆

右為咬咀每服三錢水一盞煎八分去滓不拘時
溫服更量兒大小增減

柴胡麥門冬散

柴胡去苗二 龍膽草一錢 麥門冬去心三

甘草炙二 人參去蘆二 玄參二錢半

右為咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓稍熱量

大小增減不拘時服

消毒散

牛蒡子兩 荊芥穗二錢 甘草炙二

右為咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓不拘時

稍熱量大小增減服

射干鼠粘子湯

鼠粘子兩 甘草炙二

升麻二錢半 射干二錢

右為咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓時時服

桔梗甘草防風湯

桔梗苦者

甘草炙

防風

右三味等分爲咀咀每服三錢水一盞煎六分去滓不拘時溫服量大小加減

人參清膈散

人參去蘆

柴胡去苗

當歸去蘆

赤芍藥

桑白皮炒

知母

白朮去蘆

黃耆蜜炙

紫苑

地骨皮

味各二錢半

茯苓

甘草

桔梗苦者

黃芩去腐

石膏一兩

滑石一兩

右爲咀咀每服三錢水一盞煎六分去滓不拘時稍熱服量大小增減

前胡枳殼湯

前胡去苗

枳殼去核

赤茯苓去皮

大黃

甘草炙

右爲咀咀每服三錢水一盞煎六分去滓不拘時稍熱服量大小增減

人參白朮散

人參去蘆

白朮去蘆

木香

葛根二兩

養香葉

白茯苓

甘草炙已上六味各一兩

右爲咀咀每服三錢水一盞煎六分去滓不拘時溫服量大小增減

穀精草散

穀精草兩

生蛤粉兩

生黑豆皮三錢

右爲細末猶豬肝一葉用竹刀批作片子糝藥在內荷葉包草繫定瓷器慢火煮熟令兒食之不拘時候量大小與之

疹證

小兒斑駁疹毒之病狀如蚊蟲所蝨其證亦係胎受穢液溫積於脾胃之間因時氣所作薰發頭疼壯熱咳嗽連聲不已者是也

葛根麥門冬散

治小兒熱毒斑疹頭疼壯熱心煩

葛根三錢

麥門冬三錢

石膏半兩

人參三錢

赤芍藥二錢

川升麻

甘草二錢

茯苓二錢

右爲咀咀每服三錢水一盞煎六分去滓不拘時溫服量大小增減

生地黃散

治小兒斑駁疹毒身熱口乾咳嗽心煩

生地黃半兩

杏仁湯浸去皮尖炒

款冬花三錢

麥門冬去心

陳皮去白

甘草炙

右為咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓不拘時
溫服量大小增減

惺惺散 治小兒風熱斑疹及時行頭疼壯熱目澁
多睡咳嗽喘急

桔梗去蘆

好細辛去苗

人參去蘆

甘草炙

白茯苓去皮

川芎

白朮去蘆

右為咬咀每服三錢水一盞薄荷五葉薑二片煎
六分去滓不拘時稍熱服量兒大小增減

大抵小兒所苦者痘疹最為痛苦又不得食五味五
辛腹中常不能飽膿水出多血氣衰少漸自瘦弱

至十三日瘡當作膿其毒欲退而不脫盡正宜將
養愛護亦不可謂其瘡毒未盡妄用涼藥解利傷

動脾胃則血氣轉虛煩渴不能食以致困危者多
矣瘡既成加身熱不退者謂之虛熱宜服七味人

參白朮散解熱生津如瀉渴虛煩者宜服六味人
參麥門冬散如足冷者只宜十一味木香散此藥

雖有丁香官桂之溫亦有前胡之涼是和表裏寬
上實下之妙也

痘疹雖厭實而脫脫而瀉肉尚嫩更過月餘方可澡

浴切不可用熱湯恐生赤流丹毒亦不可大冷恐

生濕毒瘡腫宜以荆芥湯溫洗之即已

痘疹之後眼目赤腫癢澁淚出羞明者宜服

烏豆麥門冬湯

烏豆小者

麥門冬去心

右二味用水三升一處煮豆熟將藥湯絞溫時時
抄與兒服乳母却食烏豆麥門冬如三五歲兒令

其自食之烏精睛突高者難治

但痘疹欲出已出前後總有泄瀉即便服木香散余

多見痘瘡全脫完備嬌嫩之間忽然不救者蓋日

前有病不曾服藥故也戒之

痘瘡已出凡辟穢氣並不得燒一切沉痾腦腐乳香

降真唯可燒大黃蒼朮為妙

延壽丹 治小兒急慢驚風胃受驚氣腹中盤腸內

吊鴉聲邪叫角弓反張眼或視上手足搐搦痰潮

涎塞不醒或一切心神悶煩睡卧不安及男子婦

人心志不寧怔忡驚悸中風涎壅手足偏廢麻木

不仁並宜服之調歲兒每服一粒嬰兒半粒用薄

荷湯浸軟磨化乳後服傷風疹痘俱不妨碍藥性

温平大人每服三五粒食後臨睡薄荷湯下

大南星去皮臍白附子一兩蛇黃四箇火煨

辰錦生硃半兩當門子半兩

右件各為細末和勻元如鷄頭肉依大前湯事服

餌糯米粉糊為劑

桃花散 治嬰幼百日內外風熱相搏或因母多食

燒炙煎博性熱胎毒致作天吊鴉聲邪叫角弓反

張寒戰壯熱發歇不已者

大藍花陰乾紅桃花陰乾蝎梢法毒

自死鴉膽法毒白附子已土各

右為散用黃甘竹一合酒半合温温調下一等

立效乳母仍忌炙博熱麵等

合顛散 治嬰幼顛門不合

防風去蘆白芨

栢子仁各等份

右為散以乳汁濃調少許厚敷顛上復時再換甚

者更以紫皂帛縫闊帶箍住底不縱開抑亦耐驚

醫書云顛門百日不合不成人戒之

天竺黃散 治小兒一切驚熱面赤痰涎壅盛

天竺黃一分大黃半兩蒸硃砂半錢別研

馬牙硝一分鬱金一分煑熟焙

右為散每服臨睡蜜熟水調下五歲已上者半錢

大人一錢半小兒驚風陽癇入薄荷自然汁同調

量大小增減

又天竺黃散 治小兒疳勞骨蒸潮熱

宜連末 生薑末

右各等分為散五歲已上者每服半錢温童子小

便空心午前臨睡三次調服重者不過十服熱退

大效

秦艽散 治小兒不時發熱漸瘦遂成骨蒸勞證

秦艽洗去道地桑胡洗去

甘草炙牛蒡子炒去

右為細末熟湯調下十歲已上每服半錢漸小者

量與服神效

蘆薈圓 治小兒八般疳疾

蘆薈研宜連去蘆為末

水銀 冰蒂為末

陳言蝸牛殼 麝香當歸門子別研

龍腦別研硃砂別研同水銀

牛屎為末蟾酥剪碎同草藥

蟬蛻去土

右等分為細末糊圓如黃米大三歲已上三五圓
五歲五六圓腦疳即鼻痒黃連湯下肺疳即上氣
喘促陳皮湯下食疳即吐瀉生薑湯下脾疳即羸
瘦棗湯下氣疳即肚脹青皮湯下筋疳即瀉血塩
湯下肝疳即目澁甘草湯下骨疳即愛卧冷地及
吃泥土茶清下奇妙不可尽述

五灵散 治小兒走馬疳漸臭氣或連頤近耳壞
爛並不知痛致於曾有人落去下頤救日方死者

梧桐淚

之粉

雪白砒霜

當門子已上各等分

十二

右各研細再研和勻先洗疹患處一日未效再煎
甘草湯洗淨再糝以知痛見血出者肉漸生長而
愈

消腫圓 治小兒遍身浮腫

黑牽牛二兩炒

青木香

青皮去白

防風去蘆

檳榔各一兩

右為細末麵糊圓如芥子大每服二十圓桑白皮
湯下未效次日再服

又方用局小方七香圓同炒陳蘿蔔子對停細嚼湯
下神効

一蘇白圓治小兒卒然風寒痰氣喘促乳食不進
用局方蘇合香圓同青州白圓子薑汁溶化對停
薑湯調下一歲兒服一鷄頭許漸大漸加至一圓
眼許

雄黃圓

治小兒頭爛瘰癧聲惡嚙舌及一切驚癇

雌黃片子

真黃丹

微炒各當門子一錢

右為末再研勻用牛乳半升熬成膏入前藥不杵
杵三五百下如菉豆大每服三圓熟水下

消毒散

治小兒毒氣攻上頤頤赤腫可畏者

皂角

兩不注者二

天南星

生用

糯米粉一合

右同為末薑汁調濃塗患處

泥金膏

治小兒一切無名腫硬炊赤并但是諸般

丹瘤熱瘰濕爛大人亦同此法神效無比

陰地上蚯蚓糞熟皮朴硝比蚯蚓糞三分之二

一處研細新汲水濃調厚敷患處乾再上

昔有鄰家一姪先因脚跟凍瘡不愈成臭爛連腿紅

腫骨節欲落穢氣滿屋將為委氣余用泥金膏與之

厚敷一宿痛減八分再敷一宿然後洗淨用檳榔末

入韶粉龍骨輕粉各少許糝敷三日起行神效

素定養生主論卷之十

童壯門

分氣補心湯 治男女事不遂意心氣鬱結忪悸噎悶或致四體浮腫上氣喘急

大腹皮 挫灰

香附子 炒去毛

白茯苓 去皮

桔梗 一兩 去蘆各

川木通 去皮

甘草 炙

川芎

前胡 去蘆

青皮 去白

枳殼 去穢

白木 去蘆

真細辛 去苗

木香 兩各半

右為艾咀每服四大錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去滓食前溫服

分心氣飲 治男子婦人七情所傷方見婦合門

白子散 治男子女人上實下虛真陽衰耗眩暈昏

塞眼赤口咽喉冷痛小便淋瀝不通及胃風痰潮

不語嘔吐痰沫并霍亂吐瀉等證

大附子 生去皮

香膩滑石 各半 研細

大半夏 湯洗

右為細末每服二錢水一盞薑七片蜜半匙煎

分空腹冷服霍亂加藿香小便不利加木通燈心茅根同煎此藥縱有差誤亦無所害

款冬花飲 治童男室女骨蒸勞瘦五心煩熱四肢

無力夜多盜汗晝少精神面無顏色體不光澤飲

食全少好酸鹹口乾煩渴胸膈不利咳嗽痰涎

款冬花 去梗

大腹子

苦桔梗 去蘆

烏梅 各二兩

肉桂 去粗

甘草

大黃 煨熟

枳殼 去穢

白朮 去蘆

貝母

芍藥

黃耆

紫蘇 陳者

柴胡 一兩 去苗各

地骨皮 去木

右為艾咀每服四錢水一盞青蒿一握烏梅一箇煎六分去滓食後多時午前臨睡三次溫服如無

青蒿乾者亦可無亦不妨房勞並宜服

青蒿煎圓 治熱勞心肺鼻口焦乾飲食無味有時

欲睡心胸脹滿兩目多眵四肢無力兩足酸疼腰

脚拘急諸虛百損

青蒿

地黃

薄荷 三味各取

童子小便 二升 當用子研分

柴胡 去苗三兩

草鼈甲 片即煎子作兩

甘草 二兩

地骨皮 一兩

桃仁 四兩

右件取煎藥汁并小便先煎令稠漸漸下諸藥以文武火熬令可圓即圓如梧桐子大用麥門冬湯下三五十圓不拘時日三服仍宜攝養為妙

地骨皮散 治一切久新輕重骨蒸壯熱肌肉減瘦多倦少力夜多盜汗

地骨皮去味 秦艽去土 柴胡去苗 枳殼去穢 知母 當歸

甘草 青蒿

右為末每服四錢水一盞桃柳頭各七箇生薑三片烏梅一箇同煎七分去滓空心午前臨睡各熱服

服

酸棗仁湯 治多睡及不睡

酸棗仁和皮 人參 茯苓去皮各

右為末每服一錢水一盞煎七分如不要睡即熱服如要睡即冷服

孔子大聖枕中方 治學問易忘令人聰明

龍骨 遠志去心

九節菖蒲

右四味等分為細末每服一錢酒調下日三服

益智散 養命開心智

肉蓯蓉酒浸 遠志去心 兔絲子各三兩 蛇床子二分 乾地黄 人參去蘆

茯苓去皮 配上

右七味為細末每服一錢不拘時溫酒調下忌食

兔肉 止平大守八味散 服三十日精神倍六十日氣力

强志意足少壯素稟虛弱或勞傷早衰多忘服之

妙

天門冬六分 乾地黄四分 桂心去麋皮

茯苓去皮各 菖蒲 五味子

遠志去心 石韋各三兩

右八味為細末酒或湯任調服一錢食後

鼈甲湯 治邪氣憂寐寤時涕泣不欲聞人聲體中

酸削乍寒乍熱腰脊強痛腹中拘急不欲飲食或

因疾病之後勞疲倦或觸犯忌諱眾諸不節婦人

產生之後月經不利時下赤白肌體不生肉虛羸

瘦小便不利或頭身發熱旋腹解散或一度交接

彌日困極並皆主之

鼈甲七枚 甘草 白薇

貝母去心 黃芩去蘆各 防風去蘆

麻黃 去節

芍藥

白朮 去蘆各

凝水石 礬

桂心

茯苓 去皮

知母 各四兩

石膏 六兩

右十四味 㕮咀 每服五錢 水一斗 煎七分 去滓 溫

服日三夜一 以效為度

別離散 治男女風邪 男夢見女 女夢男 悲愁憂悲

怒喜無常 或半年數月一發者

桑上寄生

白朮 去蘆各

桂心

茵芋

天雄

菖蒲

細辛 去苗葉

茜根

附子

乾薑 各一兩

右十味 為細末 酒服一錢 日三次 合藥時勿令婦

人 雞犬貓鼠及病者并病家人 知見為驗

土瓜圓 治諸臟寒氣 積聚煩滿 寒熱飲食中蠱毒

或食生物及水中蠱卵 生入腹而成蠱蛇 若為魚

鼈 留飲宿食 婦人產後帶下 百病陰陽不通 利大

小便不節 絕傷墮落 寒熱交結 唇口焦黑 身體消

瘦 嗜臥少食 多壓產乳 胞中餘疾 腹裏熱少腹中

急結痛引陰中者

土瓜根 末半

大黃 一斤 蒸

杏仁 去皮尖 雙

桔梗 末半升

右四味 為細末 煉蜜圓如桐子 大空腹服米飲下

三圓至五七圓 日三服 未效再加圓數

治童下元不固 便前溺後遺 遺精

韭子

半斤 酒浸一宿

白龍骨 研一兩

黃耆

炙一兩

右三味 為末 酒糊為圓 如桐子大 每服二十圓至

三十圓 食後鹽湯酒任下

治童壯男子 婦人血氣太過 致生他證 二說于后

昔有石工 少壯忽病 頭目不利 肩背拘急 合目即便

泄精 四肢沉困 不欲執作 憂寢不寧 每作虛治 愈

而半則其股足 隨氣跳躍 如豚六動 其脉亦過位

長實有力 遂用涼膈散 青木香圓 互換疎導 三五

次更服三黃圓 數日平愈

又有少壯婦人 每患頭痛 腹痛 十指酸疼 心志紛紛

鼻息粗盛 如近男子 即欲作合 其脉太盛 余亦用

前法治 愈俗語謂其花風 後其無恙 方信余言

袁老門

熟地黃圓 治肝腎俱虛 精血不足 眼昏黑花 迎風

有淚頭暈耳鳴眼多瞶動或腎藏風毒下疳腰沉
重筋骨痠疼步履無力陰汗盜濕痒生瘡常服延
年益壽耐寒暑進飲食黑髮潤肌膚壯筋骨滋
榮衛

牛膝去蘆酒浸三日 當歸洗去土 川巴戟去心

從蓉酒浸一日一夜 山茱萸洗去土 枸杞子

白茯苓去皮 兔絲子酒浸一日一夜 川芎二兩

覆盆子二兩 五味子炒 杜仲去皮 石斛去土

防風去蘆酒浸一日一夜 肉桂去皮 熟地黃二兩

右十七味為末煉蜜圓如桐子大每服五十圓至
六七十圓空心食前鹽湯溫酒任下

治肝虛視物不明常服養肝明目

生地黃三兩 菊花三兩 枸杞子二兩

巴戟去心 川椒三分 羌活三錢

右六味為細末煉蜜圓如桐子大每服三五十圓
食前米湯飲溫服

治風毒眼昏暗翳膜疼痛

荆芥穗 烏蛇退炙黃 蟬退去翅足

羌活去蘆 木賊去節 白蒺藜炒去刺

右六味等分為細末每服二錢食後溫茶清或溫
米泔調下日三服

七氣圓 治寒氣熱氣怒氣喜氣悲氣憂氣愁氣漸
成積聚堅牢如礮心腹絞痛不能飲食時去時來

每發欲死如有禍崇寒氣主吐逆心滿熱氣主恍
惚眩暈失精說物不竟而迫怒氣主上氣不可忍

熱痛上搶心短氣欲死不得息悲氣主積聚在心
下不得飲食喜氣主不可疾行不能久立憂氣主

不可刺作臥不安席愁氣主喜忘不識人語置物
四方還取不得其處四體附腫手足筋掣捉不能

舉男子諸疾婦人同法及產後中風余疾

大黃二兩 人參去蘆 半夏洗去滑

吳茱萸去梗 柴胡去蘆 乾薑

細辛去葉 苦桔梗去蘆 菖蒲各二兩

茯苓去皮 芎藭 甘草

石膏碎水 桃仁去皮 蜀椒去開口者

右十五味或以桂心為十六味為末煉蜜圓如桐
子大每服三圓漸加至十圓溫酒下日三服

七氣湯 治憂氣勞氣寒氣熱氣愁氣或因飲食為

膈氣或勞氣內傷五臟不調氣衰少力

乾薑

黃芩

厚朴

半夏

甘草

括樓

芍藥

乾地黃

蜀椒

枳實

人參

日榮

右十二味為咬咀每服四錢水一盞煎七分去滓
溫服日三服不拘時

麻豆散 治衰老脾弱不能食代穀潤燥神妙

大豆黃

右二味為末一處每服一合飲服日四五次任意

多少若以芝蔴代麻子亦可

五子散 治衰老腸臍少津及風毒燥澀大便不通

火麻子

紫蘇子

松子

杏子

蔓菁子

右五味各等分搗爛再和作一處如法爛研如泥

用瓷器貯每以一彈子大稠蜜水化下入粥內食

之尤佳每日一二次即不秘甚則頻服三圓忌

燒炙煎煉辛熱藥物

消食斷下圓 治寒冷臍消者並宜服

細麴

吳茱萸

大麥蘖

右三味為末密圓如桐子大每服五十圓薑湯下

麴

乾薑

豉

蜀椒

大麥蘖

右五味食後湯調三錢服日三服以能進食為度

百效圓 治痢冷風寒手足冷胃口寒臍冷百

病五勞七傷

子神驗無生

生地黃

大豆

右三味以

浸烏頭至

有餘汁

服至二

合亦得

有子髮

檢化散

治金

黑錫

硝石

麴

甘草

右件先溶黑錫如水便入二石末熟研為細末後

冷入甘草麴香再研勻細食後臨睡含化一檢

家菊散 治諸般頭風大能明目。

家菊花 黃白者 去蒂根 石膏 研細 水飛 牛麥子

右三味等分爲末每服二錢早晚飯後茶酒任意調服

荊芥散 治男子婦人一切風勞冷氣補虛損

荊芥穗 三兩 黃耆 蜜炙 白蒺藜 炒去刺

大黃 蒸各一兩半 乾地黄 當歸洗去苗

黃芩 去內 乾薑 甘草

附子 炮 芍藥 破故紙

龍甲 洗去塵土 醋炙 防風 去苗

紫芭戟 各二兩 去心已上

右十六味爲咀咀每服四錢水一盞薑三片煎八分去滓食後溫服

竹葉黃芩湯 治精極實熱眼視無明齒焦髮落形

衰體痛通身虛熱六極之證各主一端惟精極者

通主一身表裏勞心勞力者對病選方當知此義

竹葉 切二升 黃芩 去內 外腐 茯苓 去皮各三兩

甘草 麥門冬心 大黃 各二兩

生地黃 生薑六兩 芍藥 四兩

右九味咀咀每服四錢水一盞煎八分去滓服

丹參圓 治腰痛及四肢冷痺疼痛

丹參 杜仲切斷炒 牛膝 去苗

續斷 各三兩 桂心 乾薑各二兩

右六味爲末煉蜜圓如桐子大每服三十圓紫蘇湯下日二夜一

又腰痛方

車釐 杜仲 枸杞根 去木各

右三味咀咀好酒三斗漬之密封罈口於銅器中

漬一日止每日恣飲取醉無節度

不換金摩夢囊 治遍身風熱癢痒搔爬不暇隨手

熱癢癢疹或藏頭小瘡服一切風藥不能卒效者

余入思多年偶製此法雖非起死之方實救災疾

之窘世間妙法衰老壯年風燥通用

烏頭 去皮尖 附子 去皮臍 南星 去皮臍

右三味並爲細末用稠米飲漬絲瓜囊裏外俱透

就於藥末中袞展令人更探搗勻漏曝乾收用凡

有燥痒但以此隨意輕重搗擦一過應手即效他

日再痒仍前用之神妙無比

赤茯苓圓 治小便赤濁

人參 去蘆 白朮 去蘆 白扁豆 去皮炒

防已

木猪苓去皮各廿草

乾葛各一

赤茯苓去皮二兩切如菓子大白砂

右八味為咬咀每服三錢水一盞磨沉香木少許

同煎食前臨臥日三次以效為度

白龍骨圓 治小便白濁

牡蠣大白者 白龍骨

右三味等分為末酒糊丸如梧桐子大每服十五

二十圓煎赤茯苓湯下不過三五服立效

琥珀圓 治老人小便不通

琥珀赤明好者

地骨生一兩

右一味不以多少細研如塵煉蜜圓如梧桐子大

每服二十圓煎赤茯苓湯吞下甚者倍加圓數立

通如小便純血只以末二錢煎燈心湯調下三五

服取差

又方車前子莖葉根皆可搗自然汁半盞入蜜一匙

和勻飲之立通

又方治淋瀝疼痛赤茯苓去皮苦校各半兩咬咀每

服四錢水二碗煎去一半作二次服立效更加赤

芍藥尤佳

治丈夫婦人胞轉八九日不得小便

滑石

寒水石各半 葵子半升

右三味咬咀每服一兩半水一碗煎七分去滓溫

服以效為度

又方 治轉胞不得小便

葱白四七

阿膠二兩

琥珀三兩

車前子

右四味咬咀每服一兩半水一碗煎八分溫服

又方阿膠三兩水一碗煎七分服豉五合煎亦得

治血淋小便疼痛

雞蘇

滑石

通草各五兩

桑葉各一

竹葉一把

生地黃半斤

小薊根一兩

右六味咬咀每服一兩水一碗煎五分去滓溫服

日三次

又方

石葦

當歸

蒲黃

芍藥各一

右四味為末酒服二錢熱壯者水服日三

又方白茆根切一兩水煎服日再進

又方大豆葉一把煮汁頓服

治遺尿小便難流

牡蠣

鹿茸各二兩

阿膠一兩

右三味咬咀每服五錢水一盞煎八分去滓服

治遺尿失禁出而不覺

右以豆醬汁和龍突墨如豆大內尿孔中亦治轉胞

治遺尿失禁出不自知灸陰陵泉隨年壯

實腸散 治虛寒滑泄水穀直瀉不止

右用平胃散方加肉豆蔻訶子砂仁茯苓薑棗煎如常法頻服

又治虛寒滑泄不禁

秦生主論卷之十一

主

右用大川烏炮去皮臍赤石脂細研胡椒末各半

兩乾薑炮末一兩同以糊圓桐子大每服三四十

圓米湯飲以效為度

又治腎泄每到天明必須瀉瀉

右用五味子二兩炒具葉更半兩炒為細末米飲調服效

秦定養生主論卷之十一

秦定養生主論卷之十二

逸本

傷寒門

六經證形定例

太陽證一日二日發熱惡寒頭疼腰脊強身痛尺寸

脉俱浮

陽明證二三日身熱目疼鼻乾不得卧尺寸脉俱長

少陽證三四日胸脇痛而耳聾或口苦舌乾或往來

寒熱而嘔尺寸脉俱弦

秦生主論卷之十二

太陰證四五日腹滿咽乾手足自溫或自利不渴或

腹痛尺寸脉俱沉細

少陰證五六日口苦舌乾而惡寒六脉俱沉

厥陰證六七日煩滿囊縮尺寸脉俱微緩

故至十三日不愈者名曰過經但看何經脉證則依證調理亦不必太陽傳起而至厥陰或初得第

二三經者或只傳一經不傳者或只傳一二經者

當自消息標本備問始終曾無服藥如誤服圓藥

則謂之壞證治法不必論經也

六經類證治法

太陽傷寒發熱頭疼身痛而名慘然或腰脊強尺寸
脈俱帶浮而緊惡寒無汗麻黃湯主之

麻黃

去節一兩

桂枝

一兩

甘草

半兩

杏仁

去皮尖雙仁五十箇

右為咬咀每服五錢量大小加減不可一類水一

盞盞之大小隨藥多寡前八分去滓溫服覆衣被

取汗不可太暖汗多失津病人素稟虛寒并久及

春可依正方夏至之後並加知母半兩石膏一兩

黃芩一分強壯者四季通加服及始覺有病之醫

之虞秋冬即服香蘇散春夏即服麻黃葛根湯皆

可發汗解肌通用雖非仲景正法世俗卒然備用

亦無太過

太陽傷風發熱頭痛身痛面色紅潤尺寸脈俱浮而

緩惡風有汗桂枝湯主之

桂枝湯

桂枝

一兩

芍藥

一兩

甘草

一兩

生薑

一兩

大棗

六枚

右為咬咀每服五錢水一盞前八分去滓溫服取

微汗或湯中不入薑棗臨前每服薑五片棗二枚

擘破同煎亦得病人素稟壯實并春末至夏至日

前病加黃芩名陽旦湯夏至後加知母黃芩各一

兩石膏二兩或加升麻半兩病人素虛寒者不必

加減若小便數及好酒人不喜甘者切不可行桂

枝也之醫去慶只依俗法秋冬用香蘇散春夏用

升麻葛根湯風寒通不妨除此外餘諸證俱係傳
經並依正法用藥
太陽傷寒外證具寒多熱少不煩手足微厥脈浮不
緊而反緩名傷寒見風脈煩燥者大青龍湯主之
大青龍湯

麻黃

去節三兩

桂枝

一兩

甘草

半兩

杏仁

去皮尖雙仁二十箇

石膏

半斤

知母

半斤

右為咬咀每服五錢水一盞前八分去滓溫服取

微汗後不可再服

不煩燥者桂枝麻黃各半湯

太陽傷風外證具而發熱多煩脈不浮緩而反緊名

傷風見寒脈大青龍湯主之見傷寒見風條下

陽明身熱目疼鼻乾臥不寧靜無汗惡寒升麻葛根

湯主之

升麻

葛根

升麻

葛根

甘草

半兩

芍藥

半兩

升麻

葛根

升麻

葛根

甘草

半兩

芍藥

半兩

升麻

葛根

升麻

葛根

甘草

半兩

芍藥

半兩

升麻

葛根

升麻

葛根

甘草

半兩

芍藥

半兩

升麻

葛根

升麻

葛根

甘草

半兩

芍藥

半兩

升麻

葛根

升麻

葛根

甘草

半兩

芍藥

半兩

升麻

葛根

升麻

葛根

甘草

半兩

芍藥

半兩

升麻

葛根

升麻

葛根

甘草

半兩

芍藥

半兩

右為咬咀每服五錢水一盞煎八分去滓溫服並

治一切頭痛身痛壯熱增寒甚者用前執服甚者

冷服又治小兒瘧疹已發未發諸熱

陽明證具有汗微惡寒桂枝湯主之方見前太陽傷

風條下

陽明證具身熱汗出不惡寒反惡熱內實大便難輕

者大柴胡湯重者承氣湯主之

大柴胡湯

柴胡二兩

黃芩三兩

半夏六錢

枳殼四兩

芍藥三分

半夏三字

枳殼四兩

生薑二兩

大棗二兩

大黃半兩

右為咬咀每服五錢水一盞煎八分去滓溫服以

利為度大便潤者去大黃

小承氣湯

大黃二兩

厚朴半兩

右為咬咀本方作一服蓋漢秤極輕今宜作五服

未效再加劑服以效為度者止後服人壯病實者

或用大承氣湯方見少陰急下條

少陽口苦咽乾逆氣息飢腹脹耳聾胸脇滿寒熱往

來乾嘔小柴胡湯主之

大柴胡湯

柴胡去苗

黃芩去內外

人參去蘆

半夏六錢

甘草三分

生薑三分

大棗三兩

右為咬咀每服五錢或湯不入薑棗只每服薑五

片棗一枚水一盞煎八分去滓溫服日三次取效

為度多服無妨如病傳別經者然後依經用藥唯

此寒熱少陽證始終輕重不可發汗則反譫語只

可小柴胡解表和裏胃實煩燥者小承氣湯下之

方見陽明自汗條下

三陽合病

太陽合陽明者其病大便堅小便利脈浮而長名曰

脾約圓主之

脾約圓主之

脾約圓主之

大黃二兩

厚朴半兩

枳殼四兩

右為細末煉蜜圓如桐子大每服二三十圓熱水

不拘時下未效日再加其者至五十圓以利為度

一切虛弱老人並以意消息圓數

惡寒者升麻葛根湯主之方見前陽明無汗惡寒

條下

白虎湯

知母半兩

甘草半兩

石膏四兩

右為呖咀每服五錢粳米飲湯一大盞煎八分去滓溫服或水一盞入梗米百餘粒煎亦得

不惡寒反惡熱大便秘或譫語者調胃承氣湯主之

調胃承氣湯

芒硝九錢

甘草半兩

大黃一兩

右為呖咀每服五錢水一盞先煎大黃甘草至七分

分去滓下硝再煎一二沸溫服

太陽合少陽者其病脇下鞭續補往來寒熱脈浮而

弦及有餘證者並以小柴胡湯主之方見前少陽

條下

三陽合病下利

太陽陽明合病脈浮大而長下利者葛根湯主之

葛根湯

葛根一兩

麻黃三分

桂枝半兩

生薑三分

甘草

芍藥各半兩

大棗三箇

右為呖咀每服五錢水一盞煎八分去滓溫服覆衣取汗為度或以薑三片棗一枚三分中之一入藥同煎亦得

太陽少陽合病下利脈必浮而弦黃芩湯主之

黃芩

芍藥

甘草

大棗三箇

右為呖咀每服五錢水一盞半煎至一盞中分去滓溫服以效為度嘔者湯中加半夏生薑與前藥等分煎服

少陽陽明合病下利胸脇滿乾嘔或往來寒熱脈長

大而弦者為逆逆者死但長大而不弦者為順脈數而滑或遲而滑者有宿食宜下之小承氣湯主

之方見前陽明證具身熱汗出條下自利不渴屬

太陰四逆湯理中圓主之

四逆湯

附子半兩

乾薑三分

甘草一兩

右為呖咀作一服水一盞煎七分去滓溫服強壯

人加附子半箇乾薑三分通前作一服

理中圓

人參

甘草

乾薑

白朮三兩

右為咬咀每服五錢水一大盞煎八分去滓溫服
腎氣動者去朮加桂四兩吐多者去朮加生薑三
兩下多者還用朮悸氣小便不利者加茯苓二兩
渴者加朮一兩半腹中痛加人參一兩半寒者加
乾薑一兩半或四肢拘急腹滿下利或轉筋者去
朮加附子一枚生用腹滿脈浮者桂枝湯主之方
見前太陽傷風條下

腹痛者桂枝芍藥湯亦名建中湯即桂枝湯中加
芍藥一兩半是也痛甚者桂枝加大黃即桂枝芍
藥湯中加大黃一兩是也

少陰惡寒口燥舌乾脈俱沉小承氣湯主之方見前
陽明身執汗出不惡寒反惡熱條下當用大承氣
者於本方加大黃半兩減厚朴半兩如入芒硝者
亦半兩不入亦穩如法溫服發熱脈沉者麻黃細
辛附子湯主之

麻黃細辛附子湯

麻黃二兩

細辛二兩

附子一箇

右為咬咀每服五錢水一盞煎八分去滓溫服取
微汗

若不渴不口燥舌乾而脈沉者急溫之四逆湯主
之方見前太陰下湯調下口中和而皆惡寒通用
四逆湯小便白色者病形悉具也渴者甘草乾薑
湯主之

甘草乾薑湯

甘草四兩

乾薑二兩

右為咬咀每服五錢水一盞煎八分去滓溫服
尺寸脈俱微而反汗出者為亡陽證法當咽痛猪
膚湯主之

猪膚湯

猪膚一斤

右以水二大盞半煎取一盞五分去滓下白蜜二
兩半白粉一合二勺半熬香和令相得溫分三服
厥陰筋急唇青煩滿舌卷耳聾囊縮尺寸脈俱沉
短若脈浮緩而寒熱如瘧者必裏不縮桂枝麻黃
各半湯主之

桂枝麻黃各半湯

用前太陽條下桂枝湯二錢半麻黃二錢半共五
錢依本方前服脈沉短而陰縮者毒氣入臟也水
氣湯主之方見前陽明身熱汗出不惡寒反惡熱

調下甚者湯中加大黃半兩減厚朴半兩入芒硝半兩作大承湯主之每服五錢為率量大小虛實增減

消渴氣上衝心中疼挾茯苓桂白木湯主之

茯苓桂白木湯

茯苓二兩

甘草一兩

桂枝一兩半

白朮一兩

右為呿咀每服五錢水一大盞煎八分去滓溫服飢不欲食即吐蛇此名蛇厥胃冷也烏梅圓主之

烏梅圓

烏梅七箇

細辛一兩

乾薑二兩

黃連四兩

當歸

附子

蜀椒一兩各

肉桂

人參

黃蘗一兩半

右十味異檮羅合治之以苦酒漬烏梅一宿去核

蒸之令熱杵成泥和藥於臼中入蜜杵二千下圓

如桐子大食後服十圓至二十圓熱湯下日三服

或用理中圓者亦得

醫人謂陰證陽證者此乃六經表裏之證也在表曰陽在裏曰陰世人訛傳醫者輕謗遂使病家在焉

濟世之方不能無阻於緩急之間明理君子當熟

味之更入陰毒陽毒二證陰陽二厥治法略論小

柴胡湯五積散之可否以辨世或欲盡仲景三百

九十七法一百一十二方則學者當讀全書

陽毒之證或病傷寒一二日便成陽毒者或服藥吐

下或不吐下後變成陽毒者其證身重腰背痛煩

悶不安狂言或走或見鬼或吐血下利赤黃其脉

浮大而數面赤斑斑如錦紋咽喉痛吐膿血五日

可治至六七日不可治陽毒升麻湯主之

升麻湯

升麻二分

犀角屑一分

射干

黃芩

人參

甘草二兩

右為呿咀作一次用水三升煎取一升半去滓飲

一湯盛食頃再服暖復手足出汗未解再作咽痛

者玄參升麻湯主之

玄參升麻湯

升麻

玄參

甘草各半兩

右為呿咀每服五錢水一大盞煎至七分去滓溫

服甚者或有踰垣上屋陽毒已甚脉洪大內外結

熱舌卷焦黑鼻中烟煤宜用水漬法

米漬法

右以疊布數重新水漬之稍換去水搭於胸上須更蒸熱又漬冷如前用仍敷易新水日數十易熱甚者置病人於水中熱勢纔退則已亦良法也

陰毒之證或病傷寒一二日便結成陰毒或服藥六

七日已上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛

喉咽不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息煩燥

不虛汗或時鄭聲鄭者言語之聲鄭重難發嘔逆

下利身如被杖唇青面黑四肢厥冷其脉沉細緊

數仲景云此陰毒之候也五日可治至六七日不

可治陰毒其草湯主之

主

甘草湯

甘草 半兩

升麻

當歸 半兩

雄黃

蜀椒 各一分

龍甲 一兩半

桂枝 半兩

右以咀每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服如

人行五里須更進一服溫覆取汗毒當從汗出即

愈未汗者再服陰毒已深疾勢困重六脉附骨取

之方有按之即無而一息八至已上或不可數者

宜急用葱熨法內艾法于後

著艾法

右用淨艾作炷徑三分大小即覆穴不著太火即侵燒生肉或灼五十壯多至三五百壯臍下一寸名氣海二寸名丹田三寸名關元皆可灼之如病家不忍為之則緩不及事矣

射葱湯

右用葱以細索纏白上一束如臂大厚二寸許即切去根鬚并葉如餅之狀先於火上煏一面微熱勿令灼人即以熱面搭病人臍連臍下四圍以舊布攤隔火氣上用熨斗貯火於葱餅上熨之令葱

餅中熱氣鬱鬱然透其肌肉中須更葱壞再易一

主

枚須先做三四枚用盡或未幾而病人漸醒手足

微有汗即差更服四逆湯溫其內傷寒活人書云

用盡此二法不回者不可治也又世俗一法用之

極效以草撥為末盪和熟調圓如大鷄子大二枚

兩手各握一枚並手夾在臍下兩股之間寧寢三

兩時俟其四肢一身漸漸溫熱直待汗出即差秘

之然病人昏迷者難用必須用著艾法也

仲景云熱深厥亦深

陽厥之證初得病時身熱至三四日後熱氣方深大

便秘小便赤或譫語煩躁昏憤及但別有熱證而發厥者指爪時溫此陽厥無疑也醫家病家更勿相誤並於大柴胡湯小承氣湯大承氣湯三藥量虛實大小選用之陽厥之脈沉而滑或帶緊陰厥之證初得病身不熱大便不秘引衣自蓋或下利或小便數始終內外無熱證而至厥逆者指爪常冷則陰厥無疑也四逆湯理中湯主之方見前陽明自利不渴條下及通脈四逆湯當歸四逆加茱萸生薑湯並主之

通脈四逆湯

養生論卷之十二

甘草二兩

附子一箇去心

乾薑二兩

右㕮咀每服五錢水一盞煎八分去滓溫服未差急再煎服脈續應指者生而赤者加連翹葱圓莖同煎服

當歸四逆加茱萸生薑湯於四逆湯中加茱萸七合生薑二兩六錢依本方每服五錢煎服

畧論小柴胡湯

小柴胡湯一藥專主少陽一證此證專主手足厥逆發熱或先寒後熱或先熱後寒或午後潮熱或只內熱或大便實或大便稠黃滑泄胸悶脇痛連背

甲疼頭昏目赤乾嘔痰嗽及病後勞復發熱或婦人經血適斷寒熱如瘧但老幼男女如上之證皆小柴胡湯主之也世俗棄而不用傍求雜藥適自誤耳雖活人書中云近世多行小柴胡此藥差寒然其慮人於六經大病之間表裏陰陽未別而誤投於寒弱之證余今明具于此告毋再惑惟經候不調者加四物湯停服血枯內熱日久不已者加當歸大便秘滯者更加大黃男女通用渴者去半夏人參加赤芍藥枳殼久病服之雖效數服終不除根者必入大黃隨大小虛實加用之取微利為度但有熱證雖多服無碍大能和表裏合陰陽病人雖久不覺有熱者但舌上有黃胎白胎或飲食無味者是內熱也切勿以其寒戰發熱而謂其有寒蓋醫書云邪戰于表則寒邪戰于裏則熱邪氣出入不常則寒熱往來其餘轉變活法不能備述養生君子當自看性味則知其無損有益矣方見前少陽條下

畧論五積散

生料五積散專主外感風寒內傷生冷對證無差則可以溫中發表三日已前惡寒頭痛無汗或惡心

或不惡心或身痛拘急則宜用之若三日已後邪氣入裏或因生冷停鬱內外之邪併而作熱外即不熱此等斷不可依方用之也服之則不為陽毒則為吐血衄血煩躁之證蜂起矣况近世江南風俗以浸酒或釀酒自謂脚氣宜服習以為常服之不疑遂致腠理疎泄五臟雍滯變為他證且六經脚氣寒濕二證外未必皆用表發熱性之藥世人纔覺腿脚稍疼不審是否寒濕或因風毒流注痰實攻作例飲此酒其性狼狽不欲形容古人云若無終身之病不服終身之藥今則云無病服藥如

壁中添柱余則云無病服藥乃無事生事也五積散之功非細但用之不得其道則如水能載舟而亦能覆舟耳余嘗治一證面赤惡寒耳聾煩躁午間必須大嘔三五聲大便利赤黃水余甚欲用此藥但慮其病雜遽逐一治瘳次第唯面赤乾嘔下利終不肯已一日排闥而入正見其恣食生冷菱蓮於是急簇數服令煎一貼服之嘔聲即止粥飲即納不一二日服盡痊安未幾有崇祥院提舉余周翰以王安谷之故懇求診視余不獲已而往既見則踴然離枕曰如大旱之望雲霓也面垢聲嘶

耳聾鼻塞盛暑中衣綿着機其脉六部俱浮洪軟緩乾嘔下利赤水無度余即曰余非貨醫之士可就藥肆贖生料五積散煎服本官畏其麻黃令去之煎服不半劑下利即止諸病頓回遂再盡劑至於四五服恬然無恙後半月餘恣食生冷其證復作再用此劑亦然立效性往濟人無不輒驗但脉紫數長實飲引不利者切不可輕服無婦人新產惡露不盡腹中絞痛俗云兒枕疼者每服加桂枝水一盞先煎泣泣再入好酒大半盞煎成八分一盞溫服立效去麻黃服亦得其餘加減治法並

見諸家方書但是外感風寒內傷生冷心腹痞悶頭目昏痛背脊抽急肢體怠惰痰飲嘔逆脾胃宿冷等證無內熱者五積散主之

陳皮

去白

桔梗

去蘆

蒼朮

米泔浸去

枳殼

去穢

白芍藥

白芷

川芎

當歸

酒浸一宿

甘草

炙

肉桂

去皮

半夏

湯洗

白茯苓

去皮

麻黃

去節

厚朴

去皮

乾薑

四兩

右為咀咀除桂枳殼外慢火炒令色轉攤冷次入

桂枳殼令勻每服四錢至五錢水一大盞薑三片

煎八分去滓稍熱服如冷氣奔衝心腹脹滿
刺痛反胃嘔吐泄利清穀及疰瘕積癆脫小腸
氣痛即入煨薑小一塊切破薑少許同煎如傷寒
頭痛體疼惡寒發熱無汗不渴者入葱白帶鬚一
根或用淡豉七粒同煎並隨病緩急不拘時候

泰定養

論卷之十三

泰定養生主論卷之十三

五運時行民病證治

凡遇六十年發生之紀歲木太過風氣流行脾土受
邪民病飧泄食減體重煩冤腸鳴脇支滿甚則忽
忽善怒眩冒顛疾為金所復則反脇痛而吐甚則
衝陽絕者死

蒼朮湯 治脾胃感風飧泄注下腸鳴腹滿四肢重
滯忽忽善怒眩冒顛暈或左肋偏疼

泰定養生主論卷之十三

白茯苓

厚朴

白朮

青皮

乾薑

半夏

甘草

甘草

右為咬咀每服四錢水一大盞薑三片棗二枚煎
七分去滓食前服以效為度

凡遇六戊年赫曦之紀歲火太過炎暑流行肺金受
邪民病瘧少氣欬喘血溢泄瀉監燥耳聾中熱肩
背熱甚胸中痛脇支滿背髀并兩臂痛身熱骨痛
而為浸淫為水所復則反譫妄狂越欬喘息鳴血
溢泄瀉不已甚則大淵絕者死

麥門冬湯

治肺經受熱上氣欬喘咯血痰壅壅乾

耳聾泄瀉

胸脇滿痛連有背兩臂膊疼息高

麥門冬

去心

香白芷

半夏

洗去

桑白皮

竹葉

甘草

炙

紫菀茸

鍾乳粉

人參

各等分

右咬咀每服四錢水一大盞薑三片棗二枚煎七分去滓食前服以效為度

凡遇六甲年堆阜之紀歲土太過雨濕流行腎水受

邪民病腰痛清厥意不樂體重煩冤甚則肌肉痿

足痿不收行善癢脚下痛中滿食減四肢不舉為

風所復則反腹脹泄瀉腸鳴則太爺絕者死

附子山茱萸湯 治腎經受濕腹痛寒厥足痿不收

腰膝痛行步艱難其則中滿不下或腸鳴泄瀉

附子

炮去

山茱萸

各一

木瓜乾

丁香

一分

烏梅

各半

半夏

洗去

肉苁蓉

各二

薤白

一分

右咬咀每服四錢水一大盞薑七片棗一枚煎七分去滓食前服以效為度

凡遇六庚年堅成之紀歲金太過燥氣流行肝木受

邪民病脇小腹滿目赤背痒耳無聞體重煩冤胸

痛引背脇滿引小腹甚則喘欬逆氣背脊尻陰股

膝髀腠肱足痛為火所復則暴痛眩脇不可反側

欬逆甚而血溢太衝絕者死

牛膝木瓜湯 治肝虛濕氣燥濕更脇連小腹拘

急疼痛耳聾目赤欬逆喘背連尻陰股膝骨肱肘

皆痛悉主之

牛膝

酒浸

木瓜

各一

芍藥

黃松節

甘草

各半

杜仲

酒浸

枸杞子

天麻

各三

甘草

各半

鬼絲子

酒浸

天麻

各三

甘草

各半

右咬咀每服四錢水一大盞薑三片棗二枚煎七分去滓食前服以效為度

凡遇六丙年湯衍之紀歲水太過寒氣流行邪害心

火民病身熱煩心躁悸上下中寒譫妄心痛甚則

腹大脰腫喘欬寢汗憎風為土所復則反脹滿腸

鳴泄瀉食不化渴而妄冒甚則神門絕者死

川連茯苓湯 治心虛為寒冷所中心熱躁手足反

寒心腹腫病喘咳自汗甚則大腸便血

黃連

去心

茯苓

各一

麥門冬

去心

車前子

炒

通草

各一

遠志

去心

各半

半夏

洗去

黃芩

去心

甘草

各半

右為吹咀每服四錢水一大盞薑七片棗一枚煎

七分去滓食前服以效為度

凡遇六丁年委味之紀歲木不及燥乃盛行民病中

清肱脇小腹痛腸鳴泄泄為火所復則反寒熱瘡

瘍瘰癧腫欬而嗽

從蓉牛膝湯 治肝虛為燥熱所傷肱脇并小腹痛

腸泄或發熱遍體瘡瘍咳嗽肢消鼻乾

肉從蓉酒浸 牛膝酒浸 乾木瓜

白芍藥 熟地黃 當歸去苗

甘草各

右吹咀每服四錢水一大盞薑三片烏梅半枚煎

七分去滓食前服筋痿脚弱者銹鹿角屑同煎

凡遇六癸年伏明之紀歲火不及寒乃盛行民病胸

痛脇肢消膈背肩胛兩臂內痛胃喙昧心痛暴

瘡甚則屈不能伸體解如別為土所復則反驚瀉

食飲不下寒中腸鳴泄注腹痛暴變瘰癧足不能

任身

黃芪茯神湯 治心虛挾寒心胸中痛兩脇連有背

肢消噎塞鬱冒眩暈脾經痛不能屈伸或不能

利瀉泄飲食不進腹痛手足痿痺不能任身

黃芪 蜜炙

茯神 去木

遠志 去心薑

柴胡車

酸棗仁 各

右吹咀每服四錢水一大盞薑三片棗一枚煎七

分去滓食前服以效為度

凡遇六巳年畢監之紀歲土不及風氣盛行民病飧

泄霍亂體重身痛筋骨絛并肌肉瞶酸善怒為金

所復則反胸脇暴痛本引小腹善太息氣客於脾

食少味

白木厚朴湯 治腰膝風冷所傷心腹脹滿疼痛四

肢筋骨重痛肌肉瞶酸善怒霍亂吐瀉或胸

脇暴痛下引小腹善太息食少味

白水

桂心

乾薑

右吹咀每服四錢水一大盞薑三片棗一枚煎七

分去滓食前服以效為度

凡遇六乙年從革之紀歲金不及炎火盛行民病有

背脊重熱噴血便注下為水所復則反頭腦戶痛

延及顙頂發熱口瘡心痛

紫苑湯 治肺虛感熱咳嗽喘滿自汗衄血肩背脊

重血便注下或腦戶連顙頂痛發熱口瘡心痛

紫苑茸

白芷

人參

甘草炙

黃芪蜜炙

地骨皮

杏仁炙

桑白皮炙各等分

右咬咀每服四錢水一大盞薑三片棗一枚煎七分去滓食前服以效為度

凡遇六年涸流之紀歲水不及濕乃盛行民病腫滿身重濡泄寒瘍腰膈股膝痛不便煩寃足痿清厥脚下痛甚則胎腫腎氣不行為木所復則反面色時變筋骨并僻肉瞶瞶目視瞠瞠肌肉胗瘼

熱并膈中痛於心腹

五味子湯

治腎氣虛坐臥濕地腰膝重著疼痛腹脹滿濡泄無度行步難足痿清厥甚則浮腫面色

不常或筋骨併僻瞶瞶目視瞠瞠膈中及咽痛

五味子

附子炮去

巴戟去心

鹿茸

去毛

山茱萸

熟地黃

杜仲

絲各等分

右為咬咀每服四錢水一大盞薑七片鹽少許煎七分去滓食前服以效為度

凡六壬六戌六甲六庚六丙歲乃木火土金水太過

五運先天六丁六癸六巳六乙六辛歲乃木火土金水不及為五運六天民病所感治之各以五味所勝調和以平為期

六氣時行民病證治

辰戌之歲太陽司天太陰在泉氣化運行先天初之氣乃少陽相火加臨厥陰風木民病溫身熱頸疼嘔吐肌腠瘡瘍二之氣陽明燥金加臨少陰君火民病氣鬱中滿三之氣太陽寒水加臨少陽相火民病寒反熱中癰疽注心中熱瞽悶四之氣厥陰風木加臨陽明燥金民氣乃舒終之氣太陰濕土

加臨太陽寒水民乃悽慘孕死治法用甘溫以平水酸苦以補火抑其運氣扶其不勝

靜順湯 治辰戌之歲太陽司天太陰在泉病者身熱頭痛嘔吐氣鬱中滿瞽悶少氣足痿注下赤白

肌腠瘡瘍發為癰疽

白茯苓

去皮

乾木瓜

各一兩

附子炮去

牛膝

去苗酒浸

防風

去銀

訶子

煨大

甘草炙

乾薑

炮各

右咬咀每服四錢水一大盞煎七分去滓食前服其年自大寒至春分宜用附子加枸杞半兩自春

分至小滿依前入附子同枸杞自小滿至大暑去
附子木瓜乾薑加人參枸杞地榆香白芷生薑各
三分自大暑至秋分依正方加石榴皮半兩秋分
至小雪依正方自小雪至大寒去牛膝加當歸芍
藥阿膠炒各三分

卯酉之歲陽明司天少陰在泉氣化運行後天初之

氣太陰濕土加厥陰風木此下尅上民病中熱脹
面目浮腫善服鹹鉅噎欠嘔吐小便黃赤甚則淋
二氣少陽相火燥交合民病寒熱四之氣太陽寒
水加太陰濕土此下土尅上水民病暴仆振慄譫

妄少氣咽乾引飲心痛癰腫瘡瘍寒瘧骨痠便血

五之氣厥陰風木加陽明燥金民氣如終之氣少

陰君火加大陽寒水此下尅上民病溫治法宜鹹

寒以抑火辛甘以助金汗之清之散之安其運氣

審平湯 治卯酉之歲陽明司天少陰在泉病者中

熱面浮鼻軌小便赤黃甚則淋或癰氣行善暴仆

振慄譫妄寒瘧癰腫便血

遠志去心 紫梗香 天門冬去心

山茱萸分 白芍藥 白朮

甘草 牛黃格半

右咬咀每服四錢水一大盞煎七分去滓食前服
自大寒至春分加白茯苓半夏紫蘇生薑各半兩
自春分至小滿加玄參白薇各半兩自小滿至大
暑去遠志山茱萸白朮加川參澤瀉各半兩自大
暑至秋分去遠志白朮加酸棗仁車前子各半兩
自秋分至大寒並依正方

寅申之歲少陽相火司天厥陰風木在泉氣化運行
先天之氣少陰君火加厥陰風木民病溫氣拂於
上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚癢生瘡二之
氣太陰濕土加少陰君火民病熱欬逆嘔吐胸

臆不利頭痛身熱赤憤脹瘡三之氣少陽相火加

相火民病熱中驚悸血溢膿瘡欬逆噎欠喉痺

目赤善暴死四之氣陽明燥金加大陰濕土民病

滿身重五之氣太陽寒水民病開悶不禁心痛陽

氣不藏而欬治法宜酸寒平其上辛溫治其內宜

酸滲之泄之清之滋之

升明湯 治寅申之歲少陽相火司天厥陰風木在

泉病者氣鬱熱血溢目赤欬逆頭痛脇滿嘔吐胸

臆不利驚悸渴身重心痛陽氣不藏瘡瘍煩燥

紫梗香 車前子 青皮去白

半夏洗去

酸棗仁

續斷

生薑

甘草各半兩

右咬咀每服四錢水一大盞煎七分去滓食前服
自大寒至春分加白薇玄參各半兩自大暑至秋
分加茯苓半兩自秋分至小雪依正方自小雪至
大寒加五味子半兩

丑未之歲太陰濕土司天太陽寒水在泉氣化運行
後天初之氣厥陰風木加風木民病血溢筋絡拘
強關節不利身重筋痿二之氣大火正乃少陰君
火加君火民病溫病盛行遠近咸若三之氣太陰

養生主論卷之十一

十一

濕土加少陽相火民病身重胕腫腰滿四之氣少
陽相火加太陰濕土民病勝理熱血暴溢瘧心腹
脹甚則浮腫五之氣陽明燥金加陽明燥金民
病皮膚寒氣及體終之氣太陽寒水加寒水民病
關節禁固腰膝痛治法用酸以平其上甘溫治其
下以苦燥之溫之甚則發之泄之贊其陽火令禦
其寒

備化湯 治丑未之歲太陰濕土司天太陽寒水在
泉病者關節不利筋脉胸急身重痿弱或溫病盛
行遠近咸若或胸腹滿悶甚則浮腫寒瘧血溢腰

腫痛

木瓜乾

茯苓去皮各一兩

牛膝酒浸

附子炮去皮臍

熟地黃

覆盆子各半兩

甘草一分

生薑三分

右咬咀每服四錢水一大盞煎七分去滓食前服
自大寒至春分依正方自春分至小滿去附子加
天麻防風冬半兩自小滿至大暑加澤瀉三分自
大暑至大寒並依正方

子午之歲少陰君火司天陽明燥金在泉氣化運行
先天初之氣太陽寒水加厥陰風木民病關節禁

養生主論卷之十一

十一

固腰膝痛中外瘡瘍二之氣厥陰風木加少陰君
火民病淋目赤氣鬱面熱三之氣少陰君火加少
陽相火民病熱厥心痛寒熱更作咳喘目赤四之
氣太陰濕土加濕土民病黃疸衄血乾吐飲五
之氣少陽相火加陽明燥金民乃康終之氣陽明
燥金加太陽寒水民病上腫咳嗽甚則血溢下連
小腹而作寒中治法宜鹹以平其上苦熱以治其
內鹹以與之苦以發之酸以收之

正陽湯 治子午之歲少陰君火司天陽明燥金在
泉病者關節禁固腰痛氣鬱熱小便淋目赤心痛

寒熱更作咳嗽或鼻軌溢咽吐飲發黃瘧喘甚則連小腹而作寒中惡

白薇

玄參

川芎

芍藥

旋覆花

桑白皮

當歸

甘草

生薑

右咬咀每服四錢水一大盞煎七分去滓食前服自大寒至春分加杏仁升麻各半兩自春分至小滿加茯苓車前子各半兩自小滿至大暑加杏仁麻子仁各一分自大暑至秋分加荆芥茵陳蒿各一分自秋分至小雪依止方自小雪至大寒加紫

蘇子半兩

已亥之歲厥陰風木司天少陽相火在泉氣化運行後天初之氣陽明燥金加厥陰風木民病寒於右脇下二之氣太陽寒水加少陰君火民病熱中三之氣厥陰風木加少陽相火民病淚出耳鳴掉眩四之氣少陰君火加太陰濕土民病黃瘧腫五之氣太陰濕土加陽明燥金濕熱相勝寒氣及體終之氣少陽相火陽寒水此下水剋上火民病溫痛治法宜用辛涼以平其上醎寒調其下畏火之氣無妄犯之

敷和湯 治已亥之歲厥陰風木司天少陽相火在泉病者中熱而反右脇下寒耳鳴淚出掉眩燥濕相搏民病黃瘧浮腫時作瘧病

半夏

棗子

五味子

枳殼

茯苓

訶子

乾薑

橘皮

甘草

右咬咀每服四錢水一大盞煎七分去滓食前服自大寒至春分加鼠粘子一分自春分至小滿加麥門冬去心山藥各一分自小滿至大暑加紫苑一分自大暑至秋分加澤瀉山梔子仁各一分自

秋分至大寒並依止方

凡六氣數起於上而終於下歲半之前自大寒後天氣主之歲半之後自大暑後地氣主之上下交互氣交主之司氣以熱用熱無犯司氣以寒用寒無犯司氣以涼用涼無犯司氣以溫用溫無犯司氣同其主亦無犯異主則少犯之是謂四畏若天氣反時可依時及勝其主則可犯以平為期不可過也

泰定養生主論卷之十三

泰定養生主論卷之十四

痰證

痰證一條古今未詳素問雖載鼻軌辛煩喘滿爲熱而無治法方書雖類五痰諸飲之異而鮮能對證余自幼多病莫識其原或偏頭風雷頭風太陽疼自強樛以來遍嘗頭風藥其病轉增直至出幼諸證頓除則爲頭眩目運如坐舟車精神恍惚或口眼瞤動眉稜耳輪俱痒或顙頰四肢遊風腫硬而

似疹非疹或渾身燥痒怪之則癢疹隨生皮毛烘

熱色如錦斑用盡風藥而無效或齒頰似痒似疼而痛無定所或滿口牙浮而痛痒不一累謁齒科未能奏效或噎氣吞酸鼻聞焦臭喉間豆腥心煩鼻塞咽嗑不利咯之不出嚥之不下或因噴嚏而出或因舉動而唾其痰似墨有如破絮或似桃膠或若蜆肉服四七湯則如水投石其聚也心下如停水鐵閉滯妨悶噎逆連聲狀如膈氣久服秘方降氣湯下丁香五套圓之屬則其病自若寢寐則常夢刑戮衆囚兵刃劒戟或夢入人家四壁圍繞

甃得一竇百計透出則失記何所或適然寢在燒人地上四面枯骨烟之焦氣撲鼻不得其路而出或不回觸發忿忿而怒悲啼兩淚而寤或騎馬郊行則忽見天邊兩月交曜或見金光數道急急回顧元無所自往往請問醫師達者皆知爲肺疾驗方用藥藥罕投機或膝或足腕忽然酸軟倒地或腰腎骨節卒痛呼吸難任或四肢肌骨之間痛如擊截即痛即止痛無常所乃至不時手疼麻臂狀若風濕百藥不效秋夏夜卧光滑竹簟但覺遍身習習不安如卧麥芒之中間有數處刺然如被蟲

毛所蛻或時四肢自臂已下手足重腿雖無痛苦亦不能熟寐每遇四五月七八月之間眼如薑黃粘濕痒滋開闔皆難或逢陰晴交變則胸痞氣結閉而不發則齒痒咽疼口槩舌爛及其奮然而發則噴嚏連聲始則涕唾稠粘次則清水如注眼前黑暗腦後風聲耳內蟬鳴眼瞤筋惕備受諸苦志氣頃消攀附無成周流四方遍問高醫或曰腠理不密風府受邪或曰上盛下虛或曰腦寒鼻淵或曰鬼擊也又曰屍注也皆我所知方非我所苦之病或曰治痰必先理氣理氣徒然故自南星半夏

白朮細辛甚至芫花大戟甘遂巴豆鉛霜銀粉種
種逐邪正氣珀屑珠沉無所不爲或曰虛也或曰
寒也或曰邪熱也並無一說對證一日於廣座中
遇一眼醫年逾八旬因道其所遇前朝貴顯備論
眼科精微至於諸風痰實脈絡朝會之妙則余不
覺避席而告其所苦老醫曰此非藥餌可療故難
言也余愈加恭敬至再然後曰吾觀君氣象軒昂
未可語道蓋非飛精補腦之術則不能愈也余加
禮再三老醫曰存想作用五氣循經變化白光自
肘後直上入腦腦實則不漏也余不覺失笑曰吾
飛金精於肘後鍊玉液於丹田未嘗思想皆出自
然但風火盤旋龍交戰已嘗逐盡寒邪痼疾柰
何道力未深風疾未愈老醫即彷徨四顧欲作拜
禮合掌加額感慨喜忭歡趨不能自己謂余曰公
神仙也吾老矣恨不能給侍履孟唯有讚嘆而已
余自思父母俱有疾我稟此疾則與生俱生也
當自爲之計故於靜室默坐熟察病勢之來則於
胸腹間如有二氣交紐遂噎塞煩鬱有如烟火奮
然上衝頭面烘熱眼花耳鳴痰涎涕淚並從肺胃
沸然湧起凜然毛豎噴嚏千百連聲然後遍身煩

躁大寒之時即盡去衣衾裸體一凍則稍止片時
或春秋年涼之時則多加衣衾亦暫小緩或頻飲
冰水而勢定或不得已痛飲一醉而煩寧可謂辛
甘發散以寒治熱暗合方法而終不能逐去病根
故精心內觀反復思慮似睡非睡若聞不聞如有
人言曰云云余即解此意遂取前所服一藥以湯
爲散變散爲圓因獲大效漸爲人所知故求治者
衆初年止用圓子三二升許次第用多至今週歲
常用圓子四十餘斤總六百餘兩以大劑八九十
圓小劑五七十圓登登以八十圓爲率其重止於
一錢半該四千餘服或一服愈者或一二服而愈
者每歲愈疾常證十數年間得大效者動
以萬計其餘泛泛不可勝數矣今將三十
載官員將帶遊宦至於異方殊域皆知其名各本
無名蓋一時爲人所需設以袞袞圓名之而今市
貨之徒已竊此名以爲亂真好事者百計求方至
於請託要路官員索之未嘗敢泄必不得已則嘗
書六七味相去頗近者作袞袞圓方與之今湖海
相傳者是也非欲苟此一身蓋其簡易不群神效
特異說破不難恐人視爲泛常妄自加減輕生是

非互相誇尚則不能濟衆也或曰純陽真人誓願天下人仙然後爲仙子秘此方得不有愧乎余曰神仙之道丹經萬軸妙在鉛火二字蓋神仙不敢分明說說與時人咲殺人大抵龍章寶篆神方道術未嘗不欲濟人亦未嘗不誠人謹傳授者蓋得人則傳道不虛行余既不貨賣此藥何苦秘之自取費耗哉今恐湮沒聊序艱苦萬一仍用俚語詩以括其方庶免間閭愚小輕舉妄論妨於濟衆也諳藥性者觀之自然默解初無難事然後口口相傳與諸善人共爲饒益之事

袞袞圓方詩括曰

既裏翻身甲掛金藥性無毒利痰順氣湯滌腹中寒
于今頭戴草堂深藥性微寒利痰清肺除熱安
二八求斤正硝燬青礞倍若沉十七兩中令半兩水
圓桐子意常斟千般怪證如神效水瀉變身却不任

滾痰圓服法

一切久新失心喪志或顛或狂等證每服一百圓人
壯氣盛能飲食狂甚者一百二十圓已上至三二
百圓以效爲度
一切中風癱瘓痰涎壅塞大便或通或結者每服八

九十圓人壯氣盛者一百圓常服三二十圓無太
便不之患自然上清下潤而妙

一切陽證風毒脚氣遍身游走疼痛每服八九十圓
未效更加十圓

一切走刺氣痛每服七八十圓未效加十圓

一切無病之人遍身筋骨等處平白疼痛不能名狀
者每服七八十圓未甚全效加至效爲度

一切頭疼非頭風證牙疼或浮或痒非風蛀牙證者
每服八十九十圓

一切因風因寒鼻塞聲重等證身體不痛非傷寒證
者每服七八十圓痰盛人實者加圓數服

一切噎氣吞酸至於噎逆漏氣及胸閉或從腹中氣
塊衝上嘔吐涎飲狀如翻胃者每服七八十圓未
效再服

一切心下怔忡如畏人捕怵惕不安陰陽關隔變生
垂證每服七十圓人壯病甚者加至九十圓

一切失飢傷飽憂思過慮至於心下嘈雜或噦晝夜
飲食無度或只虛飽腹中稍飢並不喜食每服七
八十圓至九十圓

一切久新痰氣喘嗽或嘔吐涎沫或痰結實熱或頭

暈目眩每服八九十圓虛老羸瘦者五六十圓未效加十圓

一切急慢喉閉赤眼每服八九十圓甚者加圓數再服頭領腫硬繞項熱核上若癰癰者正宜服之若年深多次服之瘡穿者用十五卷中銀粉散敷之口糜舌爛慢咽喉生瘡者每以五六十圓同蜜少許一處嚼破噙唾徐徐嚥之此少口瘡等證只以三二十圓如前噙三二夜即差

一切遍身無故游走疼痛或腫或癢或如常痛無定所或俗名寒濕不腫在一處酸軟沉滯者每服七

卷中論

七

八十圓或九十圓皆量其大小虛實輕重任意消息服之

切心氣冷疼如停水塊或動身散入腹中絞痛上攻頭面腫硬遍身四肢去處腫起軟浮或痛或痒或穿或不穿或穿而復閉或此消彼長漸成篤疾此係痰毒內攻或使肺爛痰臭或作腸癰內疽每服更量虛實加減服之以下惡物立見寬緩日淺膿近者尅日全安年月深遠者但可稍減如飲食壯者續續服之亦能全效

一切男子婦人大小虛實久患心疼下連小腹面黃

羸瘦痛陣日發必嘔綠水黑汁冷涎乃至氣絕心

下溫暖者並量大小多至七八十圓事屬不虞之際至於百圓即便回生如未至顛危者虛弱疑似之間只服三五十圓立見生意然後續續進之以差為度無服生津化痰溫中理氣藥以全其功唯豁痰湯加減之法為妙方見十五卷中

一切荏苒之疾日久男子婦人之患非傷寒內外之證或酒色吐血或月水愆期心煩志亂或腹脹脇疼勞痛耳聾鼻骨即酸痛乾嘔惡心諸般內外疼痛百藥無效病者不能喻其狀方書未嘗載其疾

卷中論

上

醫者不能別其證並依前法加減處

大抵服藥必須臨睡就床用熟水一口許只送過咽即便仰卧今藥在咽隔間徐徐而下如日間病出不測疼不可忍乾嘔惡心必於除差者須是一依臨睡服法多半日不可飲食湯水及不可起身坐行言語直候藥圓除遂上焦痰滯惡物過膈入腹然後動作方能中病每次須連進兩夜先夜所服次日痰物既下三五次者次夜減十圓下一兩次者仍服前數下五七次或只二三次而病勢頓已者次夜減二十圓頭夜所服並不下惡物者次夜

加十圓壯人病實者多至百圓唯狂疾勁實及暴卒惡候多服無妨大抵服罷仰臥咽候稠涎壅塞不利者乃痰氣泛上藥病相攻之故也少頃藥力既勝自然寧帖往往痰病日久結實於肺胃間或只暴病餘無泛溢者服藥下咽即仰臥頓然百骸安靜五臟清寧夢寐佳境如游華胥氏之國和悅不可云喻大抵次早先去大便一次其餘遍次皆是痰涕惡物亦有看是清糞用水攪之盡繫痰片粘涎或百中有一稍稍腹疼腰腎拘急者蓋有一種頑痰惡物滯滯閉氣滑腸裏急後重狀如痢積

養性論卷之十

九

片餉即已若其痰涎易下者其為快利不可勝言頓然滿口生津百竅爽快間有片時倦怠者蓋連日病苦不安一時為藥所勝氣體寬和如醉得醒如浴方出如睡方起即非虛倦也此藥並不洞泄刮腸大瀉但能取痰積惡物自腸胃次第穿鑿而下腹中糟粕並不相傷唯下部臍腸之糞乃藥力不到之處是故先去其餘詳悉不能備述服者自然知之

痰論

一切氣急喘嗽咯痰吐涎世人皆知為痰病方書備

載於痰門又曰治痰必先理氣氣順痰消於理其明蓋曰憂思損志氣鬱延凝氣治則痰散也然而痰因氣結氣因痰滯理氣則其如痰何余故用袞痰圓逐去滯礙惡物如用兵討叛新民也況有稟賦痰證者要見出腹啼聲初出已有痰涎又有大善知識忘形忘骸無思慮者頓抱痰疾此豈唯因氣而然乎故學者不可固執一端而不通一切無痰不嗽不嘔者世人莫知為痰方書散入雜證是以大小七氣湯治中二陳半夏茯苓湯細辛白朮薄荷石膏白礬皂角南星貝母常山以至青

養性論卷之十

十

州白圓子膏是散種種消酒化氣去風寬膈止惡但諸方顯仁藏用於其間古人治痰莫不在斯乎余用袞痰圓獲效萬無一失者蓋泛應曲酬精心入思於理不乖濟利年遠穩審絕倫也唯脫形不食及水瀉并孕婦不服外自數歲已上至八旬者有病皆可量度前法餌之更有病者或只常人大便頻去或稍腹痛或微覺後重但看其色焦黃稠粘者並是痰瀉正宜服之逐去頑痰臟腑清利自然不瀉也

痰形

一切男女大小素稟痰疾其候往往不同其狀各各
 奇異方書有云痰清而白者為寒黃而濁者為熱
 殊不知始則清白久則黃濁稠結凝於下清白稀
 薄浮於上嗽而易出者清而白者也咳而不能出
 則黃濁結滯者也南及吐盡為稠黃者乃日久
 濕熱鬱沸上下凝結皆無清白者也黃稠濁結甚
 至帶血血敗成黑痰橫於肺胃之間者為關格異
 證人所不識及為上壅頭目齒頰喉舌諸病輕則
 鼻準赤查兩竅生瘡頤頰結硬風壅心煩鼻塞聲
 重涕唾稠粘重則為肺癰腸毒便膿臌脹為瘰癧或
 為誇大目高妄誕漸至顛狂歌笑逾垣上樹火勢
 既退痰血朦膜於膏肓之間神明之府以至終日
 兀兀定視或只言語謬錯或飲食酒醪健嗽自若
 喜睡癡癡數年者不可卒治三五載者克日可安
 服藥一次則狂勢定二次則知羞識愧定視兀兀
 三服後即復聰明逐下惡物燥擊之則如金石
 之聲得雨濕潤其狀如先痰形若清白稀薄泡沫
 粘膩與氣擊搏吹噓脹大狀若魚胞者粘喉着肺
 朦膜氣急喘急吐咯不盡下連敗濁稠痰咽
 膈沸食相雜糟粕不利終日膨脹不進飲食或腹

中虛氣作聲上攻下注乾嘔惡心腸鳴下泄或轉
 輸失常滑脫澹瀉狀若播爛山藥芋頭水洗不散
 或色如紅柿或即焦黃或對沫糟粕生熟燕并痰
 喘日久者肺氣不能護衛畏風惡寒自汗如雨小
 便頻多乃至百關不調五神失位所致多端或衣
 食過熱時候鬱發但見傷寒諸證始因痰疾而然
 者痰痰圓逐下敗物克日清寧寒者即和熱者自
 清飲食復常便溺有度也其餘頭面四肢胸背腹
 脇內外為癰疽般皆痰形不一所致有如水浸阿
 膠或似蜆肉或如破絮或如米粒或與涎相雜或
 如熟糖或如臭膿或帶痰血嗽而能出者方書載
 為一門嗽而無痰則方書別為一類殊不知總為
 一痰其狀不同故異其津液既凝為痰不復週潤
 三焦故口燥咽乾大便秘結面無血色白如枯骨
 毛髮焦槁婦人因此血無贏餘經水絕斷或即愆
 期方書雖各有條必湏逐去敗痰服餌方得有效
 痰味
 一切痰涎各有氣味清白者味淡日久漸成惡味口
 舌有如嚼椒如蜆肉破絮米粒之類者其味鹹能
 使人味咯咽痒如熟糊桃膠者其味鹹酸麻苦辣

遊腥惡氣往往不一故停滯於胸膈之間使人
心煩多怒眩運眼遊痒痛齒舌或痒或疼或寒或熱
咬頰車其味在於肺胃之間隨氣週流百脉滲入
毛竅面若蟲行遍身習習淹漬刺截甚至於風疥
燥痒入骨搔爬不厭當其作楚之時涕淚痰涎並
如砒霜礪砂之味在喉則錯喉嚨搶或乘時着於
喉嚨曲擢之中咯不出頓嗽忙窘但如米粒一點
忽然咯出齒舌俱疼其况甚惡故遂下敗痰之時
間有穿腸出腹滯滯淹漬如痢積之狀荒窘可畏
其味焦苦豆腥者使人上壅赤眼口瘡熱被喉閉

痰證或問

十三

面上鼻數生瘡口苦舌乾喉燥聲嘶鼻聞焦臭其
味相熱者熱病其味單行者單病余平生病痰爲
人治痰撈籠日深討論日久備知其詳非圖文具
而已故不愧鄙猥瑣屑敷演大畧其變狀不常
病者服藥自知痰證脉息已且於論卷中

痰證或問

或問曰據子所陳頭風已下諸證在方各有科目今
以一系痰圓治之則諸方何用六氣何有者曰古
今醫方名殊號異君臣佐使彼此兼并痰論已畢
喻及若夫六氣循經則有滯情內外之因六淫之

病當祖仲景專科七情之方雖有多門原其本標
半因痰病蓋亦有因病而生痰者也故痰之爲病
不出六經六經所屬其非六氣乎醫書以脾爲中
州合胃爲表裏胃爲水穀之海變化糟粕灌漑四
臟其氣薰蒸上朝肺爲華蓋主司皮毛週流內外
充潤百骸氤氲爲榮衛之氣合會爲津液之源隨
經變化在肝名津在肺名液在心爲血在腎爲精
在胃爲涎元和純粹穀氣相資升降無窮髓腦涕
唾淚精津氣血液同出一源而隨機感應故疑之
則爲敗痰痰者濕類也屬足太陰濕土所司故腫

痰證或問

十四

滿至極則必喘痰喘至極則必浮在方則有理氣
消腫之藥故不言痰也肺爲貯痰之器痰實鬱滯
而濕熱化屬乎少陰君火所司在方則有除熱清
劑故不言痰也大盛金衰木無以制屬足厥陰風
木所司風性飄蕩動靜不常干犯諸經在方則有
一百二十種風故不言痰也痰乃敗津結實之形
窒礙朝會隧道氣不流暢在方則有七十二般氣
故不言痰也津既爲痰不復含氣氤氲停留肺胃
之間自爲惡物其冷如水積之日久或咳不咳或
喘不喘或嘔噦涎沫或不唾痰或面青唇黑四肢

厥逆或惡風或惡寒或頭疼身痛或多汗如雨或
卽無汗本因肺病狀若傷寒屬足太陽寒水所司
在方則各分治法故不言痰也或因志不遂憂思
鬱結或因驚伏痰或因伏痰怔忡如畏人捕拂動
至甚火氣上炎性好誇大坐臥反常語言錯繆狂
或悲哀逾垣上屋邪陽獨盛奮力過人屬乎少陽
相火所司在方則有鎮心寧志之劑傷寒自有別
條故不言痰也中風者延浮痰凝津不潤下大便
燥澀有伏痰者肺氣不治腠理開闔失常衣食辛
熱或天氣鬱蒸內外交燠而壅或衝冒風寒則毛

素問卷之七

五

竅驟閉肺壅痰塞甚至皮毛枯竭燥燥並屬乎陽
明燥金所司在方則各分證類故不言痰也蓋因
痰而致病者先治其痰後調餘病因病而致痰者
先調其病後逐其痰故經云有其在本則治其本
有其在標則治其標其有敗痰既下諸證悉痊者
經又云有治本而得者有治標而得者如是之謂
也

或問曰痰留肺中人皆曉之今言在胃入腸尚或可
信所謂筋骨四肢五臟頂門脚心卒暴逆久之疾
其義何在答曰元氣氤氲榮衛之間不容髮間上

焦停痰週流不利氣阻其中奔潰四逸隨其所寓
緩急而為諸病也

或問曰有痰而服痰藥殺所共信今令無痰者服痰
藥世所未聞答曰諺云隔山見煙便知是火既是
逐動敗痰方覺痰盛殊不知積痰日久結實不泛
但能開格致病並不咳嗽吐痰既已逐動敗痰根
始能隨氣上下再進一次無不奏功

或問曰有久病得痰痰下頓安者何也答曰敗痰結
實脫滑肺無餘黨遂下敗痰四軀輕安即日無事
或問方書皆曰五痰何謂也答曰所謂風痰寒痰熱

素問卷之七

五

痰氣痰味痰又名酒痰味痰者因飲食酒醪厚味
而唾痰也氣痰者因事逆意而然也熱痰者因飲
食辛燥燒炙煎燂重稠厚穢及天時鬱勃而然也
寒痰者因衝冒風涼不節之氣而然也風痰者因
感風而發或風熱拂鬱而然也此皆素抱痰疾者
因風寒氣熱味而喘咯咳唾非別有此五種之痰
故一以痰痰圓治之即效若素無痰疾因風寒入
肺痰喘咳嗽并有外證者自屬傷寒證治之條外
證既罷或過經壞證痰疾則亦用痰痰圓治之即
效醫書又以心肝脾肺腎為五痰學者鮮有不惑

諸醫書又以心肝脾肺腎爲五痰學者鮮有不感
蓋言喜怒憂思智五者之氣鬱結成痰也痰既成
形則心肝脾腎無所停留而留於肺矣養生之家
亦宜知之則其我不惑

或問曰方有諸飲飲與痰有以異乎無以異邪荅曰
諸飲者溢飲支飲停飲亦曰留飲留者飲不入胃
不與穀勻化者也支飲者停留過度支分別道而
脇痛腸中水聲者是也溢飲者過飲酒漿湯汁之
類是也蓋有伏痰者傷於停飲是以嘔酸吐水皆
因痰涎粘滯膈礙而消化違時故也易云水就濕
火就燥物各從其類不已則邪濕侵脾而爲泄瀉
小便若秘則洪水橫流而爲水腫矣急以袞痰圓
救之

痰忌

胡椒乾薑辛辣燒炙煎炒性熱等物發痰助壅合鍋
熱麵大發風痰必須過水離湯還汁令熱食之無毒
芋頭山藥魚腥油膩粘滑等物惹痰不利腸胃熟雞
鴨彈熟菓子但是酥膩之物帶膈閉氣生痰素有痰
者宜食清涼菓木飽上多食無妨暴感風寒痰病者
皆宜禁之

藥無所忌

服袞痰圓後次日飲食湯藥俱無妨礙

泰定養生主論卷之十四

泰三論卷之十四

十八

逸人洞子撰

雜治活法

斯文之道後學賴其法度藻章及乎華散救時則其義在於損益利害而已唯醫亦然譬如匠石運斤斲削必師繩墨而運繩墨者匠石也故先達罕集方書正恐人殫在一隅耳養生君子致知然後知至據德游藝其庶幾乎

敗毒散 治四時頭疼項強壯熱惡寒身體煩痛寒

熱交雍咳嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔噦寒熱

人參 去蘆頭 赤茯苓 去皮 甘草 燉

前胡 去苗洗 芎藭 羌活 洗去苗

獨活 去苗洗 桔梗 苦者去蘆 柴胡 去苗

枳殼 去穰炒香熟

右等分咬咀每服四錢水一盞薑三片薄荷少許

同煎八分去滓溫服不拘時候

活人書中云治四時疫癘余平生以濟人常無虛日蓋四時不正之氣冬當寒而反熱夏當熱而反寒春宜溫而反涼秋宜涼而反溫故病者大小無異或一

郡一邑然唯丘陵澤國高下有差大抵使人痰涎風壅熱煩頭疼身痛等證或飲食如常起居依舊甚至聲啞市井號為浪子瘟以其咳聲不響續續相連儼如蛙鳴故又號曰蝦蟆瘟或至赤眼口瘡查顯喉閉風壅噴嚏涕唾稠粘里域皆同者並治之數服未效者須服聚痰圓逐去敗痰然後再服以效為度藥中去赤茯苓桔梗加青皮白朮者名清氣散治法並同但以荆芥穗為引子不用生薑薄荷敗毒散中須加乾葛為妙多服未效而有寒熱往來不常者必用小柴胡湯不拘服數並無過失此三法治疾延風壅熱

養生主論卷之十五

二

煩痰聚圓之次煎藥中之精粹也三陽脚氣上壅痰涎風毒熱煩通用敗毒散大便秘并口鼻出血痰涕者加黃芩今大黃同法煎服或用清氣散亦可簡當神效速驗不在沉香三之下

痢疾兼有寒熱痰者有一件者並用敗毒散入陳倉米三百粒薑棗同煎服之方名倉廩湯不拘赤白雜色任用唯無熱煩者少與之仍服圓散止痢之劑一切瘧疾輕重雜色或帶血塊惡物者不問曾經推換但是久新不已者並用聚痰圓毒甚雜色並煎或熱或不進食者每服六七十圓次日勢退者再進三

二十圓卽服局方斗門散治之萬無一失也人弱痢輕者每服三二十圓每日一服第三日卽進斗門散多服無妨以效爲度不可聽信土俗常談謂粟殼壞胃此等無知之言也蓋痢毒氣停滯腸中胃氣不行不能食緣其濕熱鬱蒸之故不服粟殼者亦有之也土俗名曰禁口痢余故用家痰圓先逐去滯滯粘綴毒物導開毒氣腸漸利多服斗門散止之則無患矣若不先拔便用遊藥止之卽禍事也蓋驚粟殼性溫體滯局方利藥中十居八九皆其害害人乎大抵百藥之性不出溫涼寒熱藥體則不過浮沉滋滑

在人用之如何耳醫之爲難上焦之病宜沉而降之中焦之病或升而發之故滑者瀉之瀉者滑之痢者滯也滯而不利則腸臟抽搐欲行不行欲已不已而裏急下迫不能通快也近代醫師故用滑石藥開導之使其利而不滯也余今用家痰圓速效者惡物與痰涕凍膿一體也豈非瞭然之事但發熱悶亂不寧混下鮮血或帶下積自汗者不可復生也主病者見此證候當言定見卽用傷寒書中陽明急下證治法療之或得九死一生

斗門散 治八腫毒痢臟腑撮痛膿血赤白或有五

色相雜日夜頻併無治禁口惡痢裏急後重大濕不止酒痢毒痢全不進食他藥不能治者服之立效

驚栗殼

地榆

當歸

右爲細末每服三錢水一盞煎七分溫服不拘時候余常人溫飲湯調尤妙昔有憲官按治間患痢以前官之言來就余醫初服家痰圓三十圓勢卽定次服斗門散經宿較之前日已減七分次日

官詳集議論稍異其疾復作憲官去左右謂余曰

吾本回司醫治因有足下故來相就衆醫皆說用栗殼不宜遂感之甫索局方觀之初無不可况衆醫之藥服之皆不及子所用之法感激甚多但官舍起居不便遂別去歸私第依前復舊效常有一富長者以父友之故求余治病大苦小便秘之每服湯浴方得初通終不快利余先發五苓散加滑石末赤芍藥木通山梔子令用燈心竹葉煎服未幾洩通並是黑穢惡物痢亦漸輕余至進家痰圓五十圓其勢頓減舉室歡悅患者笑容可掬

食亦進生意類回續令服斗門散忽為其左右各有薦主遂阻之後為前醫仍用震靈丹兼是旋煨火藥即今多服患者頻頻索余則余已在汶上矣遂天下瘀血發渴而卒養生君子幸深鑑之其餘愈疾不記其數不欲教舉也

豁痰湯 治一切痰疾余製此劑為痰痰圓相副蓋以小柴胡湯為主合前胡半夏易以南星紫蘇橘皮厚朴之類出入加減素抱痰及肺氣壅塞者以柴胡為主餘者並去柴胡用前胡為主

柴胡洗去土并

半夏洗去滑四兩

南星去內各二兩

人參去蘆風壅者不

黃芩去內外腐三兩

帶梗紫蘇

赤甘草各二兩

陳皮去白

厚朴去粗皮薑汁製

南星去脂各二兩

薄荷葉兩半

羌活去蘆一兩無

枳殼去穰炒

已上一十味中風者去陳皮入獨活胸膈不利者去陳皮加枳實去穰炒更加赤茯苓去皮內外無熱者去黃芩虛弱有內熱者勿去黃芩加南木香一切痰痰氣之藥無有出其右者氣無補法之說正恐藥味窒塞之故是以選用前件品味並是

清疎溫利性平有效者也

江東有一富商自奉頗厚忽患一疾心驚如畏人捕纔聞脂粉氣即便遺泄晝夜坐臥常欲三五人擁護方始放心甫及交睫即陽氣不固遍身紅暈紫斑兩腿連足淫濕爛膿下不絕飲食倍常酬應不倦所在求醫皆無少效一日託其親舊數輩多訪余以求診視乃六脈俱長三部九候來往有力兩手寸尺特盛至數不遲不數卒難斷證始且詢之曰足下年逾六旬神氣壯健脈息如是但是心下怔忡驚悸陽事頻興恍惚未審是否商曰非也其但覺虛弱無力及

苦於下元不固兩腿風瘡侍奉皆仰婦人而又害於

淫亂不能自禁余謂之曰汝若求醫則必作三種病

治一者治驚悸二者治虛脫三者治火風以余觀之只服痰痰圓然後調理滿座愕然莫曉所謂余與之曰此係太過之脈心腎不交商曰然則腿脚為風癩乎余曰非也水火亢行心不攝血運於下不能上升凝於肌膚日久濕爛與火炎水溫神情不寧陽事頻泄者本同標異也余故曰逐去痰毒然後調理遂服痰痰圓二次三日後再來求診脈氣稍平再令服之商曰其浙右生長家人慮其體虛欲求補藥是意余

曰足下連年求醫者無非選方對證一一合法既已日久不效愈加開格之甚者蓋認以為真不識虛

實本標故也余言既不足取信於人則請已之衆賓列坐合辭惟請遂再服三次越五日再來求診其脉漸和患者已不齒及驚悸之苦但求治遺泄之藥余用豁痰湯本方加白茯苓煎服月餘日再請諸證頓減精神爽利亦不用人扶策患者皆不言及前證但言如舊更望緊治腿脚濕瀰於是諸鄙其昧心余因回速遂寢其事明年再會仍從諸公求見首以風瘡告急諸公亦不甚贊成余憐其愚俗遂書豁痰方及

卷之五

七

今用嬰幼門泥金膏以新汲水濃調厚敷兩腿乾則再上經一復時洗去則熱氣已衰皮肉寬緩然後用

扶毒活血之劑治之

扶毒活血方後四味自是一扶毒凡扶毒畏痛不紫者係表證和得之於邪水調敷甚遠遇水一洗而犯人余常以代淡金膏妙

蛇床子 光草烏 大薊根葉

枯白礬 凌霄花 小薊根葉

赤石脂 白石脂 直葉豆粉

天花粉 檳榔

已上並為末煎大黃汁令調如泥厚敷兩腿

爛去處三易而後敗血黃膠惡者去盡及層破損剥落於瘡前後遣幣送物余一無所受

又具門一富室少年神色杜盛亦苦前疾但不患瘡飲食倍常惡聞聲響倦於執作余令服袞痰圓患家自謂其虛不敢逐利百藥無效遂為巫蠱所惑移屋改堵扶鸞禱聖生理廢置數年之間倉庫蕭然後始漸安

卷之五

八

又有富室子弟因憂畏官事勿患惡聞聲響鞋履作聲亦即驚怖有事則彼此耳語而已飲食自若舉動無措余令服袞痰圓二次即能起坐應酬再以豁痰湯并童壯門中分心氣飲相間服之而愈又有一相識官員為事卒為公吏部隸隣里直入其室搜索次人因而驚死其妻須臾甦省失志顛倒棄衣撲空親踈圍繞悲憂嗟嘆余令服袞痰圓二次下咽即睡醒則熱定矣次夜又一服仍用豁痰湯加枳實服數日即安略舉此四證因在奸所畏捕而得之其二一證為人端正喜怒有節平日而病後之二證各自有因故大同小異此之方書虛滑類中所載之方豈無相似若依而用之則實其實矣豈唯不效而已又恐有效而為害更深也俗

云千金易得一效難求非方鮮效乃是人鮮識證者也夫抵伏痰多使人眩暈驚悸恍惚是故壯人亦自謂虛弱不可不知

嘗有宦家婦人忽患心腹冷痛嘔吐去盡宿汁不已而又吐清涎如雞子清之狀一嘔一二升許少頃再嘔百藥不納嘔睡亦不能順下已經三日但聰明不昧一分付家事已備週身之具將欲就木得余診其脉六部弦細而長今服家痰圓三十圓並不轉逆須更坐寐移時索粥食之次日再進三十圓只服局方茯苓半夏湯次日服小兒方白

米散下四五日飲食如舊

復有巨室仗余友愛招致及抵其所午夜天寒可愛患人素清癯骨立但苦滿腹冷痛呻吟之聲撼屋振床嘔吐清汁亦如雞子清醫流數輩縮手無措百藥不納唯服痰圓三十圓即便寧睡更不嘔逆一家百口各得暫安復診其脉雖熟寐中亦弦數之甚次早余即拂袖飄然諸公告留不已余遂與之曰吾頗諳此證故敢下藥不無衆議紛紛不下藥則諸公見逼當此掣肘之際不去何待患人睡醒仍更呻吟急須前藥余未獲已再用五十圓

辰已間服至未申之間其痛休作數四但不甚大嘔節續登瀾略有大便如水浸指肉亦似赤白痢疾小便少許皆如丹粉相和膠膩不多餘色皆是藥汁迫暮後大嘔二升許盡如雞子清其藥圓皆如茶脚褐色仍有前數粒粒分曉以手撚之並無顏色藥汁衆兵驚駭患人痛定就寐其內人曰藥既吐出仍舊有效何也余曰此不可曉非醫義之所載也雖粗津吐出而藥味皆隨大小便下故效耳次日患者哀憐曲留余即反棹矣唯留豁痰湯數貼令其服罷仍服白米散而愈

燕人楊其姓者久患冷氣滿腹上攻下注大痛不堪任通陣墜上即吐冷涎半升而止每日一作飲食不進遂成骨立以其親爲當路官員之故累召高爵治之遍嘗溫補下元種種貴細之劑了無一效不獲已扶僮肩息而來求余診視其脉六部弦長勁急兩畔別有細脉沸然而作狀如爛綿余曰不審足下所苦何證但以脉言之則有一胸膈臭痰在內患者鼓手曰然也衆醫皆作冷氣因補治下元日久並無少效某自覺胸中痞悶但不會此方今聞此說令我大快遂令服痰圓五十圓次早

報來臨睡服之半夜後吐黑綠冷涎敗水一銅盆
今早大便畧通已見敗痰更求今晚之藥再付七
十圓第三日其親識來曰患人即目動復輕安嬉
笑自若連年痼疾不三二日頓安無以為報夫婦
頂香路拜而來踵門為謝遂遣人力止之再服一
次圓藥令服局方橘皮半夏湯四君子湯而愈
散藥李媼年八十餘歲臥病日久每託豪貴之故欲
求診視余毅然不許不得已令其親人詣余曰媼
病心煩喜怒常閉不能進食迷悶發作展轉
不安並無寒熱別證余曰汝既久醫不瘥吾除痰

養生論卷十五

上

痰圓外無法可為況其年高不食宜其宜乎來者
力請服之余曰吾故知其可服但不可多試以十
圓一服當自知之也既而逐下敗痰三五片一如
水浸阿膠頗然安好再求三十圓作三服後只再
進一服餘二十服置於佛前舉室歡躍而來曰母
氏復生矣近已備後事只俟其瞑目今得二十圓
藥蠅得痊安閭巷驚駭拜謝而去余製龍腦膏一
劑令其每夜驚睡無恙五載中風而終

龍腦膏 余撰此藥隨身自用及濟年尚不任逐利
者但是上焦風痰熱壅咽膈不利等證並宜服之

薄荷一斤

赤甘草二兩

防風去鹹二錢半

苦桔梗去蘆二錢半

川芎洗去塵土二錢半

縮砂五粒

白豆蔻三十粒

右七味勻為細末入煇硝研細二兩梅花片腦半
錢和勻生白沙蜜調搜成膏每以一彈子大嚥化
嚥津如年老枯槁痰熱喘滿者以一彈大略嚥潤
頓作一嚥遂覺胸中清涼痰涎立轉或吐或散大
小強弱之人並如此法昔有故舊膏長者強健歲
武忽患喘滿不咳不吐痰病日久腿脚陰囊盡為
水腫倚卧肩息困極之至余深閱之謂其人曰非
水證也但有一胸膈敗痰耳服家痰圓患者曰非
四五人扶持不能登園遂已之至於用醫鍼刺放
水備受諸苦年餘漸瘥忽吐臭痰患人撫牀大聲
曰果中前言吾不智以至今患今則痰敗必成肺
癰急請余謝遇求治遂合龍腦膏一劑服未竭而
愈

養生論卷十五

上

忽有婦孺弱豐顧不言何證求余診視六脈疾數勁
急上大小三焦一部搏指之甚余但曰那得許
多熱來其厥良笑曰此一言與老醫之言何其相
背大其老醫曰那得許多冷來故服藥衣食並是

辛熱過暖之事疑其證愈加今當從先生之言請
為治之萬幸遂問其故則曰上焦痰盛胸閉脇疼
頭不能舉口苦舌乾精神煩亂寢寐恍惚兩頰結
核飲食不美凡百不佳於是乎令服痰痰圓八十
圓隨時清利相繼三次服之五七日間精神喜悅
談笑異常故五七日一次服九十圓至百圓每夜
嚙服龍腦膏然而病勢日久蕪開一賦風昔之疾
遂令服黃連解毒圓一年方愈遂終身不敢開此
藥

黃連解毒圓

黃連去蘂

苗本去內附

黃蘗去蘂

山梔子去蘂

右四味為末水圓如桐子大上焦熱食後服三焦
熱不拘時候

昔有士人弱冠未婚病遺瀝日久每作虛寒脫泄滑
之愈甚來求余診六部弦數不記至數人已骨立
不能自支余曰苦哉此三焦不利膀胱蓄熱五淋
病也患者曰膏血砂垢每溺則其痛不可勝言余
用局方五淋散加山梔子赤芍藥川木通瞿麥穗
蚬殼衣草滑石末大作劑入燈心二十莖煎服五

七日全愈無奈頻發自後侵晨人來告急云九日
便溲俱不通秘悶將死余即令用細灰於患人連
臍帶丹田作一泥塘徑如碗大下令用一柏厚灰
四圍高起以新汲水調朴硝一兩餘令化漸漸傾
入灰塘中勿令湯溢橫流須臾大小便逆然而出
溺中血條皆如指面若非熱解氣使則其如龜竅
之小何又連出三四日惡物復得回生再令服黃
連解毒圓前後二三載不下三四斤矣至今安然
不發嘗有村人以鑿冥錢為生頗溫飽一日家人
出游其入強自看家心下無事因行至竹下就取

養生論卷之十五

新筍作羹食之其意洋洋然樂哉遂囑納間忽為
一噎病至一載百藥不效家產蕩然余聞之以還
寬散令其煎服次日人來報曰患者昨已病極自
已津唾亦燕不下服藥幸而納之胸中沸然作聲
見此回生之意以棺木送終之物權且小停敢望
再惠前劑余問其幾日不入粥食則曰數日矣唯
有游氣未盡今得此藥可謂還魂散也余遂令其
搗碎米煮粥將熟即入藥再煎一沸試令啜之一
吸而盡再服數服得回生還寬散治喜怒哀樂憂
恐思七情致病吐逆不定面黑眼黃日漸瘦惡傳

為噎疾十不治一著

草撥

麥芽炒

青皮去白

人參去苗

苦桔梗去苗

柴胡去苗

白豆蔻

南木香

高良薑

半夏麵

右為細末每服一錢水一盞煎七分熱服大効忌
油膩魚腥粘滑此藥最妙余救人極多但少得全
生者其說為何蓋此病去死甚近纔得少減百念
復生由是中輟者多矣所得玩存者唯處子及道
流中數人而已後之患者當自裁之如或大便秘

卷之十五

十五

實者問服痰癰圓三十圓每日一服行津潤臟庶
得延行氣降以全前功若始因實証而噎者只依
痰癰圓法度服之以效為度救人及衆更不細述
有婦人疑其夫有外好因病失心狂惑晝夜言語相
續不歇舉家圍繞捉拿不定因求余治令服痰癰
圓八十圓即便伴睡是夜不語衆人皆得休歇次
夜再進一服前後兩次逐下惡物患人已知羞恥
遂酒飲食起坐皆如常不五七日能針指終是為
意不快余慮其復作陰令一人於其前對傍人曰
可憐某婦人中暑暴死患者忻然問曰你何故得

知說者曰我見其夫買棺材去也患者曰慚慚
愧由是全瘥余再詢其家人曰患者月水通否其
姑曰近來月餘不進飲食瘦弱羸劣恐無子余
曰血稍鮮時即來取藥次後來曰血間鮮紅矣即
令服婚合門中滋血湯止之再服本門增損四物
湯半月全愈更不舉發

泰定養生主論卷之十五

卷之十五

十五

泰定養生主論卷之十六

逸本相傳

歷用得效方

驅瘧湯 治一切久新瘧疾此方元自至元十五年
阿木都元帥南征之時因患瘧疾百法不效至於
維揚召官醫診之余親識石其姓者忽為有司驅
至帳前但見虎符已下官員露刃守衛元帥卧榻
石公身自謂必死既而傳命曰元帥又患瘧疾只
今便要安可石公憂畏之極信手撮成一劑服之

泰定養生主論卷之十六

即效大有賞賚及出身根脚後數年其藥僕從余
游宦南荒彼中官吏將校例苦瘧因獲此方隨用
即效遂大行於世復會維揚石公再請訂正石公
曰尚欠陳皮一味余從而用之則鮮效矣後悟其
相戲但依前法四味為的至今四十年矣

常山

草菓棧

知母去毛

貝母去心

已上等分每服四錢虛弱老人小兒只須三錢酒
一盞煎八分不可過熟熟則不效發日天明後
去滓執服滓以酒浸至將發前再煎執服奇效如

神不能備述嘗有婦人每日午後發熱聚醫百計
循經用藥日久愈重余道此四味令服醫士莫肯
聽從余曰此純熱瘧疾平日治之如探囊取物耳
勉其服之即瘥但人惡其酒氣余家親戚老幼纔
有瘧疾俱能服之元無惡味余因用酒先煮過常
山晒乾入藥只令患人水煎服亦妙不可例謂常
山為吐藥而不用萬萬無一人曾吐者蓋瘧者痰
疾也常山專能治痰有微吐者乃痰藥相敵而然
亦有自然吐者世俗命曰醉瘧豈常山之使然乎
通神圓出余家藏中秘方治一切瘧疾神效每常濟人四時

泰定養生主論卷之十六

不閱服者除生冬魚腥油膩粘滑外於藥百無所
忌余平生收方瘧藥最多但犯砒礪惡性相逐避
忌者並絕而不用唯此二方濟人絕妙

樹上自死乾桃子二七箇

豆豉末一兩

巴豆七枚去皮

右一處用新汲水為圓如梧桐子大硃砂為衣患
者發日天初明時面東念藥王藥上菩薩新汲井
花水吞下一圓立效每日發者連服兩日小兒服
者別圓大小不等者量與之

金黃散 治尿血出篋中秘寶方神效

槐花揀淨炒 川芎金濕紙裹煨熟各一兩

右為細末每服二錢煎淡豉湯調下無時立效

桃仁法一治炎瘡氣服

好新桃仁二升去尖 好阿魏二兩

右用老酒一斗同煮酒盡焙乾於絹袋內盛如入

炎瘡之地即每日空心爛嚼七枚酒下大妙

治蛇虎病毒蟲所傷出瘡中秘寶方

白礬一味溶汁

先看患處大小用紙燃作圈水濕過圍在瘡外令

著實留中間以糝雄黃末子即用紙礬汁傾

紙圈中瘡口上

時出毒氣黃水其上有紅

線紋縷亦即收盡如大股惡物所傷者隨即用繩

緊扎定瘡後毋令入腹然後之槍悴無雄黃亦可

此法濟人頗多

通關散 治一切口眼喎斜出篋中秘寶方

川烏頭生用半兩 青頭礬半兩

右二味為細末每服一字入葶管吹入鼻內出涕

吐涎立效須令患人嚙水滿口閉住鼻息庶得藥

不落患人之口亦不逆於吹藥人口也神效無比

金風散 治一切大風惡疾除鼻塌者不治

其餘又新見患服之無不愈者

淡豉為末 真水銀輕粉 枳殼末

右三味各抄小錢上二錢五更初煎糯米飲調下

至早飯下稍覺困倦欲睡不睡意思乃藥力搜風

故也逐下惡物後次服圓子藥

鶴虱圓 治瘧中治法如前不拘歲月唯以效為度

鶴虱二兩 治法如前不拘歲月唯以效為度

藥而地生 防風去氣 一兩地榆半兩

麻黃去節半兩 雄黃 兩別研 天麻半兩

右為細末以醋糊為圓如梧桐子大每服三十五

圓溫酒下三服忌鷄猪魚蒜粘滑油膩燒炙煎燂

胡椒熱物房事財氣能如苦行三年者十治八九

不然則雖效亦成中輟余平日素善人頗多唯田

夫野叟百無一有恨病愛身者一一奏功其餘稍

加縱逸者未甚全瘥患者宜自珍惜

大戟圓 治一切水氣疾蠱癥食積

大戟 兩 巴豆 一百箇去皮水三升

芫花 兩 甘草 乾薑

真陳皮去白 礪砂 薑黃

肉桂 各等分

肉桂 各等分

右為細末於小鑪內慢火炒令極熱不可焦煉蜜為圓如梧桐子大常服生薑湯下一圓如欲取轉量臍臍虛實加至七五圓兼治婦人諸般血氣余累用奏功雖積年之疾亦遂平復但當忌甘草湯藥為穩便

治一切氣腫大人小兒遍身上下腎囊虛浮鉗方

巴豆一百餘粒布包紫乳器提

右件候通手不冷不執用舊綿布浸於藥湯中令患人於無風寒處去上下衣袴裸體坐臥取前藥湯中布畧攪去水帶熱於一身腫處揩拭不拘遍

次三五次切不可犯乳竅并瘡疥皮破處其

腫即漸消減累用神效甚若再服後藥

桃溪方氣寶圓治腰脇俱病如抱一甕肌膚堅硬

按之如鼓兩腳腫滿曲膝仰臥不能屈伸自頭至臍中痠痛露骨中腕如溢四肢無力飲食無味氣積食積或通身浮腫並皆治之有孕婦人勿服

黑牽牛頭末二兩 大黃一兩半 檳榔

青皮去白各一兩 川芎 當歸

真陳皮 茴香微炒 南木香各半兩

右為細末熬皂角膏搜圓如桐子大每服五七十

圓如前方不效病實者加至一百圓生薑煨心湯下取瀉方效不拘日數瀉三五行見水為妙末則再加數圓如不忍瀉者不可治也一切氣血凝滯風毒熾盛或脚氣走注作腫疼痛大便秘澀或脚氣入腹心胸滿悶寒熱往來狀類傷寒並宜服

局方小七香圓治大人小兒停滯面食之毒或因

瘡疥遍身浮腫並用陳真蘿蔔子揀淨炒熟與藥

對停一處細嚼一貼小兒水煎服畢呷白湯一兩

口未效連日服之大便秘者兼服局方青木香圓

取利為度

神效五食湯圓治一切瘡毒遍身腫滿按之如

泥兼積塊年深癰癤服此藥並不食甘草

大戟半兩 猪牙皂角半兩 生用

其遂半兩 芫花半兩 出炒黃一宿性

胡椒 巴豆十粒去皮心膜醋煎三

右件除巴豆先研外並為細末入巴豆霜再同研

勻用水粘圓如菽豆大每服五七十圓至十圓夜卧

時水一盞入白米白麵黑豆生菜猪肉各少許煎

至半盞去滓溫送藥取去病根止服未效者加圓

數腫大段喘急者須是瀉去惡水方效忌油膩魚

脾粘滑婦人有胎不可服水腫泄瀉不止小便不利者謂之洪水橫流不可用之別用後藥

澤瀉木香散出論治濕熱內外鬱其水腫脹滿小便赤澀大便滑泄

葶藶

赤茯苓

猪苓

白朮

肉桂

木香

澤瀉

川木通

甘草

滑石香膠細白者研

右為細末每服三錢白湯調下服小便不多大便仍瀉者難治常服效

朝貴秘授神妙紫金圓 治諸般寒濕冷痺筋骨疼痛

紫金皮

鐵

光浮草烏

木鱉子

醋

桐子

右件用木鱉子膏按和前二味以醋糊圓如桐子大腎痛臨臥服腿痛夜深腹空服每服三四十圓加至五十圓前未小酒冷送下服後忌食熱物此方余少年時在湖廣省得之得此方者連余纔

三五人世間未審知否神效無比
素問控墨證苗香練實圓出論治小腸病結於腰上

而不痛衝心肺邪所系無一切寒熱疝氣所作累用神效種種異方無出其右者

茴香練子 川練子去皮核 吳茱萸去仁

馬練花去蒂根 直陳皮去白名 芫花醋炒

右為末醋糊圓如桐子大每服二十圓未效加至三五十圓空心食前溫酒鹽湯任下須一日前後不可食其草物世俗纔聞小腸氣便令服蠶葱散之類殊不知非止寒氣為病但是風寒暑濕中七情逆意事飲食壓下腎經皆能為此病若外腎不腫痛只覺腰痛連腹名曰內疝正宜服之大抵此

疾縱有神藥不過起疾而已欲去病根者未之見也嘗有病者發則痛陣內攻響聲百異上吐黃汁

瀉血片數升其勢方退亦用前藥奏功又有一證陰痛不已漸漸日久津液不行大便秘結數日不通遍身塊大小不等四肢如厥疼痛不敢轉側六

脉洪大實數飲食不進余用十四卷內袞痰圓一百圓熱水送下津行氣順大便即通再進一服三日履地如外腎疼痛煩熱引飲小便不利者用五

苓散加燈心二十莖川木通同煎服下部畏冷者仍用炒鹽一包更換隔衣溫存外腎消息服餌之

宜唯外腎腫大痛與不痛並難除治今選附後二方

治外腎腫大日長或疼不疼方 出抱朴子附後方

皂莢刺一百箇 糯米粉水調為大餅一箇

右二味俟賽社日各人付與一刺畢患人手持粉餅逐一於社人前取刺社人問曰簋甚惠人曰簋魁如是過求取一一問答以其刺逐一插在餅上收歸安頓閑空處候餅乾時其腫亦消如一社無百人者須託人方便計會兩三社人預免其還刺時間曰蕪甚一句

又方

九

又方用蕪菁菜根切碎搗爛敷腫處以效為度如無蕪菁菜根新杏仁亦可用

鹿膠其膠用諸名方余選精料品足成

當歸 木鱉子仁 知母

五倍子 細辛 白芷 各半兩

槐條 柳條各二十七根

右件除槐柳條外並切碎同作一處

好血竭 三錢 真輕粉 二錢 滴乳香 五錢

沒藥 五錢 好雄黃 四錢 當門子 二錢

右件各研細和作一處

松香柳淨者為歷青為末 右件二味作一處

真香油三兩同前八味入鍋於文武火上三上三落不住手用槐條二三條攪令焦色即用綿濾去滓再將油入鍋先入松香瀝青末不住手攪如欲滾沸溢出即取下火攪約一茶頃滴少許入水以手圓之不軟不硬即取下火將次六味徐徐而下急攪令極勻疑則再上火勿令再沸遂傾入大盆水中半日後以搗之漸漸軟和揉翻復如金系之狀再入水浸之有暇再揉扯春夏頻換水如急用亦

浸一兩宿如浸多日愈效每以大竹管隨意大小

十一

高一二寸填藥令滿而平兩面按油紙在上於紫火上急手揭下一面再上紙復烘次一面仍揭下厚則再用紙過為二箇如欲展火即印四五箇於大紙上奏成一片貼用治一切癰疽并發背瘡各依常法烘開候冷貼之生者即散熟者即穿逐敗生肌首尾皆可一切疔腫結核並貼患處一切癰瘡先用薑汁白礬入湯用鵝翎洗淨以牛蒡干葉或金剛藤葉貼瘡半日取盡惡水然後貼上膏藥克日安痊除小兒疔瘡外一切乾濕白禿頭瘡刺

去髮用香油攤薄煎餅一箇裹着頭上一飯頃即
用大膏藥去餅滿頭貼之一二次換藥即效一切
股股黃濕痒痛等瘡並洗淨搥乾貼患處一切打
撲傷損腫脹氣刺等病並貼患處頭疼貼兩太陽
赤眼貼眼胞魚尾際暴傷風冷嗽貼脊心牙疼刮
藥塞牙縫面腫者更貼面小兒疳痢等病用濕手
圓如葦豆大米飲送下三二十圓一切風寒濕痺
臂病貼臂腿痛貼腿且如腿痛貼痛處半日許未
效即以執湯露脚指在外從痛處淋洗至下仍以
舊布帛蘸湯連布放於膏藥蒸之令熱又用磁瓦
刮脚甲指令其透快不可大甚則其痛漸移下骨
節間然後如法貼之逐節可去上面一箇俟其痛
起至脚腕又貼脚心仍剪去脚指甲自然痊可常
有婦人因濕氣腿腫至腰膝大着連將油紙滿膝
貼之用前法趕下又貼脚心數日間脚心膏藥下
發一泡出黃膠水數日至老不發貼臂痛亦如此
法大抵膏藥大如患處方能敵病小而不着肉安
可整效也貼痛處好肉上即用帶執貼貼瘡即可
不執貼也隨意藥用無不作效余壯年常隨身不
闕雖道路遇病人即使與人治之奇效不能備述

余少年時嘗從士夫遊洛間每聞諸公嘆其不遇
一人善治背瘡者其說神異余察其人見為吾僕
及歸扣之則唯唯然一日自言某師遇仙得傳此
草雖六月間以手探之亦如冰雪忽日同一方士
來授余之別墅延宿數日忽日咄咄而嘆曰門前
幸有此仙草遂與余付於余余嘆而諾之曰此
即射干也方士曰某曾見藥淮西適值官司拿醫
出征遂竄入八百里山場內遇一老姥年一二百
歲自謂金亡避罪來此元完顏氏老姥也傳以此
草并壽星散專治惡瘡救人無數

地扁竹散即射干散萬金原花園中之物葉如
良薑其色切開如金之狀

射干為末

右一味每用抄末三字許溫酒調服病在上
即微吐在下即微瀉余用濟人其功如神仍用前
膏藥收斂瘡口

壽星散 專治惡瘡痛不可當者糝之不痛糝之即
知痛

大南星 一味為末

右一味如背瘡大痛 遍糝於上即得安臥不知
痛者糝之至於知痛即可治也

嘗有少年為大家僕忽暴客至被其父中肩甲間
 一股中臂一股脇之上外科敷貼即愈但患人晝
 夜發熱坐喘不能偃息瘡口痛極求救於余試觀
 之瘡痕如碁子大常如牛鼻濕潤無竅因用壽星
 散糝之則膿血逆然而出微微咳聲即便迸出色
 如丹粉與血片相雜即用布裝盛米一石枕其腰
 膝顛倒於床已可倒頭矣如是一日次出白膿又
 其次出清膿黃水數日其喘即平遺熱不已遂服
 小柴胡湯數日方瘥此因被傷透內血倒流入膜
 外一至於斯也凡治病者不可固執一端而誤人
 也

宋理宗長生小金丹 治一切病後食不服常及諸
 虛百損并常人脾敗或脾實不思飲食立效

沉香二兩末 南木香二兩末 練實去皮核

舶茴四兩 補骨脂四兩 粉草半斤

川續斷四兩 上等江茶半斤

右件為末和勻酒糊為圓如桐子大不拘時酒下

三十圓

九似圓 治伏暑喝變生諸證頭疼壯熱似傷寒寒

熱往來似瘧疾翻胃吐食似隔氣大便下血似腸

風小便不利似淋瀝飲水無度似消渴四肢困倦
 似虛勞眼睛黃赤似酒疸遍身黃腫似食黃

船上碗子硫黃

玄精石

甘草

白礬

盆硝

各半兩

寒食麪

一兩

右為細末滴水圓如彈子大每服一圓用熟水一
 呷許浸透藥然後大薑汁蜜各少許先嚼芝蔴

一捻熱下無時

驅邪散治天行 治諸不正之氣不

問陰陽二證頭疼惡心嘔意酸痛煩渴咽乾

並皆治之

陳皮

紫蘇

升麻

乾葛

赤芍藥

葛蒲

蒼朮

厚朴

半夏

香附子

藿香

大黃

黃芩

川芎

山梔子

甘草

枳殼

香白芷

右件各依法修事等分咬咀薑葱煎服不拘時

古今明訓二道

中行寅罪大祝出新片

昔者中行寅將亡乃召其大祝而欲加罪焉曰子爲我祝犧牲不肥澤耶且齋戒不敬耶使吾國亡何也祝簡對曰昔者吾先君中行穆子皮車十乘不憂其薄也憂德義之不足也今主君有革車百乘不憂德義之薄也唯恐車不足也夫舟車飭則賦歛厚賦歛厚則民怨謗無矣且君苟以爲祝有益於國乎則詛亦將爲損世亡矣一人祝之一國詛之一祝不勝萬詛國亡不亦宜乎祝其何罪中行子乃慚

夫中行子身爲國君而不能使大祝福其無道而況於庶姓乎昔武丁之時亳有桑穀拱生于朝史

桑穀拱生

桑穀拱生

占之曰野草生朝殷其亡乎武丁恐懼側身脩德桑穀自枯八歲之內重譯而來殷道中興帝辛之時有雀生爲於城之隅史占之曰以小生大國家必王帝辛殘暴遂亡殷國大抵妖祥之象禍福由人人之平生不論貴賤婚嫁筵宴寢食割積日累歲或命逢惡耀身犯災危則當謝過禳愆豈宜再傷物命貽卵之情愛生惡死與吾一也吾生他死是誠何心哉倘人以人而賤畜則天亦以天而賤人暴殄天物祭之誰享皇天無私唯德是輔但能返躬則慶有餘矣張丞相護法論云鬼神得佛

經聖號則脫血食幽冥鬼趣未能免俗者請事斯語不亦宜乎

毗陵石刻劉澆塘先生尊天敬神文

蓋聞非其鬼而祭之聖門所戒假於神以疑衆王制必誅敢述愚情少裨明見自有太極已肇一元既分三才而爲三乃播五行而爲五歲月欲其無易定爲三百六旬寒暑難於驟更次爲七十二候一言以蔽大德曰生其在人也或寒暑所侵或飽暖太過或起居之無節或喜怒之失中或醉而風乘或虎而邪入乃成癘疫各以源流氣相薰蒸人易傳染所以不能免者亦由有以召之倘於感受之初澄清厥念擇醫必審用藥必精幼小則乳哺者以時長上則侍奉者惟謹意之所惡勿置其側口之所嗜必度其宜又同居之人各敬其業勿相戲謔勿致驚呼身雖忙而滌濯洒掃不異平時心雖憂而衣服飲食不愆常度如此則真氣還而邪惡不已內志正而何邪可干乃不反之中第求諸外俚俗相扇淫祀繁興其一曰祭瘟所在市廛皆有廟貌或肖虎兕或像虺蛇或手足妄加或眉目倒置夫物各從其類而人必擬於倫豈天地造化之工作魑魅魍魎之狀況至貪者阜吏有不

取之賊至賤者乞人有不屑之食曾謂坱圠鈞播而乃饗餐盤餐理固甚明人可自曉至於用醫藥以救表裏亦須托環玦以決從違致取短捨長或當汗反下去生已遠就死固當所擲枯節朽根何異長挺利刃其次齋聖又其次樂神晝夜留連男女混雜彼冥頑之童附而為鬼鬼固不靈腥臊之巫降而為神神亦可耻妄言禍福次約醫愚性十餘只供一夕之須香數套僅充一焚之用其他誘取不使聞知固有婦欺其夫子隱其父其費無藝豈實有餘或典質而一縷無遺或假貸而倍徙計息以致貲產破蕩老稚流移深原其情有謀如盜又病者欲療而禁其服餌老者須肉而絕其肥甘投以符水不問證之陰陽聒以鼓樂不恤體之虛弱使生者不得盡其力死者無所伸其冤揆以刑律可坐故殺甚至姦欲遲而杜絕米往之親識言不驗而委其禍祟於先亡使和順之俗變為乖離孝思之心更為怨詈則誣蔑天理壞亂人倫其惡之盈非赦所及顧無十師之權以執有罪又無先聖之道以正群心徒抱拳拳未免誹謗倘能崇德辯惑曾不以人廢言庶刷神羞不累其聰明正直且瘳入瘼同底於富壽安寧

余少年時嘗過毗陵之東郊因訪故人適值其病遂見樂神諸誣旋舞作茶商水客之鬼唱幽幽魍魎之歌彼相誇尚其能曉則為旱樺船遶村誼譁家人良賤俱往觀之遂委病人在床中間猥褻難名甚至幸災之人陰託巫鬼須以太牢以為訟端不一二年間舉喪連訟家道一空後二十餘年偶得此文於姑蘇披翫之餘頗合平日之論文所謂廟貌者惟象有自來矣此乃五氣乖戾之義是必巫覡狀為厲鬼之形如曆法之喪門吊客之類是也耶為市民歸向之所初無大費齊聖亦可以清淨家庭符水或以為煎藥之用民情好銜聊表慇懃所云妄言禍福杜絕親識遺怨先亡冒禁烹宰脇誘破家余實見之如文所論義不為過人能以此鞭心勿墮其術則可謂智矣人之有病未免貽憂於親舊間故有保扶之舉中元則償願以病之時尚有勞復致傷之患况江南浙右之風正脫災救死之不暇而烹庖賽福者爭先倒屣迎賓飛觥列饌因循禍福之機大抵徼倖倖鬼許愿違盟巫祝豈知卜筮降附扶鸞動輒上卦况有僕厮市媪走卒之徒乘急撰造妖言以偽亂真欺誑士夫凡

愚憂慮厥識既昏孰能不信此以養生則大謬不可勝論往往妖怪不能自興必也憑託小人與之貫穿人之有病始於不謹攝養終於惑信妄為是故夭橫者衆如其病勢危變坐醫技窮大化將往者當忍苦含悲聽其委脫然後舉事庶免使其牽纏喻如將睡而有未了之念尚能顛倒夢想於展轉反側而况於死別乎此余慣涉憂患久玩異書深悉其理賢者甚勿惡聞試舉一端為率曩在江東見一老叟平生潔雅言行端方雖為市井之民實通古今文典耆儒偉士莫不加敬年將九旬視

養生論卷之十六

九

聽不衰一日微恙就枕家人不在既而忽見老叟坐逝於床子孫號呼以硬物幹其口久之張目四顧再三嘆曰可惜可惜吾正在杳然白光之中道遙長往忽為群鴉亂啄吾口不勝其痛而醒遂使家人觀其所傷復卧病數日昏沉而卒哀哉子孫不忍其死而使其受禽啄之難於冥冥之中則孰若生吾順事歿吾寧也昔者孔子畏於匡顏淵後至子曰吾以汝為死矣曰子在回何敢死此生不苟生者也曾子有疾召門弟子曰啓予足啓予手詩云如臨深淵如履薄冰此死不苟死者也關尹

子曰聖人不能使冬蓮春菊貧富壽夭與人同而不同其苟且饒倖之惑也生而得其所死而得其所以養生之道畢矣

原術

原夫玄黃之道在天曰理在人曰性在知曰心心之所在之謂志志之所成之謂術術為心之習氣也故曰學術然後有士農工商之趨向遊世名家之事業於是情動欲萌曰邪曰正周知萬事則心為謀主故曰心術心之為義有末有本故性為心之本心為性之末本為道之體末為道之用用動體不動末流本

養生論卷之十六

十

不流心術者天下之作務也不可一日無百姓日用而不知古者禹彙群居而不類是故孔子繼述堯舜之道下學而上達上為本下為末性為天道不可得而形容則覺之以孝弟示之以禮樂是道也以綱常為本六藝為末既嘆玉帛鍾鼓之熾盛羽毛旌旗之僭攘故老氏有強名之言後仁義先道德自本至末而致虛靜法自然下人壽夭之身而有長生不死之性是道也以無為為本有為為末及乎星冠霞服之高尚泥形執象之妄為故釋氏以死生為幻化恒河沙數諸佛如空中花亂起亂滅是道也以真空妙有

之書明因果而昧因果者害之藥石之書奪造化而
悖造化者害之巫祝之書交鬼神而誣鬼神者害之
是以天人迭馭本末背馳譬之口之於味也捨羊糝
之克肥而悅膾炙之爽脆故嗜嗜者焦唇爛舌不
以爲痛昏昏之情相襲成世甚至有頭童齒豁者則
亦不過如是而已欲望其提挈後昆不亦難乎悲夫
安得被褐之士吾以爲師事哉

泰定養生主論卷十六終

卷十六終

三

右泰定養生主論一編予得之藩叅東
臯冒公舊本但稱洞虛子稱中陽竟不
知作者名氏比讀匏菴吳先生集始知
爲元之吳人王均章之書也其畧云均
章名珪自號中陽老人生元成時年未
四十棄官歸隱虞山之下慕丹術尤邃
於醫年餘九十而卒又謂見吳思菴跋
及考之元史無其傳敏德吳公思菴集
無其跋蓋薄榮願慕高蹈之流而國史
家集遺之也所著之書凡數種此特
其一且長於繪事錢氏所藏虞山圖乃
其手寫隱居所有柴關丹竈藥欄之屬
亦以吳詩而知耳東臯公雅好醫術而
篤於奉親間嘗以是編及予知予有老
母也茲欲刻梓以傳又將推及予之心
以及于人人養生君子時一閱焉當不
待藏刀牧羊之悟其亦思過半矣夫
正德辛未夏六月初吉進士建安楊易謹跋

書泰定養生主論後

予少時多病已有世醫曹氏諱永壽字伯齡者爲族祖姑之子每從之請益間示此書問所自曰第閱之果有益他日必當壽諸梓以傳予心愛之不能舍輒令門下士錄謄珍襲出入與俱叨第後濫厠京官屢欲托同年爲郡邑者就刻而不果然顧其中魚豕相仍多未決擇則以待其人也間嘗質之大宗伯枕肱

養生主論後序

童先生都憲節齋王先生皆謂此書當傳惜無暇考誤耳比予拜

命來參閭議偶以公寓浙聞開化有儒醫徐氏諱繁者老矣不能致爰具禮緘書因乃姪錦衣君璫請爲校之既又申之以序予歸分守建中則有吏部進士楊君乾叔先是得

請終養於家予屬之曰子不可不知此幸卒成之乾叔與乃兄陶園先生恒叔

參互搜討彙括數月令人繕寫成書甚美予忽復得代歸憶徐錦衣言福庠有謝生廷最爲都憲約菴先生季子雅知醫因重託之廷最勉爲潛心亦數月而歸曰庶矣間有一二未敢予奪姑請傳疑可乎予未答則曰今天下豈無王隱君者茲爲濟世之實其終不得完復而遂已矣乎但未有以起之耳惟先生圖之適予祗慶

養生主論後序

聖旦趨

朝過建陽即以俸餘授孫令佐曰爲我刻之佐固有爲者則請付諸義民劉洪期再閱月而迄工又請予一言以諗觀者嗚呼是書果有益於世邪惡可無傳若無甚益無傳可也予之鯁譴則謂凡事親守身者必不可不知此也同年東沂陳先生德卿曩在閩視學亦嘗就正乃欲予職事之暇刪其繁雜成一家言

用補壽域言則大矣顧予無似愧弗能
也併以俟博古君子云
正德六年辛未夏六月十日戊子東臯
官鸞謹識



泰定養生主論十六卷 兩淮監政
採進本

舊本題元洞虛子王中陽撰其書論婚孕老幼陰
陽氣運節宣之宜並摘錄脈證方劑以資調攝取
莊子寧泰定者發乎天光及養生主之語名之前
有中陽自序及至元戊寅段天祐序蓋正德間兵
部郎中冒鸞所重刊也後有楊易跋謂吳寬集中
載中陽爲吳人名珪字均章自號中陽老人生元
盛時年四十棄官歸隱虞山之下慕丹術尤邃於
醫

南北經驗醫方大成不分卷

〔元〕孫允賢撰

中國中醫研究院圖書館藏日本寬永三年

刻本

附《四庫全書總目·類編南北

經驗醫方大成十卷》提要

金匱要略大論曰醫者專門方貴經驗言今方有傳世者其初學之士無不曉海內津要而能通從哉余既觀
文注錄氏因方集成後之各區續增宜明拔萃等方又謂之大成是皆經歷効驗有不待試而自見者中其
集之捷徑也然其方中體類混雜分門欠明俾我同志不無憾焉余自幼多病喜讀醫書暇日因取時方之症
帶類指方入條後選諸名方中有得奇効而錄氏未嘗採者與夫家世傳授秘傳集成編凡二十四卷目曰醫
大全要全集大全至末增多許多必倫今之所缺大全也。公集集成宗陳在叔三因方嚴用和氏濟生方而旁採
諸家之方也。△仁宗 元帝八主也。

今南北諸家內猶存林存秋而不言冬後也。△經驗見存。△淮南子曰神農氏百草之滋味一日而七十毒由是醫方
興矣。私云方道也。史記神農本紀曰氏有疾病未知藥石炎帝始味草木之滋與示其寒溫平熱之性神農氏臣
佐使之義。日而遇七十毒神而化之遂作
方各以療民疾而遂道立矣。

南北經驗醫方大成

宋文書堂新刊

△孟子方草下為孔子之謂集大成也
亦時中攻篇札記樂記皆有大有成字也
△集注存藝文志有九流醫家者非其數也
然雖難經口注序曰醫乃九流之也。又方
考序曰後世下著林林總總列九流
△元家景淵贈醫師買其文云。嗟乎。自有
內經以來醫者之職有司者凡二百七十九
家。四百有九部。一千二百五十九卷。不為不
多矣。

醫家者流所著方書何啻數十家。然用之可否。
中家收效甚寡。虞陵孫氏為此良醫。每閱諸方。
必取其常用功要者。名曰醫方大成。意使今之
醫者。雖行萬里。不致挾他醫書。而治病之要。瞭
然盡目其於衛生之心。豈小補哉乎。

△案此集成刊行之記也。宋序亦集成序也。大要附益方改題
而歸大成之時。用旧記而序而改集成為大成者也。

孟子中篇時子賤
受命豈曰小補之哉

全係詩云仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故此窮理之要易者陰陽而已幽明陰陽之變
 天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高下
 或問云或云今之推命之者皆以所生日時之天上星辰推算其生死安危无不節々必驗云
 案云地理故天文言陰陽之術也相命之者皆相推生死安危之昏明陰陽之昏也

今下條詩曰近取諸身遠取諸物云

東坡云臣為百工之長云

周礼以各冢宰醫師並列天官

范文正公曰儒者不得為宰相親為良醫蓋

濟民之功而亦云

神聖王巧見于六十一難亦素問至真要

大論王注鍼曰王巧某曰神聖馬氏非之

三因方卷五五科凡例云凡學醫識五科

七夏五科者脉病証治及其所因七夏者

所因後分為三故因脉以識病因病以弁

盡隨症以施治則能夏畢

予嘗謂人生一身六氣所主七情所感不能無
 疾賴前賢辨脉論證處方施治然後養生者得
 以自衛厥功大矣非如地理之術相命之書可
 以富貴禍福告人而求其驗否每未即見性醫
 之得效神速近見自衛遠可濟人謂藝之中庸
 以為甲昔人以與良相並言蓋有以也今之學
 醫固不能神聖而王巧政自罕見余雖非專學
 每觀其書所謂脉證治因不過以五行之造化
 合一身之理得其理則脉證俱在是矣因致諸
 書所載之方今人所用者無幾而其中固有虛

醫家未嘗不博考其說於常人所著方書又况於此
非下書所能盡載而諸書又非常人所能盡載
文江孫氏集諸方取功要者各以類編多為大
成各類之旨又取三因及嚴氏諸家之說而
為論度觀者得其說而求其方瞭然在目矣編
成求序錢梓以廣其傳使閱方者一覽而盡得
之可省蓄方之繁而行遠者亦可挾以自便或
可為衛生之一助云

清辛酉至治初元文江王元福序

△至治延祐年号也即仁宗長子愛宗

即位之年辛酉至治元年也州堂

日本後西元辛酉年自此至千九百零九年

重刊醫方大成論目錄

風	傷寒	泄瀉	痰氣	翻胃	頭痛	脚氣	諸淋	服蒲	虛煩
寒	瘧	霍亂	喘急	諸虛	心痛	五痺	消渴	積聚	健忘
暑	痢	秘結	氣	癆瘵	眩暈	五疽	赤白濁	宿食	癰瘤
濕	嘔吐	咳嗽	脾胃	咳逆	腰脇痛	蟲毒	水腫	自汗	陰癰

不亂精在分腠之間

又云脾之為病也

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

痼冷 積熱 吐血 下血

痔漏 脫肛 遺尿失禁

咽喉 眼目 耳 鼻

口唇 牙齒 舌

五藏內外所因證治 癰疽瘡毒

瘡疥 癰癰 折傷 急救諸方

婦人 孕育 胎前 產後

小兒 疳風撮口 口瘡重舌

夜啼客忤 急慢驚風

胎熱胎寒 胎盤腸 感冒四氣

疹痘 目錄畢

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

身倚不用而此為股不收此其所以為偏枯

皆從濕土生痰。生熱。生風也。故安道出。而命。予。主氣。主火。主濕。之不同。而。皆。人。主。風。之。不。合。而。卒。真。中。經。中。之。風。收。為。三。途。然。三。子。未。出。之。前。固。從。昔。人。而。專。以。外。邪。治。愈。者。有。之。故。夫。氏。又。想。至。百。卒。中。暴。仆。一。病。家。時。時。喘。痰。不。省。人。竟。語。涉。不。語。痰。涎。應。盛。其。為。中。風。之。候。不。過。此。无。是。者。非。中。風。也。夫。外。候。已。如。此。存。而。病。因。何。而。發。不。因。於。是。續。年。歷。試。四。方。病。此。者。不。因。風。濕。痰。火。扶。應。而。作。何。其。見。其。有。真。中。經。中。之。入。哉。夫。中。風。之。病。蓋。先。傷。內。而。後。感。外。邪。也。但。有。標。本。輕。重。之。不。同。耳。古。人。言。其。証。也。三。子。言。其。因。也。矣。

△區說云其肌肉偏小者呼為偏枯云

△區綱云凡病偏枯必先仆倒故內經連其於身

擊仆偏枯也後世迷失經偏枯非病之言一

以中風名之遂指偏枯為枯細之枯而非左

痺右廢之証習俗之弊至於如此也殊不知

仲景云骨節則痺名曰枯血脈凝滯不流則

以筋骨氣肉在氣以生故消不利手足不受

水氣氣故曰枯非細之謂也既曰累月漸

成細者間有之非可使指枯為細也

△案四風症散在內經諸篇金始合取而

為四風症其詳見前論

△至若去歲氏此說與前所未定

氣乘虛而入據前人所未定

會天拒邪亦不得其意不能執傷人

醫方大成論

風

凡論風者百病之長故諸方首論之岐伯所謂大法有風者治之風者之也

風為百病之長故諸方首論之岐伯所謂大法有風者治之風者之也
有四：一曰偏枯半身不遂二曰風邪於身無痛四肢不收三曰風謔者奄忽不知人也四曰風痺者諸痺類風狀此特言其大類而又有卒然而中者皆由氣體虛弱榮衛失調或喜怒憂思驚恐勞役以致真氣耗散腠理不密邪氣乘虛而入及其中也重則半身不遂口眼喎斜肌肉疼痛痰涎壅盛或癱瘓不仁

此其中有物

△素自尺六惕音逆驚自

△小學六勿身休振動曰驚惕

△樂五歲先言肝者風屬肝也。醫目以中風

入肝部

△翁今如合羽所覆。計明理命也。表熱

也。

△瘡有不能言曰痛也。色音皆自瘡

肺也。

△風命注注陽曲者謂隱在少曲之処也。腎

藏精外府交接今藏故爪薄精氣內

微故隱故委曲之夏不通利所為也。

△兩關

三丙作人迎。兩關脈。胃脈先備脈。

胃脈先備脈。胃脈先備脈。

△凡命注云牛吉胃風而未及他府者。胃胃為六府之長也。又云。胃來則寒物薄胃而陽不內消故泄利。

物驚惕恐怖治瘧之法。當詳其脈證推其病源

之原。若中於肝者。人迎與左關上。脉浮而弦。面

目多青。惡風自汗。左脇偏痛。中於心者。人迎與

左寸。脉洪而浮。面赤俱赤。翁翁發熱。瘡不能

言。中於脾者。人迎與右關上。脉浮微而遲。四肢

怠墮。皮肉間動。身體通黃。中於肺者。人迎與右

寸。脉浮滿而短。面浮。色白。口燥。多喘。中於腎

者。人迎與左尺。中。脉浮而滑。面耳黑色。腰脊痛

引。小腹隱曲不利。中於胃者。兩關脉並浮而大

額上多汗。膈塞不通。食寒。則泄。凡此風證。或

附子。去。如。方。

因。三。時。六。淫。也。皆。是。本。寒。故。身。計。冷。也。

附子。去。如。方。

△嚴氏曰若內傷七情而得者。法當調氣。不當治風。外因六淫而得者。亦當先調氣。後依所感六氣治之。此良方也。
至我八按既曰風邪又入氣。偏風散邪。理力當然。而止言調者。意其調因病而風。理不過調。其通暢。極達則氣自
復邪氣自行之義。惟乎不能詳也。況中風治法。豈止一端而已。

△嚴氏一州和宋底河之間人作活生方也。

△漢晉平帝記云。分卒時。泊史之間也。

△案以三味。搗鼻。噴者。治不嚏者。不治。

△海精云。擦塗也。

△方云。病人初中風。筋急。口禁。不開。便以

鐵物。開之。恐傷其齒。宜用烏楊肉。擦其

牙間。陰軟。則易開。

△三生法。南星。烏頭。附子。末。煮。

△玄珠云。風病。口閉。手撒。眼合。遺尿。鼻衄。如

針者。五藏氣絕也。蓋口開者。心絕。手撒者

脾絕。眼合者。肝絕。遺尿者。腎絕。鼻衄者。肺

絕也。若見二指用。工餘症。若面赤。眼黑。主陽

上散。腎水。及克心火。兼遺尿。口開。氣喘者

劫不救也。

△醫目云。五藏氣絕。連宜大料參。芪。煎

濃。湯。灌之。及磨下。艾。壯。灸之。亦可轉

生。

按六經。脈帶。浮。遲。挾。濕。則。脈。帶。浮。滿。二證俱在。
同。從。偏。勝。者。治。之。用。藥。更。宜。詳。審。若。因。七。情。六
淫。而。得。者。當。先。調。氣。而。後。治。風。邪。此。嚴。氏。至。當
之。論。命。卒。之。際。救。此。急。證。宜。先。以。皂。角。細。辛。搗
之。鼻。內。通。其。關。竅。次。以。蘇。合。香。圓。擦。牙。連。進。以
生。薑。自。然。汁。并。三。生。飲。俟。其。甦。醒。然。後。次。第。進
以。順。氣。之。類。排。風。續。命。之。類。所。中。在。經。絡。脈。微
細。者。生。入。于。藏。府。口。開。手。散。眼。合。遺。尿。鼻。衄。吐
沫。搗。頭。直。視。聲。如。鼾。睡。者。難。治。又。有。中。之。輕。者
在。皮。膚。之。間。言。語。微。寒。眉。角。牽。引。遍。身。痠。痛。然

丹溪曰仲景論傷寒矣而未及乎中寒
先指治胃大寒而昏用附子理中陽而安
其證然則得之矣曰傷曰中未聞有證其
異同因思傷寒有即病有不即病然其
非指經而入以漸而溫中寒則倉卒感寒
病即發而暴傷寒之人因其固有熱風
寒外來肌腠自密發為熱其初也用
麻黃桂枝輩發表而安以病體不甚壯
也中寒之人乘其腰膝踈豁身受邪唯
分經感寒熱可發溫補自解此胃氣之甚
虛也傷寒熱愈甚不死中寒若不急治云
生甚遠其証實蓋可見矣

△傷寒論注云寒為陰寒為病最為衆
殺毒房病。

△通鑑云按磁法殺戮無辜曰厲

△古文云飲色賊草拂之而色變木遭之而葉脫其所以摧敗零落者乃一氣之餘烈也

△素音又云酒之類極切寒故為良

△正傳云受寒必因腎寒必傷營血故徒知溫腎而不知溫血未有不金之功溫腎其附溫血桂枝

如蟲行目旋耳鳴又當隨證治之

寒○五藏之氣虛則寒者附子湯

寒為天地殺厲之氣故見於冬則為冰為霜
木因之而摧敗鳥獸各巢穴以自居氣體虛弱
之人或調護失宜便序道途一時為寒氣所中
則昏不知人口噤失音四肢強直變急疼痛或
酒酒惡寒身發熱面赤若有汗五藏之思者
皆能有所中也其脉多遲而緊扶風則脉帶
眩暈不仁兼濕則脉濡而四肢腫痛治療之法
只宜以葷附之藥溫散寒氣切不可妄有吐下

調神會
冬三月
水地於
馬注云
此之時
以寒水
地以寒
增君子
室如盤
之固也
實把大
人過此
避矢石

中暑者。陰証中熱者。陽証。東垣曰。暑熱之時。身熱之人。或避暑於涼。涼於深堂大屋。得之者。名曰中暑。為房室之陰寒所遏。使周身陽氣。不得伸越。多大嘔散主之。若行人或農夫。於日中勞役得之者。名曰中熱。乃為天熱。外傷肺氣。蒼木白虎湯主之。王安道曰。暑熱之氣也。皆發自中傷其邪。而為病。豈以一暑熱分為陰陽二証。而名之耶。其避暑於深堂大屋。及夜食藏冰。小涼之物。正所謂口得寒物。身犯氣之病耳。自前秋冬。即病。既症傷寒。然不可名中暑也。天氏云。其論固是。抑亦有未悉之旨也。身熱。按仲景傷寒論中。証曰。中明。即中暑也。

△忘家命曰。南方生熱。生火。生苦。生心。生血。生脾。心主舌。其在天為熱。在地為火。在體為脈。在臟為心。在色為赤。

△易曰。同色相氣相求。火性燥。云云。

△痿痺云。肺熱葉焦。則皮毛虛弱。急薄者。則生痿痺。痿謂痿弱無力。是謂痿痺。不得伸以行也。

如舌卷。喉縮者。難治。

暑之為氣。在天為熱。在地為火。在人臟為心。是以暑之中人。先著於心。凡中之者。身熱頭痛。煩渴。口燥。甚則昏不知人。手足微冷。或吐或瀉。或喘或滿。入肝則眩暈。頑痺入脾則昏睡。不覺入肺則喘滿。痿痺入腎則消渴。其脉多洪。伏一時昏中者。切不可便與冷水。并臥濕地。古法當以熱湯先灌。及用布衣蘸熱湯。發臍下及氣海。續以湯淋布上。令發氣。透微汗。後其熱自退。

△金不能平不搖擲不省人夏者濕厚一日汗者月也。應者暑也。俗名者凡症皆足相火甚而行令也。先以溫水化蘇合香丸次進黃連香薷飲加薄荷云△方者云搖者四肢屈曲之名指蘇合香指開握之義也。

案中暑卒倒袖珍方名伏暑。

△原自濕有二証。溫熱症多。濕寒症少。脈滑數小便赤澀引飲為熱。小便清自大便溏利身疼自汗為寒云。

△夏真熱曰人只知凡寒之威嚴不知暑濕之凌暗。感入於冥冬之中也。

以黃連香薷散五苓散。若薄虛者。冷香飲子。霍亂吐瀉。來復丹。二氣丹。夾食則用。胃苓湯。若挾風則其脉沈而浮。證有搖擲。當放黃連香薷散。內加羌活。煎服。却不可作驚癇治之多。致不救。此方乃嚴氏累用之。而有驗者。若放途中卒然車倒。急扶在陰涼處。搦道上。熱上於臍上。撥開作竅。令人尿於其中。以待求熱湯。升生薑或木絲各一塊。嚼爛。以湯送下。立醒。

所謂疎調孔通皆蘇合也。因挾云其脉虛又云濕者暑也。諸香皆以應為暑。脉大成以沈為暑。故有挾風則沈而浮之旨也。不若依林水石以沈為

○濕者水土之因。時暑以之。越脾湯。木防己湯。山連湯。

△大成敗者若陽治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中云

大草地草

△諸人書曰中暑有四候自汗也煩渴二脈脈三也面垢四也

△仲景曰治濕不利小便非其治云

△三四云消之不得猛行及灼艾泄瀉惟利小便為佳也

△經曰濕勝則濡瀉云

△林氏中而即病者傷寒也截肌膚至春變為溫病至夏一為熱病因謂之傷寒云

△通謂自有病者有瘡形并其目正其名察其形者備當始可以言治矣未明而早誤於人害未之有也理如傷寒此以病因而為病名

并也溫病熱病此以天時為病形而為病名也

內者皆起於陰寒或者通以傷寒林氏大

理林傷寒者原其因之同耳至於用藥則不可阿而施也云

按中暑即病不即病皆緣暑氣傷風

之人或為風雨所襲或卧卑濕之地遠行澆水或感山澤蒸氣或汗出衣裏冷則發清脾腎皆能有所中傷者腎者腰痛身重如坐水中小便不利者脾則四肢浮腫不得屈伸若扶風則眩暈嘔噦心間煩熱兼寒則拳攣痛無汗惡寒證暑則煩渴引飲心腹疼痛面垢惡寒凡感濕之證其脈多沈緩而微其證多四肢倦怠不舉法當疎利小便為先決不可輕易汗下并用火攻若有泄瀉等證又當於各類求之

傷寒

傷寒者乃陰寒之邪入於少陰也其脈微而沉也其證身重而欲得近衣也其脈微而沉也其證身重而欲得近衣也

愈矣元力考暑門參白虎湯方後曰暑陽邪也中人則傷衛衛能固護故汗出且惡寒云

此則傷寒之證也。傷寒之證，由氣運而得。仲景在治法後，人用敗毒散治甚得理。切不可作傷寒正治大行天下也。云云。指掌云：度房者，又非溫病之比。此皆寒者下調，時不正之氣。云云。小字云：古人言感時非庚之氣，通謂之傷寒。云云。難知。今傷於寒者，春溫蓋房室勞傷，辛苦之人得之。云云。

林氏云：今嚴冬為較房之氣，五類深藏。君子固密，不傷於寒。當陽閉藏，及動之，筋目之者，寒主入於腠理。傳於榮衛壯者，氣行不為害。怯者，着為病也。云云。

林氏云：邪乘虛經，自背得之，則入太陽。自面感之，則入陽明。不必始太陽。次傳諸經。云云。或寒邪首尾只在二經，或寒邪間傳於三經，不可以理推。云云。受病不同。云云。傳變不一。傳曰：寒邪之中人，各有定處。或中於陽，或中於陰。云云。惟寒邪之傳，往經絡，寒在定處。故東垣有曰：太陽者，巨陽也。為諸陽之首。膀胱經病者，渴者自入於本也。名曰傳本。太陽傳陽明，曰土者，名曰巡經傳。云云。太陽傳少陰，曰木者，名曰越經傳。云云。太陽傳少陰，曰水者，名曰表裏傳。云云。太陽傳太陰，曰土者，名曰誤下傳。云云。太陽傳厥陰，曰木者，名曰巡經得度傳。云云。

何汗者，傷風也。五十八難曰：傷寒有五，有中風，有傷寒，有濕溫，有熱病，有溫病。傷風者，謂之中風。即傷風也。云云。按林氏曰：有熱惡寒，發陽有汗，表虛無汗，表實。云云。林氏曰：在熱惡寒，發陰。云云。傳陽變陰，傷寒。云云。何曰：少陽主振實，即太陽主振已午。於此時發熱，邪未入胃，非潮熱。按宋中發者，謂之潮熱。邪在胃。云云。何曰：然潮熱為裏實，可下之。証或脈浮而緊，或小便數，大便溏者，實熱未全。府傳帶表邪，常和解其外。云云。變陰傳，自始扶弱人，可感寒濕，發熱不食，數日後不省人。言詭幻，神志昏迷，面青齒黑，脈沉細，此

傷寒之證，固有天疫流行，平時所感，病無漸少。云云。李相以者，然多是體虛勞役之人，冬月衝疔道途，不謹調護，以至為風寒所傷，其毒藏伏於內。云云。不即發見，或為熱，所發手搏然，後發而為病，故經云：冬感寒，春發溫者，是也。其為證，有陽有陰。有表有裏。又當知榮病不同，傳變不一。其發也，未有不自頭疼發熱，自汗惡寒而始者。若發於太陽，即熱而惡寒，發於太陰，即惡寒而不發熱也。云云。傳陽則潮熱狂言，如有所見，其脈多長，為變陰。云云。傳陰則手足厥冷，多有自利，其脈多沈細。云云。唯在息日

暗不了。云云。

傷寒之證，固有天疫流行，平時所感，病無漸少。云云。李相以者，然多是體虛勞役之人，冬月衝疔道途，不謹調護，以至為風寒所傷，其毒藏伏於內。云云。不即發見，或為熱，所發手搏然，後發而為病，故經云：冬感寒，春發溫者，是也。其為證，有陽有陰。有表有裏。又當知榮病不同，傳變不一。其發也，未有不自頭疼發熱，自汗惡寒而始者。若發於太陽，即熱而惡寒，發於太陰，即惡寒而不發熱也。云云。傳陽則潮熱狂言，如有所見，其脈多長，為變陰。云云。傳陰則手足厥冷，多有自利，其脈多沈細。云云。唯在息日

暗不了。云云。

暗不了。云云。

暗不了。云云。

暗不了。云云。

暗不了。云云。

證之陰証傷寒

△古通脾之脈連舌本散舌下

厥陰成元已傷寒邪在三陽則手足必熱傳到太陰手足自溫至少陰則邪熱漸深必四肢逆而不溫及至厥陰則手足厥冷是又甚於逆也

△自利 自利謂不經攻下為自清泄

△平表半裏 唯知如何是半表半裏者曰身後為太陽之陽身前為陽明為陽中之陰陽表裏

陰為在表即陰陽二分邪在其中矣治當不從標本從乎中治此乃治少陽之法也

△和解 唯知少陽証禁忌不可犯忌者汗忌利小便忌利大便故名三禁陽乃和解之制也

△評熱病命曰且夫熱命曰汗出而脈尚躁

盛者死

△仲景後漢張抗字仲景南陽人也世世

聖作傷寒命

△本草綱目曰其緩曰人弱者以入其代瓜

精氣、鮮瓜蒂也青者佳也

△耳鳴 本中曰苦寒以大豆為黃蘗且一斗

升似四兩者三日後附見冬五日成半熟如生

最五散香及天氣不和蒸炒酒漬服之至佳

△狂言 唯知狂言者大開目與人語

所求皆見之更即為狂言

傷寒為治雖曰有法又須問證以察於外切脈以審於內故在表宜汗之在上宜吐之在裏宜下之在半表半裏者知解之此固一定之法然又須考得病之日傳變之期方可施治下日至三日病在皮膚者為表宜麻黃桂枝之類驅散寒邪得汗之後脈靜為愈有汗不得服麻黃熱汗不得服桂枝仲景至切之論不可不謹四日五日之間病在胃膈痰氣聚於上當以瓜蒂豆豉之類吐之而愈六日七日之間其病入腹傳胃臟肺結燥狂言潮熱煩渴黃芩清之

△然仲景所謂熱者則厭厭也

陽明之熱也則生燥也

陰明之熱也則生濕也

△蘇定黃生云水漬法右以布敷數重新米漬

之指欲然水搭於背上須臾熱又清矣

煎用仍投易初水日數十易熱甚甚置

入於中熱勢終退則已亦良法也

△陽明病人身自腹滿而喘者陽明經也其下也

力考小黃氣滿方後天陽乘於心則狂熱

干胃則喘天明理命非我在我助喘也

心腹必滿不堅或腹滿而喘則又可下

△天府指大腸而言非口胃也

△不食李子連傷寒千勸云傷寒不思飲食自是常夏終在酸死之理如理中丸之類不可輕服若陽明服之致熱氣增

重或至不救

△示便消傷寒類要曰小便清者熱不在裏

△重寒一林曰熱反欲得衣熱在肌表寒在骨髓表熱裡寒此陰且湯次小柴胡加桂

表熱在骨裡寒在肌表此白虎加人參湯熱除次各半湯

之而愈市今治法摠曰如此却又有得病之

便四肢厥冷者為陰厥欲絕者丹由氣海穴灸

之又有經曰微厥而後發熱者為熱厥熱甚舌

黑鼻燥者今人多以水漬布帛重搭之於胃

頻頻更換以拔去熱氣亦良法也又有不厥而

即變陽證或胃腹脹滿牽引疼痛坐卧不安胃

氣喘息則又不可拘以口數即宜下之又有示

七日太府結燥上不能食其脉細緊皆曰當下

却有頭痛惡寒項上有汗或小便清利乃表證

未除仍宜汗之或裏寒表熱或裏熱表寒皆當

馬氏為記

虛動虛動法不切四時應泊方思下他國未經下者非結實乃表邪傳至腎也方考欽四之
方考曰如天地不交而成否故曰痞痞林曰屏不能行氣於四臟結而不散為痞痞

車指方曰按之則痛爲小結宜不按而痛爲大結

并尋開脉沈心下滿而不硬按之不痛名曰痞。痞不滿不硬。但結胸者非痞。船之支飲。

○譚語規智狂言者大問目與人語未嘗然
熱命注曰譚語謂妄謬而不次也楊上善曰

多言也明理俞曰傷寒鄭声為邪音也

孔子曰魯郊之者亂雅承也又云輕語也

△明理台曰。讀者。越呢喃而語也。又作謠云。
會呢喃。語不了。又燃語。

香作班
 會班別也。沒也。通作班。
 班班文也。雅色曰班。

捐壹日 多生 五日可治 六七日不可治
捐壹月 多生 又十无一生。

証言云。瘡瘍疾者。以毒者不升。陰陽錯謬。
 汗下。置房不解。壞證亂經。天傷寒過經。然謂
 瘡用。病候數變。久而不瘳。陰陽無從紀律。特
 此壞病云。

先救其裏後治其表應汗而反下之則熱畜於裏或爲瘀血發而爲狂證者有之結而爲痞爲結胃者有之結胃者心下緊滿而痛按之如石手不可近痞者但緊滿而不痛證雖相類用藥却有不同若應下而反汗之則津液枯竭又有亡陽譫語者譫語爲實鄭聲爲虛若應吐而反溫之則毒氣鬱結於胃發而爲斑其色如錦紋者生黑者卽死臨證用藥若不辨其陰陽觀其傳變審而行之則必致錯亂恠證百出流而爲壞證傷寒甚至不救以此傷寒一證不可不謹

病愈之後切

林曰：病後勿早起，抗風，洗頭，浴，多食，用心，皆令勞役。忌酒，山嵐，瘴氣，消之物，不可過飽。令食積，按此外，有陽易陰易，安勞後求之証。

林又云：病新瘳後，未滿百日，氣力未平，後而犯房室者，皆死。

食中

王隱云：世傳以寒疾，脚氣，食積，虛煩，四証，乃傷寒，然以形証，較之，亦宜門証而已。此中，中者，瘳後，口大，証也。

食中

食中，或時，或後，或出，或陽，或直入等也。

食中

食中，傳經之不一，或變陽，或變陰，或壞証，或不治，或後等也。

食中

食中，流注，宋季知先字允蒙，損傷寒，謂此，始成敗，便在此，謂同名，治人，有指。

食中

食中，傳經，傷寒，論而即，謂名，傷寒，不即病，寒，每應，則，應，在，春，變，為，溫，病，至，夏，亦，為，暑，病，此外，有，四時，感，冒，新，受，風，寒，之，輕，証，而，見，腹，痛，休，痛，惡，寒，發，熱，示，証，非，時，變，傳，經，重，病，之比，今，借，仲，景，治，傷寒，之法，以，治，之，吳，非，仲，景，之，立，法，之，才，意，也。

意也。

病愈之後切不可輕用補藥，尤忌房室勞傷。食過度，憊困之，再作，未易治也。致有脚氣，痰飲，食積，虛煩，四証，與傷寒相類，更宜審之。但脚氣則脚膝軟痛，卒起，即倒，痰飲則頭不痛，項不強，食積則身不痛，左手脉平，和虛煩則不惡寒，身不痛為異，決不可有誤。作傷寒治之，其中變易非止一端，茲略舉其說，以備倉卒。其詳又當於仲景論中，千金百問內求之。且感冒本與傷寒治證一同，但有輕重之分耳。故重者為傷，輕者為感冒，之中有風有寒，又須詳別。夫感寒則

軟

傷寒論中引清湯四外傷介愈論曰傷寒則面色赤其前軀後軀重其肩而有力者乃有余之證也
傷風則面色黃其前軀後軀重其肩而有力者乃有余之證也

沈氏或說當作緊數不用也

和解凡寒熱解之儀其表裏和解之謂也

會元氏按或云或然此一疾有寒有熱也
原論注云云此處之儀也

案此存應平六名三內又謂有痼疾思
原一病一症一時而存矣

原論曰但熱而不寒者陰氣先絕陽氣後
原則少氣煩躁手足熱而欲飲也名曰瘧

瘧疾之類也

必惡寒面色黧慘項背拘急亦或頭痛發熱其
脉沈遲當以五積散養正氣散養胃湯表散
之感冒則必惡風面色先浮身體發熱如瘧
塞聲重時引清涕或咳唾稠粘其脉多浮數當
以十神湯敗毒散治之或風寒兼之又當用和
解之藥體虛之人不可過於發散恐致他疾并
述于後審之審之

瘧

夫瘧之為疾名狀不一有所謂瘧瘧寒瘧溫瘧
食瘧乾瘧狂瘧名雖不同皆由外感風寒暑濕

秋

先寒而後熱也病以時作故名曰寒病。

△先熱而後寒也亦以時作故名曰溫病。

△三因云病者寒熱相侵而不能食已支滿

腹急心煩身痛病以時作名曰溫病。六府元

痛惟胃有者蓋飲食飢飽所傷傷胃氣成

此謂之食積。全寒食積之症諸君之說不

同方者胃之食各有症治。又為二症也。

△此一症不熱方考有知良方案大成

作寒多熱少即陰一也。

△此一症自先熱而後寒或但熱不寒。案

大成作熱多寒少即陽一也。

△應濟云三陽者多熱而亢亢者三陰者寒多熱

少而夜發故有陰陽壯壯之一也。

△三因云陰病一抽熱風一先熱此病元熱外

諸一皆先寒後熱云

△察病云脈數者寒熱俱發下之乃愈也。

△脾胃曰所謂無度不成病。此謂胃氣不和痰積中脘而成病則自內而生病於外也。若素問凡暑外傷與然外既受傷。

一則內氣必鬱亦生痰由自外而生病於內也。痰而夾痰誠有之矣其引以無痰不成痰之一句則失之於偏也。

之氣與衛氣相搏而後成之。雖經云及傷於暑

秋必痲痺然四時有感冒損七情飢飽失時致

令脾胃不和痰積中脘皆成痲疾其初發也久

伸畏寒戰慄頭痛或先寒後熱或先熱後寒或

單寒單熱或寒多熱少或熱多寒少。下日一發

者易治。下日三日一發者難愈。痲脉自弦弦數

者多熱張連者多寒弦而小數者宜下弦連者

宜溫得大者宜吐治痲之法當先發散寒邪不

可驟用截補之藥若截早則補往邪氣其證變

異或成浮腫不能即愈致成癆瘵者有之發散

四寶湯散

脾胃虛弱宜用七情六淫水火調也

王注云痲

痲也馬注

云痲者

痲之結

也王注曰

乃光痲不

然云云

全云元振

有七情感

動筋氣成

痲之合司

謂痲子古

△要言曰：師曰：瘧脈自弦。數者多熱，弦遲者多寒，弦小者下之，弦大者不可發汗，針灸也。浮大者可吐之。強數者風發也，以飲食消息止之。
 △脈經曰：微則為虛，代數則死。
 △至云：淺則日作，深則間之。

△病源曰：瘧瘧者，此病生於嶺南帶山瘴之氣，其狀發寒熱，休作有時，皆由濕源瘴毒之氣故也。其病重於傷暑之瘧。

△瘧曰：感暑而預防之。見既清象

△瘧疾六仲景以河州帶下，其同論治，故厚人諸書，或言帶下，或言痢，或言河州，今者凡例，甚在岐一，故以下水各著為帶下，願讀者為痢，故為明白。

之藥。熱多者宜小柴胡湯，參蘇飲，清脾湯之類。寒多者宜養胃湯，四獸飲，發散不退，然後以常山飲勝金，圓截之，截而不愈，久則脾氣虛敗，唯宜多進養脾驅痰之藥，脾氣一盛，自然平復。此證既愈，尤當節飲食，謹勞傷，防其再作。如煙瘴之地，居人常患瘧疾，又當隨其方土，所宜藥性，施以治法，客旅往來瘴地，常宜服平胃散，革菓飲，先以防之。

痢
△瘧疾六仲景以河州帶下，其同論治，故厚人諸書，或言帶下，或言痢，或言河州，今者凡例，甚在岐一，故以下水各著為帶下，願讀者為痢，故為明白。

今人患痢者，古方謂之帶下，是也。得病之由，

因脾胃不和飲食過度停積于腸胃之間不得

轉動而成其病皆熱俗以痢白為寒誤也

熱生疽瘡的出白膿可以白為寒乎

△丹溪曰赤痢屬血白痢屬氣赤白相雜血

氣俱病皆濕熱為本

河間云下痢赤白俗言寒熱相兼其說心誤其

知水火既濟寒熱者指權衡也高則必下盛

則必二寒豈能寒熱俱甚於腸胃而為痢乎

知熱瘡瘍而出白膿者豈可以白為寒哉

△蓋我示辨赤白分於熱之說河間命之甚詳

其云風下清血濕下且黃汁者蓋謂凡傷

肝心主血故下清血者為凡也濕得傷脾會

為五泄之海食物不受常兼四散黃汁之

色如五色之相雜故下且黃汁者為濕也又云

治法當先通利此迎而奪之之義若有虛

者亦宜密之使果有積滯在腸胃者方所當通利然嚴氏謂曰豆餅等藥使用之於傷冷物則可若用之於熱者為害非輕又

云凡則祛逐所謂祛逐者果何法何藥故若以邪氣當祛逐則豈独於凡而寒溫熱為不可耶

△心法云餅米穀治痢疾之功最急亦人如劉潔可成之

△通評厘實命曰腸澼下白沫脈沈則生浮則死腸澼之屬身不熱脈不躁則瀉大者生熱瀉者死腸澼便血身熱則死寒

則生

△脈式云凡下痢之脈微小者生浮滑者瀉瀉則

詳審之

因脾胃不和飲食過度停積于腸胃之間不得

冠化而又為風寒暑濕之氣于之故為此疾傷

熱下痢則赤傷冷則白傷風純下清血傷濕則

下如豆漿汁冷熱交併赤白兼下又有如魚腦

髓者治法當先用通利之藥蹀蹀腸腑積滯然

後辨以冷熱風濕之證用藥調治熱赤者清之

冷白者溫之風濕者分利之冷熱相兼者溫涼

以調之仍須先調助胃氣切不可驟用瀉藥殺

訶子之藥止瀉之使停滯不能蹀蹀未有不致

危者凡下痢之脈宜微小不宜浮洪宜滑大不

合經曰如

肥者半死

半生

也

下

不

腹

積

不

明

分

利

之

下

而成久毒則宜化毒以保衛之

後隨寒熱溫涼以調之。

此言水火既濟主運化生血生氣以充四體者也。

開食。即心虛却快。名曰氣嘔。痰涎症病者。

並山名曰炭吧。

五指南其病者心下滿食入即嘔血隨食出者

又云病者胃中寒心下液々四肢厥冷食即呃

今益病者胃中扶熱煩躁聚結經法食入即

之不可一槩而論也

嘔吐各半為

肺流腎肝膨石珍飲食不下當以潤肺之藥

胃弱胃虛腹脹胸悶不思飲食
入即吐飲食難化食而嘔吐者曰食嘔此由
飲食傷脾宿食不化之所為也

△區區三三內熱曰煩煩者心中煩也非熱曰躁
躁者外熱躁也內熱為有根之火故但煩不
躁及先煩後躁者皆可治外熱為無根之火故
但躁不煩及先躁後煩者皆不可治

△金氣此篇并心痛門損傷經絡之語意蓋
損傷心包絡也夫包絡者心外之膜絡也吳
起邪客於心包絡之外經大或經絡即外經之
謂也非謂經絡絡也 按此篇有胸膈
疼痛此指此胸膈內攻伏胸膈氣門治

△要言曰懷吐者曰恩阻
△易因九三用于酒食 云 合命晉

△論主癰疽初水和飯也△會元謂時食也本少食今大作癰疽其云水澆飯也
△四氣神神論主水注云音孫食不化而腹出也又曰喉泄者水谷不分為利也

△論主動良 案至義引三因厥氏云而舉發泄等六名中有泄泄而無清泄泄
情者似及洩作瀉者也直格方瀉池大侯孫澤 △六元正紀云泄瀉則瀉泄注瀉
泄水利也 △瀉泄瀉下如瀉也 案此云水瀉入胃名為瀉飲所泄瀉飲水瀉下
後瀉而為此其某症當大瀉 △主義云和曰夫暴泄瀉水不止內經曰注下也
注下水利也 △水谷注下見臣欒 △初與命云大腸者傳運之官

之挾者則脈弦數煩躁而渴又當清瀉之傳食
則消化之痰聚則順氣溫胃停積者多由憂思
過度損傷經絡其脈實大者難治虛細者易愈
嘔吐之證名狀不一至若胸膈內攻婦人懷妊
中毒因酒俱有嘔吐又須各從其類以求之此
證決不可輕用利藥唯腹痛胸脹視其何部不
利然後利之三因詳論及此不可不審

泄瀉 嘔吐手足煩者五瀉

泄瀉之證經中所謂發泄泄瀉泄洞泄瀉泄泄
水穀注下是也大腸為五穀傳送之官脾胃為

傳運之官
有汗不可下
泄之故也
三因已下
十六字則
本元之也

脾胃不養大腸全傳運之
穀少主泄瀉者此

一切痼疾，如風寒暑濕，之氣所中，皆能令

俗解為痢，痼疾相同。

合胃湯，王執中按此方，各口治凡其寒和血之禁也。

合蘇麻同，按青白，鹹，合為一方。

弱飲食過度，或為風寒暑濕，之氣所中，皆能令
人泄瀉，如傷於風，其脉必浮，下必帶血，當以胃
風湯等驅散之。如寒氣所傷，脉必沈細，腹肚切
痛，下必青黑，當以附子理中湯治中。湯等溫脾
之。若傷於暑，則脉沈微煩渴，引飲其下如水，當
以五苓散來後丹，以分利之。或來食則又當以
胃苓湯下蘇麻圓，若濕氣所中，其脉沈緩，腰脚
冷痺，小便自利，不渴，其下黃黑，色當以滲濕湯
藿香正氣散調之。因停食而泄者，下必淡類，拖
壞雞子，或噦氣作酸，先服感應圓，推其食積而

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

金附子湯方

後理脾氣體虛弱及年高之人脾氣虛敗而自

利者又當投以四柱散寇附圓若脾腎氣虛清

晨泄下二次二神四神圓主之又有腎氣虛

而泄者又須金鎖正元丹以固之凡治瀉之法

先理其中焦分利水穀然後動下醫之太法如

此若脾氣泄瀉各以類求之滑泄一證最忌五

虛五虛者脉細皮寒少氣前後泄利飲食不入

者是也若得慶邪入胃泄瀉止則可治也

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

霍亂之證多兼平吐瀉皆由飲食不節或過食

乳者牛馬羊水生乳也。酪者煉乳也。本經

造酪之法詳也以乳成酪則不分生熟可也佛說有乳酪酥熱酥醍醐之五味皆資淨之滋味也

△國難重於君，救難迫死在頃刻，俗尚抗勝沙。

忽然心腹絞痛手足厥冷脉沈細或沈伏

欲吐不得吐欲瀉不得瀉腸中隔外降

不通急用煎湯探吐及刺委中穴出血治

用理中湯加枳，慎勿用米，誠補作邪氣。

難治。直待吐瀉後。方可用清米粥。補接元

氣者吐瀉不出——死症也。

△至我嶺以日治霍亂轉筋藪一犯去而腹水

三升煮二升放溫熱洗之 茱萸命銀絲方

煎服之云

△傳曰脉洪大者為熱八四云熱多洪滑云

△陳氏云紫筋失養必致窄縮甚則炸絡

古書為唯泊△全聚郊舖古巷者殿所之

絕症也內經唯經俱云余今大成此命與中

寒門野維古寒之誦意盛元陽表絕而

寒極也故難治

會食也親也

醫部彙編
醫方類聚
卷之四

胎前乳後之物傷于五臟停積胃脘脾弱不能

五、此乃為氏之流。其功於世，其德於人，其

運化又爲厥寒之氣於干陰陽隔絕推積成

而成此證。輕則上吐下瀉。兩腳轉筋。甚者過體。

東方發土寒痛手足厥冷苦次色皆青卒之然

申所用拜拜三皮屏以者各縣者各立二所

宜於臍中灼艾及用蓼一把煎湯泡洗次投以

付賜聖中賜之類其求共大者所台求散

上
江ノ二類
江ノ二類
江ノ二類
江ノ二類
江ノ二類

縮舌捲者難治又有霍亂而不吐瀉者止其類

吐不吐類利不利頃刻之間便致懸絕當多灌

漢易也其水スル百金、合其財、後人焉、成

睡夢中其心吐宿食然物以麗血力若此

中湯治中湯欬欬之既愈之後煩熱多渴者

四月溫霜

忽忽時心

版疼痛

上吐或下

一遇或吐瀉

一、有作接外

不安四肢

厥五六脉

洗飲終站

名

卷之九

永安

手足須微冷脉魚豆小切不可用藥附熱
禁治在暑症香餅飲內治之。

合元唯云三焦者水谷道路氣之所終始也。
張氏云水谷自上焦而入自下焦出也。
林氏按養中理致致邪氣客搏三焦氣約
運轉不行則二便為之閉結矣。

合三元子於例曰凡於脉須識脉息兩字脉
者血也息者氣也脉不自動為氣使然。
合元唯俗解

以麥門冬湯調之及月中暑亦能令人霍亂吐
瀉臨證後當詳審。

秘結

秘結之證不問氣虛體實之人攝養乖理三焦
氣滿運轉不行壅結於腸胃之間皆有秘結之
患。有風秘寒秘氣秘熱秘濕秘及因病發汗利
小便過多以致津液枯竭并婦人產後失血耗
氣之餘皆成秘結。但當審人氣體虛實脉息沈
數若何然後用藥治療之法熱實者通利之寒
虛者溫行之氣結而澀者潤滑之風濕而秘者

○三焦水谷道路氣之所終始也。
大元唯俗解

死云
病入厥者

△蓋我華子扣坎與坎全一應之說而其後其說皆與
與嗽字兩字義內經已作一症此言之既詳大
抵嗽者氣動也陽也嗽兼血也陰也此其本
與殊其標則也故世俗不以為疑唯聖古究
內經微旨其義見下病機全舉云飲謂无痰而
有聲肺氣傷而不消也嗽謂有聲而有痰肺
濕動而為痰也咳嗽謂有聲有痰也因傷肺氣
動於濕內故而有嗽也。

△十四經云肺之為候六葉兩耳內垂如蓋故為五
肺華蓋也。

△三因云傷風咳者情寒壯熱自汗惡風口乾
煩躁傷寒者情寒發熱无汗惡寒煩
躁不渴。

驅利之津液枯竭者補益之臨證更宜詳審
實用藥不可一槩而論

咳嗽

肺為五藏之華蓋聲音之所從出皮毛賴之而
潤澤腎水由滋而生養腠理不密外為風寒暑
濕之氣所干皆能令天咳嗽傷風則肺洩憎寒
身熱自汗煩躁鼻引鼻涕欲語未竟而咳傷寒
則肺緊而無汗惡寒煩躁不渴遇寒而咳傷熱
則肺數而煩渴引飲咽膈乾燥咳唾稠粘傷濕
則肺細咳則四肢重者骨節煩疼又有七情之

以應風寒者為初起之際凡
寒俱憎寒者也。

△欬命以咳之狀咳則心痛喉中介介如梗
狀其則肺腫喉痺介介並入聲。王注云甲乙

經介介作喘云云

①會點分 ②品點切持也。以介介若河此
有義云介介似邪邪也。若介介出伴似也。

③同音 ④介介如邪凡 ⑤介介若臨切
⑥介介如邪凡 ⑦介介若臨切

⑧同音 ⑨介介如邪凡 ⑩介介若臨切
⑪同音 ⑫介介如邪凡 ⑬介介若臨切

△經曰在腹咳經久不已傳六府云

△馬注云心咳不已則小腸受之小腸之下即大腸

也。今咳則下失其氣其氣與胃咳而俱失也。

△肝咳不已則膽受之膽脈從缺盆以下貫中

胃故咳則出酸汁其味苦也。

△王注肺脈氣而息故咳則喘息而喉中

有聲其則肺絡逆故喘也。

△馬云大腸之腑入於肺經則下為傳導之用故欬則遺失食物也。此三焦乃上中下三焦也。上焦在於胸中中

焦在於中脘下焦在於小腹夾皆在於腹故腹滿不飲飲食也。

氣傷于五臟六腑要方選越于肺經亦能致咳
喜傷者咳而喉中介介如腫狀不已則小腸
受之咳狀與氣俱失然傷肝者咳而兩脇下痛
不已則膽受之嘔吐苦汁思傷脾者咳而右脇
下痛引至肩背不已則胃受之嘔吐酸沫傷
肺者咳而喘息有聲甚則唾血不已大腸受之
咳則遺屎恐傷腎者咳而腰背相引痛不已則
膀胱受之咳而遺溺咳而不已三焦受之咳則
腹滿不欲食治勝之法宜詳審其脉證若外感
邪氣止當發散又須觀病者之虛實用藥若內

金傳云消痰嗽治痰為先治痰順氣為主

金丹云經曰諸病皆屬肺金而肺

對則以燥為盛則生痰又曰有痰則

塞津液不通水飲停留結成痰

△方考云水飲入胃不升反化肝則不能

傳于脾中下二焦之氣壅滯結持

飲稠則曰痰

△治生力云人之氣血貴於順則津液

決而痰飲之患

△至抗嚴氏曰人身元氣上之痰天下元逆流

痰之說乃有痰之類水柱下時

因七情而得者又當隨其部經與氣口相應脉

浮緊為虛寒流數為實熱弦澀為少血洪滑則

多痰咳嗽之脈浮大者易治流微者難愈大緊

以痰為先下痰次之又有停飲而咳者又須

消化之切不可輕用罌粟殼等藥滋之又有寒

邪未除者亦不可便用補藥最忌憂思過度房

室勞傷不問多痰痰疾之證謹之謹之

痰之說
痰之說也原於者痰之動也也

人身之痰如長流水貴乎順行又賴土為之堤

防偶為風所激或為物所壅滯則使有聲可以

摘要治本
者必以曉
防之公同
札注限防

雖可便通結痰一服其效大出於水可至
過今庸醫其來此我天每口誦以語人
可悲矣。

△方考曰：肺難者，痰火內動，如粗食在胃，令人不自安也。

△常曰：振寒而動，即怔忡之別名。

△并提云：痰飲留於胃脘，則嘔瀉而作寒熱。

△至抗云：古方謂四飲生六症者，即四飲伏飲，留飲也。或云五飲者，即留飲伏飲合為二症也。

△千金曰：當汗出而汗不出，身體疼痛，在四肢水，非可汗也。

△又云：自強口者，短氣也。痰云：是似喘而不喘，有似呻吟而無痛者，短氣也。

△傳曰：兩溫之使，痰有聚之積聚，故為留飲，濕府之疾。

△又云：自強口者，短氣也。痰云：是似喘而不喘，有似呻吟而無痛者，短氣也。

過額故痰之為疾，或由脾土虛弱，不能攝養金，肺或為四氣七情所干，氣壅痰聚，發而為喘，為咳，又有水飲停滯，胃膈亦能為喘，為咳，為嘔，為泄，為眩暈，心嘈怔忡，為寒，乾為疼痛，為腫，滿掌，為壁，為癰，閉，痞，脹，皆痰所致。古方所載四飲生六證，懸飲者，飲水流在脇下，咳嗽引痛，溢飲者，飲水流於四肢，當汗而不汗，身體疼痛，重飲者，咳逆倚息，短氣不得臥，其形如腫，痰飲者，其人素盛今瘦，腸間漉漉有聲，留飲者，背寒如手大，或短氣而渴，四肢歷節疼痛，脇下滿，引缺盆，欬嗽。

山是宜水之性也。

生薑五錢，白朮五錢，桂枝五錢，甘草五錢，水煎服之。

生薑五錢，白朮五錢，桂枝五錢，甘草五錢，水煎服之。

△明理命云振者振然若水然振動者是也。

△至云使氣比滿氣順則痰自下之說蓋以人之七情前結氣滯生涎聚為痰飲治若能使氣道通利則痰自降下也然有病入元有痰積其氣因痰而結滯者宜但理氣而痰能自行耶。然先逐去痰結則津氣自行豈可導主一說。

△活生方云王叔和云腎寒多唾蓋腎為水之官。腎能撥水。腎氣溫和則水液運下。腎氣虛寒則邪水滯上其間用山茱萸山茱萸取其補附子肉桂取其溫熱各以酒取其利理亦當矣。

△條升云問經之用方皆言主之後人則云專治兩意同不同主之者求之以極紐也。專治則以人以為解性也。

轉甚伏飲者膈滿喘咳嘔吐發則寒熱腰背引痛眠淚流出其人振振惡寒其脉皆弦微沈滑治法懸飲當下之溫飲當發其汗支飲則隨證汗下痰飲則用溫藥從小便利之此固定法而嚴氏獨以痰飲之疾皆氣不順而致之當順氣為先分導次之氣順則津液流通痰飲自下亦至當之論也亦有腎氣虛寒不能攝養腎水使邪水滯上多吐痰唾又當溫理之代味圓最得其宜或因酒後停飲而嘔者三陳湯丁香養散主之或脾胃為物所傷而停積痰飲五套圓破

自下至下
運下自小
便中出矣

△傳見於喉以聲言各喘以氣息言喉中死

水難死者謂之喘氣促而連屬不能以息者謂之喘丹溪云喘急者氣為火所迫而為痰在肺胃也

△按家坐喘咳下云大腹者青者各水難

△又拒腹命曰肺脹者肩滿而喘咳

△經脈篇是動則病肺脹滿脇下而喘咳

○喘咳色水者肺入是喘而水者水

位下不可入肺入是喘而水者水

脾旺則水自去也

二寸許也

枯骨死白濁湯

欠於湯

飲圓主之臨病之際更宜詳審

喘急

人之五臟皆有上氣而肺為之總故經云諸氣皆屬於肺居五藏之上而為華蓋清虛而不欲牽碍調攝失宜或為風寒暑濕邪氣相于則肺氣脹滿發而為喘呼吸坐臥迫不安又有因七情之氣于於五藏鬱而生痰或體弱之人脾腎俱虛不能攝養一身之痰皆能令人發喘治療之法當究其源如感邪氣則驅散之氣鬱則調順之脾腎虛者導理之又當於各類而求

△脉經卷四。診百病生死訣曰。上氣脉數者死。謂其形損故也。上氣喘息低昂。其脉滑平足溫者生。脉洩四肢寒者死。

△氣痛角△百病生於氣。云云故有九氣之不同。

心法：人以氣為主。息不運則氣凝。一息

不續則寧壞判陰陽之所以升降也

血脈之所以流行者亦氣也。管衛之所以

轉者此氣五藏六府之所以相養相生者。

此氣也。盛則盈。衰則虛。順則平。逆則病。氣由

者。強作人身之根本耳。

不若弄人與三折肱乎。

△作以運在下焦者。李鼎七疔等疔云。

者，精神之根蒂也。

秀林之打帝也

△洛人言曰：形者祖之宅也。

公府望三舟之字釋家祖之教息誠息道

肥之氣息胎息備矣與胎在石月不轉云

凡此證脉滑而手足溫者，生；脉澀而四肢寒者，

死^ス者^モ亦^モ死^ス謂^フ其^ノ所^ニ損^ス故^ニ也^{ナリ}此^レ嚴^シ氏^ノ之^ノ說^{ナリ}故^ニ再^ニ

迷于此

附諸臟腑水腸腎氣

人稟天地陰陽之氣以生藉血肉以成其氣

氣周流於其中以成其神形神俱備乃謂全體

故婦人宜耗其氣以調其經男子息養其氣以

全其神惟氣得煖則行貴乎宜流調攝非宜致

生多謬故內因七情而得之喜怒憂思悲恐驚

者是也喜傷於心者其氣散怒傷於肝者其氣

子 41—340

△經曰悲則心氣急也。又驚則心氣散神元
所傷。元氣所失。故氣亂矣。

△王云。半痛合曰。百病生於氣也。氣本一也。四所
動而為九。

王云。氣因寒聚則為痛。血因寒泣則為瘕。
△王水云。寒氣聚而為痛也。

△七疝之疝。在于腎空命注。而為丹溪論詳在
經旨。又七疝之名狀。諸書之說不同也。又利達
從命。馬氏注曰。疝有如山積之義。

△摘要云。寒疝。囊冷結硬如石。陰莖不舉。

△傳云。氣一其狀上連腎俞。下及陰囊。多得
於寒。天怒寒則氣逆之而脈跳。天怒風即

氣散者是也。

△選云。瘕。腹中痛。盤結。腸傍。

△傳曰。疝者。其狀如仰。凡疝則入小腹。行立則出。腹入囊中。如瓜露出穴而溺。夜入穴而不溺。

傷於心胞者。其氣急。悲傷於腎者。其氣怯。傷
於膽者。其氣亂。雖七證自殊。無踰於氣。又有體
虛者。外為風冷。乘之入於腹中。遂成諸疝。發則
小腹疼痛。或繞臍。或逆搶心。甚則手足厥冷。
自汗。嘔逆。或大小便秘。諸疝氣之證。亦有七種。
厥疝。心火。心氣。心疝。附疝。狼疝。若此也。厥
疝。則心痛。足冷。食已。則吐。勝疝。則腹中氣積。如
碎。心。則飲食因寒。卒然。腸勝引痛。氣疝。乍滿
乍裁。而痛。盤結。腹中痛。引臍傍。附疝。則腹痛連

△全曰：目戴子如七疳之圖而跋云：疳疳，魚七然寒疳即疳之總名。

△至凡疳痛可以溫藥逐之，不可以溫藥補之。今疳疳有七，非人命有甚多，非是也。素問：人之情，予皆不取，非予好異也，但舉其原耳。俗示識，因立此名，以明其光，或曰：腎余，或曰小腸氣，立名既誤，併改其實。

△厥同。

△潮湖脈守曰：脈書往來，此守準為一夫守為寒文，作為疑。

△舊氏：脈洪，聚脈洪曰：洪緊浮牢，小而流，或結或伏。

膈下有積聚，後疳小腹痛，與陰相引而痛，治療之法，若因七情所傷者，當調其氣而安其五臟外邪所干者，當溫而散之，倘治之非道，內外之氣突入於腎者，為腎氣入于膀胱者，為膀胱之氣入于小腸者，為小腸氣，因寒而得者，遇寒而發，喜怒而得者，遇喜怒而發，甚則結而為積聚，或於左右脇下有物如覆杯，或長如展臂，或腹大如盤，令人癢瘦，少氣，漸寒熱，飲食不為肌膚，積聚之脈，厥而緊浮而牢，牢弦急者，生，虛弱者，死，臨證審而行之。

此乃為去脾胃人身之地元也。至誠坤元萬物
資生故脾胃為百骸之母。東垣所以標名
常山者。无他。長為知脾胃之為要。亦虛師
治病增人脾胃者多矣。此欲養其子者。先
成其母也。豈豫養之道哉。

△素問云。胃受其食。脾具磨而消之。

△考經序云。載而示。聚坤之道也。

△格致云。脾具坤靜之德。而有乾健之運。

△養老新書曰。唐柳公度年八十有強。力。人間
其術。對曰。平生未嘗以脾胃熱生物。暖冷
物。不以元氣佐喜怒耳。

○按金匱湯 大建中湯

脾胃

人身之脾胃。專藉之以容納五穀。而化之。脾
屬土。而居五臟之中。寄旺於四時之內。以土能
容藏萬物。故好靜。其脈常喜沈細。而緩帶浮緊。
洪數者。即有病之脈也。尋常理解助胃之道。當
用以平和之藥。又須時其飢飽。不以生冷之物。
傷之。不為寒暑所侵。不為七情所傷。如是則氣
體自然充實。百病不生。將理失宜。或為六淫七
情。相干。為嘔。為泄。為喘。為滿。變生諸證。又當於
各類求之。略述此。以為養生者之助。

△方者曰漢臣但持噎膈而已後之方書皆
噎五噎五噎者氣噎憂勞食噎也五
膈者憂兩志一氣一熱也立言者曰有
五說其末兩今本拘其說只提世人所有之
說而訂其方矣

△云云噎膈之症皆由氣聚成積自積成
痰積之久血液俱病以其為痰在咽在膈
故前人立兩噎二者之名三因方又分五噎
五噎病狀捷有其名為治則一而已故不叙
焉又嚴氏為化痰下氣之說夫氣之不
下痰之不化必有為病之因苟不治其本而專
以香燥之藥治其標痰氣何由而自下也
△經曰食不得入是有火食入而足元氣也
△本咽音繞
△胃眼也
△桂枝湯
△甘草湯
△芍藥湯
△小建中湯
△大建中湯

翻胃 附五噎五膈

翻胃之證其初也未有不由五噎五膈而始者
五噎五膈者喜怒不常憂思勞後驚恐無時下
情傷於脾胃鬱而生痰痰與氣搏外而不降故
食不下蓋氣留於咽噎者為五噎結於胃膈者
為五膈治療之法當順氣化痰溫脾養胃久而
不治則氣體羸弱脾胃冷絕致成翻胃食罷即
反或一日二日而反至此亦甚危矣非硃砂降
痰化積兼以剛劑暖胃不足以療此證如水穀
並不能下方便集中一方用丁香附子為末於

△要略云跌陽脈浮而濇濇則胃氣虛則傷脾
脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿食
不化名曰胃反脈緊而濇其病難治
△跌陽二名會源一名衝陽足而脈難之故也

△本序曰大衆病積聚皆起於虛也虛生百
病云

△奇効云諸虛百損莫不由是心腎而致也

△脾胃命曰真氣又名元氣乃人身生之精
氣也

掌心皴裂亦一法也如跌陽脈緊而濇者為難
治之證又有下虛之人氣上控膈令人胃下緊
滿痞急胸中苦痺緩急如刺不得視仰名曰胃
痞其證類乎五瀉又當以嚴氏八葉實丸治之
臨證又宜詳審

諸虛

有幾種某曰假如男女虛損得之各曰勞傷
只是乃各淋瀝公已屬亦各病極

諸虛之與勞極雖曰皆由體氣虛弱心腎有虧
水火不自升降而致此疾然各有其所以因不可
不究諸虛者或稟賦素弱又為寒暑勞役所傷
或色慾過度俱能致此真氣以致形體羸瘦
或

諸虛百損之病
大建中湯
破

△方考云目眩者目睛如見黑色也。
△奇効云无根之火為虛炎之病。

△五常政大論曰根于中者命曰神
去則恍惚。

△病源五勞五極有肌極血極而无脉。肉
紫肌与肉。脉与血。鮮異而實同也。外有
精。而六極也。大成謂精氣者。即精極也。
五積六府皆有精。故實生諸症也。
△州縣曰張浮數大四者皆勞也。大者易治。脉
氣未衰可救而正也。強者難治。血氣已耗而
難補。

△素問應象論文 為氏精有榮明。然
大成似无功。則矣。
△通丹以王辰為溫養之溫也。東垣作溫
藥之溫。 △玉田氣難補也。丹溪從

脉無力。小便頻數。大便滑泄。目眩耳聾。遺精自
汗。甚則虛炎上攻。面紅發喘。此皆諸虛之證。勞
極者。七情傷乎五藏也。盡力謀慮。勞傷乎肝。應
乎筋。極曲連。神機勞傷乎心。應乎脉。極意外過
思。勞傷乎脾。應乎肉。極預事而憂。勞傷乎肺。應
乎氣。極矜持。志節勞傷乎腎。應乎骨。極此五勞
應乎五極者也。勞極精氣變生諸證。其脉多弦。
治療之法。虛者補。燥之勞極者。溫而精。而安其
五藏。又隨其冷熱調之。故素問云形不足者溫
之以藥。精不足者補之以味。凡滋補之藥。當用

之為氏甚非之

△言人知補之為利而不知補之為害也。補者蓋有六法。平補。峻補。寒補。溫補。筋骨之補。房室之補。以人參黃芪之類為平補。以附子硫黃之類為峻補。

△若曰男子三十前後。色慾過度。損傷精血。必生虛火。動病盜汗。午後發熱。咯血。咳嗽。倦怠。無力。飲食少進。甚則癆瘵。帶血。咯唾出血。或咳血吐血。衄血。身熱。脉沉。肌肉消瘦。此名勞瘵。

△心火主血。腎主精。竭血燥則勞生。

北經云

仲子榮采以湯

黃芪補子湯

通脈理傷經湯

平和不司。驟用峻補。緣腎水枯竭。不足以當受。又恐愈甚。上炎之患。慎之慎之。

勞瘵

清生方云。夫勞瘵一症。為入之大患。

勞瘵之證。非止一端。其始也。未者。不因氣體虛弱。勞傷心腎。而得之。又有外感風寒。暑濕之氣。先為瘧疾。以致咳嗽。寒邪入裏。失於調治。又不能保養。過於房勞。傷於飲食。久而成瘵。瘵之傷其為證者。令人肌肉羸瘦。皮毛乾枯。寒熱盜汗。遺洩白濁。或腹中有塊。或胸後兩邊有小結核。或聚或散。或咳嗽痰涎。或咳唾膿血。及傳變則

△讀字大成云。(附) 與者同。

△臨錄云人身中有三尸諸虫與人俱生常居血而惡能毒與鬼神通每接引外邪與人為害諸尸病其狀恍惚不定的知所苦而無功不惡或心腹痛脹或精神錯雜其狀不一。

△病源云突元由漸急然而至若走之急疾故謂之毛尸。

△含靈賦臭虫 本蟬 蜚虫 尺名 蠹虫 蟣与毛同

△遺尸錄云停道不消者各一尸考示一者見尸皮間哀哭便突。

△源云案一錄身內尸虫与外邪相引接而成發動亦令人心腹脹滿刺痛但以其致三月感其寒氣即發故謂一。

△又云尸因人年命衰弱至於喪死之處而心意忽有畏忌其身內尸虫性既忌惡便接引外邪其為此病其病亦心腹刺痛腹滿喘急但此其病即發故謂一。

源云尸注其人死後易注傍人乃至渡門以其尸病注易傍人故為一。

為二十四種或三十六種或九十九種又有所謂五尸者曰蜚尸。遺尸。寒尸。喪尸。尸注者是也。其各形雖不同傳變雖不一其實所傷不過五臟故傳於肝者面白目枯。口苦自汗心煩驚悸。傳於心者面黑鼻乾口瘡善忘太便秘或洩。傳於脾者面青唇黃舌強喉哽吐涎體瘦飲食無味。傳於肺者面赤鼻白痰吐咯血喘咳毛枯。傳於腎者面黃耳枯胃滿肺痛白濁遺瀉又有二十四種勞蒸者亦可以因證驗之蒸在心也少氣煩悶舌必黑蒸在小腸也腹內雷鳴木

方考天王補心丹方後曰心主血。瀉則大便瀉血。故大便燥或時時利者必火不足以致脾土也。向各血蒸出於腎。

△痿命曰。宗筋主束骨而利機關。注。宗筋
指陰部中橫骨上下之堅筋也。

△竅回腸。本大腸也。前已舉大腸蒸則吐。

蓋指廣腸而言。然他骨无効者。陳氏嚴氏特言之耳。故不次也。德伯曰。指大腸十六曲之中間而言。故又无効矣。

腸或秘或洩。蒸在肝也。目昏眩暈躁怒無時。蒸
在膽也。耳聾口苦。腸下堅痛。蒸在腎也。耳輪焦
枯。腰膝酸痛。蒸在右腎也。情意不定。洩精白濁。
蒸在肺也。喘嗽咯血。聲音嘶遠。蒸在大腸也。右
鼻乾疼。大腸隱痛。蒸在脾也。唇口乾燥。腹脹
滿。畏寒不食。蒸在胃也。鼻口乾燥。腹脹自汗。睡
卧不寧。蒸在膀胱也。小便黃赤。凝濁如膏。蒸在
三焦也。或寒或熱。中脘臃中。時覺煩悶。蒸在膈
也。心胃噎塞疼痛。不舒。蒸在宗筋也。筋脉縱緩
小腹隱痛。陰器自強。蒸在回腸也。肛門秘滯。傳

便難

精白濁

玉房 在男陰
在女陰

△首發大成云婦人下白而不甚稠者曰白淫
与男子白濁同也其下赤白稠粘者謂之帶
下即若男子自遺之精也

△林昌燕別人竟熱自竟冷食无味而嘔或
煩躁不安

△尿血 杯謂之莖中

△傳曰凡胃熱脾熱元氣未脫者發崔氏四
花六代

△資生經曰育育俞元氣不廢而古人不能求
其穴是以晉景公有疾秦醫曰緩者視之
曰在育之上育之下攻之不可達之不及
厥才至焉不可也晉侯以爲良醫而治其

道之時裏急後重蒸在玉房也男子遺精女子
白淫蒸在腦也眼眩頭眩口吐濁涎蒸在皮也
肌膚起毛折髮焦蒸在骨也版齒黑燥大掉
酸痛蒸在髓也肩背疼痛筋骨酸痛蒸在筋也
眼昏脇痛心申焦枯蒸在脉也心煩體熱痛刺
如針蒸在肉也自覺身熱多不奈何四肢動
蒸在血也毛髮焦枯有時鼻衄或後尿血蒸傳
及此未易言治若病之淺者服藥之外惟有早
灸育育崔氏四花穴然生者可謂有命諸方所
載皆以此證有蟲嚙心肺間治法先當去之然

金惠云元別病偶然發就者元害即吃熱茶二口即止以紙捻鼻嚏而止。
三因曰若傷寒久病得此甚惡內經所謂壞府是也。揚上善歌云浮淺者如爐器之漏也。嗽者如琴紋之絕。葉落者如槁木之摧。琴此三物義壞之微以此喻故知是病深之候也。

有噦而心下緊痞眩悸此乃膈間有痰故也。當詳其脈證施以治法。大率胃實則噦胃虛則噦。年高氣虛及婦人產後多有此證皆是病深之候也。非易治也。

頭痛

天曰大地方水腎是則水火不交故病也。

靈樞邪客云天曰地方尺頭曰足方以心之天有日月人有兩目。

△四十七難

△黃庭經云腦為泥丸宮心為絳宮脾為土宮三官肝為清冷宮膽為紫極宮腎為中黃宮腎為牧官。

△厥病篇云真頭痛甚腦尽痛手足寒堅即死不治。

金氏云頭痛最甚命在氣血俱虛風寒暑濕

頭圓象天故居入身之上為諸陽之會頭疼之疾非止一端如痛引腦顛陷至泥丸宮者是為真頭痛且發夕死夕發且死非藥物之可療今之體氣虛弱者或為風寒之氣所侵邪正相搏伏而不散發為偏正頭疼其脈多浮緊又有胃

多氣所使便痛經內倒不去者曰腦
頭痛蓋厥者逆也逆者而衝於頭也
斯言得之矣。

△方考云痰厥者濕痰厥逆而上也。

△東垣曰頭痛甚謂之足太陰疾云

△風俗云新沐中風則為首風云

△傳作胃脘痛曰夫胃為脾之府陽先於陰故

歲未病而府先病也甚而至於腸下如刀
刺之痛者已連及於脾矣古方名為脾疾
者是也胃之上口名曰賁門與心相連故經所
謂胃脘痛而痛今俗呼為心痛者未達
此義耳。

△口問篇曰心者五藏六府之主也。

△左傳卷中杜氏云脾猶受也。

△手足青 經云手足青者其痛甚手足青至節且發夕死東垣謂真心痛者手足冷至節死
不治者則必死矣則必青也。 △張氏曰且夕即早晚也言死之速。 △經注云手足之色青至指節云

膈停痰厥而頭痛蓋厥者逆也逆者而衝於頭
也痰飲之脉時伏時見亦固有腎虛而氣厥并
新沐之後當風露卧皆能令人頭痛治之當詳
其所以因風邪則驅散之痰聚則溫利之腎虛則
補暖之尋常感冒頭痛發熱又宜隨證治之

心痛

心為五臟之主一身之所聽命也宜處安靜不
可使有所傷傷之則痛若痛甚手足青過節者
是名真心痛且發夕死夕發旦死非藥物之所
能療經云脉浮大弦長者死沈細者生凡心

金匱要曰。有蟲痛者。必面上白。眇唇紅。又痛止後。即能食。時作時止者是也。
△三因曰。有卒中客忤。鬼擊尸症。使人
心痛。

△戴氏云。怔忡者。心中不安。惕然。如人將
捕者是也。

△回春曰。怔忡者。心自血養。如魚在水。心中惕
惕然而跳動也。如人將捕捉之貌。

痛之病。醫經所載。其種有九。一曰蟲痛。二曰疰
痛。三曰風痛。四曰悸痛。五曰食痛。六曰飲痛。七
曰寒痛。八曰熱痛。九曰來去痛。名雖不同。其實
皆由外感邪氣。內傷生冷。結聚痰飲。停於心胞。
傷於經絡。重則心膈引痛。輕則怔忡而已。蓋心
乃藏血之府。愛思勞役太過。耗散真血。心帝失
輔。亦能令入怔忡。以致膽氣虛怯。變主驚悸。或
因事聞聲。卒然戰怯。又夢寐之中。忽墮層崖。精
神恍惚。如有所見。治法宜詳其所以。若內外之
氣相持。則宜驅散邪氣。溫利痰飲。心血有所虧。

補注並言損其肺者益其氣損其心者調其營衛然此又義不倫內經諸氣皆屬於肺諸血皆屬於心故氣言衛氣指諸邪血謂營血者皆謂百脉營行脉中衛行脉外本經云心營肺衛今其治肺損下增一衛字治心損下以血字替去衛字治肺曰益其衛氣治心曰調其營血云云
 △摘要云痰在上火在下火炎上而動其痰也內經云諸風掉眩皆屬肝木此特舉一端耳此症屬痰者多並無痰不作眩然因風者亦必有痰
 ○此後天氣
 ○此後天氣

損又當補益其榮血寧其心志壯其膽氣如此調之病無不愈矣

眩暈

心法曰眩者言其黑暈者言其轉也
 法云云眩暈者中風之漸也

眩暈之證發於卒然之間眼自昏花如屋旋轉起則眩倒維經云諸眩掉皆屬於肝肝風上攻而致眩暈然體虛之人或外為風寒暑濕之氣所干內為七情之氣所結鬱而生涎皆能令人一時眩暈目暗口噤頭痛項強眩病之際宜詳以脉證辨之風則脉浮而有汗寒則脉緊而痛暑則脉虛而煩悶濕則脉細而重者加以吐

△度云肩角痛即指什穴也。

△至云子和云撥亦痛俗呼為肩凡骨痛

△至云駝峰一症人皆以為上風下風所致而不

明言其所以然之故蓋所謂風者非與氣

也然謂實者痰涎風火也。

△奇効云夫腎肝受病則

△治諸痛之通升。

△經脈要精微論注皆以所君為由而為之府

也。

△內合山門月又辨避也

通如氣轉生涎而暈者多令人眉角痛眼不

可開寸脉多泥有此為異至若疲勞過度上盛

下虛金瘡吐衄便利去血過多及婦人崩傷皆

能眩暈各隨所因施以治法。

腰脇痛

附云按人海人有項腰

夫腎受病則腰瀯而痛故經云腰乃腎之府轉

旋不能腎將癰矣要知腰痛之疾所感不一有

因風寒暑濕傷于腎經發為腰痛者又有墜墮

險地閃動腰脇氣血凝滯而痛者其為痛也或

引於項有傍及兩脇不可俯仰或腰下如有橫

△風濕之脈者為痺痺由風濕如木

△丹溪云骨痛之脈必沉而弦沉為清弦為風

△虛鑑云治筋骨諸疾手足不遂專欲發心肝腎之三經也故有左經瀉

△三因云夫中風寒暑濕與脚氣皆漸風淺深之不同中風寒暑濕得之頓而淺脚氣得之漸而深以其藏氣虛寒熱發動故得氣名

△千金云問曰風毒中人隨處皆得作病何偏著於脚也答曰夫人有壯藏心脾二臟經絡所起在手十指肝腎與脾三臟經絡所起在足十指夫風毒之氣皆起於地之寒暑風濕皆作蒸氣是常俗之所以風毒之中人也必先中脚

木如坐水中多令人面目紫黑腹脇脹滿大物腰痛之脈皆沉弦又須明沈弦而緊者為寒沈弦而浮者為風沈弦而瀰細者為濕沈弦而實者為凝滯各推其所因感邪氣者驅散之凝流者順其氣而調其血如斯此治之病無不愈又有腎經虛憊心血耗散不能養其筋脈以致腰痛又當補其心腎筋骨自壯矣

脚氣

脚氣之疾難辨之曰氣而古今證治實為多端故千金論脚氣皆由感風毒所致又經云地之

△素問厥論云注脈氣逆上也此謂傳風脚
氣廣師方論云

△古今注傷寒天胸氣者古謂之緩風又謂之
厥持是古今之異名也

△方考云有緩縱不隨者名曰緩風亦有
轉筋亦名緩風名曰風毒

△宋中一印中云在背後脊間

△醫綱云寶鑑云脚氣之病自背腰收始

△千金作經三兩日不起方乃覺之

△同曰晚弱名曰緩風疼痛為濕痺

△醫賦云其脚不腫者名乾脚氣而腫痛風脚
腫枯細者曰濕風

△同書腫者名濕脚氣濕者筋脉弛長而

軟或浮腫或生外腫瘡之類謂之濕脚氣

△同書腫者名濕脚氣濕者筋脉弛長而

○脾腎二水七榮則能生血而少則生

四逆


風寒暑濕皆作蒸氣足常履之遂成脚氣古來
無脚氣之說黃帝時名為厥阴漸之間名為緩
風宋齊之後始謂之脚氣其名雖不同其實一
也今之所感未有不由脾腎兩經虛弱坐卧行
動之間為風寒暑濕之氣所于流注而成此痿
得病之始多不令人便覺會因他病乃始發動
或奄然大悶經三二日方乃覺之先從脚起或
緩弱痺痛行起忽倒或兩腿腫滿足膝枯細或
心中忪悸小腹不仁大小便秘澀或舉體轉筋
骨節酸疼或惡聞食氣見食吐逆或胃滿氣急

五方云
不仁者不

脾經虛弱，中氣不足，補之脾氣
宜調血清燥。

千金云：凡患脾氣，到心難治，以其腎水尅
心火故也。

三因方序云：腐因不識，緩為餘病治之，莫
不不斃。



東脚氣者，虛疾也，宜補。故云微加。

壯熱懨懨，其為微也。不可治之，須詳審乃可。否
則誤以為他疾治之。若入腹攻心，鮮不致危矣。
大抵脾氣之證，發於外者，大同而小異，必須以
脉辨其風寒暑濕，然後施以治法。若寒氣中三
陽，經者患寒，必冷，暑中三陰，經者患熱，必熱。又
以其脉浮而弦者，起於風，濡而弱者，起於濕，洪
而數者，起於熱，遲而滿者，起於寒。風者汗而愈，
濕者溫而愈，熱者下而愈，寒者灸而愈。又當順
四時調理，不可拘。春夏疾盛者，宜汗利之，秋
冬以後，又須量入氣，微加滋補，防其過。

今有行走注為風勝方 同春亦作无汗走注

今有初起即走竹覺三三三此因此脚
愈不復發。

△此要云切不可用補劑及湯淋洗此區象之
太戒也。蓋補則氣實多致不救淋洗則邪
毒入內亦難治。

寒濕再作此皆嚴氏詳論及此又如無汗走注
為風勝急掣痛為寒勝腫滿重著為濕勝煩
渴熱頑為暑勝四氣兼中者但推其多者為勝
分其表裏施以治法亦三因平富之說古人得
脚氣之初多用針灸最忌用熱藥蒸泡恐過邪
氣入于經絡為難治也今之治脚氣者有一方
偶合於所患之證服之得愈便以為秘方其後
遇病更不審其脉證所因又服以前藥藥證既
殊非徒不能愈病適足以重病戒之戒之

五痺

夫痺之為病者於五臟皆有所關
身命長短皆由是而決其筋骨
皆為天機正傳謂之麻痺。

△痺命風寒濕三氣雜至合而為痺也其風
氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺濕
氣勝者為著痺也帝曰其有五者何也
岐伯曰以冬遇此者為骨痺注五
痺之生不外乎凡寒濕之三氣也特以時
有五者而遇此三氣則異病耳非復有
五氣以入五藏也

△素問多飲水數小便見馬注

△心痺脈不通煩則心下鼓暴上氣而喘噤
乾善噫厥氣上則恐注煩則心下鼓戰暴
時上氣而為喘又噤喉乾燥也心主為噫以
其鼓滿故噫之以出氣也

△腎一者善服況以代踵脊以代腰注腎者胃
之關門不利則胃氣不轉故善服

△踵本在足而尻則伏地而不伸其尻反以代
踵也脊本在中而頭則俯伏而不上其脊反以代頭也

△肺一者煩滿喘而咳

△肺一者四肢解墮發咳吐上為塞注肺上為喉咽故發咳吐上為塞

△痺在骨則重注在皮則寒故具此五者則不痛也凡痺之類遇寒則痛遇熱則解注遇寒則痛遇熱則解
△金索遇寒已下八字內經為衆痺之總命大成為皮痺者蓋以及及在人身之表凡外之寒熱先与干皮故
假以為皮痺之症也

凡痺疾自有五種筋痺脈痺骨痺皮痺肌痺是
也多由體虛之人腠理空疎為風寒濕三氣所
侵不能隨時驅散流注經絡久而為痺其為病
也寒多則痺痛風多則引注濕多則重著其病
在筋者則屈而不能伸應乎肝其證夜卧多驚
飲食少小便數其病在脈者則血凝而不流應
乎心其證令人心悸黃心下鼓氣卒然逆喘不通
噤乾善噫其病在骨者則重而不能舉應乎腎
其證手足不遂而多痛心腹脹滿其病在皮者
多寒遇寒則急逢熱則縱應乎肺其證皮膚無

△脈經第八淡飲第十五曰。胃中有留飲。其人

△傳云。夫古之所謂痛痺者。即今之痛爪也。諸方書又謂之白虎歷節風。以其走痛於四肢。骨節如虎咬之狀。而以其名之耳。

△跳會。一曰跳也。跳。跳也。師古注。是失撓也。又范

△力考。此症分五症。然於中。最之金匱要略。先

其言。至於舉一而廢百。宜乎。視仲景之堂。豈

所知。氣奔喘滿。其病在肌肉者多。不仁。應乎。其證。四肢懈怠。發咳。嘔吐。診其脉。大而滿。或來急而緊。俱為痺之脉也。治之當辨其所感風寒濕三氣。注于何部分。其表裏須從偏勝者。主以藥餌。又有停蓄支飲。亦令人痺。又當隨證治之。至如白虎歷節。遍身痛者。無非風寒濕三氣。乘之。巢氏云。飲酒多。當風汗出入水。遂成筋痛。久而不愈。令人骨節蹉跌。恐為癱瘓之病。始有此證。治之宜早為貴。

五疸

傳曰。五者。五者之分。然無寒熱之異。丹溪曰。不必分五。時是

黃疸之疾諸書所載其證雖繁究其方治不過
景之門猶不入奈何而後百家之奧乎

蓋云寸口脈沈滑者中有水氣或惡瓜一身
念腹脹浮而不渴續自汗出而無大熱者皆
為風水

△良論疾診尺篇曰身痛而色微黃爪甲上
黃黃疸也小便黃赤脈小而欲者不嗜食
△平人氣象曰溺黃赤安卧者黃疸已食而飢
者胃疸

△病源云食已如飢令身體面目爪甲小便不
黃而欲安卧者身體多赤黑多青云云
又欲卧者

黃疸之疾諸書所載其證雖繁究其方治不過
五疸一曰黃汗二曰黃疸三曰穀疸四曰酒疸
五曰女勞疸是也黃汗之證身體俱腫汗出不
渴狀如風水汗出染衣黃如藥汁此由脾胃有
熱喜自汗汗出入水中洗浴故汗凝熱結其汗
黃也黃疸之證食已即飢遍身皮膚及爪甲面
目小便俱黃卧時身體又帶赤帶青者必發寒
熱此由酒食過度藏府熱極水穀相併積於脾
胃復為風濕所搏結滯不散熱氣薰蒸所致若
發於陰部其人必嘔發於陽部必振寒而後熱

黃而晦者
黃而明者
黃而明者

三四五穀通者。由失飢發熱。大食傷胃氣。衝
胃所致也。

△全云。過為者。因大飢。頓食而過分也。過厚者。
失節而度。食也。又有過於度量之義也。

△直格方。○^{上為刀切}下為刀切。一者煩心。熱燥。悶亂。
不寧也。

△方考曰。要畧曰。黃家曰。嘔所發熱。而反惡寒。
此為女勞疸。得之勞光急。小腹滿。額上黑。足
下熱。因作黑疸。其腹脹如水狀。大便必黑。時
澀。此女勞之病。非水也。腹滿者。難治。

△奇効云。大緊疸病。渴者難治。不渴者易治。疸
毒入腹。喘滿者危。

△傳云。濕在上宜發汗。濕在下宜利小便。或云。法
宜用。使上下分消其濕。則病无有不安者也。
戴氏云。食積者。量其虛實下之。其余但利
小便。

○附。○也。茵陳蒿湯。大黃。石。湯。

穀疸之證。食畢。即腹脹。心中憊憊。不安。而遍體
發黃。此由脾胃有熱。大飢。過為飲食。所傷。胃氣
衝蒸所致也。酒疸之證。身自發黃。心中懊痛。足
脛滿。小便黃。面發赤斑。此由飢中飲酒。大醉。當
風入水。所致。女勞疸者。其證身自皆黃。發熱惡
寒。小腹滿急。小便不利。此由過於勞傷。又於極
熱之中。房事。之後。入水。所致。如多渴。而腹脹者。
難治。大驚。五種之病。多是脾胃經有熱。而後發。
黃。治法。各當究其所因。分利為先。解毒次之。又
有時氣傷寒。傷風。伏暑。解散未盡。亦令人發黃。

如痘狀口淡怔忡耳鳴脚弱微寒微熱小便白濁天當作虛證治之不可妄投涼藥愈傷血氣臨病之際辨之可也

易曰：六五，允吉。婦人貞吉，夫三陽也。

△病源以蚊蟲蛇蠍等三十種

△三四曰此皆邊鄙邪僻之地多有此喪中土則

英聞也

今幸國序云憫南方盛處之如云

金說曰蛇勝於蝦蟆、勝於蜈蚣、勝於蜂

勝其豆。故食互相畏而死其一物者。是盛也。

今奇効良方云開廣源山之人以三虫作蠱云

蠱之爲毒，醫書所載雖有數種，而中土少見之。今古相傳，多是閩廣深山之人，於端午日以蛇、蝎、蜈蚣、蟻、蜂、三物同器貯之，聽其互相食咬，俟一物獨存者，則謂之蠱，欲害其人，密取其毒於酒食中，啖之。若中其毒者，令入心腹絞痛，如有蟲咬，吐下血皆如爛肉，若不卽治，食人五臟卽

嶺南朱子
紫園
卷之九

△病深白且起取花水米食前當令病人唾水
肉唾和桂脚主下沈者是蠱沈散不至下者草
毒。

△李子夫鵲不日浴而白鳥不日浴而白之其
不足以爲升。

△本綱六鵲不食。

△李時珍曰。家師曠會經云。鵲鳴也。故謂之鵲。
吳僧贊寧云。凡物大皆皆以天色名者。亦則天
氣名義。蓋亦同此。羅氏謂鵲即鵲亦不然。
又曰。鵲大子。羽毛白澤。其羽極高而善步。所
謂鵲不浴而白。舉十里是也。

△敗鵲。宗璠曰。此身穿敗者。不言是何皮。爲
皮皆可以之。當以黃牛皮者爲勝。

△韓氏曰。敗鵲之皮。俱收並黃。得用尤遺者。臣
等之皮也。

死然此毒中久有緩有急急則十數日便死緩
者待以歲月氣力羸敗食盡五臟而後死死則
其毒流注於傍人亦成蠱注大抵試蠱毒之
法令病人咳唾水中沈者是毒薄者非也或含
一木豆其豆脹皮脫者蠱也豆不脹皮不脫者
又非也又以鵲皮至病人卧下勿令知覺病甚
者是也否則非也治瘥之法必須審而後行試
而後可令人凡有積聚脹滿之病類乎蠱者使
以爲蠱尤爲非也世說閩廣深山之人專有以
蠱行毒於人者若欲知其姓名以敗鵲皮燒灰

此方自後世傳功。

三因曰淋古謂之癰名亦不同也癰者腫也

淋者滴也今名魚俗於我為得矣天年有五

白濁曰膏曰石五種不同皆以氣為本

案五淋之外有文腸病也摘要曰尿出小便尿

由大便也再漢四物湯加海金沙散柳木通亮

仁治之。

方考曰表氣凝滯小便淋瀝身重者名曰氣淋

不淋傳作砂淋王世俗又名砂石淋方考曰

砂淋者溺出砂石也此以火灼旁光濁陰凝結

乃煮海為鹽之藥也又云煎鹽有二砂一則淡能滲利一則無鹹不作石也

方考曰膏淋者濁頻數澀白如油光彩不亮者名曰一。

方傳曰膏淋為病過房勞即發。

心法曰痛者為血淋不痛者為尿血。

米飲服方寸匕須臾自呼蘇家性名令十一字

以濟生呼喚將去其病自愈又一說病者善能

知元中毒於何物之中終身不服此物其毒亦

不復作雖相傳如此俱未之見謹用載之以備

搜覽。

諸淋 金匱要略云淋病分五種

淋閉之疾其證五有氣石血膏勞是也氣淋為

病小便澀痛有餘瀝石淋為病華中痛尿不得

卒出膏淋為病尿似膏出勞淋為病勞倦即發

痛引氣衝血淋為病遇熱即發甚則溺血候其

命丹溪云：淋症有五，皆屬熱，宜利小便，使
邪子之類，不可發汗，汗之必便血。
宜用五苓散，方為不利為瀉，不為瀉。

全附症因勢，人之有尺蠖之有微。

△陳陽別命，注同上消者，名高漢，名高漢病，抗
已上消者，即也，多飲水而少食，大便如常，小便清
利，知其燥在上焦也。治宜流濕以潤其燥，又云高
消者，古上赤製，又渴引飲，則河間曰：飲水多而小
便多者，名曰消渴，蓋指上消而言，原元氣清，消渴
為心火熾，心火熾，渴而飲，諸脈較，較
皆氣虛，血虛也，亦指上焦而言。今求其同氣
脈，命有忌，轉然於肺，傳為消渴，蓋指邪氣

○心腎不交，人少也。

桃花湯 經年大...

鼻頭色黃者，小便難也。大抵此證多由心腎不
交，積熱毒，或酒後房勞，或七情鬱結，或飲食
不節，熱發散不動，結于下焦，小腸膀胱受之，則
為癃閉淋閉，其所以為病皆一類也。又有濕病後
餘熱不散，當風取涼，亦能令人淋閉，故治法當
以清心為先，滑利次之，臨證用藥更須詳審。

消渴

傳曰：三消為大亦同，蓋今不同，頃病者以後世三消之
統別，五臟皆有消渴之症，其間各有所指。

人身之有腎，由樹木之有根，根腎受病，先必形
體憔悴，難加以滋養，不能潤澤，故患消渴者，皆
是腎經受病，由壯盛之時，不自保養，快情恣慾，

飲酒無度，食脾爽及丹石等藥，遂使腎水枯竭，
 心火熾熾，三焦猛烈，五藏乾燥，由是渴利生焉。
 醫經所載，有消渴、內消、強中、三證。消渴者，多渴，
 而利、內消者，由熱中所致。小使多於所進飲食，
 而反不渴，應極短氣，強中者，應陽強大，不交而
 精氣自泄，大槩消渴之疾，上盛下虛，心脈多浮，
 腎脈必弱。故經云：脈洪大，陰不足，陽有餘，則為
 熱中。即消中也。又云：腎實則消，而不渴，小使自
 利，名曰消腎，即內消也。其治宜抑揅心火，攝養
 腎水，消渴之人，津液枯竭，服劑刺過多，防發癰
 不可治也。

探中事
 腎正至
 不可治
 不時發
 作時大
 注大
 脉大也
 今路生
 指中
 作便多
 所飲食
 滿作小
 及不

又案補腎方云人身之有腎者猶木之有根腎受病必先形容憔悴血加以滋養不能潤以滋養清濁者皆腎經為病由是言之則不自休養使情慾過度飲酒元度食嗜炙丹石等藥遂使腎水枯竭心火熾盛三焦猛烈五臟乾燥由是濁利生焉此言濁必平于腎也然錄又謂未傳能食者必死胸膈痞滿痞不能食者必傳中滿皆為不治之症蓋古今而治之能食而消者自視為人未濁治之不能食而消者錢氏方白水散治之通評虛實命帝曰消痺虛實何如岐伯曰脈實大者久可治脈懸小者病久不可治

公方考云精濁與便濁不同便濁是使前渾濁即前之膏淋也乃是胃中濕熱滲入旁光

身腎經絕元相干精濁則牽絲粘膩血不便濁亦是有之是腎水不足濕熱易動精離其位故令漸淡而出耳

公清生方云其間曰夫精者身之本也蓋五藏六府皆有精腎為精舍會開司之所聽命於心人能法道清淨精氣內持火來坎戶水到巽竅陰平陽秘精元符固矣

公案原病區林惠治正傳集要之諸言白濁亦為濕熱傳亦不分赤白俱熱也但區方雖要云白濁為腎虛有寒因嗜慾而致也則河間又謂白濁亦屬於熱如清水作濁則有白濁矣然則水渾濁冬寒則水澄清此理亦或然也然則精白濁皆由心腎不交相火妄動而得惟所治之藥非為一途其可一例言之蓋遺精則自精氣離中而外泄白濁則於小便裏乳中而後分

疽之疾无忌房事并飲酒鹹食實麪之物切勿不可用金石之藥臨證慎之

赤白濁

水火不交人由是也

人之五藏六府俱各有精然腎為藏精之府而聽命於心貴於水火升降精氣內持若調攝失宜思慮不節嗜慾過度水火不交精元失守由是而為赤白濁之患赤濁者心虛有熱或因思慮而得之白濁者腎虛有寒過於嗜慾而得之其狀凝面如油光彩不定凝脚澄下凝如膏糊治法當以赤白究其病源心虛者當清心調氣

其經預其氣而調其官也

△通考曰。史堪載之蜀人也。又續。臣說有
醫家畧之。

△水腫。藉曰。層腹者。寒氣客于皮膚之間。
然不堅。腹大身及腰。厚。按其腹。實而
不起。皮色不變。此其候也。

△鼓脹何如。岐伯曰。腹脹身皆大。大与層腹等
也。蒼黃。腹筋起。此其候也。

△腸覃何如。岐伯曰。寒氣客于腸外。与衛氣
相搏。氣不得營。因有所繫。積而內着。惡氣
乃起。瘕肉乃生。其始生也。大如雞卵。稍以益大。至
其成。如懷子之狀。久者離歲。按之則堅。推之則
移。月復以時下。此其候也。

△石瘕何如。岐伯曰。石瘕生于胞中。寒氣客于子門。閉塞氣不得通。惡血當寫。不寫。結以留止。日以益大。狀如懷子。月復不以時下。
皆生女子。可導而下。△金匱曰。瘦人。以爲風濕之病。而今大成引此。而爲水腫之諸症者。衆也。

腎寒者。溫補下元。仍須清上。使水火既濟。陰陽
叶和。精氣自固矣。凡思慮過度。不特傷心。亦能
病脾。脾生虛熱。而腎不足。故土邪干水。亦能令
入便下。渾濁。史載之云。夏則土燥。而水濁。冬則
土堅。而水清。醫多峻補。其疾愈甚。只宜以平和
之藥。療之。水火既濟。脾土自堅。其流清矣。

水腫

傳曰。通身面目。半足皆浮。而腫名曰水腫。或腹大如鼓。而面目
微不腫者。名曰腹滿。又名鼓脹。皆脾土濕熱。爲病。腫輕而腹
重也。

岐伯所謂水腫者。層腹鼓脹。腸覃。石瘕者是也。
名雖不一。皆聚水所致。故人身之脾。屬土。五行
論之。雖曰剋制腎水。然非土。則又不能防其泛

○脾之自好。而水不能水。則止。乃爲水腫也。
防已茯苓湯。

△水腫命曰水腫起也。目窠上微腫，如新卧起之狀。此言水之症也。病方起時，目之下為窠，俗曰卧蚕，其微有所腫，如新卧起之狀。大抵人之卧起者，其目窠上必腫也。
△氣脹命曰氣脹微腫，如卧蚕起之狀。曰水，法舒然命曰水者，限也。目下亦限也。限者，至限之所者也。故水在腹中，首必使目下腫也。

△人相經曰：目下為腎，目下為水。

△四者曰初起，眼胞上下微腫，如蠶水。
△又曰：平按成窠，舉手即滿者，是水腫也。

△水熱次命曰肺腫者，聚水而生病也。其肺必腫，此乃聚水而生病之驗也。

水腫之疾，究其所以，皆由脾土有虧，不能防制，以到腎水浸漬脾土，變而不流，遂成此疾。其為證也，發見之初，畏寒微腫，有若卧蠶，纒起之狀，微而至天，以手按之，則隨手而起。如畏水，其內上則喘急咳嗽，下則足膝附腫，面目虛浮，外腎或腫，小便不利，治瘳之法，當辨其陰陽，脈證若陰水為病者，脈來沈澁，色多青白，不煩不渴，小便澁少而清，木肺多泄，陽水為病者，脈來沈澁，色多黃赤，或煩或渴，小便赤澁，木肺多秘，腰已上腫者，宜發汗，腰已下腫者，宜利小便，然後

寒此書奉水腫五絕心法加常平肉硬大便
滑泄三無舉八症。

△永類方三水腫門曰然腫症年少血熱生
痰變成腫疾治法方同此。

實其脾土。土盛自能攝養腎水其腫自消。虛弱
者又當溫補下元尤宜節飲食絕辛冷戒房事
否則愈而復作。凡腫證甚者肌肉崩潰足脛流
水。若唇黑鉢盆平臍凸背平足平五者皆是
五臟有損非可療之病。又有內挾七情之氣傳
滯涎飲腹滿脇脹名爲氣分及少血熱生瘰癧
爲腫痛名爲熱腫又當隨證施以治不可一塗
而取要知此證脉浮大者生沈細者死臨證施
治宜詳審焉。

服蒲

七葉樹

七葉樹

△腹中會有病心腹脹滿且食則不能食此為何病按曰名為鼓脹新校正云按太素取作鼓
△三四方卷上云何經自鼓腹太素作鼓腹

脹滿之疾古方以為鼓脹穀脹是也雖見之方治而其論自三因啟氏始詳大抵脹滿之證多是脾胃素弱或病後失調外為風寒暑濕之氣所侵內為憂思七情之氣所傷及過食生冷飲漿之類并傷脾胃以致五臟傳寇陰陽之氣不得升降痰飲結聚中焦遂成脹滿之疾其為證也或腸鳴氣未漉漉有聲或兩脇腰背痛連上下或頭痛嘔逆胃滿不食大小便為之不利其脉浮者易治脉小者為難至如積聚之證亦由膨脹而始又當以脉證辨之從五積治法莫

全病通者言脾胃有熱氣流於旁光

小便液而身面黃腹滿如水狀因名濕水云云

△三十一用此水之狀然非此清水和之謂也

△五十五用此水者陰氣也聚者陽氣也故陰流

而伏陽浮而動氣之所結名曰積聚之所聚

名曰聚故積者五臟之所生聚者六腑所

成也積者陰氣也其始生有常處其痛不

離其部上下有所終始左右有所旁處聚者

陽氣也其始生無根本上下無所留止其

痛元常也△五藏五積詳別見五十六准

△案以七情命五積之病曰者始嚴用和氏也

△本義云肥之言盛也有頭足者有大小本

末也云云

△金云五藏五積之立名始干吳起邪氣藏

府病形篇而故肝積痞氣之名余載同父

不知此其刊誤以心之積名伏深出難起云然伏深有三種一見形所謂心積也一素問腹中命

△三十九准云住之為病其內苦結男子為七疝女子為瘕聚云云

有水疽水氣脾氣及婦人血脈皆能令入脹滿
又當各以類求之

積聚

五積六聚者五藏六府之有所積聚其為病也
諸書所載皆以內為言怒憂思七情之氣剋制
五藏結而不散乃成積聚之證故憂傷肺者以
所勝傳之肝遇憂則脾土旺傳越不行故成肝
積名曰肥氣其狀在左脇下天如覆杯似有頭
足診其脉弦而細其色青兩脇下痛引小腹男
子為積女子為瘕聚失志傷腎者以所勝傳

余我日居於寒而不通也
今天如覆杯

△本我日居於寒而不通也

心過秋則金肺旺傳剋不行故成心積名曰伏
梁其狀起於臍上如臂循梁之橫架於胃脘
間診其脈沈細而芤也其色赤腹熱心煩面赤
咽乾今人食少羸瘦甚則吐血怒傷肝者以所
勝傳解過冬則腎水旺傳剋不行故成脾積名
曰痞氣其狀見於胃脘大如覆杯痞塞不通診
其脈浮大而長其色黃過飢則減過飽則見腹
常滿而足腫兼以嘔泄久則肉削今人四肢不
取喜傷心者以所勝傳脾過春則肝木旺傳剋
不行故成肺積名曰息責其狀覆在右脇下大

持六指則吐而食不下也

⑤ 胃者指曰曰元未煉也

△ 詩小雅巧言之篇曰他人有心予忖度之

如和扶喘息奔溢診其脉浮而毛其色白氣逆
背痛目昏閉而唇寒皮中時痛如刺或如風綠
思傷脾者以所勝傳腎遇其則心火旺傳胞不
行故成腎積名曰奔豚其狀發於小腹或淩心
下上下無時有若奔豚之狀診其脉沈而急其
色黑飢則見飽則臌小腹裏急腰痛背脊脹
口乾久則令大骨癢少氣到如六聚之在六府
其痛上下亦無常處在上則格在下則脹旁攻
兩脇如有塊易於轉動此其與五積為異耳
雖曰氣之積聚而成此證余忖度之必是因氣

△下條詳云子巨類式之子其病廣幾
元功意旨也適也。
云義

△實心法及相映外之續用導引也

結聚痰飲或是積聚之物而後能堅硬如此發
崩之初早能辦其脉證投以藥餌或以導引之
法云云廣幾若其見形於皮膚之下藥入腸胃
熾熱之所不及誠為難治之證凡積聚之脉實
弦者生沈小者死
一傳化五藏故胃之停滯者胃
脈為諸陽之
榮國 敬遠元

宿食

人之有身藉五穀以生故胃以納之脾以化之
脾胃喜暖不宜以生冷傷之體虛者不善調
養飢飽失時或過餐飲食并一切生冷之物脾
胃怯弱不能消化停滯胃脘遂成宿滯輕則吞

△明理會曰自汗者謂不因發熱而自然汗出者其也。

△方考云有目而自汗非病也。

△血与汗異名而同類故發汗者先血奪血者无汗。

△金匱曰營衛者精氣也血者神氣也故血之与氣異名同類故奪血者无汗奪汗者无血。

△上文言營氣以精和養津液化其精微上出于肺脉化而為血則以營氣而化以液而為汗即心之液是血与汗亦一物而異名也。

酸嘔氣胃滿嘔噎或泄或利其奧如抱壞雞子或米穀不化甚則積聚結而為癥瘕之病治之須究其源又須量入之氣體虛實病證淺深投以藥餌病之淺者則消化之甚者必預推利而後調補脾胃或有因扶裏奪之氣而泄者又當以脉證辨而料理。

自汗

水火不濟心火上升則發汗

心之所藏在内者為血。溢於外者為汗。蓋汗乃心之液而自汗之證未有不由心腎俱虛而得之者故陰虛陽必湊發熱而自汗陽虛陰必寒。

△方者曰暑。產中之名也。
 △醫綱十七云。歲時流汗皆屬腎經。腎病者
 流汗出。惜風是也。

△明理命曰。虛煩者。心中時時而煩也。有胃中
 煩。有心中煩。有虛煩。諸如此者。皆熱也。若止云
 煩者。表熱也。及其邪熱傳裏。故有胃中煩。有
 心中煩。虛煩之別。三者要在現其熱所從來。
 虛煩之狀。心中溫々然欲吐。煩々然无示欲吃
 不吐。按之亂々是名煩也。
 素問。調經篇文也。

發厥而自汗。此固陰陽偏勝所致。又有傷風中
 暑病濕。兼以驚怖。房室勞極。壓節腸癰。痰飲產
 辱等病。亦能令人自汗。如睡中不覺汗出者。是
 名盜汗。亦心虛所致。其脉多微而瀉。濕而虛治
 之。宜斂心氣。滋腎水。使陰陽調和。水火升降。其
 汗自止。自汗之證。若兼以他病。又當各類求之。

虛煩
華度曰。外熱曰熱。內熱曰煩。身覺熱。謂自合痛。口乾咽煩。不
 過清。不寐。皆虛煩也。

虛煩之疾。非止一端。究其大槩。多是體虛者。攝
 養有乖。經術不調。使陰陽二氣有所偏勝。或陰
 虛而陽盛。或陰虛而陽虛。素問云。陽虛則外寒。

陰陽水火以二以十交萬化之
病證是受其化也
如勞之入腎水有虧心火內蒸其煩必躁吐
瀉之後津液枯竭煩而有渴惟傷寒及大病後
虛煩之證却無霍亂臨病之際又宜審之治法
宜用以平和之藥清心實下未可峻用補藥又
若婦人產後去血過多虛煩發熱又當各以類
求

補藥徒忘者為良有加先於百散不知首
尾此以為病之名非比生成之愚禍不知人其
徒然林補珍作徒然會徒然立也

健忘

健忘者徒然而忘其返也雖曰此證皆由憂思

其心胞以致神

癩痢

合臣就目大人曰瘰癧瘰癧云小兒胡湯

疾歌唱在

子

子

魚鱗者不所養也。獨有濁痰流入其中。以主宰。故昧其明。言語交錯。或稍氣亦以流通。遂去濁物。其言猶復自也。此名為痰迷心竅之應。非邪祟也。

△新大成云。犬癩癩病者。考之諸方。所說各殊。不同。唯備載。現別錄有五癩之說。云。

△癩癩亦有五種。謂諸陽。陰。風。濕。火。是也。詳病源也。

△癩五癩配藏。錢氏與別錄不同。但大成曰。三司方之所說。

△方考曰。或作六畜。戶者。風痰。較其氣。竅而戶自變也。譬之弄笛。弄六孔。閉塞不同。商官別異也。

△別錄云。雞癩作雞叫色。以雞屬足。足明。則金主之。應平胃。云。

△癩錢氏方五癩之說。除馬癩。而更有犬癩。應平肝。亦以雞癩屬肺。无胃。癩也。

△另錄云。猪癩作猪叫。以猪屬亥。手尸。庚心。包絡。爪木主之。應平右腎。△牛癩作牛吼。色以牛屬丑。平太陰。應五主之。

△至抗云。按千金方。叙六畜癩。牛馬羊猪犬雞。並下以六畜屬五藏。今三司所引五癩。无犬癩一症。錢氏叙五癩。无馬癩一症。各以五藏分配五藏。各不同。俱不知所由然也。

後惡露上衝。而語言錯亂。神志不守者。各當隨其證治。所謂五癩者。馬癩。羊癩。雞癩。猪癩。牛癩。是也。其為證也。卒然之際。旋暈顛倒。口眼相引。手足搐搦。背脊強直。口吐涎沫。食頃乃甦。原其所因。五臟之間。或為七情之氣。鬱結。或為六淫之邪氣。所傷。閉塞。諸經一時痰涎壅滯。心竅致有此證。馬癩。作馬嘶者。應平心。羊癩。作羊叫者。應平脾。雞癩。作雞聲者。應平胃。猪癩。作猪叫者。應平腎。牛癩。作牛吼者。應平肺。此又以五行合五臟而言。須詳考其因。施以治法。大抵當以祛

△丹溪曰：不分五等，大行痰為主。

方考曰：癰疾之原，得之於氣，或在母腹之時，或在有生之後，必以驚恐而致疾，故曰驚癰。

○腎氣不足，則其氣不固，有之於胎，則其氣不固，有之於生，則其氣不固。

△三因方云：癰因房室過度，元氣虛冷，陽功不聚，不收，墜入囊中，上下不定，謂之。

△氣一，時大時小，或痛或不痛也。詳三因也。

△外腎浮腫，三因号之卵癰。

△水癰包水而腫也。三因云：病者久坐冷濕，氣下凝，致腫，腫脹，屬外所因。

△濟生方云：輕則時出黃水，甚者成癰潰爛。

大抵卵癰，皆不易治，氣一水一灸之。

痰順氣為先，然後辨其有無風寒暑濕之氣，方可補其五臟。又有在母腹中受驚，及幼少時有所感觸而成，此證又當辨之。

陰癰

陰癰之證，其種有四：一曰腸癰，二曰氣癰，三曰外腎浮腫，四曰水癰是也。究其所以，皆是腎經虛寒，或為勞役所傷，或為風濕之氣所侵，結而不散，久則腎氣虛損，而成此證。外腎腫脹者，偏有小大，或堅硬如石，或臍腹絞痛，甚則層囊腫脹，成瘡時出黃水，病而至此，未易治也。腸癰亦

△元氣在膈下三寸。又曰丹田。清生方云灸百壯良。

壯良。

△方考曰癰疽者頑病也。舉凡愈大而無疾苦也。此以父子相傳得於有生之初已然。雖若有生之後三因所致之疾也。故不必主治。或有先是癰疽。後來疾苦者。此舉前件六症也。

宜於前方消息之。

○此要明腎傷自水元元氣悔也。

△清生方云。癰疽則為癰冷。

△金云。癰疽癰冷之說。宜考格致局方癰疽醫經。詳辨其可否自定。

△脾虛當作肺虛。脾字傳寫之差也。

然惟氣癰。水癰。關元灸之可愈。又有小兒自生以來。外腎偏墜者。此又宿疾。不必醫療可也。

瘡冷。

△奇效良方云。六癰冷者。癰疽年久不愈者也。冷者為未。

人之一身。貴乎陰陽外降。平和無偏。若有偏勝。是即為病。瘡冷之證。皆以人身真陽耗散。脾胃卑弱。加以食淡冷物。愈傷其脾。腎癰結其於藏府不散。以致手足厥逆。畏冷。憎寒。飲食不化。嘔吐涎沫。或太腑洞泄。或小使頻數。其為證也尤多。治之須暖下元。兼理脾胃。若又有脾虛而畏寒者。令人咳嗽。又當於咳嗽門求之。

子 41-385

△陽生方云陽偏盛而為積熱之症也。

△推度云果熱病在心肺積熱病在腎肝。

此篇初言心腎之病以通以可其內之

新大成云血既聚不意竟宗桂曰本大陰

盛血表陰手傳寫之禁也當作陽守云

△摘要云咳血者咳出痰內有血是也吐血者吐

全血者是也咯血者每咳出皆是血痰底血

者鼻中出者是也溺血者小便出血也下血者

大便出血也血色分為六候是熱症候有血

寒新出之不同或妄言為寒者誤也。

積熱

積熱者熱毒蘊積於其內也。夫人固有體氣素實一時感觸熱毒之氣或鬱積藏府之間或在心肺之間令入口苦咽乾涎唾稠粘眼淚多淚口舌生瘡大小便秘結又有陰盛血衰日上四力作除三焦已燥服餌酒炙之物并丹石之與愈助其熱結滯於內亦能令人變生諸證治之須詳其脉證若在心肺者清之結于藏府者蕩滌之更量入氣體虛實輕重用藥。

吐血

肺咳血喘血

△摘要云大吐血從下流者為肺癆從上面

人身之血猶水行地中百川皆理則無壅決之

患一身之間榮衛失調七情四氣相干氣血逆

亂然後發生吐血衄血諸證夫血之妄行固由
△傳曰鼻出血皆是陽盛陰虛而有升元
降血諸氣上越出上竅

脾主心火故行也

萬應湯

△刊誤曰他症吐血皆以沈細為生惟中壅吐
血以洪大為生云

人身之血猶水行地中百川皆理則無壅決之
患一身之間榮衛失調七情四氣相干氣血逆
亂然後發生吐血衄血諸證夫血之妄行固由
積熱所致然其證多端難以一一繫而論有因
食過飽負重傷胃而吐者有思慮傷心并積熱
而吐血衄血者有勞傷心肺又為七情所干而
咳血吐血者心主血肝藏之而脾為之統通思
傷脾亦能令人吐血治之須究其因傷胃者調
胃勞傷心者補益其心志熱則清之氣鬱則
順之傷脾則安之吐血之脉宜沈細不喜浮數

△此舉云救中帶紅線者久則必成勞瘵

△三因云有者因飲食中熱之燥傷肺血得

熱則溢因作嘔吐出血一合或半外計名曰

肺血傷者則胃傷於虛則屬肺右以此外不

△折大脈云失血有三種一曰內衄二曰肺疽三曰

傷胃是也

向經之說又見明理會下

方考曰漢在內陽之守也故曰實陽在外陰之

衛也故曰衛

△三十二難曰心者血脈者氣血為官氣為衛相隨

上下謂之官衛

△官衛生衛者曰衛者為官滿者為衛官行脈

中衛行脈外

△此舉云陰在內陽之守也陽在外陰之使也

此舉云此舉有以辨其為官衛一句

吐而不收者易治中帶紅線者難醫為其有
所損故也病之淺者惟有早灸膏肓而已致君
肺生疽瘡從高墜下下應傷折皆能吐血傷寒
汗後不解鬱結經絡隨氣湧決吐血衄血又當
從各類求之

下血 一百五十

人之滋養下身惟氣與血血為榮氣為衛榮行
脈中衛行脈外故心主血肝藏之而脾為之統
貴於氣順則血調若內因七情并酒食所傷外
為四氣相干則血氣逆亂榮衛失度皆能令人

道。

歲事下血者必在糞後名遠血也。

△丹溪曰。血從大腸來。逐血從小腸來。天

△摘尋云。下清血而色鮮者。腸風也。血濁而色黯。

者。賊毒也。

金一本作蟲清生云肝門射如血線者或蛇也云

△丹溪曰諸見血為熱症。正經所謂知其要者。一言而終。不知其要者。流散而無窮。此之謂也。

病源云

近者書病

在上集下

作也

白頭翁本水也火文氣赤色無火有
火則不白動行火無以調則過熱
者行格故白頭是以要證者一
白頭翁本水也火文氣赤色無火有

金匱要云成痼不瘳者曰痔。致潰而出膿血者
淋瀝者曰漏也。

△因註釋本二十四種。

△竹法云。肛边發露因瑤。如胤乳。時今滴潰。膿血
日壯。△三因云。壯痔者。肛边腫痛。突出二枚。五
六日後。潰出膿血。自愈。

心法云：脈內結，按有血，寒熱往來，登瀉脫肛，曰

陽一、△三四云生在腸口更衣時非接擦不入。
△心法云每遇大便清血隨下而不止血痔也。三箇

云。肝边有瘀血出如射者。曰血痔。

念法云。肋边生瘡。腫痛突出。一枚。數日膿潰。即

散曰牝一。△然錄云。淫痔乃牝痔。另名云。

金素盛有候錄之盲心注三因同出酒痔各症

日酒痔則每遇飲酒發動瘡腫而流血。

△心法云：胸中煩之突痕，且痛且痒，出血淋瀝，曰

原壽。三因云。頭脈中逆出小竅。注下動血。

痔漏

四卷。通義。漢書。卷四。也。

痔之疾五種。牡痔。腸痔。血痔。牝痔。痔是也。究其所以因。皆是素蘊熱毒。或過食燒炙新酒。又座血脈不流。或因七情之氣鬱結。平藏府之間。其毒不能消散。發而爲痔。或藏於肛門之內。或突出於外。犬者如蓮花雞冠。核挑之狀。小者如牛妳。雞心鼠尾。櫻桃之類。名狀更多。其實皆由藏毒所致。故蘊毒深者。其狀大。蘊毒小者。其形小。或流膿水。或出鮮血。行坐之間。病者殊爲之苦。久而不治。血氣衰弱。必然成漏。今之治法。多用

心法云痔
者日腐
腐本虛外
傷風因內
熱氣在脾
納欠持多
結自成以
故氣血下
墜結聚紅
口痔不
散而衝突
爲痔也。
心法云痔
痔久不愈
必生穿水

△此證與前證去毒清毒之文相類而視之則其
另自可見也。

△心法云。治法經要。大抵以解熱調血順氣主
之。蓋熱則血傷。血傷則經滯。經滯則氣不運
行。氣與血俱滯。乘虛而墜入大腸。此其所以
為痔也。

△時珍曰。生者砒黃燻者名砒霜。

△金紫痔漏者。初肛邊生瘻。久不已。遂生穿穴。
為漏也。瘻者。唯偶余肛邊生一竅。流出膿
血。初先非生瘻。漸潰破。而為漏穴者。故大成云
无痔者。肛邊另有一竅也。所以然者。痔者。初
成。瘻不破。昔之名也。

△草會取藥作瘻。

△漢風穴。九生則死。又云。在皮膚則血水出而已。已截府瘻則大便出也。

刀線割剔其痔。雖有藥可以封固。然其毒在內。
無由而去。必有再作之理。否則成漏。轉而為難
治之證。諸法多有服食敷貯之藥。今人用之少
見有效。揆度其理。其病既有形於外。非服藥之
能愈。必須用去毒消痔之藥。點之候其毒盡痔
消。方可為愈。切不可用砒霜等毒藥。恐致入奄。
忽慎之。慎之。又有無痔者。肛門左右。別有一竅。
流出膿血。名為草漏。治之須用溫煖之藥。補其
內。又以生肌肉之藥。敷於外。其竅在皮膚者。易
愈。藏府有損而生竅者。未易治。

△楊女操六紅也。言其外似車紅形。按曰。肛門即廣腸也。又名腫腸云。

△紅會銅鏡紅也。謂車轂中鐵。自閩以西謂之釘云。

△產育 三四十 產蓐

△三四五六七八九及久痢之後

野水
桂枝加附子湯
八味丸

脫 C 謂神胃大腸為表裏。神土金而可邪去也。

肛脫

集靈云。脫在脊下即痔也。俗作肛非也。全案。集靈云。脫自已新案也。何者。脫肛者。水肛門脫也。云。

肺與大腸為表裏。故肺臟蘊熱則肛門閉結。肺臟虛寒則肛門脫出。此三因之論。又有婦人產育用力過多。及小兒久痢。後臟寒皆能使肛門突出。治之必須溫肺。補腸胃。父則自能收矣。

遺尿失禁

同案云。小便便自遺失禁者。溺出而不知也。又云。膀胱不約。為遺尿。小便不禁。常上出而不寬也。

人之游涼。藉心腎二氣之所傳送。蓋心與小腸為表裏。腎與膀胱為表裏。若心敗腎氣虧。陽氣衰。令傳送失度。則必有遺尿失禁之患。故經云。膀胱不利為癰。不約為遺是也。治之宜補。幾下元。

乃集靈
神子胃大腸

回春丸脫
肛首肛門
甜出屋果
脫也云云

△喉咽小便原委論云膀胱者膈之室也
△格致

△三因云喉以候氣咽以嚥物咽接三焦以通胃
喉通五藏系膈氣散故分故然明自有為水
喉殺喉之說者謬說也

△喉
力有切有骨

△吐嚥不下 筋成作 吐不出嚥不下

△玉枕云古下後生一小古子名曰子古康

△面赤云古下有形如古而小者名曰重舌

又曰重舌乃古下生舌也

△至枕云經曰火疳是之矣謂發汗也然咽喉中

豈能發汗故出血乃發汗之端也

△喉

△玉枕云古者色音之枕也應喉垂者音聲之

關也

△案上脘垂下如經形者曰懸癰又曰懸門當此所而生瘡之謂懸癰也又有一種懸癰者坐谷道外腎之間其說詳于區鑑問答也

清心寡欲又有產厚不順致傷膀胱及小兒胞
冷俱能令火遠尿失禁又常隨證施治

咽喉

附重舌云區字指而曰喉則通氣咽則嚥物喉在前
咽在後喉主出納咽則吞之而已

咽喉者為一身之總要與胃相接呼吸之所從
出若胃腸之間蘊積熱毒致生風痰壅滯不散
發而為咽喉之病喉內生瘡或狀如肉腐為腫
為痛塞塞不通吐嚥不下甚則生出重舌治之
尤宜先去風痰以通咽膈然後解其熱毒遲則
有不救之患又有熱毒衝于上腭而生瘡謂之
懸癰及肺寒亦能令人咽閉吞吐不利肺病須

△喉
道也喉也
者所以上
下者也

○田子
枯使主竹湯
托子六

群客
其托云：天有日月，人有兩目。

△大惑篇云：五藏六府之精氣皆上注于目，而為之精。之精為眼，骨之精為瞳子，筋之精為眼眦，血之精為眵，淚氣之精為白眼，肌肉之精為眳。目者五藏六府之精也，皆衛氣之所常營也，神氣之所生也。

△龍太命云：五輪者，肝、心、脾、肺、腎也。

△世說曰：徐得九歲人，口中无物，當益明。徐曰：如人眼中，有瞳子，如此必不明。

詳審其說，施以治法。

眼目

○四時眼附症：一方初青，四時。

人之有兩眼，猶天之有兩曜，視萬物，察纖毫，何所不至。日月有一時之晦者，風雲雷雨之所致也。眼之失明者，四氣七情之為害也。大抵眼目為五藏之精華，一身之至要。故五藏分五輪，八卦分八廓。五輪者：肝屬木，目風輪在眼為眳；心屬火，目血輪在眼為二眵；脾屬土，目肉輪在眼為上下胞；肺屬金，目氣輪在眼為白睛；腎屬水，目水輪在眼為瞳子。至若八廓無位，有各勝。

谷

△脾度目腎氣通于耳腎和則耳能聞五音矣。

血脈凝而不流亦成癰疾當量人老少氣虛
實用藥又有腎虛者亦能令人眼自無光或生
冬野止當補機下元滋其腎水北方之人患眼
最多皆是目目風沙夜則熱坑二氣交蒸使然
治之多用涼藥北方藥受與南方不同故也疹
豆之後毒氣結於心肝二經不能自已發於眼
目傷于瞳人者素無治法。

耳

耳手少陰經

○腎氣虛則耳鳴耳聾
八味丸治之

夫耳者腎之所候腎者精之所藏腎氣實則精
氣上通聞五音而聽矣若疲勞過度精氣虛

天_{上焦} 地_{中焦} 火_心 水_腎

肝_{下焦} 脾_{中焦} 山_{中焦} 沃_{下焦}

△痘疹心印云兩目不開思見明者謂之蓋明
惟而暗處救開也

△面赤蓋明怕白屬難開

△龜本命云眼疾有七十二種以障二十三條外
障四十九條病狀不同

之府為天麻勝眇之府為地麻命門之府為水
麻小腸之府為火麻腎之府為風麻脾胃之府
為雷麻大腸之府為山麻三焦之府為澤麻此
雖為眼目之本根而又藉血為之包絡五藏或
蘊積風熱或有七情之氣鬱結不散上攻眼目
各隨五藏所屬而見或腫而痛羞淚多淚或生
障膜昏暗失明其證七十有二治之須究其所
因風則驅散之熱則清涼之氣結則調順之切
不可輕用針力點割倘得其愈出平倖僥倖或
不然為終身之害又且不可過用涼劑恐冰其

△良方云示兒腎藏虛而精氣上衝於耳津液竭
滿則生膿汁有因沐浴水入耳內水濕停積搏
於聖乳蘊積盛熱亦令耳膿汁出謂之聾耳
而不痒則亦有牛成聾碎者

澤會元句胡凡切說文說
 澤有也茅單聲
 (燁)同音津色也又
 問句燁說文

度治設工司札事王記一人為卑陶注象陶鼓匠
外司農口般亦長六尺六寸通作碑孔記京籍
碑四吏之賤者音与連同

△三十七難曰。肺氣通於鼻。七和則知香臭矣。

△荀子曰香臭音氣之應鼻者猶臭故香亦謂之臭音天

△經脈篇云：小腸手太陽之脉起于小指之端，云其支者從缺盆循頰上頰至目眦，皆却入耳中。

△焦牛少陽_云其又者按耳後入耳中出走耳前_云

△五臟者，耳者腎之官也。天云：腎病者，顛與頽。

於是平風寒暑濕得以外入喜怒憂思

傷遂致聾耳鳴熱壅加之出血出膿則成聾

耳底耳之患候其顛頰色黑者知其耳聾也亦

有手少陽之脉動發而聾者耳內

手太陽脉動。缺而聾者耳內氣滿也。大抵氣厥

耳聾尚易治精脫耳聾不易愈諸證既殊治各

有法リ 轉々 吳托音又土源切。屬法爲耳。諺云。然則然。豈竟不事也。
註曰。轉々。轉々。處也。時音推。又能生切。

鼻 脉度鼻通于鼻肺心则鼻能知香臭矣

夫鼻者肺之候職欲常和和則吸引香臭若

情內鬱六淫外傷飲食勞役致鼻氣不得宣調

水也。
 全日服之
 必有眩暈
 本膏能治
 飲主之。

△明理會曰：千金翼曰：吐血有三種：一曰肺癰，二曰傷胃，三曰內傷。吐衄家謂之內傷，則其真中出血者，可謂之外傷云。

△明理會曰：雜病類書：黃熱在裏，傷寒則有黃熱在表。一經曰：其人發煩，目脈劇者，必衄。乃解所以然者，陽氣重故也。

△又曰：桂枝湯麻黃湯治衄者，非治衄也，即是發散，經中邪氣不若邪氣不得發散，雖在表無通迫於血，則因致衄也。

△全云：大成本于初經文也。

△厥後曰：脾氣通于口，脾和則口能知五味矣。

清道壅塞其為病如為衄，為癰，為息肉，為瘡癤，為清涕，為衄塞不通，為濁膿，或不聞香臭，此皆肺藏不調，邪氣鬱積於鼻，清道壅塞而然也。治之之法，寒則溫之，熱則清之，塞則通之，壅則散之，無越於斯，但時氣鼻衄不可遽止，如出三升已上，恐多者，方可斷之，活人書所謂衄血者，乃解蓋陽氣重故也，此又不可不知。

口唇

指熱盛者此陽重也。王云：血乃養口之精也。石下七物以桂枝去芍藥之類。

夫口者，足太陰之經，脾之所主，五味之所入也。蓋味入口，藏于胃，脾乃運化，津液以養五臟五

血滿於人，胃無求子，亦也。

△經曰諸液枯潤乾動逆揭皆屬於燥云
△經曰諸液枯潤乾動逆揭皆屬於燥云
△經曰諸液枯潤乾動逆揭皆屬於燥云

△經曰諸液枯潤乾動逆揭皆屬於燥云
△經曰諸液枯潤乾動逆揭皆屬於燥云
△經曰諸液枯潤乾動逆揭皆屬於燥云

△經曰諸液枯潤乾動逆揭皆屬於燥云
△經曰諸液枯潤乾動逆揭皆屬於燥云
△經曰諸液枯潤乾動逆揭皆屬於燥云

△經曰諸液枯潤乾動逆揭皆屬於燥云
△經曰諸液枯潤乾動逆揭皆屬於燥云
△經曰諸液枯潤乾動逆揭皆屬於燥云

藏之氣偏勝由是諸疾生焉且熱則為寒酸則
停滯滋則因燥淡則由虛熱則從苦從其也口
臭者乃府藏燥腐之不同蘊積於胃膈之間而
生熱衝發於口也口瘡者脾氣凝滯風熱之而
然至於唇者亦脾所主經合於胃脾胃受邪則
唇為之病蓋風勝則唇動寒勝則唇揭燥勝則
唇乾熱勝則唇裂氣鬱則生瘡血少則藩生
而無色治法內則當理其脾外則當敷以藥
無不效矣

牙齒 時珍曰兩旁骨中牙齒 金匱曰牙有上下四十六
枚滿上下六十八枚有之合三十二枚也或三十八枚也是平
人血氣調者數也甚盛實者或至四十枚也

○以月空氣神國火之己

八味丸 葛根湯

△經脈別篇云平陽明之脈起於大指次指之端，其支者從缺盆上頸，貫頰入下齒中，還出挾口，夾人中，左之右，右之左，上扶鼻孔，是動則病齒痛。云云△足陽明之脈起于鼻之次頰中旁約太陽之脈，下循鼻外，入齒中，還出挾口，環唇，下交承漿。云云

△傳曰：經曰百病之起，有生於本者，有生於標。

者，大指乃腎之握骨之餘也。

△四十四難曰：齒為戶門，飲食由此得入，聖家室之門戶也。

△進字解云：頤重齒高也。

△和藏云：牙齒是手足陽明之所趨，上繼脾土，下足陽明胃之脈所貫終也，止而不動，下繼腎物，動而不休，半陽明太陽之脈所貫終也。

△三因云：太陽虛則齒為之浮，太陽虛則齒搖，扶風則攻目頭面，疳積則齲脫為痔。云云

△正傳云：大齒齒齲宜露而動搖者，腎元虛也，治宜滋陰補腎為要。云云

△經脈篇曰：心氣通乎舌，心和則舌能知五味。云云△經脈篇曰：脾足太陰脈連舌下，散舌本。云云△經脈篇曰：脾脈係舌旁，肝脈絡舌本。云云

△經脈篇曰：心氣通乎舌，心和則舌能知五味。云云△經脈篇曰：脾足太陰脈連舌下，散舌本。云云△經脈篇曰：脾脈係舌旁，肝脈絡舌本。云云

△本綱云：凡食肥甘，胃受濕熱，口作臭，息次弟齒黑，名曰齒疳，漸至齲爛，名曰潰槽，又或出牙，名曰宣露。云云△痘疹心印云：牙新生時，時出血，謂之牙宣，吐吸臭，謂之臭露。云云

齒乃骨之餘氣，骨乃腎之所主，呼吸之戶門也。

精氣強則齒自堅，腎氣衰則齒自豁，且手陽明大腸之脈入於齒，灌注於牙，倘風寒壅熱之氣鬱滯心胃，衝發於口，則齒為之病矣。輕則宣露齲頭浮腫，甚則為疳，齲脫之證也。亦有腎氣虛，齒痛宜露，當以補腎藥以治之。

經曰：心氣通乎舌，心和則知五味矣。蓋舌者脾脈之所通，心氣之所主，和則知味，資於脾而榮於身者也。二藏不和，風寒中之，則舌強而不能

古 會元凡物入口以于其舌也。 名氏云：以于其舌也。

經曰：心氣通乎舌，心和則知五味矣。蓋舌者脾脈之所通，心氣之所主，和則知味，資於脾而榮於身者也。二藏不和，風寒中之，則舌強而不能

於身者也。二藏不和，風寒中之，則舌強而不能

同春曰：牙齲宜露者，胃中寒熱也。

金匱云：齒齲者，是也。

食肉云：齲者，是也。

齲者，是也。

齲者，是也。

齲者，是也。

△區區古上忽脫出口外俗云是喉必毒用雄

血一小盞浸之即縮入矣

△回春云蓋古乃古下生古也不自乃腫硬不

果和也

△明理云古者心之官法應南方之火本紅而

沃傷寒三四日以後古上有喉舌清和胎或

燥或淡或黃或黑是數者熱氣淺深之

謂也

△病原云脾胃有風熱邪氣乘之而衝發

於唇尋血氣相搏則唇裂炸也

△區區曰甲鼻管痘發為鼻鼻腔空主之

△髮本其家謂之血絲

言盛熱攻之則舌腫而不得語更有重舌木舌

舌胎出血等證皆由心脾虛風熱所乘而然矣

五藏內外所因證治

金匱云大抵證治門中各證皆由五藏之病而然也

人身之有形於外者必有諸內故五藏之受病

於內而發於外者必見之眼耳鼻舌口牙之間

心經蘊熱則口舌生瘡唇口裂壯熱與胃相通

故受熱則噎氣臭穢腎受冷則耳不能聽或兼

風則牙痛頰腫肺受風邪則皮毛癢痒積毒則

發為癰疽肝受病則目不能視髮乃血之餘焦

枯者血不足也此皆病在內而應乎外也凡有

內外內因外感是皆一病一經之

△瘰 原病式云淺而大也。△瘰源去腫二寸至五寸瘰也。△正傳曰得熱而淺。△因依曰六府主表其氣淺故瘰皮薄而腫高。
△瘰源云一者大而高起屬平陽六府之氣所生也。

△疽 原病云深而惡也。△瘰源云五寸至一尺疽也。△正傳曰感伏而深者為一。△因依曰五藏主裏其氣深故一皮厚而腫堅。
△瘰源云一者平而內收屬平陸五藏之氣所生也。△全云精義有一一之解及因依畧之。

△瘰 瘰源云一者平而內收屬平陸五藏之氣所生也。△全云精義有一一之解及因依畧之。

△瘰 瘰源云一者平而內收屬平陸五藏之氣所生也。△全云精義有一一之解及因依畧之。

△瘰 瘰源云一者平而內收屬平陸五藏之氣所生也。△全云精義有一一之解及因依畧之。

△瘰 瘰源云一者平而內收屬平陸五藏之氣所生也。△全云精義有一一之解及因依畧之。

△瘰 瘰源云一者平而內收屬平陸五藏之氣所生也。△全云精義有一一之解及因依畧之。

△瘰 瘰源云一者平而內收屬平陸五藏之氣所生也。△全云精義有一一之解及因依畧之。

△瘰 瘰源云一者平而內收屬平陸五藏之氣所生也。△全云精義有一一之解及因依畧之。

△瘰 瘰源云一者平而內收屬平陸五藏之氣所生也。△全云精義有一一之解及因依畧之。

△瘰 瘰源云一者平而內收屬平陸五藏之氣所生也。△全云精義有一一之解及因依畧之。

△瘰 瘰源云一者平而內收屬平陸五藏之氣所生也。△全云精義有一一之解及因依畧之。

△瘰 瘰源云一者平而內收屬平陸五藏之氣所生也。△全云精義有一一之解及因依畧之。

△瘰 瘰源云一者平而內收屬平陸五藏之氣所生也。△全云精義有一一之解及因依畧之。

其證必須考其所自來辨其冷熱虛實治之

癰疽瘡癤

癰疽瘡癤者上之皮大以堅如牛頓之皮也。其皮上薄以深其候也。

凡瘡之痛痒即屬虛實寒熱故痛而實者為熱虛痒者為寒經云諸瘡痛癢皆生於心以心主血而行氣氣血凝滯而為癰疽瘡癤闊大一寸以上曰癰疽一寸以下曰瘡癤諸瘡之中惟背疽丁瘡最為急證其初發也使身體或先熱而後惡寒或先癢而後痛若其不痛最為惡證且如背疽始生如黍粟粒大纔有覺時使用艾於痛處灸之痛則灸至痒痒則灸至痛使毒氣隨

通者先為其未達所以痛而次及將潰所以
不痛也。

△全云精義灸瘡瘡腫法詳也。

△而春云凡瘡疽未破毒攻厥府下毫熱赤不
敢用苦已破潰成府既腐故入食少進毫
冷藥不敢用。

△必字作多 醫林

△精義云在手足頭面宜背骨節間最急。

△瘡瘡云內經有五疔生地白一瘡右鼻赤一瘡

右根黃一瘡口唇黑疔瘡耳前青一瘡目下

△瘡瘡丹方見 醫林回春。又正傳 瘡癰門

有一膏。

△乳膏膏方見 奇効良方

△全云瘡癰與醫一音相同。醫如奔豚作奔

徒天鈞內約作天吊內吊。

△入門云。浮淺者為疥。深沈者為癰。皆有

細虫而能傳染人云。

久而散若失之於初瘡勢已成又當審其虛實
寒熱熱實則清之。虛寒則溫之得毒消腫潰方
為可治之證了瘡者必發於手足之間生黃泡
其中或紫黑色有一條如紅線直上倉卒之際
急宜以針於紅線所至之處刺出毒血然後以
蟾酥亂香膏等於正瘡上塗之針時以病者知
痛出血為好否則紅線入腹攻心必致危困至
若瘡癰癰疽瘰癧之類皆毒氣鬱積於內發而
為此治之皆須解毒潰膿若氣血弱者又須生
之此一定之法瘡癰疥癬之類隨其藏府所受

蠟赤痒病。有膿是也。

唐履含環稿
破出水是也

薄皮小瘡。
常々油汁。

仲煩躁。名曰熱
瘧。不丸痛痒。經
脈之氣。發瘡癰
毒。一。初生如飯粒
肉。及如花開之
容。相瘡瘡也。

各有方隨證選擇

附癰疹
心火不
分動
爲此
也

或腫或皮肉疼痛或抓之凸起或破大也

萬根萬運

△瘰癧初生甚小。先痒後痛。汁出浸漬溫爛。延及遍身。名曰浸淫瘡。

△瘰癧曰瘰癧者。結核是也。或在耳後。或在耳上連及頤頰。或在頸下連及缺盆。

△瘰癧云結核連續者。為一也。又從在所立名曰瘰癧也。

△門云瘰癧即漏也。經年成漏者。与痔漏之漏相同。但頸則曰瘰癧。在痔則曰痔漏。治法則一。

△瘰癧云。夫瘰癧之病。其名甚多。巢氏病源載之三十六種。千金聖惠所命。瘰癧九漏。然論說有風毒熱毒氣毒之異。瘰癧結核。寒熱之殊。

△瘰癧如貫珠。此記

△瘰癧寒熱曰。寒熱瘰癧在於頸腋者。皆何氣使生。岐伯曰。此皆風寒熱之毒氣也。留於脈而不去也。黃帝曰。去之奈何。岐伯曰。用藥之者。皆在於脈。其未止出於頸腋之間。

△時珍曰。蟻大者為虻。亦曰馬蟻。△勿府曰。浮蛆。金錄。蟻謂酒。△私云。蟻也。△山谷浮蛆。蟻。坏底滑。△轉脈。瘰癧於頸。瘰癧於腋。瘰癧也。千金詳也。△本綱。瘰癧其蛆。生入反中。蛇化為蟻。

瘰癧或膿水浸淫。治之內則當理心血。祛散風熱。外則敷洗。理無不愈。

瘰癧 內經音尺。音瘰癧。瘰癧音瘰癧。

大陷胸湯

瘰癧音瘰癧。瘰癧音瘰癧。

夫瘰癧之病。即九漏是也。古方所載。名狀大槩不一。難以詳述。及其生也。多結於項腋之間。累累大小無定。發作寒熱。膿水潰漏。其根在肺。蓋肝主狼瘡。胃主鼠漏。犬肺主蠅。肺主蜂。肺主蛇。蛇漏。心主蟻。蟻漏。脾主浮蛆。脾主瘰癧。小腸主轉脈漏。原其所以。多因寒暑不調。或由飲食不節。遂致血氣凝結而成也。巢氏

△是把寒熱篇說鼠瘻之末云黃帝曰其
生死奈何岐伯曰反其目視之其中有赤
脉上下貫瞳子見一脈一歲死見二脈半
半死見三脈三歲死見四脈半三歲死見
三脈三歲而死赤脉不下貫瞳子可治也
昌曰赤脉從上而下貫瞳子中又見論
疾診尺篇

△外科集驗方云刀斧所傷者曰金瘡

所載決其生死反其目以視之其中有赤脉從
上下貫瞳子見一脈一歲死見二脈半一歲半
死見三脈二歲死見四脈半三歲死見三脈
三歲死赤脉不下貫瞳子可治三因云有是說
驗之少有是證理宜然
劫傷○逐家通謂生金方也下於白濁 劫傷者謂其有所傷於身體者也或為刀斧所
刃或墜墮險地打撲身體皆能使血出不止又
恐瘀血停積于藏府結而不散去之不早恐有
入腹攻心之患治瘡之法須外用敷貼之藥

△藥石散見醫方疏費——二味也

△病深者見其懸柱便勿處截劫其繩試之則不可救此言氣已絕則繩忽暴斷其氣血通而奔逆還回故則氣不能逆守不得復生云

其血止其痛內則用花藥石散之類化利瘀血然後救救調理生肌或因打傷而停機其氣又當順之或因湯火所傷并具一二方以備揆討

急救諸方○附二方

救百鎰法凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得截斷上下安被卧之以二人用脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使縱緩一人以手撮按背上數上數摩動之一人摩背臂屈伸之若已踰直但漸屈之并按其腹如此一時頃雖得氣從口出呼吸服開仍引按不佳須臾以少桂湯

面赤亦勿驚之

△初源云：貴州陽盛并氣易通，夜則阻盛，其氣難通也。

△同卷云：然度月夜短，其氣又熱，難通可治。

△源流云：大蘇端識市先生東垣弟子也。着衛生室錄，其性固又有經方方。

或清粥灌之，喉潤漸漸能嚥，乃止。更令兩人以管吹其兩耳，此法最好，無不活者。自且至，雖冷亦可救。甚至且陰氣盛，難又法緊用兩手掩其口，勿令透氣。兩時氣急則活。

經驗方救凍死治：四肢直，口噤，只有微氣者，用太金煨灰，令暖，以裹盛熨心上，冬即換之，目開氣出，然後以湯清稍稍進之。若不溫其心，硬將火灸，則令氣與火爭，必死。孫真人救落水死急解法：死人衣帶盡去，腹中即活。

經驗方救溺水法：凡人溺水者，救上岸，即

△婦人調經藥方
△婦人調經藥方

△良方云常以三旬一見以象月盈則虧也

△天與會自女子七七腎氣盛齒更長三七

而天與至任脈通太衝脈盛月更以時下故

有子云法女子先天之氣方父母交媾之時

陽氣不勝其陰則為女陰中有陽其氣象

坎惟陽精盛者其內至七七乃少陽之數其

腎氣始盛

△天與八七腎氣實髮長齒更三八腎氣盛天

與至精氣盛海陰陽和故能有子云

△升幾曰考古方耗其氣以調其經以歸見人之正氣不宜耗也太衝者氣也任脈者血也氣升則外氣降則降由元智止

息若耗其氣血無所施云△清生曰女子當養血抑氣以戒專怒云

牛一頭却令溺尿之人將肚橫繫在牛背上游
邊用人扶其徐徐牽牛而行以出腹內之水如
醒即以蘇合香圓之類或老薑搗碎若無牛以
活人於長板擔上仰臥却令溺尿人如前法將
肚相抵活人身上取出即活

婦人調經藥方

△本綱曰婦人月經名紅絲珠骨有血
虧者有期月更月一行之期故謂
之月本月信月經者常也有常期也

夫女子十四則月水行男子十六則陽精溢此
皆合乎陰陽之數各及其時故男子之精氣宜
盛女子之月水宜調調經之道貴乎耗其氣以
行其血血盛氣衰是謂之從從則百病不生孕

△濟生云崩漏之疾，李子一症，然有輕重之別。
為輕者，謂之漏下。若淋瀝不斷是也。重
者，謂之崩中。忽然暴下，乃漏症之甚者也。
方考月見人，胃腸之間有帶脈，奇經八脈之
一也。週身一周，如束帶焉。下焦虛損，督任有
虧，則中焦氣血乘虛而襲之，陷于帶脈
之下。氣病為白，血病為赤，故名曰赤白帶下也。

育無損矣。且婦人之病，四時所感，不淫七情所
傷，悉與男子治法一同。惟胎前產後七般八般
崩漏帶下之證，為異故別。斯方究其所以因多由
月水不調，變生諸證。大槩婦人之疾，以經候如
期為安。或有愆期當審其冷熱虛實而調之。先
期而行者，血熱故也。法當清之。過期而行者，血
寒故也。法當溫之。然又不可不察其有無外邪
為之寒熱，而後投藥。且經行之際，與產後一般。
將理失宜為病，不淺。若被驚則血氣錯亂，經脈
動然不行，逆於上則從鼻口中出，逆於身側為

婦人經血先斷後病者名曰血分
治先病水後經血新名曰水分易治

血分勞瘵之疾若其時
為疼痛之根若患怒則氣逆氣逆則血逆逆於
腰腿心腹皆脇之間遇經行時則痛而重著過
期又安若怒極而傷於肝則又有眼暈嘔吐之
證加之經脉滲漏於其間遂成竅穴淋瀝不止
凡此之時中風則病風感寒則病冷久而不治
崩漏帶下七瘕八瘕可立而待若能治病於未
然當以調經為先故首論之各備諸方依次于
後

孕育 余曰月之孕三月之胎

格致余命見成胎以精血之後先於男女者指
證之命也愚切憂焉後聞李東垣之方有
已經水而後二日血海始淨精勝其血感者
成男四五日後血脈已旺精不勝血感者成女此確命也又云
建於左連於右精勝其血則陽為主父氣於左子宮而男形成精不勝血則陰為主
本綱曰易曰陰一陽之謂道男女構精萬物化生就道成男坤道成女此言男女生
耳存司徒精澄言血先至最精則生男精先至最血則生女陰陽均至非男非女之身
月水止後三三五日成男四六日成女東垣李景言血海始淨二日成男三四日成女
成男因氣而右動陰資之則成女丹溪朱震亨乃非指氏而是東垣主聖濟左右之說而立命
歸誠可謂悉矣時珍竊謂指氏未可非也東垣未是也蓋指氏以精血之先後言道藏以日數之奇耦言
東垣以女血之盈虧言聖濟丹溪以子宮之左右言有執一見會而現之理自得矣夫按男按女之胎則可以日數而辨

胎品胎之盛亦可。以日數論。年。皆之譜。史載一產三子。四子者。甚多。其子有半男半女。或男多女少。男少女多。西樵野
記。載國朝入項時。揚列民家一產五男。皆育成。現此則一三五曰為男。三四六曰為女之說。豈其然哉。焉有一日受男。百後
受女之理乎。此則指氏聖濟丹溪主精血子宮左右之命。為有見。而道概東垣日數之命。為可疑矣。王叔和脈經及脈之
左右浮沈辨。假生之男女。而陽生脉訣以脈之縱橫逆順。辨胎品之胎形。恐亦臆度。非真見也。

今千金云。煩令月經絕後。百三日五日。以其至相。及月宿在貴宿日。以生氣時。夜半後。乃施。濁有子皆男。以奇而賢明高貴也。

合婚良日。至相日。春甲子。外戊丙子。秋庚辛。冬壬子。金辛。我相子。死我所勝。四州不勝。若男

合轉女成男之法。良方回春等出之。

合經書。按。百月始胎。月始胎。三月名始胎。此時血不流行。形象始化。未有定儀。

合面書云。胎之結。月如白胎。三月如桃花。三月之後。男女分。

生育之道。陰陽二氣。交感而成胎。若陰血先至。陽精後衝。血開。畏精。陽內。陰外。陰抱陽胎。而男胎成矣。若陽精先入。陰血後參。精開。畏血。陰內。陽外。陽抱陰胎。而女形成矣。又曰。婦人月信初止。一日三日五日。及男女生命旺相。陽白陽時。交合。則有子多男。若二日四日六日。又值男女生命。休囚死絕。陰白陰時。交合。有子多女。過此之外。皆不成胎。又有所謂轉女成男法。女子但懷娠始。三月名曰始胎。血脈不流。象形而變。是時男女未定。故令於未滿三月間。服藥方。術轉。

性理大全云。存柱之真。三五精妙。合而提。就通。成男。坤道成女。二氣。感。化生。萬物。

全生男也

胎前

人之夫婦猶天地也。天地之道，陰陽和而萬物生焉。夫婦之道，陰陽和而男女生焉。故婦人先須調其經，而百病不生。百病不生，而成孕育，然猶當知氣盛血衰則無孕。血盛氣衰，乃有孕，須以抑氣生血為先。若有胚腫，則服安胎順氣之劑，及善將理，以候分娩。如胎前產後變生諸證，皆由不善調攝所致。茲詳具各方，于後。臨病之際，又當對證求藥，若外感四氣，內傷七情，以成

今句會元句云

胡是切。胎前未分也。郭璞江賦：類胎渾之未凝。注云：渾，混雜卵

未分也。又全也。胎渾字，俗作胚，腫誤。廣句元暉字，玉篇干運切。

今云

規。按辨切，生子脫身也。文選切，坐也。通作規。

童子便

十二歲以下死病男子小便也。三白者尤佳也。

△良方可扶上床仰卧

不得側卧宜立膝伸足云

△良方使无孔隙免被賊風枕頭吹着云

△解 庭暗音敢以手伸物也。

△良方云燒硬炭或江中黃石令通赤置於

床前以醋水之得醋氣除血暈產後一服時作妙。

諸疾治法則與男子無異當於各類求之但胎前產後損動胎氣之藥尤當避忌。

產後○大血山崩○下血不止○

凡婦人生產畢且令飲童子小便一瓊不得便卧且宜閉目而坐須臾方可扶上床仰卧宜立膝高倚枕頭厚鋪茵褥使無賊風吹着兼時時令人以軟物從心搭至臍下使惡露不滯如此者兩三日常令產婦聞醋炭氣或燒乾漆煙若無乾漆以破舊漆器燒之以防血逆迷運之患分免之後須臾且令白粥一味不可令大飽逐

良方一應也。之後方可進醇酒云。
今時若早服日解。

良方本此。若微若微。若微若微。病重如山。不可不
畏哉。

百漸增之。仍時與童子小便一琰飲之。或童子
小便以好酒和半琰溫服。三日過後方可進醇
酒并些鹽味。及喫爛猪蹄肉。或雌雞亦不可太
過。若纔產便與酒。恐產母藏府方虛。不替酒力
必引血進入四肢。致生諸證。或熱酒入腹。致昏
悶。况不善飲者。平纔產食肉太早。緣藏府方虛。
恐成泄瀉。或變精滯。亦不可喜怒憂思。動力太
早。恐食生冷。及不避風寒。或冷水洗濯。當時雖
未覺大損。滿月之後。致病百端。或成產後諸疾。
不可不慮。願失於將捕。便成大患。終身悔而不及。

雖會廣身軀時又發端也增身又大凡也

合眼眼目若小兒頭中人意身輕力懶者難養也古人有或醫者持也平然不親成矣甘苦

肝風

伏天麻丸方前日新肝後為水溫風全所乘入於肝流於心脾遂令肚腹膨脹身體重者四厥氣自夜帝預不能吃乳甚則驚風風搐

合目昏目黃赤氣息喘急喘急不出蓋由

生而食行至心者必死

其產後倘有諸證不論巨細并有藥可療

小兒論○此論不托脈不托氣不托血也

蓋小兒初生受胎氣之厚者疾病自少稟賦怯弱者又藉藥力以扶植元氣何况養護不謹或受驚觸或飲食過度衝胃寒暑以致變生諸證調治之法又須察脈親證審之而後投以藥餌略備數方于後

臍風撮口

臍風撮口因胎前傷風或是在胎中感風

小兒初生一七日內忽患臍風撮口十無一活坐視其斃良可憫也有一法極驗世罕有知者

命書云：撮口由胎氣挾熱，風邪入膈，毒流心脾之經，故令舌強，唇青，撮口，啼不出，當視其齒齦之上，有小泡，正如粟米狀，急以溫水蘸青綿布異指，輕擦破，即開口便安。甚者用牛黃二分，研水調，滴入口即愈。

小兒心經云：少小所以有客忤病者，是外入來息忤之，名中人，是為客忤也。重是家人，或別房異戶，重是乳母及父母，或從外還衣，服藥，或神虛，惡氣，暴風，或牛馬之氣，皆為忤也。凡非常人及諸物，從外來，亦能驚小兒致之。云：同歌曰：客忤畏生人，或衝風共神，吐黃青白沫，兩綠黑紅筋。

凡患此證，兒齒齦上同齒內也有小泡，子如粟米狀，以溫水蘸熱帛，裹手指，輕輕擦破，即口開便安，不用服藥。

口瘡重舌，皆由心脾熱，小兒口內，口瘡重舌，皆由心脾熱。

小兒夜啼，哭故乳，若口到乳上，即啼而不乳者，必身額微熱，急取燈照口，若無瘡，舌必腫也，隨證施治。

夜啼客忤

每見兒夜啼，伴心經有熱，或脾寒，今而痛也。此證上三說不同，曰心熱，主脾寒，未知孰是。定謂客忤，症亦兒初生，輾因生人入房，觸胃氣也。

夫小兒胎熱，則心躁而喜，夜啼或散熱，啼時有汗而身仰，或口舌瘡腫，不能吮乳，故夜啼不止。

陽明一經之脈，主心火也。

也客忤者見生人氣忤犯而啼也。

急慢驚風

主批曰急慢驚風古人无之惟曰陰陽兩動而速時陽病曰急驚陰病曰慢也故疾者曰慢驚風此陰陽虛寒之別云

驚風有陰陽二證身熱面赤而發搐搦上視牙關緊硬者陽證也因吐瀉或只吐不瀉日漸困面色白脾虛或冷而發驚不甚搐搦微微目上視手足微動者陰證也陽證急驚風用涼藥陰證慢驚風用溫藥不可一槩作驚風治也又有下證欲發者身熱驚跳或發搐搦此非驚風當宜解散。

胎熱胎毒

胎動相似但痛則血氣乾乾而汗為異

胎動內散抽掣痛胎動原因胎驚風動胎中

胎動者

△愚謂曰變熱有十變五熱者乃生精神聰智

也格謂之牙生骨長如蚕之有眠竟之脫骨虎

之轉瓜丹淡曰是胎毒散也孕後散為虛

熱之諸症有胎氣壯實暗變而無鼓發者此

骨脈微痛由變而全胎毒亦因變而散也

△傳曰諸家所命自生之日始至三百一變凡人

有三百六十五骨節除手足四十五碎骨外正有

三百一十骨節生下骨而上日十骨三百一十乃

為一變骨氣如全一變生一歲或府下變則

散府始足△每變異情異於時也

△私曰生減府次減肝脾心小肝脾脾大脾胃

三天蒸計四百四十八日又六十四日為三天蒸計五百一十二日

△痘疹心口生者曰余考痘之為症上古軒岐泰越人海千公輩皆未之命列也自東漢漢武中南陽任屠冰洗中國時望

濟國者以遠煎外感數六枚之然則痘疹肇于東漢也△又云漢書軒曰上古之時未聞痘疹之症蓋雅之文辭有及者其

其人海鳳朴野積精金神虛邪苛毒莫之能害秋或云自建武擊屠連深其毒流布中國謂之屠瘡或曰屠瘡言其

變化元測也或曰天瘡言為天行疫癘也或曰百步瘡言人自少至老必作一番也或曰鼠瘡言其形之相似也故患此瘡

如蛇蛇反如直蛇骨死生存於呼吸之間夫上古所无而李氏有之抑時世異耶人將失之邪余思其緣天地之氣春發生

養之化也其物無不秋各殺之紀也其物無不時變未也非泰和之景不可謂非時世之異然人日習焉不知特神之道

凡小兒胎中受熱則多驚啼身熱或太

便不通胎中受寒生下則身青腫冷或腹痛

腸內吊須察其候而治之

感冒四氣

方者良自製家者為中者為傷輕者為感冒

凡小兒之病與大人不殊惟脾胃夜啼重舌

蒸客忤驚風解顧疳病數證大人無之其如感

冒四氣傷風傷寒斑痧瀉痢嘔吐等證則一但

藥劑大小輕重之不問耳諸方前已類編可披

而得是

疹痘

按神方東垣先生

痘疹心口生者曰余考痘之為症上古軒岐泰越人海千公輩皆未之命列也自東漢漢武中南陽任屠冰洗中國時望

濟國者以遠煎外感數六枚之然則痘疹肇于東漢也△又云漢書軒曰上古之時未聞痘疹之症蓋雅之文辭有及者其

其人海鳳朴野積精金神虛邪苛毒莫之能害秋或云自建武擊屠連深其毒流布中國謂之屠瘡或曰屠瘡言其

變化元測也或曰天瘡言為天行疫癘也或曰百步瘡言人自少至老必作一番也或曰鼠瘡言其形之相似也故患此瘡

如蛇蛇反如直蛇骨死生存於呼吸之間夫上古所无而李氏有之抑時世異耶人將失之邪余思其緣天地之氣春發生

養之化也其物無不秋各殺之紀也其物無不時變未也非泰和之景不可謂非時世之異然人日習焉不知特神之道

疹痘

按神方東垣先生

痘疹心口生者曰余考痘之為症上古軒岐泰越人海千公輩皆未之命列也自東漢漢武中南陽任屠冰洗中國時望

濟國者以遠煎外感數六枚之然則痘疹肇于東漢也△又云漢書軒曰上古之時未聞痘疹之症蓋雅之文辭有及者其

其人海鳳朴野積精金神虛邪苛毒莫之能害秋或云自建武擊屠連深其毒流布中國謂之屠瘡或曰屠瘡言其

變化元測也或曰天瘡言為天行疫癘也或曰百步瘡言人自少至老必作一番也或曰鼠瘡言其形之相似也故患此瘡

如蛇蛇反如直蛇骨死生存於呼吸之間夫上古所无而李氏有之抑時世異耶人將失之邪余思其緣天地之氣春發生

養之化也其物無不秋各殺之紀也其物無不時變未也非泰和之景不可謂非時世之異然人日習焉不知特神之道

疹痘

夫邪正之中大邪勝小邪而相持者相似而死相持未久必入如此之甚也將謂時行之正病邪何以自少至老但依一次厥後無不傳染也蓋父母於子一而而分精血之毒已寓於陽感陰化之始而不待生之頃然其血而後有是事也夫天行其病亦有其時但現夫年之所加及有四時不正之氣即知有是正病也然則待時而發者非也其速而免或後而持或暴而死者其之微其所使也發其毒清矣所以終身但作一度後有其氣不復傳染焉

合和機曰：既則食母血而則飲母血隨日長

皮膚筋骨血脉形氣俱足十月降生口中常有

恩血而一發隨吸而下此恩血後歸命門

胞中解於陽伏而不泄直至內傷乳食

濕熱之氣下流皆於腎中火火攻致營氣

不從此於內理惡血乃發諸斑疹皆出於旁

先求其病後聚肉理歸於陽明故三番

斑始顯之症皆足太陽土旁先起病小腸其

始出皆見於面終歸於陽明肉理然化為

膿者也天機甚反勝寒水而身復出此皆

出從足太陽傳寒中來也當外發寒邪使

內消故曰為三天不令其攻其中今濕氣上

層後其本位可一二服立已仍令小兒以後

再無三番斑出之患此內經之法覽者計之

合和機大服胞小水斑疹應三色皆營氣逆

而後發其表

○此在父母胎中因相火以發則止大發則方數多故不不止

夫小兒癰疹始之證必先見面癰腮赤目胞赤

呵欠煩悶乍涼乍熱咳嗽噴嚏足稍冷多睡

並瘡疹之證或生膿胞或生小紅斑或生癰疹

此三等不同蓋諸證皆太陽寒水起右腎之下

煎熱左腎足太陽膀胱寒水夾脊迎流上頭下

額逆手太陽丙火不得傳導逆於面是土癸寒

水逆起丙子熱火故也小兒瘡疹之由皆始生

之時啼聲一發口中所含惡血隨吸而下遷於

右腎包絡之胞中其瘡之發下焦相火熾也三

等之瘡皆與此見

等之瘡皆與此見

等之瘡皆與此見

等之瘡皆與此見

等之瘡皆與此見

等之瘡皆與此見

為二火。寒者為發寒邪可為內
 漏。二火又令濕氣上歸本位。三服瘕瘕即愈已
 後無二番瘕出之患。損生命者矣。

三服
 當之
 無也
 常作
 一二服

醫方大成論終

經載六腑者一名赤宮一名丹田。乃命門主男子藏精施化。婦人藏
 胎孕。俱為生化之源。非五行也。非水亦非火。此天地之異者也。象坤上之
 生萬物也。



千時寬永三年
 丙寅臘月吉日
 開板之

類編南北經驗醫方大成十卷

兩淮鹽政
採進本

舊本題元文江孫允賢撰本名醫方集成此本爲
錢曾也是園所藏猶元時舊刻目錄末題至正癸
未菊節進德書堂刊行前有題識曰醫方集成一
書四方尙之久矣本堂今得名醫選取奇方增入
孫氏方中俾得貫通名曰醫方大成云云則坊賈
所爲非允賢之舊矣

劉河間傷寒醫鑒一卷

〔元〕馬宗素撰

中國科學院圖書館藏明萬曆二十九年新

安吳勉學刻古今醫統正脈全書本

附《四庫全書總目·傷寒醫鑒

一卷》提要

劉河間傷寒醫鑒

傷寒醫鑒

平陽府志
新安縣志
校

天道有遭世而興事有遇時而顯此古今之常理出於自然者也且謂醫書衰滅以後邪說蜂起以淆亂六經之首紅紫亂朱無以折衷孝武皇帝舉用俊茂罷黜百家非而六經之道始明自漢而降註述繁錯醫書尤甚况醫乃人之司命所係尤重殆非小智所能及也惟昔黃帝岐伯難疑答問上窮天道下極地理中盡人性垂法萬世以爲生民之壽域是以名曰素問於是守真劉先生恐斯文將墜於地民罹橫天於是分地陰陽剛柔消長之理察人生風氣血脉寒熱之宜逐一擬一篇無不引素問先標受病之本源所處方用藥注書有四焉一者明天地之造化論運化之盛衰目之曰要旨論一部計三萬六千七百五十三字一者分君臣之佐使定奇耦之逆從又作宣明論一部計八千九百零三字一者又註傷寒六經傳受直格一部計一萬七千零九字又取至真要論一篇病機氣宜之說著玄機原病式一帙計二

萬餘言。又先生臨世之後恐庸醫不知樞要於宣明論內又集紫切藥方六十道分為六門亦各直格通計八萬餘言可謂勤矣守真曰自昔以來惟仲景註述遺文立傷寒九十七法合一百一十二方而後學者莫能宗之謂如人病傷風則用桂枝解肌傷寒則用麻黃發汗傷風反用麻黃則致強項柔痙傷寒反用桂枝則作驚狂發斑或誤服此二藥則必死矣故仲景曰桂枝下咽陽勝則斃承氣入胃陰盛則亡是也守真為此慮恐麻黃桂枝之誤遂處雙解散無問傷風傷寒內外諸邪皆能治療從下証錯汗者亦不

集醫鑒

爲害如此輩誤人之弊已不少矣仲景處大承氣湯小承氣湯調胃承氣湯亦各有所宜熱勢大者大承氣主之微小承氣主之胸中有痛大便溏者調胃承氣主之守真又恐承氣有三恐有過焉不及之患遂處三一承氣以總之又慮仲景所著之書文深義奧淺學難通遂芟其枝蔓撮其本根十去七八將三百九十七法一百一十二方制三十二藥而總之使人易於檢閱一見此書對形見影了無障礙得之對證用藥人可自療况醫家者流業此者平兼仲景除傷寒之外亦無雜病之論是已備於仲景書也故守

集醫鑒

真自論傷寒之差謬故一切內外所傷俱有受汗之病名曰熱病通謂之傷寒今春溫夏熱秋涼冬寒是隨四時天氣所感輕重及主療消息不等合而言之則一也冬伏寒邪藏於肌肉之間至春變爲溫病夏變爲暑病秋變爲濕病冬變爲正傷寒冬冒其氣而內生怫熱微而不病者以至將來陽熱變動或又感之而成熱病也經曰冬傷於寒春必病溫亦其義也然其陰證者爲雜病終不爲汗病由是傷寒汗病直言熱病不言其有寒也三陰證者邪熱在臟裏以臟爲裏爲陰當下者是也素問三篇刺熱詳熱其雜病論熱不說其寒非無謂者也熱論之外素問更無傷寒之證熱論云熱病者皆傷寒之類也又云人之傷於寒也爲熱病注云寒者冬氣也冬時嚴寒萬類深藏固密不傷於寒觸冒之者名曰傷寒傷於四時之氣皆能病以傷寒爲毒者最爲殺厲之氣中而即病名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌肉間久而不去變爲熱病故曰熱病者傷寒之類也古聖訓陰陽爲表裏此一經大節目惟仲景深得其旨起厥後朱肱編活人書將陰陽二字釋作寒熱此差之甚也中間誤羅橫天嗟之何及素問言人之臟腑陰陽臟

者為陽府者為陽又四時陰陽蓋有經記內外之應
皆表裏其信然乎六合為十二經脉之合太陰陽明
為一合厥陰少陽為一合少陰太陽為一合手足之
脉是謂六合表裏者諸陽脉皆為表諸陰脉皆為裏
以此驗之是守真之言不謬矣然恐俗人不悟未眩
活人書之謬且略舉傷寒六經傳受一端而明之眩
昔云傷寒中病時腠理寒便入陰經脉不微細不經
三陽也三陰寒微則下理中湯稍厥或下利即乾
又甘草湯若陰毒已深病勢困重六脉肘骨取之方
有按之則無於濟中用葱熨法或灸艾三五百壯以

四

手足不溫者不可治也守真曰則三日三陽病在
表故當汗之後三日三陰病在裏故當下之六經傳
受皆是熱證有陰寒之病也素問云傷寒未滿三
日者可汗而已其滿三日者可泄而已由此言之守
真之說正合素問眩書失之遠矣又如身冷脉微陽
厥極深一證眩書云病人身冷脉沉細而疾或時鄭
聲指甲面色青黑陰毒已深若服涼藥則渴轉甚躁
博急須急服辛熱之藥如得手足溫更服前熱藥助
之若陰氣散陽氣來即漸減熱藥而調之守真曰傷
寒下後熱不退者熱在內陽厥極深以至陽氣拂鬱

不能營運於身表四肢以至遍身清冷若急下之殘
陰暴絕陽氣後竭而立歎不下亦歎此際當以涼膈
散或解牙痙陰退陽但欲畜熱漸散則心胸復暖脉
自漸生至於脉復有力方可三一承氣湯下之守真
復慮熱有兩感說復以素問證之曰九則害承乃制
此則正謂陽厥極深不能營運於四肢以至身冷脉
微也比略舉一二端耳餘者之謬自可觸類而眩書
暴於當世上一代之名醫其誤謬猶若是況其餘碎
雜不經之說何可盡信至論小兒如閻孝忠曰凡小
兒瘡疹當乳母慎口不可令饑受風冷歸腎變黑

傷寒醫鑒

五

而難治春夏病為順秋冬病為逆冬月腎旺盛寒多
歸腎變黑若妄下之則內虛多歸於腎此則直以瘡
疹為寒守真云閻孝忠不詳錢氏本方斑疹黑陷牛
李膏百神丸寒藥下之多獲痊不救必死為熱豈不
明哉經云諸痛痒瘡瘍皆屬心火及斑疹黑陷無不
腹滿喘急小便赤澀不通豈非熱極使然耶此閻孝
忠所以失錢氏之意也守真如此分別可謂醫者之
龜鑑也學者當詳其說無妄謂傷寒有陰毒之證傾
投姜附之藥使實實虛損不足益有餘以此誤人
不亦冤哉每觀平城王公序曰譬如宵行冥冥迷路

不知其往遇明燈炬火正路昭然此醫鑑之所作也然世俗惡寒好熱蓋亦有說守真云病勢輕微以熱藥強切開發誤中而後効者有矣如中酒有熱蓋而復飲熱酒以投之令其結得開而氣液宣通此謂以熱治熱亦有痊者世或於病輕而易痊謂大疾亦然殊不知不中則反為害也熱病以熱藥治之者譬如驕主得佞臣縱恣及滅亡更不覺佞臣之惡惟其同好之可幸使熱勢轉甚以至陽厥身冷脉微反陽為陰雖死不悟至於諸熱變證十損八九莫不皆然也如下利不止痰熱在裏若使火艾熨烙無不悅者也此世俗好寒惡熱所以滋眩書之失也又守真去病勢熱甚而依法治之不退者或失寒涼或因失下或熨烙重火使熱極而妄為陽厥切不可用銀粉巴豆性熱大毒熱燥丸藥下之反耗損陰氣而衰竭津液使熱勢轉甚而懊憹喘滿結胸腹痛下利不止血溢血泄或為淋閉驚狂譫妄熱証蜂起不可勝舉由此為癥癥堅積之疾誤人必多然則世情亦不知醫者之過未盡究守真之奇效嘗聞守真之言曰正治者以寒治熱以熱治寒病証輕微可如此治之若病重危則當從反治之法其反治者亦名從治蓋藥

氣從順於病氣也是以以熱治熱以寒治寒是謂反治以熱治熱者非謂以熱治熱甚而更以熱性之藥治之本謂寒性之藥反佐而服之蓋謂病氣熱甚藥氣寒甚拒其藥寒則寒以不入寒熱交爭則其病轉加也故用寒藥反熱佐而服之令藥氣與病氣不相忤其藥本寒熱服之後熱體既消寒性乃發由是病氣隨愈餘皆倣此然正治之法猶若刑臣過逆其臣性而刑之古病執不其治之以寒逆其病氣而病自愈矣反治之法猶臣諫君非順其君性而以悅之其始則從其終則逆可以諫君去其邪而歸於正王水曰病水猶人大火得草則熾得木則燔得水而滅病火猶救龍火然熾而熾得水而熾以人火不繞逐之則其火自滅耳此謂良醫之治法也夫逆治從治皆是違性之藥病人豈有不惡者是藥病相爭其氣所以得固也然十救其十亦不為醫之功以謂人之有命也如身冷脉微終不省畜熱在內設以涼隔解毒之藥調治無有不惡又如患形不至有經年終不曉熱在裏設以寒氣寒藥下之無有不畏雖得痊愈尚不免於畏惡病勢大藥力小而致死者亦不知杯水救車薪之火為非只指為用涼藥之過此二者

無他存於世人是非不明而惡寒好熱也

論脈證

活人書陰毒脈浮七至八至以上疾不可數者正是陰毒已深也六脈沉細而疾又部斷小寸口脈或大若誤服涼藥則暑濕急有此之證者便急服辛熱之藥一日或二日便安若陰毒漸深其候沉重四肢冰冷腹痛或嘔或咽不利心下脹滿結硬燥渴虛汗不止六脈但沉細而疾一息七至以乘有此證者速於氣海關元二穴各三二百壯以手足和煖為効仍兼服正陽散

醫鑒

八

守真云然既脈疾五七至八以上疾不可數者正是陽熱極甚之脈也世俗妄傳陰毒諸證以素問論之皆陽熱亢極之證而熱於內在裏極深身表似其陰寒者也及夫經云立則重承乃制也謂五行之道實其則過極則反似封已者也是謂兼化如萬物熱極而反出水液以火煉金熱極而反化為水是以火極而反以水化也

素問脈要精微論長則氣治短則氣病數則心煩大則病進則人云即藏象論人迎一盛為汗少陽二盛病在太陽一盛病在陽明四盛病已上為

格陽注云謂人迎脈於寸口一倍餘盛同法四倍以上為關格之脈人脈不能極於天地之精氣則必矣

論六經傳受

活人書太陰少陰厥陰皆屬陰證也少陰者腎也厥陰者肝也太陰者脾也何謂太陰太陰者脾之經主胸膈也何謂少陰少陰者腎之經主脈微細主心煩欲寐也何謂厥陰厥陰者肝之經主脈微細主心陰經不經三陽也蓋氣入於大腸則發熱而惡寒入於少陰則惡寒而不發熱也三陰中寒微則理中湯稍厥或中寒下利即乾薑甘草大段重者四逆湯無

醫鑒

九

脈者通脈四逆湯何謂厥陰者肝之經也厥陰之為主主消渴氣上衝心中痛熱饑不欲食食則吐蛇下之利不止也若陰氣獨盛陽氣暴絕則為陰毒其證四肢逆冷腹脹痛身如被杖脈沉疾或吐或利當急炙臍下服以辛熱之藥令陽復而大汗矣

守真曰人之傷寒則為熱病古今一同通謂之傷寒病前三日巨陽陽明少陽受之熱在於表汗之則愈後三日太陰少陰厥陰受之熱傳於裏下之則愈六經傳受由淺至深皆是熱證非有陰寒之證古聖訓陰陽為表裏惟仲景深得其意厥後朱肱編活人書

特失仲景本意將陰陽二字釋作寒熱此差之毫釐失之千里矣

素問熱論云黃帝問曰熱病者皆傷寒之類也或愈或死皆以六七日之間其愈以十日以上者何不知其解顏聞其故岐伯曰巨陽者諸陽之屬也其脉連於風府故諸陽主氣也人之傷寒也則為病熱雖甚不寒其兩感於寒而病必不能免於死矣帝曰願聞其狀岐伯曰傷寒一日巨陽受之故頭頂痛腰痛強二日陽明受之陽明主肌肉其脉夾鼻絡於目故身熱目痛鼻乾不得臥也三日少陽受之少陽主膽傷其醫鑒

十

其脉循脇絡於目故胸脇痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於臟故可汗而已四日太陰受之太陰脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脉貫腎絡於肺系於舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之脉循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三陽五臟六腑皆受病榮衛不行五臟不通則死矣其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微開十日太陰病衰腹滿如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而噤十二日厥陰病衰囊縱小腹微

不大氣皆去病日已矣帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其臟脉病日衰矣未滿三日可汗而已其滿三日可下而已

論汗下

活人書云陽明證宜下少陰證宜溫又云少陰病一二日口中和其證惡寒者宜蓄艾并四逆湯又云三陽證宜下三陰證宜溫少陰病發熱脉沉麻黃附子湯主之少陰證二三日常見少陰證無陽者宜麻黃附子皆陰證表藥也又云發熱而惡寒者發於陽也麻黃桂枝湯主之

傷寒醫鑒

十一

守真云夫辨傷寒陰陽之理者邪熱在表府病為陽邪熱在裏臟病為陰世俗妄謂有寒熱陰陽之異誤人多矣寒病固有然非汗病之謂也止為雜病不可與汗病同科且造化為汗液之氣者乃陽氣之氣非陰寒之所能也觀萬物熱極而反出水液明可知也況法曰身熱惡熱在表飲水為熱在裏其傷寒病本末身涼不渴及小便不黃脉不數者未之有也雖仲景有曰逆湯證然熱裏和誤以寒藥下之太早表熱未入於裏裏寒下利不止及表熱裏寒自和急以四逆湯溫裏利止裏和者志於解表也故仲景四逆湯

證後復有承氣湯寒藥下熱之說由是傷寒汗病經
直言熱而不言其有寒也經言三陽證者邪熱在藏
在裏以藏為裏為陰當下熱者是也按素問論傷寒
執病三篇皆名曰熱竟無寒說兼以靈樞諸經運氣
之說推之則明為執病說非寒也

素問熱論云帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏
汗病日衰已矣其未滿三日可汗而已其滿三日可
泄而已此言表裏之大體也謂曰正理傷寒論脈大
脈沉細數病在裏可下之由此雖日數過多但有表
証而脈浮數猶宜發汗日數雖少即有裏証猶宜下
之正應脈証
而汗下之也

傷寒醫鑒

論陽厥極深

十一

活人書云傷寒盛陽病人身冷脈細沉疾煩躁而
不飲水者又云大抵陰毒本因腎氣虛寒或因冷物
傷脾外感風寒則陽氣下守遂發頭痛腰重腹痛眼
睛淚身體倦怠四肢逆冷汗不止或多煩渴精神恍
惚若誤服涼藥則渴轉甚躁轉急有此病者便須急
服辛熱之藥或時鄭聲指甲面色青黑若陰毒已深
病熱六脈附骨取之則有按之即無但於臍中
用葱熨法或着艾三百壯以來手足不溫者不可治
也

守真云或下後熱不退或畜熱內甚陽厥極深以至

陽氣鬱閉不能營運於身表四肢以致遍身清冷痛
甚不堪項背拘急目睛赤痛昏眩恍惚咽乾或痛燥
渴虛汗嘔吐下利腹滿實痛煩冤悶亂喘急鄭聲以
其重也深而脈道不利以脈沉細欲絕者俗本明
其速亡之理而及傳為陰毒或失下熱極以至身冷
脈微而昏冒將死若急下之則殘陰暴絕陽氣後竭
而立臥不下亦死病人至此命懸頃刻然則治法當
何如曰此當涼膈散或黃連解毒湯養陰退陽但欲
自熱漸漸宣散則心胸復煖脈漸以生至於脈復有

傷寒醫鑒

十一

力可以三一承氣湯微下之或解毒加大承氣湯尤
良俗未明此故認作陰證是以陰陽失其治也
素問五運行大論岐伯曰氣有餘則制已所勝而侮
所不勝不及則已所不勝侮而乘之已所勝輕而侮
之木餘則制土輕侮於金氣不爭故木恃其餘而欺
侮也又木少金勝土反傷木以木不及妄凌之也四
氣本同侮謂侮慢也而凌忽之也又云以火煉金熱
極反化為木又云亢則害承乃制

論燥濕發黃

活人書云一身盡痛發熱身黃小便不利大便反快

者此名中濕風而山澤蒸氣人多中濕濕留關節煩身熱煩其脈沉緩內中濕也主一身盡痛發熱身重小便不利又云以寒濕在表不解為不可下也可以下而湯主之

守真云發黃者陽明裏熱極甚煩渴熱鬱留飲不散以濕熱相搏而體發黃也或言寒濕搏而發黃者色及苔黃也本傷寒失下或誤汗之溫之灸之熨之或服銀粉巴豆大毒熱藥下之及以亡液損其陰氣邪熱轉甚或下太早熱入以成結胸但發黃者或失下寒涼調治或熱極本惡雖按法治之而不能退其熱傷寒醫鑒

勢之甚者或下後熱不退皆能為發黃也大抵本因熱鬱極甚者留飲不散濕熱相搏而以水附湯主之誤矣

素問平人氣象論云食已如飢者胃疸則是胃熱也熱則消穀食已如飢日黃者疸陽佛於上熱積胸中陽氣燔上故目黃也

素問通評虛實論云足之三陽從頭走至足然久厥逆而不下以致佛積於上焦故為黃疸

論不得眠

活人書云下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜

不嘔不渴無表證脈沉微身無大汗者乾薑附子湯主之

守真云夫傷寒病煩心及復煩倒不得眠者燥熱佛鬱於內而氣液不得宣通也以梔子豉湯主之素問刺熱篇云肝熱甚小便先黃腹脹多臥身熱熱靜則狂言及驚脇滿痛手足躁不得眠也

論嘔吐

活人書云無陽則厥無陰則嘔却言少陰下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔者白通加豬膽汁湯主之又云膈上有寒痰乾嘔者不可吐各溫之傷寒醫鑒

宜四逆湯主之

守真云嘔者火氣炎上之象也故胃熱甚則嘔也又云吐酸肝木之味也由火實制金不能平木肝木日甚故為酸也則如飲食則喜酸也或言酸為寒者則如酒苦性熱養於心火故飲之則令人色赤氣粗脈洪大而數語謔妄歌唱悲笑喜怒如狂胃味健忘煩渴嘔吐皆熱證也其吐必酸宿熱可明矣

素問至真要大論云諸吐酸暴注下迫皆屬於熱注內隔嘔逆噴食不得入是火也

論濕熱不利

活人書云傷寒下利多種須辨陰陽勿令差互大抵傷寒下利多種須看脈與外證下利脈大者虛也脈微弱者為自止寒毒入胃臍下必寒腹脹滿大便秘白或青或黑或一利清穀濕毒氣甚則下利膿血大便如膿血或如爛肉汁也得之寒毒入胃四逆理中湯白通湯加附子四逆湯等若濕毒下膿血者桃花湯地榆散主之

守真云下利膿血者如世之穀肉果菜濕熱甚則自然腐爛潰發化為水故食於腹中感入濕熱邪氣則自然化為膿血水其熱為赤熱屬心火故也其濕為傷寒醫鑒

十六

黃濕屬脾土故也燥鬱為白屬於肺金故也濕熱甚於腸胃涕鬱結也濕主於痞以氣逆不能宣通因而以成腸胃之燥也濕熱相兼蓋水火陰陽寒熱僭權衡也一高則一下一興則一衰豈能寒熱俱盛於腸中而同為利者乎若此之繆世傳多矣則如熱生瘡瘰癧素問大奇病論云腸辟下血少為陰氣不足搏為陽氣求之熱在下焦故下面血也素問陰陽別論云陰結者傳血一升陰主血故也再結二升三結三升泄不止熱宜寒瘰癧瘰癧須除以寒下之結散利止則

通因通用也

論霍亂

活人書云霍亂嘔吐而利熱多而渴寒多而不饑理中丸主之吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷四逆湯主之吐利已汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆湯猪膽汁湯主之

錢氏吐瀉問難廣親七太尉七歲病吐瀉是時七月其証全不食而昏睡睡覺而悶亂吸氣乾嘔大便或有或無不渴眾醫以驚治之疑睡故也

錢氏曰先補脾後退熱石膏湯次日又以水銀硫黃傷寒醫鑒

十七

未生薑水調一字八月十五已後吐瀉身冷無陽也不能乳乾嘔瀉清褐水當補脾益黃散主之不可下

守真云吐下霍亂三焦為水穀傳化道路熱甚則傳化失常而吐瀉霍亂火性燥動故也或云熱無吐瀉只是寒此說誤也

素問大論云諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小兒瀉腹脹大如鼓有聲如鼓癰疽瘡疹瘰癧氣結核吐下霍亂皆屬於火

論好用寒藥

活人書云傷寒論家方論不一獨伊尹仲景之書猶六經也其餘諸子百家時有一得要之不可爲法況有好涼藥者時子疏黃矣而不喜用雖隆冬使人服三黃丸之類又有好熱藥者如大黃芒硝則畏而不敢用雖盛暑勸人炙病服金液之類非不知罪福蓋緣偏見所趨然也又云近時用小柴胡湯不問陰陽表裏凡傷寒之家皆令服此藥蓋不可輕用雖不若大柴胡湯小承氣之緊要之藥病不相當其爲害也同往往服小柴胡湯而成陰証者甚多矣又云陰毒傷寒心神煩躁頭痛四肢逆冷返陰丹主之此方甚

傷寒醫鑒

大

驗喘促嘔逆者入口便住若加小腸不通反陰囊縮入小腹絞痛欲飲臍下二寸灸仍與返陰丹當歸四逆加吳茱萸生薑湯慎勿與尋常利小便之藥尋常利小便之藥者多是冷滑藥此陰毒氣在小腹所致也

守真云大凡治病必先明此寒暑燥濕風火六氣最爲要也故曰其治病之法以寒治熱以熱治寒以清治溫以濕治燥乃正治之法也又云逆治所謂藥氣逆病之氣也其病輕微則當如此治其病重當從反治之法其反治者亦名從治所謂從順於病之氣也

是故經曰以熱治熱以寒治寒然以熱治熱非謂病氣熱甚更以熱性之藥治之本是寒性之藥反熱佐而服之所謂病氣熱甚藥氣反寒病熱極甚而拒其藥寒寒攻不入寒熱交爭則其病轉加也故用寒藥反熱佐而服之今藥氣血病不相違忤其藥性寒熱服下咽之後熱體既消寒性乃發由是病氣隨愈其餘皆倣此然正治之法猶君刑臣過逆其臣性而刑之矣故熱病不甚治之以寒逆其病氣而病自除矣反治之法猶臣諫君非逆其君性而以說之其始則從其終則逆可以諫君其邪而歸於正也

傷寒醫鑒

十九

素問至真要大論云寒者熱之熱者寒之從者逆之順者從之王冰註云病猶救火火得龍而燭得木而燭可以水滅之故逆其性氣而拒之病之氣微而攻之以寒病濕猶救龍火得濕而燭遇水而燭不知性以水折之以濕攻之過足以光焰詣天物窮方止矣識其性者反常之理以人火逐之則焰灼自消矣光撲滅然逆之謂以寒攻熱以熱攻寒從之謂熱難入從其性卽不必皆同是以下又曰逆者正治從者反治從少從多觀其事也此之謂乎

論小兒瘡疹

活人書云小兒瘡疹與傷寒相類頭痛身熱足冷脈數疑似之間只與片麻解肌兼治瘡子已發未發皆可服但不可下瘡疹發熱在表尤不可轉瀉世人不學乃云初覺以藥利之其毒也誤矣又云疹豆已出不可疎轉出得已定以膿血大甚却用疎利亦非也大抵瘡疹首尾不可下小兒身熱耳尻冷咳嗽而用利藥即毒氣入內殺人

錢氏曰瘡疹始出之時五臟証見惟腎無候但見平証耳熱必耳涼是也論瘡疹熱耳俱屬陽其居北方主冷也若瘡黑陷耳熱者為逆是也若用牛李

傳寒醫案

二十

膏即祥丸各三服不愈者必病此瘡疹當乳母慎口不可令饑受風冷必歸於腎變黑難治也有大熱利小便有小熱宜解毒若頭紫乾陷者百祥丸下之不至者慎勿下更時月輕重故春夏為順秋冬為逆冬月腎旺又盛寒病多歸於腎變黑者無問何時下難救一又曰瘡疹始出未有他証不可下也但當用平和之藥頻與乳食不受風冷耳如瘡疹三日不出不快者即微發之微發不出即加藥發之加藥不出即大發之後不多若及脈平無証者即瘡疹稀少不可更發也腎旺盛脾土不尅水故脾虛寒戰則難治矣所

以百祥丸者瀉膀胱之腑腑若不實臟自不盛也何以不瀉腎曰腎主虛不受瀉故二服不効反加寒而

歟矣

守真云小兒斑疹未出誤以執藥汗致陽氣轉甚則重密出不快多致黑陷而久恐是斑疹未敢服藥以誤小兒諸病多矣亦不知古人留涼瀉之藥通治驚風積熱設是斑疹使熱少退而稀少出快得痊除愈也若用涼膈散為妙耳聞孝忠集小兒論未達錢氏本意不明造化之理及妄言黑陷為寒及云斑疹終始不可服涼瀉之藥後人因之反致熱甚黑陷而久

傳寒醫案

三

者聞公豈不詳錢氏本方治斑疹黑陷者牛李膏百祥丸寒藥利之而多獲痊可不救必為熱豈不明哉斑疹瘡黑陷者無不腹滿喘急而小便赤而不通豈非熱極者也豈能反為寒邪素問云諸痛痒瘡瘍皆屬於火

劉河間傷寒醫案

傷寒醫鑒一卷

通行本

元馬宗素撰宗素始末未詳是書載河間六書中皆采劉完素之說以駁朱肱南陽活人書故每條之論皆先朱後劉大旨皆以熱病爲傷寒而喜寒涼忌溫熱然活人書往往用麻桂於夏月發洩之時所以貽禍若冬月真正傷寒則非此不足以散陰邪豈可專主於涼洩未免矯枉過直各執一偏之見矣

雜病治例一卷

〔明〕劉純撰

遼寧中醫學院圖書館藏明成化十五年蕭

謙刻本

附《四庫全書總目·雜病治例

一卷》提要

雜病治例序

予自髫年入郡庠讀書之餘有志醫術又恐工夫
分用急務相妨竊美此術自為之固不及若澤前
聞人良方錄傳不惟及於一家一國且遍於天下
而傳於後世豈不愈於身親為之者耶博訪旁求
累月經年無可意者迨舉天順己卯鄉試乙未中
進士觀政小部奉

命給賞甘肅

車東甘肅州即真張捕瀉泉郡也而名醫

存者乃延其後人禮貌之懇求之慨然以木素脈
訣雜病治例見與予如獲隋珠趙璧喜不自勝連
自檢閱研究知其切脉辨証療病用藥深有奧妙
綽有法度救急扶危起死回生與夫古貴賤亦
占於此即欲板行則力又不及焉今幸以非材束
丹應天之上元遂捐俸資以償夙願且序其得之
之由意儒先有云一命之士苟存心於愛物於人必
有所濟予讀儒書以承

上命而為民牧敢不以濟人利物為心乎是書之行

賜進士第知上元縣事長安蕭謙

一全草 一岸草 一葛草 一積雪草 一雪下草

艾葉角 右下又燒了也 一印少草藥服之七日已付

音ノ妙也

口口方ノ葉妙書緑 一味ハ云々

○先瘡藥妙 黑雲膏 一鳥乳 一硃砂 唐土 狗頭

一五五 右五味末又醫化方

[illegible]

○白象仁如柔而帶一味市又仁至氣山三六〇〇

○（五） 京外 各 藩 子 堀 金 服 立 じ 三 子 年 出 心
香 附 末 五 分 一 合 木 山 ノ 根 ミ ス リ ツ ケ テ ク チ ス 一 升 入 瓶 ミ テ 子 年 出 心

昇陵劉純宗厚編輯
長安蕭謙子燕校正

△蘭室集

醫家十要

益蓋學海無盡此乃務本之計

一早起晏眠不可片時離店中凡有抱病者至

必親自診視用心發藥莫仍前京師郎中惟

務安閑蓋一日之計在於寅生之計在於勤

不惟乃可燒藥亦可成實云不白女實

怕你壞

100

行醫及開首發藥當依經文開出藥則不

不可誣言人言求為學官益爾隻身幼難

以支持恐因虛名而妨實利也

一同道中切宜謙和不可傲慢於人年尊者於

敬之有學者師事之倘有賢頭仁當義讓

一可據尊致招然誘細云禮之用和為貴

物出入當合閫政掌官庶可積蓄仍置收支

工作簿以憑照用倘有餘則辦首飭器血以

備緩急不可收買玩具及不急什物浪費錢

財

一隣友人情除親喪疾病慶賀隨眾外其餘無緊要者當已之一則省錢三則不廢生理至於饋送之禮尚往來不可求奇好勝古人有云廣求不如儉用

一即中磨作量其所入可用幾人莫言人多好看工價雖廉食肉甚貴

一開筵會客命妓作樂非不美也當有故而為之量力而行之若不守本業惟務宴遊其窮可待矣及有行院干謁送至茶肆廟前之類初馬使不可接當贈湯藥一二貼運物自

自然絕其後患若圖風流之報故本非難曰樂與餌過客止宜細末之

右前十說皆升溪先生海子脩身齊家之節要故直言而不文當置之座隅朝夕覽倘能遵而行之則可成家立業若不聽信必有飢寒凍餓之憂進退而難悔將何及矣

△蘭室吾戒

一醫術本吾儒之餘事可以濟物惠難中可以防身古人云養道而已切不可恃意妄為家鑒與人為治慎人生命不惟禍及自身家

訪奇錄
卷之三

九祖爾但以活久之心為心本於因民之所

利而利之一則生意自有一則禍患自無也一吾宗累世譜繼名門布族善父精來翁始從丹溪朱君脩學此術惠難中實得濟余又得從鄉先生馮庭幹許宗魯克容數君子印証方始道明藝精但以此因虛名多受權要

一此集本求古人為治之法如指諸掌可以見法例之變無窮病証之機不一講求究藏為家寶切不可示人傳諸不道不義之士

一傷寒証候宜熟讀傷寒論明理論百證歌及與索者指掌圖大抵緊要在表裏虛實寒熱二字一證有兼證者於看緊處先之如結胸身熱發黃俱見脈沉而實宜用陷胸合茵陳急下之後看次第調之是以不可執一當看證例約之

一雜證看形氣實者宜以劉張大法治之形氣虛脈虛或老幼羸弱脫榮者宜以東垣之法

治之藥亦不可太雜是以丹溪云吾每治病用東垣之藥効仲景處方庶品味數少藥力專精也又云以某藥治某病以某藥監其藥

以某藥為引經此得古人之心法也

戒行吟

藥術全捷利澤心活人陰陽在居仁若無道
精誠者必有神明暗伺人濟物共登同壽域
真半養自家身香林摘者俱陳迹高穎餘芳種
德新

調鼎吟

茫茫宇宙一坤乾調鼎工夫筆不傳指應心機
徒造偽問半氣窮實調元貪人敗俗漸風受良
相匡時化日全四海雍熙民物阜春風花柳保
年

右二詩一以見醫術行道定用心戒慎如

此一以見大道之本調元之意是為西
達為良相不達則為良醫非流俗工技之
比實非小材小智所可窺也特

永樂六年歲在戊子十月望後一日中山劉宗厚甫
謹識

雜病台倒目錄

風一	火二	暑三	濕四
燥五	寒六	發熱七	腹痛八
頭痛九	腰痛十	脇痛十一	心痛十二
牙痛十三	眼目十四	瀉痢十五	瘡十六
欬嗽十七	吐血十八	瀉血十九	下血二十
諸氣二十一	漏二十二	淋二十三	關二十四
小水不禁二十五	喉痺二十六	諸瘡二十七	滿瘡二十八
疥二十九	風癬三十	痔瘡三十一	癰疽三十二
疔三十三	腳氣三十四	轉筋三十五	瘰癧三十六
內傷三十七	痰飲三十八	喘三十九	哮喘四十
霍亂四十一	嘔吐四十二	惡心四十三	腸鳴四十四
疸四十五	消渴四十六	水腫四十七	鼓脹四十八
自汗四十九	盜汗五十	吃逆五一	頭眩五二
痛風五三	肩臂痛五四	癱五五	瘡五六
噎氣五七	吞酸五八	嗜雜五九	夢遺六十
濁六一	痢六二	健忘六三	怔忡六四
驚悸六五	耳聾六六	痺六七	厥六八
癰六九	癩七十	白癰風七一	紫癰風七二
下疳瘡七三	骨梗七四		

目錄終

氣

雜病治例

風一

中風大半主血虛 氣虛以痰治之 治痰為先 扶火與濕 半身不遂 大率多痰

復氣

初未辨內外因多有因七情所動氣厥暴逆而昏冒牙關緊急若便作中風用藥多致殺入惟宜蘇合香丸灌之使醒謂氣復則已也 中風如鋒鏑之中非感胃傷風之比也

捷覽

初卒倒或中者用皂角末或不吐散於鼻內吹之

汗

解表表實無汗者散之初之表裏俱實

風

欬表表虛自汗者溫之解之表裏俱虛

宣

氣滯者難治宜吐之 痰氣實能食痰壅感者白眼喝斜不能言皆用吐法 亦有虛而不可吐者

下

此因內有便溺阻隔故攻裏審諦的當方可施此法機要三化湯 子秘使風此 花人相

雙解

陽亢 裏虛云脈微而數中風使然表裏有風熱

切

理氣

理血

補氣

補血

風

通關透肌

家寶丹

防風通聖散川芎芍藥湯風寒小續命湯如聖散天麻防風之類 見後

氣滯氣鬱胸脇悶痛有脾麻疼之類此七情也宜調氣烏梅順氣八味順氣之類

無表裏之急 血逆暴發不時大發死湯是活愈風湯兼用導痰丸子治在經之病

六合湯愈風湯之類表裏現証全無而血氣虛者須補之見左

氣虛卒倒參木補之有痰者竹瀝薑汁以參為主本於虛者補中益氣之類加風劑

用四物或少入薑汁葱泥痰涎再入竹瀝

飲食者去竹瀝加刺蘆入薑汁不若湯藥

下青州白丸子

陽証用五寶丹陰証用盧賓丹皆胃者宜用之高風入骨髓不能得出故

用龍麝牛雄之類皆入骨髓肌肉使風邪外出也若中血脈中筋未可用

治一切風症左癱右瘓手足痿痺口眼喝斜邪入骨髓者其病如只在肌表者不宜用否則引風入骨髓如油入麵不能出

川烏 南星 五靈脂用姜汁製為研 草烏 白附子 全蝎 沒藥

升發 瀉 緩 正治 從治

神 上 頂 山 東 寒 水 石 朱 砂 草

早

升發	之類。重則從其氣而升之升陽傷火湯例
瀉	實者下之解毒涼膈調胃皆可
緩	火急甚必緩之生甘草無緩無瀉
正治	看虛實分正從法
從治	人壯氣實火盛癲狂者可用正治或硝水 冰飲之涼膈解毒之類 人虛火盛或狂者用養汁湯調辰砂監死 微與之若投以冰涼藥立死如左金丸 治肝火黃連一兩吳茱萸一兩連而從之 治也
滋陰壯水	補陰即火自降妙香柏地黃之類
鎮墜	紫雪 珍珠 琥珀 犀角 雲母 朱砂 石膏之類 輕者安神
各經主治藥	肝 氣鬱明 血黃茶 心 氣鬱明 血黃連 脾 氣鬱明 血生地 肺 氣鬱明 血地黃 腎 氣鬱明 血黃柏 膽 氣鬱明 血紫胡 胃 氣鬱明 血大黃 三焦 氣鬱明 血大黃 膀胱 氣鬱明 血黃柏 大腸 氣鬱明 血大黃 小腸 氣鬱明 血黃柏 包絡 氣鬱明 血大黃

火

清暑 暑 濕 溫 火 燥 汗 利 泄 瀉 痢 嘔 吐 霍 亂 痧 脹 疔 瘡 癰 疽 疔 瘡 癰 疽 疔 瘡 癰 疽

暑	熱傷氣火極陰虛。注暑。暑風熱也。陽是陽症。暑是陰症。尿沉弱者切不可用寒涼
補	陰虛元氣不足者清暑益氣陽虛補中益氣湯扶元加半夏或生脈散
宣	扶火兼痰實者可用吐法暑風多痰天水白虎皆可可用熱開辰砂五苓散
清熱	黃連香薷有痰消暑丸
清神	香薷天水東垣清暑益氣湯加石膏
清燥	濕熱相合而刑庚全陽明病在下東垣清燥湯方消暑死至妙夏月不可無
溫	熱甚自汗而渴使逆者宜分利之桂枝甘露飲
瀉火	吐瀉脈沉微甚者可用附子大順散香薷丸 桂枝丸 水浸丹 伏熱傷冷縮脾飲 冷香飲子
汗	黃連解毒湯 神效丸 治伏暑泄瀉身熱脈弱宜來復丹
利	風濕 濕熱 濕痰 濕腫 濕痺
泄	羌活仙木之類
瀉	五苓加羌活
痢	葛根湯溫中下之類

子 41—442

涼降
更研可起
之本古製
清涼飲
更古昔日

乾癆

瀉火

痰熱、傷食、脚氣、發熱、皆不得與傷寒初治，誤則殺人生斑戶。症勞瘵鬼症皆為寒熱發熱，蓋病本不同，其標多相似，故舉諸例于左。

涼血

氣實、脈盛、身熱、煩擾、宜三乙承氣湯、涼隔等藥下之。熱在中、四順清涼飲在下、八正之類。

夜熱多或有汗或臭、身熱而便難、四物去芍加黃連生地、骨皮之類。紫胡生草知母、勞熱骨蒸、血青蒿、蛤蚧、鱉甲、小麥。

清氣

日熱多熱在氣分、紫胡飲、白梅湯、有暑熱從前例、蒸熱氣為梅秦元紫胡。

清肌

有輕手按之甚熱、重手取之不甚熱、此熱在肌表、宜清之。竹茹竹葉地骨皮麥門冬之類。

清神

有神氣、佛鬱而熱、宜清神散。

抑火升水

熱在上而陰水不升、虛火沸騰、宜非陽瀉火法、虛者補之。

養陰退陽

初病陽症而失於下、至變陰而不

瀉黃

可下、用白虎之類。因脾熱也、實則調胃瀉黃、虛則人參

黃芪散

人參門黃

桑寄生

地骨皮

朱砂安神

連生地黃

甘草妙

和知母

來復

破石

玄石

玄石

玄石

玄石

導赤

瀉白

滋陰

下食

導痰

消積

解毒

鎮墜

益精

潤燥

逐血

分利

水沃

揭越

心熱實則瀉心湯、虛則朱砂安神丸。

肺熱實則涼膈散、虛則人參白虎湯。

肝熱實則胡飲子。

腎熱實則滋腎丸、本滋陰法也、無實不可瀉。

有食傷大陰而熱、或停食而下之。

痰液不散、鬱結成熱、宜導開之。

因積滯而蓄熱、當先消積而熱自退。

有丹毒熱腫、氣鬱結滯、並可解散、隨証用藥、此候欲發瘡毒、宜治。

紫雪、朱砂、琥珀、犀角之、墜浮。

陰虛精耗元氣、脫者用滋陰藥。

俱前燥法下。

有蓄血証、宜下之。

或有與小便卑、服又。

虛者補中例、加水通。

解肌生津例。

以水沃於外、或令坐水中、當審脈証而行。

汗下後元氣虛而下陷、陰陽之氣揭薄而。

不起為虛、宜與參、緩、薑、以揚之。

升麻
升犀射干
升人甘

傍於滑石澤瀉

當下之見痰例中

疾者

<p>行血</p> <p>散之用撫芎蒼朮</p>	<p>行血</p> <p>輕者用桃仁紅花川芎肝苦急食辛以散之用撫芎蒼朮</p>	<p>脇痛</p> <p>肝急</p>	<p>通關節</p> <p>濟生菴間丸</p>	<p>肝火盛</p> <p>木氣實</p> <p>有死血</p> <p>有痰流注</p>	<p>下</p> <p>閃胸實痛諸腎散等藥下之</p>	<p>摩腰膏</p> <p>附子尖</p> <p>烏頭尖</p> <p>南星</p> <p>各二分半</p>	<p>炒姜</p> <p>一升</p> <p>雄黃</p> <p>樟腦</p> <p>丁香</p> <p>各半</p>	<p>麝香</p> <p>五粒</p> <p>煉蜜為左姜汁化開成膏放</p>	<p>手掌內火上烘摩之大抵邪在表可用麥</p>	<p>姜汁蔥亦可</p>	<p>補榮衛</p> <p>固真飲</p> <p>下後藥</p> <p>真氣虛</p> <p>戒免方</p>	<p>灸</p> <p>腎俞</p> <p>崑崙</p>	<p>鍼</p> <p>血滯於下委中出血</p>	<p>補</p> <p>氣血虛</p> <p>補中益氣中加地黃杜仲</p> <p>脾大者</p> <p>腎虛用杜仲敗龜板黃柏知母枸杞五味</p> <p>之類猪脊髓丸</p>	<p>散</p> <p>錯雜之邪</p> <p>風寒暑濕氣五積散主之</p>	<p>行血</p> <p>血調氣藥中加桃仁紅花</p>	<p>理氣</p> <p>小兒昏死或簡易枳殼湯</p>
--------------------------	---	---------------------	-------------------------	--	-----------------------------	--	---	--	-------------------------	--------------	--	------------------------------	--------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------

子 41—446

<p>消導 元戎厚朴丸 感應丸 宣 銅青之類 蘿蔔子三大合炒細細汁 空心茶湯和下大鍾漸 濃服吐 下 大實滿痛者元戎厚朴丸倫急丹大陷膏 湯虫痛五圓集効丸 或出血屬熱胃口有熱 有風寒 濕熱 牙疼 虫蛙</p>	<p>疎風 川芎 石膏 升麻 細辛 草烏 白芷 防風 羌活 擦之或單用鶴虱 一方用升麻石膏細辛葉木檀香屬是角 行濕 細辛 羌花 蒼耳 葉大戟 小麥川椒 煎水漱 之</p>	<p>清熱 石膏升麻地骨皮羊脰骨灰 鮮錯雜之邪 東垣當歸龍膽散治寒熱用元 戎梧桐淚散 下 神功丸涼膈散調胃承氣湯為末蜜丸服 之</p>	<p>行血 牙疳蝕鼻出血當作陽明蓄血治之桃仁 唇氣湯蜜丸服之東垣清胃散 有服牛 尿瀝而得血者立愈 草薺菰白芷細辛草烏丁香煆梢</p>
--	---	---	--

清田
省連生地社
升

神亨
鹿本亭中
滑石連亨
寸亨
川本調
芳本寸花
正廿四葉
清本調下
屏浦地香六
屏赤百其
生地

耳 皂角樹上蛾子或白馬蛆或用草烏川椒細辛、

益腎 腎虛者骨熱而蘇、然痛者滋腎丸

灸 煩車 聽會 曲池

熏 用蕪子

治虫 天仙子燒烟筒竹筒抵牙引烟裏之其虫即死

鍼 合谷 内庭 浮白 陽谷 三間

擦藥 元戎問王散方 醋榴皮訶子各二兩并麻何首烏綠礬枯青鹽百藥煎五倍子沒石子各兩半 麝二分 白茯苓二兩細辛石膽礬各半兩 荷葉灰白檀芽金甘松各香苗香廣香猪牙皂角及木别子各三茶青黛二分半 共為末

眼目 十四 夾着肝氣實 風熱 痰熱 血瘀熱血實 氣壅

諸邪 風熱羌活 甘菊 川芎 蔓荊子荊芥穗 火酒炒各連大黃當歸生地防風薄荷 溫熱神效丸 風川芎茶調散

涼血 實者犀角地黃湯加本連荊穗石膏際胡虛者四物加黃連生地黃芩荆穗枳實

日

點 先用童便淬、後用黃連汁燉之
黃連 黃栢 各三兩 麝仁 一末 去油

漢本芥子園

黃陽散、桃紅湯、養血湯、養氏烏

蟹木薑根
 草果甘肅陳
 方月林
 蓮花子
 蓮木三枝青
 胡椒 阿膠
 普山 普山
 果椒 知參
 馬椒 普山

辰砂丹

羅子藥湯下胃丹主鬱木香散 水等分

子 41—451

淋 濁

<p>補 九人氣虛人參白朮中加木通山泡六味</p>	<p>鮮熱 關格者分利之 涼血火府丹 木通 黃芩各兩生地二兩不渴而小便閉者滋腎</p>	<p>淋 屬熱 小便通 氣承水 寒閉 熱結 痰氣不利 胞痺屬寒</p>	<p>內托提 二地芪參朮升草菟芍</p>	<p>外塞法 用童便煨炒甘石牡蠣粉</p>	<p>導痰 散鬱和中二味四七蘇子降氣之類</p>	<p>理血 氣逆血從降生歸脾湯</p>	<p>宣 木鬱則達之</p>	<p>捷嚏 搐鼻</p>	<p>下 沉香降氣湯分心氣欲紫沉通氣湯</p>	<p>調理 沉香降氣湯分心氣欲紫沉通氣湯</p>	<p>補 吳則氣泄宜清暑益氣湯</p>	<p>降抑 逆者抑之木香流氣散降氣湯有熱者須加涼劑抑之所謂從陰引陽也</p>	<p>升散 寒氣鬱於中作痛亡氣湯溫散寒降氣</p>
-------------------------------	---	---	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------	--	-------------------------------

<p>△悶 不通者用已上法或用坐藥見傷寒例 男子急甚者令人吹吮之婦人仍用坐藥</p>	<p>△溫 局方仁風丹 九人八味九氣澤瀉 陰虛泉 陽虛泉</p>	<p>△灸 內虛寒自汗御藥秘元丹平固家並子丸 內虛濕熱者六味丸寒者八味丸加杜仲 骨脂五味</p>	<p>△小水不禁 內虛寒自汗御藥秘元丹平固家並子丸 內虛濕熱者六味丸寒者八味丸加杜仲 骨脂五味</p>	<p>△擦 用連須蒼擦周身</p>	<p>△降氣 八正中加木香沉香琥珀清氣蓮子飲 寒者溫之三固生附散</p>	<p>△外迎 湯浴之</p>	<p>△捷嚏 不臥散吹之</p>	<p>△下 八正散之類</p>	<p>△宣 吐之以提其氣升則水自下以仁陳吐 之吐中使有降開格必用吐提其氣之橫 絡不必在出痰也</p>	<p>△掩臍 連須葱三莖生薑一塊豆豉二十一粒鹽 一匙同搗作餅烘熱掩之扎空即通</p>	<p>△灸 三陰交</p>	<p>九為主氣虛不運者加升麻虛寒者八味 丸為要藥</p>
--	--	--	---	-----------------------	--	--------------------	----------------------	---------------------	--	--	-------------------	----------------------------------

喉痺
三焦
喉痺
三焦
喉痺
三焦

△喉痺

以桐油吐或以射干連翹水吐

吹藥

三因雄黃丸 雄黃二兩 巴豆去油四箇 醋糊丸茶葉大茶清下之丸

三因玉鑰匙 煅硝二兩半 硼砂半兩

金鑰匙加雄黃或止用膽礬

一字散 雄黃 蝎梢 白礬 藜蘆

猪牙皂角各等分為末每用一荳大

鼻內噴之

木通

合谷 湧泉 天突 豐隆

初起傍灸之蓋亦鑿數使外洩也

頭腫鍼曲池二穴

痰不降而致格梗者一夏湯 寒痰三因

玉粉丸 熱者滾痰丸

脈實氣厥火甚者涼膈散下之氣虛老人

勿輕用 血熱紫胡飲子 氣熱碧雪

風熱用通聖散

疎風

大力子 桔梗 半夏 薄荷 甘草

防風 荆穗 射干 牛膝 山豆根

當歸 黃芩 竹瀝

有下虛陰盛格熱在上切不可用涼藥

沉緊細小者是也宜桂附溫下之藥上用

半夏桔梗之類

初起者疔疽發背便熱之或毒下陷亦可

用方別內托

發汗 在背脊活為主 在面白芷 在肩脇紫

胡 在背脊白芷升麻 東垣最妙

脈數骨痛大者宜東垣消毒散 沉細者

十補散 滑數瘡在下宜當歸貼痛湯

蒜片或白芷木紫為末蜜和作餅用

多年冷瘡用附子片

脈實瘡腫嫩便閉宜內疎黃連湯

汗多脈大謔語破棺丹

有因食一切毒物及死駝馬肉而發瘡腫

者有濕毒等致宜服後藥

飛龍奪命丹治一切疔瘡惡腫癰疽初發

或發而內陷者如熱毒脈盛宜后飲子

天南星 雄黃 巴豆 各等分 硃砂 黃丹

乳香 各半 班布 土箇 去粗皮

桂竹已當其本

外治

子 41—455

宣 寸脉實當咳在上瀉亦不吐中有痰
 散之香 桔梗 參 桑 梨
 消導 食積瑞竹堂化痰丸 戴氏白餅子 痰
 在四肢非竹瀝不開在腸下非白芥子不
 能連 熱痰 青黛黃連散痰丸 二陳加
 參連 濕痰 小胃丹 肺癆乾者 二陳
 湯 寒痰 蘇桂丸 溫中丸 五香丸
 風痰 青州白丸子 玉虛丸 天南星丸
 驚痰 辰砂化痰丸 保生抱子
 發散 風寒外感金沸草散 二切湯 固本蘇飲
 下 祛痰丸 有痰實飲邪聚狂症降痰丸 大刺
 隔丸 瀉飲枳實丸 有痰飲內痛十棗湯
 三圖控涎丹
 理氣 四七湯 蘇子降氣湯
 滋陰 半夏止能燥痰之標不能治痰之本 胃氣
 花以主之 海粉熱痰能降濕痰能燥結痰
 能軟頑痰能消奇入九子不可入煎藥
 鎮墜痰飲升降陰陽 重砂丹 黑錫丹
 來復丹
 喘 未發以扶正氣為主 已發以攻邪為主
 有外感邪感

宣 寸脉實當咳在上瀉亦不吐中有痰
 散之香 桔梗 參 桑 梨
 消導 食積瑞竹堂化痰丸 戴氏白餅子 痰
 在四肢非竹瀝不開在腸下非白芥子不
 能連 熱痰 青黛黃連散痰丸 二陳加
 參連 濕痰 小胃丹 肺癆乾者 二陳
 湯 寒痰 蘇桂丸 溫中丸 五香丸
 風痰 青州白丸子 玉虛丸 天南星丸
 驚痰 辰砂化痰丸 保生抱子
 發散 風寒外感金沸草散 二切湯 固本蘇飲
 下 祛痰丸 有痰實飲邪聚狂症降痰丸 大刺
 隔丸 瀉飲枳實丸 有痰飲內痛十棗湯
 三圖控涎丹
 理氣 四七湯 蘇子降氣湯
 滋陰 半夏止能燥痰之標不能治痰之本 胃氣
 花以主之 海粉熱痰能降濕痰能燥結痰
 能軟頑痰能消奇入九子不可入煎藥
 鎮墜痰飲升降陰陽 重砂丹 黑錫丹
 來復丹
 喘 未發以扶正氣為主 已發以攻邪為主
 有外感邪感

地黃 蒼 熟地 參 桑 梨
 宣 寸脉實當咳在上瀉亦不吐中有痰
 散之香 桔梗 參 桑 梨
 消導 食積瑞竹堂化痰丸 戴氏白餅子 痰
 在四肢非竹瀝不開在腸下非白芥子不
 能連 熱痰 青黛黃連散痰丸 二陳加
 參連 濕痰 小胃丹 肺癆乾者 二陳
 湯 寒痰 蘇桂丸 溫中丸 五香丸
 風痰 青州白丸子 玉虛丸 天南星丸
 驚痰 辰砂化痰丸 保生抱子
 發散 風寒外感金沸草散 二切湯 固本蘇飲
 下 祛痰丸 有痰實飲邪聚狂症降痰丸 大刺
 隔丸 瀉飲枳實丸 有痰飲內痛十棗湯
 三圖控涎丹
 理氣 四七湯 蘇子降氣湯
 滋陰 半夏止能燥痰之標不能治痰之本 胃氣
 花以主之 海粉熱痰能降濕痰能燥結痰
 能軟頑痰能消奇入九子不可入煎藥
 鎮墜痰飲升降陰陽 重砂丹 黑錫丹
 來復丹
 喘 未發以扶正氣為主 已發以攻邪為主
 有外感邪感

補 氣虛短氣用人參蜜炙黃柏麥門冬地黃
 何膠桑白皮
 降痰 有痰亦短氣而喘傳痰湯方 半夏南星
 陳皮枳實茯苓甘草
 滋陰 陰虛自小腹下火起而上者地黃丸
 年高痰喘不定者必用此仍痰氣與地黃
 等分
 疎利風痰 婦人十全大補方 降痰湯
 降火 有熱甚而喘
 有水無肺而喘 參桂湯 牛之類
 降氣 導氣湯 蘇子降氣湯 二氣實消導下行
 潤燥 欬花膏
 下有胃實壅遏以承氣湯下之氣實者下之
 椒目為細末一二錢用姜汁調下止各又
 蘇白蒸熟為君皂角燒灰等分姜汁煉蜜
 九梧桐子大服五六十丸初後看証用藥
 外感心下有水氣乾嘔而喘小清龍去麻
 黃加杏仁主之
 宣 宜春初吐之
 導痰順氣 清肺養正之藥

霍亂吐瀉 內有所積 外有所感 宣 就微吐之以提其氣或用樟木湯吐亦可 解散 乾霍亂不用涼劑二陳加川芎山木防風 白芷 分利 有熱 有痰 寒 停食 清熱 胃中有熱腸上有痰二陳加薑黃連 溫 運少升 腎氣丸 導滯 有積滯毒氣上攻而嘔者 下 有食則消 清鎮 燒針必用之 決洩 水逆者五苓散主之 補 久病者胃虛不納穀也人參黃芪白朮陳 皮之類 惡心 痰熱 虛 辛散 皆用生薑隨証用藥 灸 嘔吐惡心 胃俞 幽門 高丘 中府 石門 膈俞 陽關 膈噎 二 即穀胃 血虛 氣虛 熱 痰無病 補氣 四君子加滋補量便或參苓白朮散或

霍亂吐瀉	內有所積 外有所感	宣	就微吐之以提其氣或用樟木湯吐亦可	解散	乾霍亂不用涼劑二陳加川芎山木防風	白芷	分利	有熱 有痰 寒 停食	清熱	胃中有熱腸上有痰二陳加薑黃連	溫	運少升 腎氣丸	導滯	有積滯毒氣上攻而嘔者	下	有食則消	清鎮	燒針必用之	決洩	水逆者五苓散主之	補	久病者胃虛不納穀也人參黃芪白朮陳	皮之類	惡心	痰熱 虛	辛散	皆用生薑隨証用藥	灸	嘔吐惡心 胃俞 幽門 高丘 中府 石門 膈俞 陽關	膈噎	二 即穀胃 血虛 氣虛 熱 痰無病	補氣	四君子加滋補量便或參苓白朮散或
------	-----------	---	------------------	----	------------------	----	----	------------	----	----------------	---	---------	----	------------	---	------	----	-------	----	----------	---	------------------	-----	----	------	----	----------	---	---------------------------	----	-------------------	----	-----------------

霍亂吐瀉 內有所積 外有所感 宣 就微吐之以提其氣或用樟木湯吐亦可 解散 乾霍亂不用涼劑二陳加川芎山木防風 白芷 分利 有熱 有痰 寒 停食 清熱 胃中有熱腸上有痰二陳加薑黃連 溫 運少升 腎氣丸 導滯 有積滯毒氣上攻而嘔者 下 有食則消 清鎮 燒針必用之 決洩 水逆者五苓散主之 補 久病者胃虛不納穀也人參黃芪白朮陳 皮之類 惡心 痰熱 虛 辛散 皆用生薑隨証用藥 灸 嘔吐惡心 胃俞 幽門 高丘 中府 石門 膈俞 陽關 膈噎 二 即穀胃 血虛 氣虛 熱 痰無病 補氣 四君子加滋補量便或參苓白朮散或

霍亂吐瀉	內有所積 外有所感	宣	就微吐之以提其氣或用樟木湯吐亦可	解散	乾霍亂不用涼劑二陳加川芎山木防風	白芷	分利	有熱 有痰 寒 停食	清熱	胃中有熱腸上有痰二陳加薑黃連	溫	運少升 腎氣丸	導滯	有積滯毒氣上攻而嘔者	下	有食則消	清鎮	燒針必用之	決洩	水逆者五苓散主之	補	久病者胃虛不納穀也人參黃芪白朮陳	皮之類	惡心	痰熱 虛	辛散	皆用生薑隨証用藥	灸	嘔吐惡心 胃俞 幽門 高丘 中府 石門 膈俞 陽關	膈噎	二 即穀胃 血虛 氣虛 熱 痰無病	補氣	四君子加滋補量便或參苓白朮散或
------	-----------	---	------------------	----	------------------	----	----	------------	----	----------------	---	---------	----	------------	---	------	----	-------	----	----------	---	------------------	-----	----	------	----	----------	---	---------------------------	----	-------------------	----	-----------------

<p>一蒸</p> <p>桑白茅蘆大橘皮湯五苓之類 煎</p> <p>用湯以法生煎之</p>	<p>一實脾土</p> <p>脾虛不能制水 瀆妄行當燥脾補虛</p> <p>為主切不可下對金飲子脾積丸</p>	<p>一利機關</p> <p>同腎氣須茯苓與地黃對用平胃為</p> <p>衣稍實者下後用此潔淨府也</p>	<p>一三聖散</p> <p>枳實 薤白子 牽牛 為末</p> <p>看大小與服氣實三花神佑丹連為切選</p> <p>用之 苦飲丸</p>	<p>一神全散</p> <p>枳實 薤白子 牽牛 為末</p> <p>看大小與服氣實三花神佑丹連為切選</p> <p>用之 苦飲丸</p>	<p>一水腫四五</p> <p>五臟水為証不同 皮水 正水 石水</p> <p>風水 內因氣 濕 食</p>	<p>一潤燥</p> <p>黃連末天花粉末生地汁生藕汁和入牛</p> <p>乳佐以姜汁蜜 或單用浮萍汁</p>	<p>一生津補氣血</p> <p>東垣生津甘露飲子</p> <p>調胃承氣湯</p>	<p>一清鎮</p> <p>珠砂黃連丸 三茵陳珠丸</p>	<p>一滋陰</p> <p>八味丸丹溪補陰丸</p>	<p>一養肺降火</p> <p>人參白扁湯 東垣蘭香飲子</p> <p>麥門冬飲子</p>	<p>一赤為中消</p> <p>下消則多膏淋面色黑而瘦</p>
--	---	---	---	---	--	---	--	-------------------------------	----------------------------	---	---------------------------------

<p>分凡 李連資半 善本人口 楊善本信 名知以主 分消湯 智幸本木 升五葉三 亞白類三 人必善美</p>	<p>繆刺 脉盛氣實者可開胃倉穴 合谷 石門 水道 有食傷太陰而浮腫如水者因積滯者集熱分消凡 開鬼門 謂發汗也 鼓脹 四六</p>	<p>分消湯 智幸本木 升五葉三 亞白類三 人必善美</p>	<p>消導 氣脹清熱行氣中滿分消凡 寒脹中滿 補中行濕 此脾虛之甚大劑參朮厚皮苓 仙术</p>	<p>鼓脹</p>	<p>行血 有血積 潔淨府 小便澀者宜克滲利之 下 脉實人壯盛者下之便用收拾 行氣 厚朴治脹因味辛散二法用大蝦蟇一箇 入猪肚內煮熟去蟇不用病人一日吃盡 還愈神妙</p>	<p>鼓脹</p>	<p>滋陰 無陰則不能化故脹故藥加苓連類 鐵 上脘 三里 車門 陰谷 關元 期門 行間 脾俞 懸鍾 承滿</p>	<p>鼓脹</p>	<p>自汗 氣虛 濕熱 陽虛 助陽 參朮中佐以桂枝 甚者附子 下 大氣上蒸於胃作汗者不屬虛</p>	<p>鼓脹</p>	<p>助陽 參朮中佐以桂枝 甚者附子 下 大氣上蒸於胃作汗者不屬虛</p>	<p>鼓脹</p>	<p>助陽 參朮中佐以桂枝 甚者附子 下 大氣上蒸於胃作汗者不屬虛</p>
---	---	--	---	-----------	--	-----------	--	-----------	---	-----------	---	-----------	---

補心虛者礪粉丸補之

牡蠣麋皮麻黃根葉本糯米防風白芷為

寺店身撲之

何首烏末津調封之

消導導脾胃有食積熱而自汗煩導之脾積丸

血虛 陰虛 小兒不須治

涼血補血
生地當歸黃芪黃連黃柏黃芩甘

草麻黃根浮麥

實解氣肌 白朮四兩 黃芪牡蠣各令一兩

炒過只開水為末每服三二錢

文蛤 九箇下二十粒

何首烏煮去鹽調安臍內

逆
九
痰
氣
虛
陰
火

補虛者參朮中下大補丸輕者半得用思

勝之

胃寒理中湯

下
便實者下之

宣
氣實脈盛有痰者必吐之

或運疾扶氣處 火利其症 用力是

久病

和痰清熱

南星半夏枳殼
天麻白附片
川芎羌活獨活
木瓜桑寄生
杜仲續斷
狗脊
骨節
木香
砂仁
豆蔻
草豆蔻
藿香
佩蘭
茵陳
黃連
黃芩
山梔
薄荷
冰片
檀香
降香
乳香
沒藥
血竭
蘇合
安息香
阿膠
龜板
虎骨
豹骨
蛇膽
蜈蚣
全蝎
地龍
僵蚕
蝉衣
珍珠
珊瑚
琥珀
朱砂
磁石
礞石
石膏
煅石膏
芒硝
硃砂
雄黃
硫磺
自然銅
煅自然銅
鐵屑
煅鐵屑
錳屑
煅錳屑
鉛粉
煅鉛粉
汞粉
煅汞粉
砒霜
煅砒霜
礬石
煅礬石
滑石
煅滑石
燉皂莢
燉白朮
燉蒼朮
燉厚朴
燉枳實
燉木香
燉砂仁
燉豆蔻
燉草豆蔻
燉藿香
燉佩蘭
燉茵陳
燉黃連
燉黃芩
燉山梔
燉薄荷
燉冰片
燉檀香
燉降香
燉乳香
燉沒藥
燉血竭
燉蘇合
燉安息香
燉阿膠
燉龜板
燉虎骨
燉豹骨
燉蛇膽
燉蜈蚣
燉全蝎
燉地龍
燉僵蚕
燉蝉衣
燉珍珠
燉珊瑚
燉琥珀
燉朱砂
燉磁石
燉礞石
燉石膏
燉煅石膏
燉芒硝
燉硃砂
燉雄黃
燉硫磺
燉自然銅
燉煅自然銅
燉鐵屑
燉煅鐵屑
燉錳屑
燉煅錳屑
燉鉛粉
燉煅鉛粉
燉汞粉
燉煅汞粉
燉砒霜
燉煅砒霜
燉礬石
燉煅礬石
燉滑石
燉煅滑石
燉燉皂莢
燉燉白朮
燉燉蒼朮
燉燉厚朴
燉燉枳實
燉燉木香
燉燉砂仁
燉燉豆蔻
燉燉草豆蔻
燉燉藿香
燉燉佩蘭
燉燉茵陳
燉燉黃連
燉燉黃芩
燉燉山梔
燉燉薄荷
燉燉冰片
燉燉檀香
燉燉降香
燉燉乳香
燉燉沒藥
燉燉血竭
燉燉蘇合
燉燉安息香
燉燉阿膠
燉燉龜板
燉燉虎骨
燉燉豹骨
燉燉蛇膽
燉燉蜈蚣
燉燉全蝎
燉燉地龍
燉燉僵蚕
燉燉蝉衣
燉燉珍珠
燉燉珊瑚
燉燉琥珀
燉燉朱砂
燉燉磁石
燉燉礞石
燉燉石膏
燉燉煅石膏
燉燉芒硝
燉燉硃砂
燉燉雄黃
燉燉硫磺
燉燉自然銅
燉燉煅自然銅
燉燉鐵屑
燉燉煅鐵屑
燉燉錳屑
燉燉煅錳屑
燉燉鉛粉
燉燉煅鉛粉
燉燉汞粉
燉燉煅汞粉
燉燉砒霜
燉燉煅砒霜
燉燉礬石
燉燉煅礬石
燉燉滑石
燉燉煅滑石
燉燉燉皂莢
燉燉燉白朮
燉燉燉蒼朮
燉燉燉厚朴
燉燉燉枳實
燉燉燉木香
燉燉燉砂仁
燉燉燉豆蔻
燉燉燉草豆蔻
燉燉燉藿香
燉燉燉佩蘭
燉燉燉茵陳
燉燉燉黃連
燉燉燉黃芩
燉燉燉山梔
燉燉燉薄荷
燉燉燉冰片
燉燉燉檀香
燉燉燉降香
燉燉燉乳香
燉燉燉沒藥
燉燉燉血竭
燉燉燉蘇合
燉燉燉安息香
燉燉燉阿膠
燉燉燉龜板
燉燉燉虎骨
燉燉燉豹骨
燉燉燉蛇膽
燉燉燉蜈蚣
燉燉燉全蝎
燉燉燉地龍
燉燉燉僵蚕
燉燉燉蝉衣
燉燉燉珍珠
燉燉燉珊瑚
燉燉燉琥珀
燉燉燉朱砂
燉燉燉磁石
燉燉燉礞石
燉燉燉石膏
燉燉燉煅石膏
燉燉燉芒硝
燉燉燉硃砂
燉燉燉雄黃
燉燉燉硫磺
燉燉燉自然銅
燉燉燉煅自然銅
燉燉燉鐵屑
燉燉燉煅鐵屑
燉燉燉錳屑
燉燉燉煅錳屑
燉燉燉鉛粉
燉燉燉煅鉛粉
燉燉燉汞粉
燉燉燉煅汞粉
燉燉燉砒霜
燉燉燉煅砒霜
燉燉燉礬石
燉燉燉煅礬石
燉燉燉滑石
燉燉燉煅滑石
燉燉燉燉皂莢
燉燉燉燉白朮
燉燉燉燉蒼朮
燉燉燉燉厚朴
燉燉燉燉枳實
燉燉燉燉木香
燉燉燉燉砂仁
燉燉燉燉豆蔻
燉燉燉燉草豆蔻
燉燉燉燉藿香
燉燉燉燉佩蘭
燉燉燉燉茵陳
燉燉燉燉黃連
燉燉燉燉黃芩
燉燉燉燉山梔
燉燉燉燉薄荷
燉燉燉燉冰片
燉燉燉燉檀香
燉燉燉燉降香
燉燉燉燉乳香
燉燉燉燉沒藥
燉燉燉燉血竭
燉燉燉燉蘇合
燉燉燉燉安息香
燉燉燉燉阿膠
燉燉燉燉龜板
燉燉燉燉虎骨
燉燉燉燉豹骨
燉燉燉燉蛇膽
燉燉燉燉蜈蚣
燉燉燉燉全蝎
燉燉燉燉地龍
燉燉燉燉僵蚕
燉燉燉燉蝉衣
燉燉燉燉珍珠
燉燉燉燉珊瑚
燉燉燉燉琥珀
燉燉燉燉朱砂
燉燉燉燉磁石
燉燉燉燉礞石
燉燉燉燉石膏
燉燉燉燉煅石膏
燉燉燉燉芒硝
燉燉燉燉硃砂
燉燉燉燉雄黃
燉燉燉燉硫磺
燉燉燉燉自然銅
燉燉燉燉煅自然銅
燉燉燉燉鐵屑
燉燉燉燉煅鐵屑
燉燉燉燉錳屑
燉燉燉燉煅錳屑
燉燉燉燉鉛粉
燉燉燉燉煅鉛粉
燉燉燉燉汞粉
燉燉燉燉煅汞粉
燉燉燉燉砒霜
燉燉燉燉煅砒霜
燉燉燉燉礬石
燉燉燉燉煅礬石
燉燉燉燉滑石
燉燉燉燉煅滑石
燉燉燉燉燉皂莢
燉燉燉燉燉白朮
燉燉燉燉燉蒼朮
燉燉燉燉燉厚朴
燉燉燉燉燉枳實
燉燉燉燉燉木香
燉燉燉燉燉砂仁
燉燉燉燉燉豆蔻
燉燉燉燉燉草豆蔻
燉燉燉燉燉藿香
燉燉燉燉燉佩蘭
燉燉燉燉燉茵陳
燉燉燉燉燉黃連
燉燉燉燉燉黃芩
燉燉燉燉燉山梔
燉燉燉燉燉薄荷
燉燉燉燉燉冰片
燉燉燉燉燉檀香
燉燉燉燉燉降香
燉燉燉燉燉乳香
燉燉燉燉燉沒藥
燉燉燉燉燉血竭
燉燉燉燉燉蘇合
燉燉燉燉燉安息香
燉燉燉燉燉阿膠
燉燉燉燉燉龜板
燉燉燉燉燉虎骨
燉燉燉燉燉豹骨
燉燉燉燉燉蛇膽
燉燉燉燉燉蜈蚣
燉燉燉燉燉全蝎
燉燉燉燉燉地龍
燉燉燉燉燉僵蚕
燉燉燉燉燉蝉衣
燉燉燉燉燉珍珠
燉燉燉燉燉珊瑚
燉燉燉燉燉琥珀
燉燉燉燉燉朱砂
燉燉燉燉燉磁石
燉燉燉燉燉礞石
燉燉燉燉燉石膏
燉燉燉燉燉煅石膏
燉燉燉燉燉芒硝
燉燉燉燉燉硃砂
燉燉燉燉燉雄黃
燉燉燉燉燉硫磺
燉燉燉燉燉自然銅
燉燉燉燉燉煅自然銅
燉燉燉燉燉鐵屑
燉燉燉燉燉煅鐵屑
燉燉燉燉燉錳屑
燉燉燉燉燉煅錳屑
燉燉燉燉燉鉛粉
燉燉燉燉燉煅鉛粉
燉燉燉燉燉汞粉
燉燉燉燉燉煅汞粉
燉燉燉燉燉砒霜
燉燉燉燉燉煅砒霜
燉燉燉燉燉礬石
燉燉燉燉燉煅礬石
燉燉燉燉燉滑石
燉燉燉燉燉煅滑石
燉燉燉燉燉燉皂莢
燉燉燉燉燉燉白朮
燉燉燉燉燉燉蒼朮
燉燉燉燉燉燉厚朴
燉燉燉燉燉燉枳實
燉燉燉燉燉燉木香
燉燉燉燉燉燉砂仁
燉燉燉燉燉燉豆蔻
燉燉燉燉燉燉草豆蔻
燉燉燉燉燉燉藿香
燉燉燉燉燉燉佩蘭
燉燉燉燉燉燉茵陳
燉燉燉燉燉燉黃連
燉燉燉燉燉燉黃芩
燉燉燉燉燉燉山梔
燉燉燉燉燉燉薄荷
燉燉燉燉燉燉冰片
燉燉燉燉燉燉檀香
燉燉燉燉燉燉降香
燉燉燉燉燉燉乳香
燉燉燉燉燉燉沒藥
燉燉燉燉燉燉血竭
燉燉燉燉燉燉蘇合
燉燉燉燉燉燉安息香
燉燉燉燉燉燉阿膠
燉燉燉燉燉燉龜板
燉燉燉燉燉燉虎骨
燉燉燉燉燉燉豹骨
燉燉燉燉燉燉蛇膽
燉燉燉燉燉燉蜈蚣
燉燉燉燉燉燉全蝎
燉燉燉燉燉燉地龍
燉燉燉燉燉燉僵蚕
燉燉燉燉燉燉蝉衣

卷之六

川芎茶調散兼熱痰三博加羌活仙術

芥子園畫傳

降火清痰丸 清空膏

導引 羅疾丸

苦食 有內傷停食扶痰而致

血 胎前產後血

補氣 廣老老牙 陰虛 虛之寒

拍鼻 泥甚老牛未吵之

風熱
風濕
血虛
有

一、山木、星、白、當、尋、酒、性

多前以之

味甘量在上也。羌活威靈性在下加牛膝。

太通炒栢 寒小續命湯 風天麻防風

散

調理 虎骨散 虎骨 蘇灸二兩 花蛇 酒洗取肉

天麻 防風 川牛膝

乳香另研桂心各兩炙草 金蟬中麝香一

右為末每服二錢薑汁酒調下

補血 多用芎歸佐以桃仁紅花

疎風勝濕 南星仙木炒和煮 羌活 獨活 白芷 川芎 蔓荊 薄荷 桑葉 菊花 煨石膏 煨磁石 煨礞石 煨牡蠣 煨龜板 煨虎骨 煨狗寶 煨人參 煨鹿茸 煨虎骨 煨狗寶 煨人參 煨鹿茸

桂枝仁防己有濕勝一身盡赤

濟川散

子 41—462

人參 遠志 白朮 歸身 茯苓 神丹 天麻 人參 陳皮 獨活 遠志 犀角 麥門冬 桑仁 辰砂 各等分 守田 南星 石膏 各兩 甘草 白附子 川芎 鬱金 牛黃 各等分 珍珠 生地 黃連 各等分 金箔 三片

●夢遺五九脫精 夢主濕熱 虛
●固真 縛虎飲子見腰痛補例
●補 氣血虛六八物湯下 珍珠粉丸
●燥濕 珍珠粉丸方 黃柏 知母 牡蠣粉 蛤粉
●清熱安神 青黛海石栢
●濕熱 痰 虛 赤屬血 白屬氣
●燥濕 濕痰流注於二陳中加仙朮白朮 赤者加白芍仍用珍珠粉丸
●清熱 脉弦滑者青黛清石栢一之
●燥痰 南星守田海石以神麴糊為丸青黛水
●補 氣血虛縛虎飲子下珍珠粉丸 心虛宜定志丸
●下 熱在下氣實者導水丸
●大率行痰為主
●清熱養氣血 寧神丹 天麻 人參 陳皮 白朮 歸身 茯苓 神丹 荆穗 礞石 獨活 遠志 犀角 麥門冬 桑仁 辰砂 各等分 守田 南星 石膏 各兩 甘草 白附子 川芎 鬱金 牛黃 各等分 珍珠 生地 黃連 各等分 金箔 三片

早 驚悸 早 驚悸

●健忘六二 精神短少者多 亦有痰者隨証治之
●清熱養血 安神丸小黃芩合服之
●順氣清神 補中益氣加石膏荆芥芎
●怔忡六三 大抵屬血虛 有慮便動屬虛 時作時止者痰逐火動 瘦人是血少 肥是痰
●補 補中益氣湯加生地石膏荆芥穗
●宣 氣實者用倒倉法見積聚門 再舉
●導痰清神 調中益氣丹方
●人參 歸身 茯苓 遠志
●乾山藥 生地 酸棗仁 辰砂
●陳皮 各兩 白朮 各半 牡蠣 各兩 麥門冬 各兩 黃連 各兩 生甘草 兩 枳實 各兩 半夏 各兩 右為末酒糊丸如梧桐子大每服四五丸 食後白湯下
●耳聾六五 痰 熱 隨証治之
●疎風 痰者用五倍末針烙末處最寒之處
●人乳和草麻子肉末作膏塞耳中
●清熱開痰 清神散合二陳
●宣 蘇白子年兩分為末白湯作三二次服

<p>解鬱 有因七情致者隨氣治之</p>	<p>痺六六 風寒濕</p>	<p>發散 風寒濕三氣合為竹痺上下左右無不宣</p>	<p>溫經 寒勝為痺痺四肢疼而浮腫宜明發散湯</p>	<p>潤膚滋腎 在血脈之中隨上下不通</p>	<p>摩擦 薑汁泥周身擦之</p>	<p>灸 疎風養血 通聖散去硝黃加白芷羌活為末</p>	<p>服之</p>	<p>導痰飲 有因支飲手足麻痺多唾眩冒</p>	<p>服之</p>	<p>發散 赤茯苓陳皮枳實桔梗甘草黃芩湯</p>	<p>服之</p>	<p>捷寢 初得厥而不知人事宜不臥散吹指</p>	<p>調氣 先用蘇合香丸灌之醒後看虛實治</p>	<p>升發 卒厥暴死飛尸鬼注鬼擊客忤</p>	<p>宣 或七情痰氣所致故宜吐之</p>	<p>清熱養氣 白芍加人參湯 虛甚者獨參湯</p>	<p>溫 表熱內寒下利清穀食入則吐或乾嘔或</p>
----------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------

<p>汗四肢冷拘急身體痛不渴四逆湯</p>	<p>常服苓桂枳朮丸仍食後凡 用昆布海</p>	<p>藻帶各二錢大力四錢炒為末如後用効</p>	<p>彈子太每九含化之</p>	<p>導痰氣 三棱丸</p>	<p>下虫 此是感天地殺厲之氣聲啞者難治</p>	<p>病在下通天再造散 取虫及微物方</p>	<p>共為末酒下五錢</p>	<p>取涎 病在上角醉仙散於牙縫中連毒取涎方</p>	<p>見後</p>	<p>發散 痛者養血藥中加如聖散</p>	<p>疎風清熱 防風通聖散加生地羌活獨活大力</p>	<p>子白芷蔓荊子</p>	<p>宣 氣實痰壅者宜吐汗之</p>	<p>換肌 換肌丹方 當歸 苦參 各兩 川芎</p>	<p>撫芎 防風 荊芥穗 川羌活 獨活</p>	<p>金蝎 蛇退各兩半共為末 大楓子 三斤取</p>	<p>淨肉一斤 右楓肉搗如泥和陳米飯為丸</p>	<p>每服四十丸空心至晚各進一服</p>	<p>出惡血 取委中二穴鍼之去惡血二三</p>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	----------------	--------------------------	------------------------	----------------	----------------------------	-----------	----------------------	----------------------------	---------------	--------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

合。又黑紫疣瘡處亦去惡血。

涼血瀉火 四物加生地荆芥穗黃芪黃連地骨

甘草黃芩之類。

潤膚 大楓子杜松輕粉苦參白芷為膏潤之痒

者加白芨硝雄黃

追涎 鼻塞者用猪牙皂角十條微炮去皮玄胡

索大者三枚青黛半錢共為末滴水凡如

鷄頭太晒乾每一丸以水浸開口含水以

藥搗鼻中其涎自出後以水漱口自止

醉仙散方 服五七日後牙縫中出涎

胡麻 麻子 枸杞子 蔓荊子

白蔹 苦參 防風 瓜蒂

右為末每十五錢入輕粉一錢每服一錢茶

湯調下

雄黃 研生用臨時下黃柏槐花麻黃苦參乾

姜各一兩只為粗末用水一桶許浸五日

令藥水濃却煎數沸去粗入缸或大桶內

令滿坐於內浸身汗出為度真至取下遠

去其水於僻處埋藏換新衣者大忌色慾

口味

雙解 烏蛇花方 皂角去皮穢子二十之酥炙

白花蛇烏蛇各一條並酒浸去骨焙乾苦

白癰風

追風丹

前年

若

若

若

若

若

若

若

若

若

若

若

若

若

若

若

若

若

若

若

若

參四兩大楓子三斤內取淨肉一斤共為

細末以皂角十三空搥碎以水五升浸一

宿應去根熬成膏和前藥為丸桐子大每

三十九粒利溫酒下以利為度欲汗通聖

散汁送下三日服一遍汗出為度

紫癰風 風痒多用尋常少用

紫荊皮 白芨 赤小豆 斑蝥

明礬 全蝎 各半 右為細末水調塗

敷其瘡直到了不換瘡後其痂自落

瑞竹堂追風丹

一法臘八日不沾免血和酒服之

紫癰風 雄黃白附子 烏頭 和姜汁搥之

下疳瘡 好茶末 川椒 半升 為末貼之瘡乾者燒

灰貼之亦可 洗後敷之

又方 五倍子 炒吳白芷 荆芥穗

黃柏 共為末貼

骨梗 七三

喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉

喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉

喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉

喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉

喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉

喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉

喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉

喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉

喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉 喉

雜病治例一卷

浙江范懋柱家天一閣藏本

明劉純撰純有玉機微義已著錄是書成於永樂戊子末附蘭室誓戒四則叙其父橘泉翁受醫術於朱震亨純承其家學又從其鄉馮庭幹許宗魯邱克容游盡得其法因撮舉綱要著爲一編分七十二證每證各標其攻補之法蓋皆其相傳口訣故畧而弗詳初無刊本成化己亥上元縣知縣長安蕭謙觀政戶部時奉命賞軍甘州始從純後人得其本爲鈐板以傳

傷寒治例一卷

〔明〕劉純撰

北京圖書館藏明刻本

附《四庫全書總目·傷寒治例
一卷》提要

傷寒治例引

傷寒治例者名醫劉翁之所著也翁名純字宗厚其先淮南人以事移關中遂家焉予晚生不及識翁因金暴而訪求翁後見其譜牒乃稽祖裔也翁為人博極群書尤精醫道厥考楠泉先生受業丹溪之門及翁繼之醫道大行家聲大著遂以所學於父師者為此書蓋有以邇茲問之源撮仲景之旨治傷寒者循此而行如射而中獵而獲足以起死回生易危為安無天橫之危皆躋仁壽之域矣予得而刻之益有以廣傳翁之德惠不特此爾翁所著又有醫經小學玉機微義傳於世云

成化己亥歲陽月吉日易菴居士蕭謙書



傷寒治例

引用書諸家姓名

內經

金匱方

鍼經

傷寒論

難經

活人書

明理論

韓祇和

陳孔碩

王海藏

孫兆

片玉

曾家學

龐安常

保命集

李知先

嚴仁菴

趙慈心傷寒

釋疑

直指方

仁存方

朱肱

究源方

良方

此事難知

宣明論

總錄

東垣方

素問

無求子

證治

百證歌

孫用和

補亡

醫鏡

雲岐子

陰證畧例

千金翼

高保衡

薛立明

外臺秘要

易簡方

傷寒治例目錄

發熱

發熱反欲近衣

身寒反不欲近衣

惡寒

一身盡寒

背惡寒

惡風

寒熱

熱多寒少

寒多熱少

潮熱

自汗

盜汗

頭汗

手足汗

無汗

頭痛

項強

頭眩

胸脇滿

心下滿

結胸

痞

欬逆

腹脹滿

小腹痛

煩熱

煩躁

懊憹

舌上胎

衄血

畜血

下血

吐血

欬嗽

喘

嘔吐

悸

驚惕

渴

振

戰慄

搖頭

四逆

厥

鄭聲

譫語

短氣

瘕瘕

筋惕肉瞤

鬱胃

動氣

自利

熱入血室

發黃

發狂

霍亂

勞役

陰陽易

大便不利

脇痛

咽痛

魀厥

傷寒治例目錄終

陽證陽毒	陰證陰毒	太陽陽明合病
太陽少陽合病	三陽合病	陰證似陽
陽證似陰	陰盛陽陽	陽盛拒陰
癰	晝夜偏劇	口燥咽乾
百合病	邪感	漱水不嚥
水氣	小便不利	陽瘕
陰瘕	不仁	直視
遺尿	循衣摸床	濕病
溫瘧	風溫	濕疫
溫毒	濕溫	暑證
陽證	三	

傷寒治例

吳陵劉純宗厚 編集

發熱

長安蕭謙子豫 校正

屬表者即風寒客於皮膚陽氣怫鬱所致翕翕發熱若翕所覆邪在外若小便黃非在外也

屬裏者陽氣下陷入陰分蒸熱若熏蒸邪在內若小便清非在內也

邪在三陽太陽證多邪在三陰少陰證多與潮熱若同而異此屬半表

解表

與煩躁相類而非此屬半裏有發汗解肌之別

發汗

脈浮緊為表實無汗寒傷榮宜麻黃湯

解肌

脈浮緩為表虛自汗風傷衛宜桂枝湯

脈浮緩反無汗脈浮緊反煩躁宜桂枝麻黃各半湯

和榮衛

風兼寒脈寒兼風脈榮衛兩傷俱實脈浮緊無汗宜大青龍湯

解肌表

發熱脈浮大小便赤煩渴此表裏證俱見或汗後脈浮小便澀並宜五苓散

已上二條屬兩解例

隨經治例

太陽麻黃湯

太陽陽明六物麻黃湯

陽明葛根湯 太陽少陽七物柴胡湯

六經表 少陽小柴胡湯 太陰桂枝湯

少陰麻黃附子細辛湯 厥陰當歸四逆湯

合病表 陽明少陽葛根柴胡湯 太陰少陰真武湯

太陰厥陰當歸四逆湯 少陰厥陰四逆湯

助陽 發熱脈沉無力或少陰病始得之反熱者亦

屬表所以一經表有一經表藥也

溫經 發熱為邪在表當汗脈沉細屬裏而當溫散

凡熱而脈沉為陽虛經虛

隨病治例 汗後不解脈浮大而遲或緊滿或又不應

宜小建中加歸芪俟脈盛再汗

或身熱汗出藏然脈實者調胃承氣或汗

後不惡寒但熱者實也並陽明發熱汗多者

急下之大承氣湯太陽病三五日發汗不解

柔然發熱屬胃也調胃承氣內實身熱汗不

出反惡熱或發熱汗出不解心下痞嘔吐而

利並大柴胡湯 非痞滿不可下 非潮熱

渴不可下 非脈沉數不可下 非謔語不

可下

隨病變例 太陽病八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒

少或熱而脈微惡寒者並宜桂枝麻黃各半

湯如大下後身熱不去心中結痛用枳子豉

湯因以九藥下後身熱不去微煩者枳子乾

姜湯 陽明脈浮發熱渴欲飲水小便不利

者指苓湯主之汗多者不可與 陽明脈浮

而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒

反惡熱身重若發汗則煩燥反譫語若加燒

針則必怵惕煩而不得眠若下之則胃虛寒

氣動心中懊憹舌上胎者枳子豉湯主之全

在隨證臨病加減擇法

六經裏 太陽五苓散 陽明調胃承氣湯

少陽黃芩散 太陰桂枝加大黃湯

少陰黃連阿膠湯 厥陰桃仁承氣湯

合病裏 三陽合病白虎湯 太陽陽明小承氣湯

正陽陽明調胃承氣湯 少陽陽明大承氣

湯 合三陰即是兩感證也

隨時治例 傷寒本為卒病故用已上一表一裏治例

如夏至後用麻黃知母石膏湯或以防風通

聖散加減用者是從其時令或地理方宜哉

不可執一也有近代諸方如正氣五積之類

禁例 太陽病禁居多 陽明一禁 少陽三禁

蓋其暑則知其餘證用藥皆有禁例也如藥

禁

鍼例 汗不出悽悽惡寒取王枕大抒肝俞膈俞陶

道 身熱惡寒後發 身熱汗出身三厥冷

取大都 身熱頭痛食不下三焦俞汗不出

取合谷後發陽池厲兌解紛風池身熱而喘

取三間 餘熱不盡取曲池 煩滿汗不出

取風池命門 汗出寒熱取五處橫竹上腕

煩心好嘔取巨闕商立 身熱頭痛汗不

出取曲泉 身熱進退頭痛取神道關元懸

顯 已上出鍼經

變解

裏證已急或脉浮或頭疼風寒表證仍在者

過經不解是也大柴胡主之此解表攻裏法

又非前兩解之比

清形為汗

熱而脉弦細非往來寒熱不可和非腸肋

痛不可和 非胸滿而嘔不可和 非脉緩

不可和 或表證未罷氣傳裏裏未盡意

為半表半裏 或自皮膚漸傳入裏 或自

內熱達於表 直指方曰凡當汗下如有他

證相妨切須和解俟其他證已退却依汗下

法小柴胡湯

活人書去半夏名黃龍 陳孔碩名中和湯

海藏名三葉湯 孫兆名黃胡湯真四物

對名調經湯守真加減名三元湯

敢熱生津蘊氣 身熱目痛鼻乾惡熱自汗脉尺寸浮

長白虎湯

片玉云得汗脉靜身熱不退是發汗太過胃

中亡津液也也處以生津液益氣血養胃氣

之藥參苓白朮麥冬升麻陳皮甘草桂枝

歸芍半夏飴糖三服而愈或只用補中益氣

湯

出血

曾氏家學治傷寒七八日不解自胸上至頭

目黑紫腫寸脉浮大而數是欲作衄而不

能出也用乾薑乾漆任兩鼻彈刺之出血五六

升而安弱藥亦可西北方人或於兩尺澤中

出血而射即安諒亦此意

復脉

龐氏云有不因大汗下而兩手忽無脉謂之

雙伏或一手無謂之單伏或下過如此必有

正汗急四逆輩溫之醉時有汗便安脉汗不

出者死脉結用炙甘草湯

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱不可表

散宜桂枝二越婢一湯以解表邪而益衛滋

津液

黃蒸在外取汗是也但病脉微弱遲細動氣

瘡淋亡血虛煩皆不可用此

六脉沉細一息二三至取氣海關元

少陰發熱取太谿

却

有汗下後陰陽之氣下陷熱不退其人昏

吐

不渴不食者用來復丹靈砂之類
病如桂枝證頭不痛項不強脈浮胸中痞硬
氣上逆胸有寒也宜瓜蒂散吐之或心口結
痛而煩宜梔子豉湯之類

四證似傷寒

寒痰 脚氣 食 勞煩
皆往病別治

發熱反欲得衣

熱在肌表

寒在骨髓

溫

脈沉手足微厥下利發熱四逆湯活人書云
表熱裏寒先與陰旦湯寒已次用小此就加
桂溫表

反治

身寒反不欲近衣

熱在骨髓

寒在肌表

從治

先用白虎加人參湯次用麻桂各半湯
脈滑而厥口噤舌乾所以少陰惡寒而倦時
時自煩不欲厚衣大柴胡下之

惡寒

有熱惡寒者發於陽有汗表虛無汗表實無
熱惡寒者發於陰陰寒為病口中和陽氣已
陷口乾而渴

一身盡寒

由陰氣入陽中或陽微陰虛相搏之所致
有脈沉實為陽盛格陰
皆為陽陽氣不足陰寒盛故耳或三陽合病

背惡寒

發汗

額有汗口燥不仁清熱用白虎湯
表實無汗不惡風麻黃湯或各半湯

解肌

脈緊與傷寒麻黃湯脈浮升麻湯
表虛自汗惡風桂枝湯保命集曰表未解葛
根湯 李氏用桂枝湯 嚴仁菴曰風傷衛
桂枝湯

溫

發汗後不解及惡寒者虛也陽微也與芍藥
甘草附子湯以補榮衛

在陰者四肢冷大小便滑溫中湯四逆湯或
脈沉緊且細內自煩躁不飲水者此為陰盛
格陽身冷宜四逆湯薤白散

和

尺脈遲小建中湯易簡方加附子名附子建
中湯 身寒拘急泄下重腹痛皆少陰也宜
溫中益陰

下

蕪湖熱藥胡加桂湯汗已寒而心下痞附子
瀉心湯

灸

寒而潮熱腹滿與小承氣湯
背惡寒口中和須灸之 關元穴

惡風

悉屬於陽 有汗而惡風為中風衛病也桂
枝加葛無汗而惡風為傷寒榮病也葛根湯
設反無汗雖服桂枝反煩不解惡寒裏證

解肌

刺

先刺風池風府却與桂枝葛根湯

發表

與汗而惡風

溫經

發汗多漏不止則亡陽外不固是以惡風以桂附溫其經而固衛

散濕

風濕相搏骨節疼痛濕勝自汗而反腰不重是以惡風必以甘草附子湯散濕而實其衛

利痰

憎寒發熱惡風自汗胸膈滿氣衝不得息而頭不疼項不強為有痰隨其虛實散利與陽爭則氣鬱不發於外而為熱

寒熱

身之陽虛則邪客於表與陽爭則為寒身之陰虛則邪客於裏與陰爭則為熱

表裏

邪在表多寒多邪在裏多熱多

和解

半表裏往來寒熱小柴胡主之熱多白虎加桂湯寒多無胡姜桂湯先寒後熱陽

不足也小柴胡加桂湯先熱後寒陽

不足也小柴胡加芍藥湯主之

下

難知曰若用柴胡而移其時於早晚氣移於血血移於氣是邪無所容之地知可解也

日病多而結熱在裏復往來寒熱大柴胡湯主之惡熱者胃實也調胃承氣湯下之

兩解

熱多寒少

脈浮各半湯微弱桂枝二越婢一湯

寒多熱少

脈連小建中加黃芪或溫中不煩躁手足厥逆為傷寒脈反浮緩為中風

仲景一書只有熱多寒少之條無寒多熱少之證

潮熱

發於寅卯巳午時者邪未入胃日晡所發者乃入於胃也

有兼證結胸脈不浮陷胸湯腹滿身黃梔子柏皮湯

和解

小柴胡湯脈浮兼寒加桂

攻下

邪入胃腹滿脈實大便秘脈滑

解肌

脈浮乃和解

自汗

多主衛此衛氣不和兼熱邪所干也

太陽中暈汗出惡寒身熱而渴汗出而濡風濕自甚皆邪干於衛氣不能固於外皮膚為之疎而津液妄泄澀澀潤然出也

表虛汗後惡寒裏未解惡風微惡寒

解肌

表未和汗出不惡寒熱越陽明發熱桂枝湯

淺淡 渴者五苓散

補 自汗而小便數者不可與桂枝宜芍藥甘草

二物或小便建中諸方加黃芩黃芩建中湯

和解 柴胡加桂湯

溫經 發汗多遂漏不止曰漏風亡陽桂枝附子湯

表虛未解桂枝湯 四逆厥有汗四逆湯

凍風 太陽病熱厥沉細搖頭口噤背反汗出不惡

寒名柔瘧中風也宜小續命湯

汗多亡陽惡風煩躁先與防風白朮牡蠣湯

汗止次服小建中湯

下 裏未和 熱越故下之 惡汗多者至淫派

乾連下之則為捷徑免致用藥誤也

從治 吐利止後汗而厥脈微欲絕通脈四逆

清暑 暑邪干衛非傷寒此

流濕潤燥 多汗而濡此其風濕甚濕邪干於衛也

撲法

寢痼 陽明自汗小便利為津液內竭雖硬不可攻

盜汗

睡而汗盜兒而則止方是非若雜證邪在表

表裏使然也 出而微惡寒小柴胡加桂湯

解肌

和解 素有積 或熱在內脈實

撲法 白朮 白芷 藁本 川芎 各二兩

米粉二兩 為末周身撲之

邪搏諸陽津液上湊則汗見於頭也

疥熱在裏身必發黃小便不利引水

熱入血室 陽明被火 水結胸中

寒濕相搏 邪在表裏

和解 頭汗惡寒小柴胡加桂 汗不止者難治

若汗下後胸滿微結如往來寒熱手足冷心

下滿脈細惡寒小便不利此皆頭汗之逆者

小便不利而成關格陽脫也喘者亦然

下 痼熱在裏

熱聚於胃是津液傍達也 有陽明中寒不

能食小便不利手足厥厥然汗出此欲作痼

痼即是中寒也

胃熱可下

下 寒聚於胃為不可下當溫之

寒邪傷人獨不汗出 寒傷榮而不傷衛衛

無邪氣所干則皮膚腠理得密津液得以固是

以汗不出也及其傳變裏為熱則亦自汗蓋

熱則榮衛通脹三刺無汗熱病脈躁盛而不

得汗經謂陽脈之極也主死

熱附配麻黃發中有補出經氏釋疑

助陽

乾姜配生附補中有發

無汗而解者屬之陽也 戰而汗解者太

陽也 不戰汗解者陽明也

頭痛

太陽證居多 三陽經受風寒伏留而不去

則名厥頭痛痛甚而手足寒者為黃病頭頂

痛屬厥經 頭角痛屬少陽

發汗

傷寒無汗發熱惡寒不惡風麻黃湯

不大便六七日頭痛有熱小便清者知不在

裏仍在表也當汗解痛甚者必衄葛根湯

解肌

傷風汗出發熱惡風不惡寒桂枝湯

輕者柴胡桂枝湯

溫經

厥陰少陰證嘔而吐沫是寒更湯

夏月頭痛身冷自汗此中暑濕木附湯

清上

大頭傷寒須用酒炒黃芩荷葉羌活草

攻下

表邪入裏不大便有熱脉沉而滑尺寸俱長

皆可下之有熱不惡寒反惡熱或不大便小

便赤者胃實也宜調胃主之

和解

邪在半表裏少陽往來寒熱脉弦細宜小柴

胡發熱頭痛似瘧欲愈麻桂各半湯

分利

夏月頭痛惡寒心下煩躁不快五苓散

清鎮

自汗頭痛及風暑雜病俱宜白虎少加芍藥

赤尤妙或竹葉石膏湯

吐

頭痛及發寒熱脉緊寸大即是痰飲宜瓜蒂

散消

汗後不解因正辛為輩同潔白湯膏貼於額

吹搗

汗後不解用不卧散末吹之鼻內

鍼刺

項強

表實

發汗

汗出惡風

解肌

和解

身熱惡風頭項強腰中滿手足溫而渴小柴

胡主之

下

結胸病亦項強如柔痙狀大陷胸主之

頭眩

太陽與太陽併病故眩者實其虛也眩者有

皆發汗下後所致是知其陽虛也針經有云

上虛則眩下虛則厥與風家眩暈同

和解

半表裏邪漸行於裏表易虛故時時目眩

也 中風家多頭眩宜解肌傷寒亦然

溫經

頭眩身動或虛弱汗多宜真武湯

吹鼻

眩暈鼻塞而煩此頭中寒濕宜瓜蒂散吹鼻

胸脇滿

中取下濕水

胃滿多帶表證 多夾半表半裏證

邪氣自表傷裏必先自胸脇已次經心腹入胃

發汗

太陽陽明合病

調中

寒中太陰候下之愈不快腹脹或吐或利理中湯枳實陳皮輩

和解

半表裏胸下痞鞭冲和去裏加牡蠣或已汗下胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出或往來寒熱柴胡桂湯

吐

邪氣留於胸中聚而為實者非上吐不可如

傷寒論 十四

四日在胸之則已

刺

燕譚語刺期門

下

陽明少陽合病下利身熱胸脇痛大柴胡湯主之

心下滿

汗後頭疼心下痞胸滿疼短氣十棗湯是不經下後而滿 有吐下之殊

若下後滿者又有結痞之別 虛邪留滯則

但滿而不鞭痛也脉雙弦而遲者必心下硬

實則心下滿虛則心下悸

和解

滿而不痛半夏瀉心湯

分消

飲水多心下脹滿用牡蠣澤瀉湯利小水傷寒例云心下滿心下悸皆邪在胸水停也

吐下

邪在胸中病則滿而煩饑不能食者

心下滿而鞭痛近平結胸大陷胸湯主之

心下痞按之濡脉關上浮者大黃黃連瀉心湯

諸瀉心例

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯

汗後胃不和心下痞鞭乾噦食臭腸下有水

氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯下多痞而

乾嘔心煩不得安下之痞益甚此非熱但胃

中虛客氣上逆故鞭也甘草瀉心湯

有下之早而成者 脉浮緊心下硬痛未可

下之 按則痛為小結 不按而痛為大結

直指方曰厥氣閉結而不復流布也

結胸證悉具而加之煩躁者為不治藥之所

以能勝邪者必待胃氣施布藥力始能溫汗

吐下以逐其邪氣邪氣勝胃氣絕者安可為

之

理中

邪熱在上胸膈痞結或未辨虛實先與理中

加枳實尤妙 先理其氣枳不理中尤結梗

枳殼湯 韓祇和用七物調中丸

省寒熱兼證隨治 故不按胃痛者乃熱結

在心下也

攻下

大小陷胸及大陷胸丸選用 韓祇和用葶

苓陷胸湯 究源方用鶴頂丹治陰陽

水漬法

仁存方治結胸煩亂欲死凝雲滯布薄胸
上熱除為度當溫發四肢防厥逆也

泄熱

如汗後未全解候下之候而之為小結胸煩
渴脉實宜三黃瀉心湯表全未解亦不可用
野者小結正在心下按之痛脉浮滑小陷胸
湯無熱證者小陷胸三物白散亦可此寒實
也

重者熱實脉沉緊心下痛大陷胸湯有熱項
強如柔痙狀或從心下至臍上不可近者大

陷胸湯

逐寒

與熱證此寒實結也枳實理中丸或三物白
散 麗氏用積散 良方用海蛤散

刺

期門 嚴仁菴刺肝俞 婦人因血結胸亦
熱入血室刺期門

和解

結胸有熱或煩渴宜先用中和加枳實次下本
藥 活人書治水結中和去藥加茯苓牡蠣
湯 此事難知用五苓合枳木湯飲水不散
而結小半夏茯苓湯

舉水

直指方云結胸喘促狂亂極熱大躁用地龍
水一服未效再服自然汗出則愈

灸

又用太乙牛黃丸竹葉湯調下以手揉其心
膈即下二藥兼治上一證
以黃連巴豆七粒作餅子置臍中以火灸之
得利為度

痞

不痛為痞寸脉浮關脉沉 心下滿而不硬
按之不痛名曰痞 不滿不硬但妨悶者非
痞也謂之支飲 有下之太早而致
凡痞而硬為水停 濡者為氣聚
保命集云脾不能行氣於四臟結而不散則
為痞

瀉痞例

滿而不痛半夏瀉心湯泄熱而緩脾
色黃手足溫心下痞按之濡其脉關上浮者

黃連瀉心湯泄虛熱 痞而惡寒方見煎煮
溫通陽乾薑食臭臍下有水氣者生薑瀉心
湯兼止嘔逆 下痢腹鳴例見瀉心用甘草
瀉心湯兼調胃 韓祗和用厚朴瀉心湯

宣明論治痞積散

雙解

胸滿硬按之不痛脉沉緊大柴胡湯
當先解未解之表宜桂枝湯 甚者兼治

分利

痞而小便不利五苓散
痞而下利直指方用木附湯

和解

不滿不硬心下妨悶謂之支結小柴胡加桂

湯胸滿而濡者半夏瀉心湯後覆代赭石

湯輕者通用桔梗枳實湯主之直指方

加茯苓甘草補亡者常氏用茯苓甘草白朮

生薑湯成痙可振痿湯

心下痞硬滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡

寒十棗湯主之

欬逆保命集云胸中氣不交也少陰經至胸中交

於厥陰水火相搏而有聲故噎氣也

溫胃寒先服理中湯次服旋復代赭石湯水寒

相搏小青龍去麻加附脈微細宜重溫燥之

保命集云如聖加枳實湯汗下後喘而噎氣

下如聖加人參薑黃杏仁湯世俗或用橘皮半

夏湯有因失下所致脈散者死便軟用瀉心湯

便硬用大承氣湯

乃火熱逆上肺不納也甘草瀉心湯

清利少陰下利咳而嘔渴心煩不眠猪苓湯主之

腹脹滿藥無效以硫黃乳香為末酒煎服之

傷寒一日在皮膚肌肉胸六日入胃

是在腹也太陰證居多經謂非太陰腹中無

虛滿腹中滿痛小柴胡去苓加芍

和解腹滿痛者急下之脹而大便者急下之

攻下大黃痛桂枝大黃譴妄脈沉數煩渴不

拘日調胃承氣湯

溫太陽病反下之因而腹滿時痛桂枝芍藥湯

主之腹滿時減者為虛也

吐下後心煩腹脹滿則起不安此安下邪氣乘

虛入鬱胸中為虛煩上下不得通利故宜吐

也要識邪氣日漸起所在虛實之的則溫補

針艾適當

和中氣

汗後脹滿者厚朴薑半夏參湯此脾胃津

液不足氣塞不通壅而滿無求子用桔梗半

夏湯

少腹滿

必有物聚而為之滿在上而滿者氣也在

下而滿者物也物者溺與血也

下而滿者物也物者溺與血也

下而滿者物也物者溺與血也

下而滿者物也物者溺與血也

下而滿者物也物者溺與血也

下而滿者物也物者溺與血也

下而滿者物也物者溺與血也

少腹硬小便自利其人如狂者血證諦也當
出不出積而為滿

少腹急結者可攻之桃仁承氣湯

輕者犀角地黃湯

下

少腹硬小便不利為無血也當瀉利之

刺括

有中少腹虛脹或腹中急痛刺括瘻中或奪

命穴等處

煩熱

為煩而熱無時而渴是也 有陰 有陽

有真陽內鬱陰中伏陽之證 虛 實

發汗

邪氣在表而煩

分利

汗後煩熱而渴辰砂五苓散主之

下

汗多煩熱脈實宜下之 陽明病不吐不下

心煩者煩之實也宜調胃承氣湯

和解

心煩喜嘔或胸中煩而不嘔 經吐而心煩

不眠酸棗仁湯

吐

汗後煩熱心胸煩悶宜人參散吐之

反復顛倒心中懊憹但藥有輕重之不同耳

實煩而胸中窒者梔子豉湯

脈浮上部填塞胸心而滿者用瓜蒂散

可水

汗後胃乾煩不得眠欲飲水者少與之

和中

傷寒二三日心中悸而煩者是煩之虛也小

建中湯補之

和表裏生津液 有寒者附子湯 熱者白虎湯

脈浮表未解也渴者熱大實者煩燥也宜五

苓生津和表

陰虛而邪盛熱煩於內心中煩不得眠者黃

連阿膠湯以扶陰散熱

陰虛各熱下利咽痛胸滿心煩與痞膈湯以

調陰散熱

煩躁

煩為擾擾而煩躁為憤躁之躁 邪氣在裏

煩為內不安躁為外不安有因大劫有陽虛

有陰盛善結胸者死 無求于曰脉洪實或

滑小便赤者陽躁也脉微手足逆冷大小便

不利者陰躁也

兩解

散榮衛風寒 太陽中風脉浮而繁不汗出

而煩躁太青龍湯主之 惡寒而倦時時自

煩欲去衣服大柴胡主之

解肌

煩躁消渴辰砂五苓散

與水

汗後煩躁不得眠欲水者少以與之

和

下利咽痛胸滿而煩猪膚湯 自汗心煩小

便多者芍藥甘草湯

下

不大便六七日絳脹痛煩躁發作有時此有

燥屎也小承氣下之

溫

陰盛而煩躁少陰病亡利手足厥冷煩躁欲

死者吳榮更湯主之 證治云八石散治煩

躁佳 活人書云身冷脉沉疾煩躁不飲水

名陰盛隔陽證靈散火燭丹

外臺云陰躁欲坐升水宜熱溫之

退陰復陽

汗下後晝日煩燥不得眠夜而安靜不渴

不嘔無表證脉沉微者乾姜附子湯陰盛發

燥名陰躁四逆湯

補陽益陰

發汗下後病仍不解煩躁者茯苓四逆湯

無求子云晉人患傷寒身冷脉微手足厥而

躁甚醫家湯調研黃末四錢與之即時安

灸

傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁宜灸厥陰

扶陰泄熱

少陰躁不得眠黃連雞子湯

總錄云雞清散治煩躁悶亂 絳霄治狂躁

發熱 大安丸疑小石丸治狂躁悶亂

熨

韓氏云不甚實丹砂丸 輕者朱砂安神丸

陰毒用大熨

下

比之煩悶不甚者也 有表未解下早所致

陽明無汗小便不利心中懊憹者必發黃二

者為邪熱結於胸中當攻下 陽明病下已

心下懊憹微煩胃中有燥屎

吐

邪熱鬱於胸中宜梔子豉湯吐之 汗吐下

後虛煩不得眠者刺者必反復顛倒心中懊

古上胎

懷亦用之

古上有膜白滑如胎或燥或澀或黃或黑皆

熱氣之淺深也 有邪氣傷裏或在半表裏

和解

初傳入裏者

陽明病弱下硬滿不大便而嘔舌上白胎者

下

與小柴胡主之

陽明病下利嘔腹滿而喘心中懊憹舌上

胎者梔子豉湯主之

古黃末下者下之黑滑皆然

清熱生津 七八日不解熱結在裏表裏俱熱時惡

風大渴舌燥白虎加人參湯

傷寒血者積熱在表 或出口鼻是謂下厥

上竭

發汗 傷寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯脈證

諸當方可用是發散經中邪氣爾

解肌 勿家不可發汗蓋慎之也

脉浮自汗桂枝湯

溫

許氏治少陰候汗血及嘔吐用姜附湯

下

不大便六七日頭痛有熱而胸者與小承氣下之或涼膈加生地黃

分利

涼血

衄而渴心煩飲則吐者先五苓散次竹葉湯脉微為血虛凡傷寒及溫病應發汗而失之熱蘊為血衄及吐者犀角地黃湯黃芩芍藥不止者芎花湯

水貼

汗後熱退血不止用新井水濕草紙於鼻上貼之及頭頂項上皆貼時時易之

墨汁倍及必用

畜血

惡毒流於下而瘀血者謂之畜血附下血例亦有年高入小便不利者難紙和用嚏法通之

溫經

涼血

陰證下如豚肝當溫之芍藥附湯陽證溢血鮮血當清之芩連生熟地黃地骨

下

柴胡芍藥甘草之類太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人如狂以熱在下焦之腹當硬小便自利者下血乃愈抵當湯主之太陽隨經在裏也傷寒有熱少腹滿硬小便自利為有血已抵當丸主之輕者犀角地黃湯芍藥地黃

加大黃黃芩湯孫用和用破棺丹無示

子云陽毒入胃下血用消蘊湯

韓祇和用地黃湯

解肌

太陽病不解熱結膀胱發在血自下者愈不愈者用桂枝湯

補中散寒

少陰下利膿血者桃花湯以固脫散寒補正

補虛消熱

許氏治湯熱下膿血梅煎散難知云傷寒熱毒入胃下膿血阿膠散

鍼

小便出血總錄用竹茹湯少陰證下利便膿血者可刺陽明病下血

而諸證者悉熱入血室頭汗出者當刺期門

下血兼有雜病例

吐血

涼血

當汗不汗熱毒蘊結而成吐血犀角地黃湯升麻湯黃芩湯芍藥地黃湯三黃丸倍灰必用

三黃瀉心湯抵當湯大黃散

溫

畧例上焦熱血用黃芪桂枝湯中焦血用當歸建中湯增損胃風湯下焦血用芍藥附湯桂附六合湯陰證三焦出血色紫不鮮

此重寒濕化毒染血浸漬而成治要用黑錫丹見直指方

咳嗽

有肺寒而欬 有傷飲而欬 或邪在半表裏

發汗

表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬小青龙主之

溫經

少陰病腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬者真武湯加五味細辛乾姜主之

和解

小柴胡湯證悉具而欬者本方去參棗生薑加乾姜五味主之此陽邪傳表也

少陰病四逆 其人或欬者四逆散加乾姜五味主之此為陰邪傳裏也

清利

見欬逆例中

喘

發汗

其人素有痰證者熱濕風火宜蒸治之有邪氣在表不利 有水氣射肺 形寒飲冷傷肺 故其氣逆上為喘有腎氣乘心邪氣外感壅遏使氣不利為喘雖汗而喘不已邪在表也雖經汗下亦可發之麻黃杏仁甘草石膏湯 龐氏用麻黃甘草湯

解肌

用桂枝湯加厚朴杏仁汗出而喘者主之 心下有水氣乾嘔熱而欬或喘小青龙去麻黃加杏仁主之是散水寒也活人書加茯苓

脉感自汗大柴胡主之 傷寒例用茯苓湯

即敗毒散去枳殼加陳皮倍紫胡此蕪消痰飲也

溫

直指方曰陰證喘則必促脉伏而厥宜返陰丹 證治曰宜理中四逆輩 陰厥喘促用來麤丹

潤肺養氣

陰促脉浮而厥者或陰陽未和並用五味子湯

下

或腹滿而喘 或潮熱 並大柴胡湯 或小承氣湯微解之

垂結胸者看輕重用陷胸

分利

水停心下腎氣乘心為悸為喘五苓散

清熱

內蘊熱邪有汗喘者葛根黃芩黃連湯

灸

寒邪陷下者灸肺俞多者主之

大抵表邪傳裏裏氣上逆則為喘也

有積為熱 有積為寒 有停飲 有胃脘有膿 癰腫不必治 吐家多是胃虛冷

先嘔後渴為欲飲 先渴後嘔此為水停

發汗

心下 龐氏云病傳陰必吐利 太陽與陽明合病氣下而不下但下利不嘔裏氣上逆不下者但嘔而不利與葛根加半夏湯 傷寒例云兩經俱病邪氣壅盛於表正氣拂鬱於裏邪正分爭爭於下則為利爭

兩解

於上則為嘔與半夏以下逆氣
嘔而發熱紫胡證具心下急鬱鬱微煩大紫

溫經

膈上有寒及寒飲或嘔不渴乾姜附子湯
鬱吐沫頭痛者吳茱萸湯主之

清熱

有虛熱少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯活人書
治差後嘔竹葉湯加生薑嘔而思水者急與

猪苓湯

分利

中風發熱六七日不解而煩渴飲水則吐名
曰水逆五苓散

和解

半表裏證多嘔與小紫胡和之胸中有熱胃
中有邪熱陽不交腹中痛欲嘔吐者黃連

湯主之或黃芩加半夏生薑湯以升降陰陽

溫胃

嘔吐手足冷小橘皮湯理中湯生薑汁半夏
湯半夏加橘皮湯溫中丸姜汁為要藥散其

逆氣

下

乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和十
棗湯 胃氏家學治吐逆大小便不通厥逆

無脉大承氣下之愈

灸

口中和脉微澀弱皆灸厥陰 脉經及千金
翼林氏本曰一云灸厥陰五十壯

收臟氣之真

治例云若熱嘔不可無烏梅

悸

氣虛 悸飲 陽氣內弱心下空虛正氣內
動而為悸也 胃不和則煩而悸

悸證有八九皆屬三陽

補中

虛則心下悸 脉結代心動悸炙甘草湯
傷寒三二日心下悸小建中湯 發汗過多

其人胸中陽氣不足 手胃心下悸欲得按

者與桂枝甘草湯

溫

汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身動
振振欲擗地真武湯 少陰病四逆其人或

悸者四逆散加桂主之或汗後臍下悸欲作

奔豚茯苓桂枝甘草湯主之

鎮固原氣

脉浮因火迫劫之驚卧不安者桂枝去芍
藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯以固陽收脫鎮

定其浮氣也

和

飲水多必心下悸雖有他邪亦先治悸恐水
溢為喘為腫為噦為利也茯苓甘草湯

往來多熱心下悸小便不利心煩喜嘔小紫

胡主之

驚惕

鎮安浮氣

見前悸下 或因汗下 或因溫針 或因火劫
傷寒八九日因下之胸滿煩驚小便不利語

語一身盡重不可轉側滿而煩者陽熱客水

胸中也驚者心惡熱而神不守也

便不利津液不行裏虛尤謔語者胃熱也一

身盡重不能轉側者陽氣內行於裏不營於

表也與柴胡加龍骨牡蠣湯以解錯雜之邪

朱砂安神丸 東垣方

邪氣初傳入裏熱氣散漫未收斂成熱裏寒

焦膈持耗津液遂成渴也

六經渴 有陰證 有陽證

解肌生津

在太陽脈浮必用桂枝 脈浮熱渴

欲飲水必便不利猪苓湯

清熱生津

潤燥每虎加人參吐汗下之後渴者用之

不傷津液則

陽明脈長有汗發熱而渴白虎之類夏至左

右煩渴發熱不惡寒虛煩竹葉石膏湯

和解

太陽脈弦而嘔邪在半表裏小柴胡加瓜姜

根之類 證治云厥陰病消渴氣上衝心

中痞熱茯苓白朮甘草桂枝四物湯

汗下後胸膈微結小便不利渴而不嘔但

頭汗出往來寒熱心煩者柴胡桂枝乾姜湯

溫中

少陰自利而渴小便清白下焦虛寒也甘草

乾姜湯心煩但欲寐或自利而渴屬少陰理

中湯 活人書云自利而渴屬少陰白通湯

加猪膽汁通脈四逆真武湯選用之

分利

小便不利而渴必發黃茵陳五苓散

汗後脈浮煩渴者五苓主之

與水

厥陰脈微引飲宜少少與之但渴與水常令

不足勿極意也

清鎮

天水或加辰砂

解肌表

表邪不解或有或為之證小青龙去半夏加

瓜蔓根主之

下

陽明脈長而實有汗而渴者調胃承氣主之

脈沉滑熱實煩燥而渴大陷胸

陽毒燥盛大渴黑奴丸 厥陰證此事難知

云煩渴燥縮大小便不通發熱引飲尺寸俱

微續直指方云發陰屬肝心之母也裏熱已

極子氣乘母挾心火以為煩煩則消渴矣

近乎戰也傷寒振者皆積其虛寒也下後復

發汗必振寒者表裏俱虛也 亡血家發汗

則寒慄而振者血氣俱虛也其振振欲擗地

有身為振振搖者皆為發汗過多亡陽經虛

不能自主持故身為振搖也

太陽病發汗後不解其人仍發熱心下悸頭

眩身瞤動振振欲擗地真武湯主之

和經益陽

吐下後裏虛氣上逆陽不足起則頭眩脈

沉緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝

戰慄

白朮甘草湯或小建中湯主之

為病欲解也戰為上與邪爭則為戰慄而戰振但虛而不至爭故止從行動而振也慄為心戰戰外為慄內皆陰陽之爭也戰者正氣勝慄者邪氣勝也

助陽

具前

溫經散寒

具前 桂苓白朮甘草

救逆

韓氏治汗下後戰與救逆湯微減與主肉湯

再投而戰解

灸

陰氣內盛正氣太虛心慄而鼓領身不戰者已而遂成寒逆者宜灸之

搖頭

陽脉不治則頭為之搖有裏痛所致

卒口噤背反張獨搖頭者瘧病風主動使然也 直視搖頭者為心絕

缺治例

四逆

四肢臂逆而不溫者是也積涼成寒積溫成熱非一朝一夕之故六腑氣絕於外者四肢手足寒冷之脛寒逆少陰也四肢厥冷身寒者厥陰也

溫

若始得之手足便厥而不溫者是陰經受邪陽氣不足可用四逆湯溫之

散熱收陰 若至

經之邪

散傷陰之熱而收陰氣此非虛寒之證也

熱之

活人書有王女散毒瘰癧許學士用黑錫丹

近世用三建湯 陰病下利清穀裏寒外熱

手足厥逆脉微欲絕者身反不惡寒其人面

赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出

者此陰盛於內不相通也與通脉四逆湯以

成氏謂散毒瘰癧於四逆詳仲景治例則四肢通冷其病為重

灸

悉射

厥

有陰陽不相順接便為厥厥者手足逆冷是也陽氣內陷熱氣逆伏而手足冷也

先熱而後厥者熱伏於內也 先厥而後熱者陰退而陽氣得復也 始得便厥者是陽

氣不足而陰氣勝也 大抵厥逆為陰所主

寒者多差發熱七八日身冷此名臟厥難治

有冷厥熱厥 證治引楊兆云若證未辨陰

陽且與四順凡試之直指方云未辨疑似且

以理中丸試之陽厥則有熱陰厥則無熱

冷厥才病便厥 高保衡云寒厥外多靜而

溫

了了脉雖伏按之通弱陰氣勝陽不得復厥
多熱少當溫之理中湯 龐氏曰寒熱而厥
面色必澤昏昧者當用綿衣包手足溫煖必
大汗而解也 少陰病吐利手足厥冷煩躁
欲絕者吳茱萸湯厥自多熱日少為陽氣退
病進也謂其脉得遲或微或細或沉皆屬裏
有寒也

正陽回陰

無熱證而厥當歸四逆加茱萸生薑湯

白通湯 白通加猪膽汁湯選用之

虛者宜附子湯

補原氣

證治曰有熱者黃芩人參建中湯

不傷寒論

三十四

熱厥必四五日才發半日之間熱復來也發

熱日多厥日少病自愈 外證多昏憤脉雖

伏按之數而有力兼下兩解下例法中約之

下

其脉沉伏而滑頭面有汗指爪溫皆陽實伏

熱在內也小便赤大便秘汗汗滑四肢逆冷

熱深也皆宜急下之大小承氣湯

片玉云熱深厥深調胃承氣湯

吐

諸陽受氣於胸中邪氣留客則陽氣不得敷

布而手足為之厥脉生緊心中滿而煩飢不

能食病在胸中當吐之

解表

寒熱而厥面色不澤胃脉兩手忽無脉或一

兩解

手無脉必是有汗也與麻黃桂枝各半湯
而心下悸先治其水茯苓甘草湯
初得之身熱頭痛已後大便秘小便赤或渴
有譫語而厥大柴胡湯

清熱清形

厥而渴者白虎湯

刺

具不仁例中

交

龐氏曰脉促而厥者灸之

聲

汗後人及久病人聲轉者是也為重語也鄭
為聲轉也若聲重而轉本音者亦是也止為
正氣虛而不全故使轉聲而不正也如大小
便利手足冷脉細微弱者是

不傷寒論

三十五

補

助陽扶正也

和解

見譫語例下

譫語

脉短者死沉細不過一二日死實則譫語氣
收斂在內而實者本病也或氣上逆而喘或
下利皆為逆也不治 又作譫謂妄有所見
而言也直氣昏神識不清所致 有被火劫
有汗出 有下利 有下血 有燥屎在

胃 有三陽合病 有過經 有亡陽譫語

下之緩微熱病久真氣昏神氣不清所致脉

虛而長微弦滑者宜大承氣或柴胡飲子或

腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺尿

下

腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺尿

是三陽合病也汗出譫語此為風也須下之
過經方可 早則言必亂如下利譫語者下
之急有燥屎也小承氣主之有潮熱反不能
食者胃中必有燥屎五六枚也大熱入胃水
竭躁煩必發譫語又腹滿微喘口乾咽燥或
不大便久則譫語是因火劫所致也宜調胃
承氣

刺

下血譫語者此為熱入血室當刺期門隨其
虛實而瀉之脇下滿如結胸狀而譫語者是
及經水適來皆熱入血室也

解錯雜之邪

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利

傷寒治例

三十六

譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡

蠣湯無欲飲神氣

和解

發汗多亡陽反身和譫語者不可下與柴胡

桂枝湯和其熱

溫

亦有陽虛陰盛而譫妄脈沉細弱者當溫經

助陽

逐瘀血

晝夜譫語言忘小便不利小腹滿為瘀血抵

當湯

清熱

譫語不惡寒反惡熱白虎湯 煩不得眠白

虎加梔子湯

短氣

氣短而不能相續者是呼吸雖知而不能相

發汗

下

續似喘而不搖有似呻吟而無痛者短氣也
短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈矣
乾嘔短氣汗出裏未和十棗湯 短氣煩躁
心中懊憹陽氣內陷心中因鞅則為結胸大
陷胸湯 有短氣腹滿而喘有潮熱者不柴
胡主之此短氣之實者也

溫經

瘰癧

腹滿滿而短氣者邪在表而為虛也
跌陽脈浮而緊緊則為寒微則為虛微虛相
搏則為短氣此短氣之虛者也
瘰者筋脈急也瘰者筋脈緩也或瘰急或舒
緩而不止名曰瘰癧也俗謂之瘰是也邪熱

氣極也熱盛則風搏併經絡風主動致四肢
瘰癧而不寧也病勢已過矣

或汗不流是汗出時蓋發下而設腰背手足

搐搦用牛蒡根散

兩解

汗

此汗多亡陽之所致也 久而成痿逆之其

也 內經曰陽氣者精則養神柔則養筋

汗及下後亡津液陽虛筋肉失所養故惕

而跳躍虛甚也

溫經益陽 具煎液溫經下

疎風濕

防風白朮牡蠣湯

和經益陽 具前條下

發汗

發汗為氣不舒胃為昏神不清也世俗謂之

昏迷是也多虛極乘寒所致或因吐下使然

清形為汗

太陽病候九下之而不愈因復發汗以此

表裏俱虛其人因致胃胃家汗出自愈所以

然者汗出表和也

溫中

吐下後極虛復極汗者復與之水因得職

有熱而拂鬱或不得卧有燥屎故也

刺

太陽少陽併病頭痛或胃悶如結胸狀當刺

大椎第一間及肺肝二俞慎不可汗

奔豚者動氣也築然動於腹中者是矣臟

動氣

氣不治隨臟所主發泄於臍之四傍動跳築

築然謂之動氣難經所謂臍左右有動氣是

臟氣不治其氣虛雖有表裏攻發之證即不

可汗下

汗氣逐熱 汗下後臍四傍有動氣方見保命集中

溫衛 汗下後臍下有動氣茯苓散

補養血氣 行氣養血和穀散 行氣清熱防葵散

謂不經攻下為自瀉洩 自利不渴屬太陰

也以其臟寒也 下利欲飲水者以有熱也

身熱脉大為逆 五臟氣絕於內者則下

利不禁

發汗

太陽陽明合病必自下利葛根湯以發之嘔

者加半夏

下

陽明與少陽合病必自下利太承氣主之發

熱後重泄色黃赤此為有熱下利脉遲而

滑者內實也脉滑而數者皆有宿食也

和解

太陽與少陽合病下利黃芩湯 三陽病身

必熱

灸

下利脉微澀而汗出必更重反少者當溫

其上灸之以消陰 少陰吐利手足不冷反

發熱脉不至灸少陰太谿穴

分利

五苓散等湯

溫

挾太陽脉證便不可溫 脉微自利清穀此

為寒少陰必瀉腎虛也可溫理中白通諸四

逆湯主之鴨瀉者寒也脇寒而利臍下必寒

四逆湯草少陰吐利手足必冷煩躁欲死吳

茱萸湯主之

劫

少陰病下利便膿血者下焦不約而裏寒也

宜用桃花湯以固澀之如關腸洞泄便溺遺

失用赤石禹餘糧湯 薛汝明家傳名朱桂

湯

刺

少陰下利便膿血者可刺之宣通血氣

清熱

自利而瀉屬少陰白虎湯或黃連湯

脉浮大而長千金翼用葛根黃芩黃連湯
協熱利白頭翁湯 下血類要栝皮湯

邪自陽傷入少陰腎虛客熱下利咽痛胸滿
心煩者猪膚湯主之 陽垢者熱也協熱而
利必臍下熱赤石脂丸白頭翁湯

解錯雜之邪 邪傷裏下後脉沉遲手足冷或吐膿血

下利不止為難治麻黃升麻湯以潤肺除熱
助陽

熱入血室

男子由陽明而傷女人則隨經而入男子則
下血諸語婦人則月水適來邪得乘虛而入
血自下則愈

和解

婦人傷寒經水適來得之七八日晝則明了
暮則譫語如見鬼狀此熱入血室也寒熱如
瘧宜小柴胡湯以和血也 許氏小柴胡加
生地 保命集加牡丹皮 元戎曰先服小
柴胡去其熱次以四物湯和之

下

大實瀉者桃仁承氣 活人書下少腹滿小
便和屬抵當湯

刺

七八日熱除而脉遂胸脇滿如結胸狀諸語
者此熱入血室刺期門 保命集用甘草芍
藥湯不已刺隱白

溫經

保命集去表虛自汗身涼拘急脉沉而遲桂

枝加附子紅花湯 活人書曰發熱惡寒經
水凝滯桂枝加紅花湯 素問云其紅必結

不須治

熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈是不
須治也謂針藥皆不可以裏無留邪但不云
犯熱隨血散必自愈

發黃

瘀熱在裏身必發黃 有濕熱 有蓄血
濕熱而實 風濕熱而虛 寒濕 痞氣
瘀熱身黃麻黃連翹赤小豆湯 脉浮而緊
不可下宜各半湯

發汗

下熱

陽明身熱頭汗出小便不利渴引水此於熱
在裏身黃茵陳蒿湯主之

逐血

身黃脉沉結少腹硬而小便自利其人如狂
者又為蓄血在下焦使之黃也抵當桃仁承
氣主之

散熱

傷寒身黃發熱為熱未實與施干栝反湯若
大便自利而黃者茵陳梔子黃連三物湯

溫經散濕

發熱身黃一身盡痛或小便自利或不利
湯 韓祗和云病人三五日脉微下寒太遲
虛甚脾胃津竭飲水白傷此陰虛傷脾受
黃宜溫之茵陳茯苓湯 及茯苓桂枝芍藥
茵陳湯茵陳四逆湯茵陳附子湯茵陳梔子湯

黃陽皆治陰黃證客以云病後飲食勞動中
州變黃之病而生黃非壞之而得只用建中
理中大建中等藥是矣

和解

有潮熱者則心脇疼鼻乾身及目黃小便難
小柴胡主之

分利

發熱頭汗渴引水小便利大便反快五苓加
茵陳 補亡云茵陳蒿汁調五苓散

搐鼻

初覺黃以灰蒂散吹鼻內出黃水
春夏時身黃而熱悶授菲菜向胸間擦之

外治

傷寒後因飲食致黃者用枳木內消丸
有陽毒多能煩躁面赤肺實是也

發狂

畜血發狂多脉沉微但欲飲水不嘔入
升麻梔子湯 龐氏云濕病無熱但狂言煩

吐

不安宜以猪苓散方寸七服之隨以水一升
服以吐之

發散

證治用升麻散
用新汲水濕布搭於胸上

水漬

濕散

雙解

黑奴丸
畜血者其人如狂以熱在下焦小腹當硬小

下

便自利下血乃愈抵當湯 脉弦而長調胃
承氣湯 脉沉實有表證大柴胡湯

清鎮

小腹結急者用桃仁承氣湯
吐下後及虛人未解者宜與人參白朮辰砂

救逆

有因火劫亡陽驚狂卧起不安屬桂枝去芍
藥加蜀漆龍骨救逆湯

逐血

血上逆則喜忘血下畜則內爭其大如狂用抵
當湯 輕者犀角地黃湯 活人書承氣湯

逐熱

三陽熱極脉大身熱渴而狂者黃連解毒湯
不已用承氣湯

疎風

龐氏曰人患時氣六七日因發狂目瞪口紫
手攣胸曲或張口不知人事口鼻氣絕但心

壯陰

陽氣獨盛陰氣最絕必發狂走至喜面赤相
痛發斑多下利赤黃脉洪實急滑促宜酸苦

下兩服遂省

頭溫面色和六脉皆動一如尸厥不知人五
六日因作成敗計救之用風引湯加附子灌

痛發斑多下利赤黃脉洪實急滑促宜酸苦

下兩服遂省

壯陰

陽氣獨盛陰氣最絕必發狂走至喜面赤相
痛發斑多下利赤黃脉洪實急滑促宜酸苦

下兩服遂省

下兩服遂省

壯陰

陽氣獨盛陰氣最絕必發狂走至喜面赤相
痛發斑多下利赤黃脉洪實急滑促宜酸苦

下兩服遂省

下兩服遂省

之藥收陰抑陽苦酒厚蘘生艾湯主之

抑陽

陽毒狂躁發斑甚者踰牆上屋戰者桔梗大

黃湯升麻湯梗子仁湯

霍亂

上吐而下利揮霍而撩亂也邪在中焦胃氣

不治為邪所傷使陰陽乖隔遂上吐而下利

躁擾煩亂乃謂之霍亂但稱吐利者是有以

異也

溫中

寒多不渴者理中丸主之 無求子曰用隔

薑湯治中湯四順附子湯小麥湯

吐利手足冷腹痛甚加吳茱萸更自誦歌云吐

利轉筋入腹者難矢白湯主之脉微緩四肢

冷理中加附子當歸湯 沉細四君子加芍

藥良薑湯

分利

吐利頭痛而熱熱多欲飲水五苓散主之

散表

通用霍香正氣散加桂 風寒暑濕自外

入正氣散除濕湯轉筋白木湯

平胃

脉弦木尅土平胃散加木瓜

刺

乾霍亂或腹中急痛絞刺宜刺中及絞刮

奪命穴

兩解

發熱脉弦汗出不解心下痞而吐利大柴胡

主之 一法具自利下

解肌

汗後霍亂身體重者桂枝湯

消暑

吐利大渴煩躁冷汗出轉筋脉遲沉宜消暑

藳氣湯 白虎湯 香薷飲

和解

嘔而潮熱小柴胡 乾霍亂藳湯紫蘇主

之

散陰通陽

吐利止汗出而厥不欲水四肢拘急脉微

欲絕通脉四逆加猪膽汁湯

勞復

有差後勞復有食後 有文勞復

和解

勞後發熱冲和湯

解表

脉浮以汗解之

清熱

竹葉石膏湯 麥門冬湯

下

脉沉實發熱至腹滿語語大黃湯

吐

宿熱而熱復枳實梔子豉湯吐之

補

補中益氣湯

升陽益胃

養榮

其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣

陰陽易

熱上冲胸頭重不舉眼中生花

導陰氣

燒散 假鼠摘皮湯

大便不利

脉數為熱陽邪偏結於內陰氣不能相雜故

其證能食不大便名陽結 脉沉遲為寒陰

邪偏結於內陽氣不能相雜故其證不能食

身重天便閉為陰結

汗

小便難為有津液可作汗小便數不可誤
汗證似煩臥不着席服梔子湯或五苓散得
汗而解

下

潮熱大便鞭陽盛陰虛下證已具 陽結證
趙氏用調胃承氣 難知用七宣丸

醫鏡用五承丸枳實湯倍急丸

許氏用大柴胡

吐

三下不通不可下攻便當上吐提之

瀉

蜜導猪膽汁導

滋陰

陽藏陰虛者頻進羊肉

溫

陰結活人書用金液丹 索矩用蜜慎丸

難知用厚朴湯 醫鏡用半碗丸

龐氏云臍腹四逆輩極冷服之

和解

陽結祇食不大便或頭汗出惡寒手足冷或

心滿不食大便硬不可下與中和湯

潤腸

大便堅小便數不可下跌陽脉浮濇麻仁丸

枳實丸

浴

用棕櫚皮燒湯坐盆內浴之亦謂之外迎

熏

虛者用皂角烟熏大便即通

熨

服藥不通即以此熨熱熨臍下須臾即通若

臍下冷結不通不可便熨冷散攻心必死須

先服溫藥久乃可熨

脇痛

少陽證 表解裏未和 素有痞積在臍傍
痛引小腹入陰筋者名臍結主死

下

心下堅滿引脇痛十棗湯

和解

往來寒熱胸脇滿痛柴胡牡蠣湯

鍼

腹痛

有實有虛 寒 熱 邪 燥 寒 舊積

按之不痛為虛痛者為實

建中

陽脉滿陰脉弦并泄利建中湯 桂枝芍藥

湯 小建中薛汝明名芍藥湯

和血

厥陰證小腹滿當歸四逆湯

下

關脉實大便秘硬腹滿為實緩脾腹煩燥

發作有時有燥屎也大小承氣腹滿時痛桂

枝加大黃

溫中

蕪泄利下重脉沉微四逆湯 蕪小便利

真武湯隨證選用

逐熱

胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃

連湯

外按法

畧例云

熨

用灰包熨之

灸

龐氏云合灸不灸令病人冷結久而彌困氣

冲心而死

刺括

欲吐利而煩躁者多有必毒世俗以刺括委

中六

咽痛

陽毒 少陰證 伏氣

酒熱

少陰腹痛脉沉細猶有咽痛者黃連龍骨湯

溫中

脉微弱有伏氣必先痛次下利當溫之手足

冷或加吐利少陰證也下利不止手足冷咽

痛無熱證四順丸 少陰中風胸滿心煩咽

痛自汗腰痛連脣頭痛吐沫脉弦三因用桂

枝附子

散結下痰

脉數而滑甘桔半夏湯

鍼

吹點

敷

咽痛有瘡黃柏細辛末敷之

解毒

陽毒脉浮數而大密膿血千金外臺烏扇膏

治之

蛇獸

溫胃

烏梅丸 理中丸

利

消渴吐蛇但用理中加大黃入蜜以利之

陽證陽毒

二陽病不治陽獨盛陰欲暴絕變為陽毒必

發狂內外熱結舌又卷鼻內煤烟脉洪實滑

促

吐

升麻梔子湯

下

陰證陰毒

陰病盛則微陽消于上故其候沉重四肢逆

冷臍腹築痛厥逆或冷六脉沉細時來疾尺

脉小短而微寸口盛時大者皆其候也

溫經

真武湯 四逆湯

正陽回陰

辟瘟散

灸

關元 氣海

劫

金液丹

熨

腹中急痛及包圍之

熏

逆冷囊縮者以炒豆投熱醋中如法熏之

太陽陽明合病

自利

發汗

喘而胸滿者麻黃湯

和解

不下利但嘔者葛根芩夏湯

兩解

止利發表葛根湯

太陽少陽合病

和解

黃芩湯止利利者為邪在半表半裏非汗下

所宜

止嘔清熱

嘔者胃氣逆也黃芩加半夏生薑湯

三陽合病

腹滿身重難以轉側口中不仁譫語遺尿皆

不可汗下

清熱和表裏

白虎湯

太陽少陽併病

頭痛眩暈如結胸心下痞硬或譫語

刺

肺俞 肝俞 如頭項強刺大椎

陰證似陽

煩躁面赤身熱脈沉微

雖見陽證蓋是陽在上焦

盛若調理得下焦有陽則

也上焦雖見陽證其勢淺

見前發熱溫經例下

四逆甘草乾姜湯隨證輕重用

大便秘小便赤甘脈沉滑

熱深也

治法見前厥證例下

傷寒例云面赤赤脈沉滑

必重用通脈四逆湯正合仲景法

陽盛拒陰

汗下後發者熱毒不散所致

有表證脈浮數有表虛裏實熱毒不散所

以不可發汗不可輕易下

白虎加參名化癍湯

表證多防風通聖去硝黃

調胃溫中

陰證發癍

汗下後胃虛極而發者此火游行於外所致

宜補以降之白虎加參不

補

宜補以降之白虎加參不

宜補以降之白虎加參不

下

身無大熱煩渴便實有燥調胃承氣

涼熱

豬膽雞子湯

溫毒發癍嘔逆黑膏

晝夜偏刺

熱入血室

陰虛

亡陽

汗下後身無熱不渴晝則煩躁夜而安靜

沉宜乾姜附子湯

和解

婦人熱入血室夜則譫語小柴胡加牡丹皮

口燥咽乾

慎不可發汗

清熱涼胃

口乾少津液脈浮緊微數白虎加人參湯

和解

口苦脈浮緊咽乾舌燥宜小柴胡

下

少陰病得之二三日口燥咽乾急下之

百合病

百脉一宗悉致其病無經絡之狀飲食不食

欲卧不卧有寒非寒有熱非熱

默默不知所苦服藥即吐如有鬼神

清熱涼血

百合湯

其後齒燥惡飲令面目赤赤白舌黑舌上

白唇黑有瘡四肢沉重喜眠

或食甘味為

清熱安虫 黃連犀角湯

飲水不欲 熱在經也

涼血 陽明身熱頭疼飲水不嚥必發斑疹用犀角黃

湯主之

水氣

兩解 表不解心下有水氣乾嘔發熱常飲湯或利

小青龙主之

下 結胸有水氣但頭汗出大陷胸湯

溫 少陰腰痛小便不利四肢疼痛下利此有水

真武湯 厥而心下悸宜先治水茯苓甘草

湯

分利 煩渴飲水水入即吐名水逆五苓散主之

軟堅清熱 病在陽當汗解反以水嚥之其熱被却不

得去彌更益堅肉上栗逆反不渴

文蛤散

小便不利 邪畜於內津液不下行

分利 汗後脈浮煩渴五苓散

和解 汗後陽氣虛熱不利心煩桂枝乾姜湯

下 小便不利大便下難乍易人小承氣湯選用

溫 自汗身寒小便不利甘草附子湯

坐藥 婦人月之男子用指膈空之

固下散寒 少陰病四五日腹滿痛小便不利下利膿

血桃花湯

灸 陰寒甚下閉者灸之 陰證小便不利

必陰囊縮入小腹欲死者灸石門穴

仍與返魂丹當歸四逆湯世有醫人見小水

不通炒鹽及熱藥臍下熨之以致陰氣俱熱

變無處出即上衝心往往有死者

洩濕熱 頭汗出小便不利渴引水漿熱在內必發

黃芩陳湯

解錯雜之邪 傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利

諸語一身盡重不可轉側者柴胡龍骨牡蠣

湯主之

散傳陰之熱閉 少陰陰病四逆其人或欬或悸或小

便不利或腹中痛或吐利下重者四逆散主

之

溫經散濕 少陰二三日不已至四五日腹痛小便不

利四肢沉重疼痛自利者真武湯

本作痊 仰目是陽症 直指方云無汗先

諸語者發劇症

發汗 證治曰太陽無汗小便少氣上冲昏口噤欲

作剛症麻黃加葛根湯 雲岐子用葛根黃加

獨活防風湯

下 胸滿口噤卧不着席脚攣急其人必咬牙大

陰症

發汗

承氣湯許氏次用小續命湯調之
眼合是陰症 有汗先發逆發寒症
龐朱二氏用桂枝葛根湯 朱氏

陰症厥逆筋脉俱急汗出不止桂心白朮散

項強頭搖口噤附子散

分利

頭項強小腹滿小便難已成痙五苓散

不仁

謂不柔和則痺痛寒熱皆不知也正氣為邪
氣閉伏鬱而不散榮衛血氣虛少不能通行
故斯然也經曰少陰脉不至腎氣微精血少

奔氣便迫上入胸膈宗氣反復血結心下陽
氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為
尸厥其系寒之脈鬱胃不仁可知矣

直指方用甘草乾薑湯桂枝芍藥湯加乾姜

各半湯以意度用

若越人入號太子病尸厥以鬱胃不仁為可

治刺之而痊濟者神醫之診也設脉停洪身

汗如油喘不休體不仁雖越人其能起之哉

心腎臟氣絕也針經云骨之精為髓筋之

精為血血之精為絡氣之精為白五經血氣

調和六目則明矣今邪氣難感正氣已絕

直指

風濕

下

故衄家不可發汗汗則額上陷脉急緊直視
不能眴也

其或有目中不了了睛不和無表裏證大便秘
難身微熱者非直視此內實也可於大承氣

大熱胡選用之

遺尿

風濕證被下必失溲 三陽合病
下焦氣絕不歸其部 濁邪中下

溫

下焦陰陽虛用附子湯
自汗而熱白虎湯主之

清熱

循衣摸床

無微常直視小便利脉弦實者可治
大小承氣選用

下

溫病

春月病發熱惡寒頭疼脉來浮數
瘟病當分治之

解肌

升麻解肌湯

和解

小柴胡竹葉湯
重感於寒變成溫瘧脉尺寸俱盛兼弦數

和解

先熱後寒小柴胡或白虎加桂枝
但熱不寒止用白虎

風濕

發汗

敗毒獨活湯許氏用續命湯減麻黃附
朮胡桂枝湯或白朮湯加減用

解肌

清熱 汗後惡熱無下證知母石膏湯
疎風 頭目昏眩四肢煩疼荆芥散

金櫃風引湯

溫疫

溫毒

陰脈實太陽脈洪數 發熱

發斑

癰疹

咳兼心悶

清熱

玄參升麻湯

濕溫

發熱頭疼胸間多汗兩脛逆冷妄言脈陽濡

而弱陰小而急

五十六

暑證

中暑病熱自汗脈虛細弱

清神益氣

東垣清暑益氣湯

清熱

白虎湯

解肌

五苓散

降痰逆

消暑丸

橘皮湯

濕

冷香飲子

喝證

中暑喝脈洪緊感身熱惡寒頭痛心煩躁渴

乃是

分利

五苓散

益元散

降火

黃連解毒湯加香薷

消暑

香薷飲

傷寒治例終

傷寒治例一卷

通行本

明劉純撰其體例與雜病治例相同不標六經亦不分表裏但以現證九十五種爲綱而每證推其病源與其治法亦成化己亥蕭謙所刻也

醫方選要十卷

〔明〕周文采輯

北京圖書館藏明刻本

附《四庫全書總目·醫方選要

十卷》提要

醫方選要序

周官醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事曰王之食飲曰萬民之疾病曰疖瘍者皆有醫先王懋生人之德而又濟之以生生之具故人彌厥性罔有闕札者豈非順化之治哉迨我

祖宗治政師古設有內外醫藥院局若所爲慮已深爲具已悉爲天下賴已廣即周官之良法美意亦不能過是但名醫多萃於都邑而窮簷蔀屋疾病者何限惠政先於所近而

邀陬僻壤率多庸醫如是而
求仁澤之無滲漏其可得哉
然欲俾醫道之無間而仁澤
之旁洽非假醫方以博眎之
不可也吾受

封以來脩齊之暇每令良醫周文
采等於諸方書中精選其方

之簡明切要而有徵効者以
進吾躬爲較閱得十卷裒成
一帙名之曰醫方選要以與
天下疾病之人共之夫人之
所至惜者命也命之所由全
者形也性形之不可犯者疾
病也疾病之生或喜怒哀樂

之過中飲食男女之無節謬
戾於聲色萌蔽於竅臟不以
五藥攻之五味五穀養之五
聲五色五氣眎之不兩之以
變而參之以動焉則其生亦
殆矣時雖有黃帝扁鵲之內
外經泰始俞柎之經方容成
盤庚之陰道岐伯之按摩泰
一之雜子吾見其人已遠其
書指玄微且曖昧不易取徵
猝何用哉苟遍得是書所選
簡要之方以攻所疾則垂斃
之命庶乎可生而爲太平考
終之人矣雖然人所自致之

病是方或可治之若其病於
凍餒病於徭役病於憲網病
於征輸病於鋒鏑之患而不
能起者則惟好生之

聖天子若贊化之賢宰執能相與
消息調停以通其關節脉絡
而生之全之安之養之俾少

可壯壯可老少壯可終事其
老而咸躋於壽域焉顧敢謂
是方之能爾哉國語曰上醫
醫國其次醫人蓋此之謂歟
因序而書之篇端時

弘治乙卯冬十一月望日

大明興王書于中正齋

醫方選要序

弘治乙卯秋七月既望敬蒙

王殿下令旨命臣文采集錄醫方臣悚愧
之餘遂稽顙再拜而嘆曰仁矣哉吾
王之用心也蓋仁之蘊於中者深厚而莫
測故其發於外者充大而難禦恭惟
殿下天衷純粹纖欲不留仁之蘊於中者
其深厚可知以故發而為

孝敬為

友愛為

恩禮以待臣為

慈祥以撫衆其仁之發於外者亦可謂充

且大矣而

睿意尤以為人之有身不能無疾攻疾之
要非藥石不可然藥石之當否又係
乎醫方之良不良耳于是不以臣為

愚陋乃命集錄古今良方欲嘉惠遐邇

邇其

仁之充大又可以勝言哉臣嘗觀夫醫之道開其源者有內經靈樞湯液等書導其流者有千金十書心法等篇揚其波者有普濟袖珍奇效等集醫方至此可謂極備矣然而書目既多議論亦異此是彼非自相牴牾誠不可

選要序

二

不擇其理之當者而集之以便觀覽以全人壽如

睿意之所及也臣幼承家學服膺有年第以質性愚劣雖苦心極力未能得其要領今祇承

睿命遂忘其鄙陋勉強擇出平日所聞所見及常用有驗之方去其繁而就其簡分門別類凡十卷名之曰醫方選

要庸成編帙敬陳

睿覽然但愧其擇之未精收之未當無以

上副

殿下壽衆之仁心也他日

賜及遠近使人因是疾用是方而儻獲功効之一二是豈臣之能所致哉實惟

殿下之仁有以及之也仁之澤愈流而愈長天之慶益臻而益熾亂祚綿遠與

選要序

三

國咸休蓋將並天地之悠久矣臣草茅賤質臨書不勝惶懼之至謹拜首稽首

上言

弘治八年冬十月吉日良醫副臣周

文采再拜謹書

醫方選要總目

卷之一

諸風 諸寒 中暑

中濕

卷之二

傷寒 瘧疾 諸痢

泄瀉 霍亂

卷之三

嘔吐 祕結 咳嗽

癆瘵 諸虛

卷之四

脾胃 諸氣 積聚

水腫脹滿

卷之五

心腹痛 翻胃膈噎

欬逆 頭痛 眩暈

腰脇痛

卷之六

痰飲 喘 消渴

遺精白濁 諸淋

卷之七

五疸 腳氣痿痺

自汗盜汗

怔忡健忘動悸 疝氣

積熱

卷之八

痼冷 諸血

腸澼痔漏脫肛 眼目

耳鼻

卷之九

咽喉口齒

癰疽瘡癤

卷之十

折傷

婦人

小兒

選要總目

三

醫方選要總目 畢

進賢選要疏

通政使司右通政臣顧可學謹

奏為恭

進

先皇御製醫書以光

聖孝事臣聞大道以博施濟眾為要達孝以繼志述事

為先臣父工部主事先臣顧懋時年三十無子禱

於

武當獲應生曰長成臣於弘治十八年倖登進士臣

父前往本山進香酬恩恭捧

選要疏

十

睿宗獻皇帝御製醫方選要一部共十卷回家皆經

先皇躬為校閱精通神妙臣父依方施藥多所全活濟

人益已壽至八十八歲臣承先臣遺澤亦賴此書

通醫攝養其書諸虛門內有秋石一方臣試服有

效暮年多子因推演其法廣詢博采以合延長之

道荷蒙

聖訪節沐

殊恩謂臣精曉醫道善於攝生臣初無知識實由

聖啓豈敢忘本臣竊意此書既經刊行必已流布以此

未敢奏

聞今訪之太醫院未有知者豈

聖澤尚有未溥

神化有待而成耶恭惟

皇上至孝通乎

天地深仁切於臣民累歲施藥濟度羣生罔不受戴更

得廣布此書尤為溥博臣伏觀

先皇御製序內有云人所自致之病是方或可治之若

其病於凍餒病於徭役病於憲網病於征輸病於

鋒鏑之患而不能起者則惟好生之

聖天子若贊化之賢宰執能相與消息調停以通其關

△選要疏 二

節脈絡而生之全之安之養之俾少可壯壯可老

少壯可終事其老而咸躋於壽域焉大哉

皇言其體

天愛民之心至矣經今五十餘年

帝祐

皇上克成先志况良醫周文采後序內一則曰

睿意二則曰

睿令三則曰

睿覽今日又應

睿廟之徽號可見氣數關

天誠非偶然臣昨自家恭捧來京謹將原本裝帙奏

進御覽上冀調護

聖躬萬壽以壽

宗社生民仰副

先皇憫世之慮誠有望於

聖君賢相位育元化共成

天壽平格之麻

垂裕之弘烈於是為大夫

皇上成德大孝重加

△選要疏 三

宸翰續序

勅諭禮部修輯梓行以昭

大聖作述之盛典仍

頒兩京各省翻刻傳播則博施濟衆之功當與

天地同其悠久矣臣不勝祝頌之至謹稽首頓首親齎

隨本奏

進以

聞

嘉靖三十三年十月十六日通政使司右通政臣顧可學

本月十八日奏奉

聖旨

皇考躬集醫方選要書實仰體

天地生德壽衆至仁之心歲久傳布未廣覽爾奏進朕
心嘉悅禮部便重加恭錄刻梓仍行兩京各省翻刻
以宣濟民之化欽此

選要疏

四

題爲恭

進

先皇御製醫考以光

聖孝事祠祭清吏司案呈奉本部送於本年十月十八
日申刻該禮科抄出通政使司右通政顧可學奏
前事奉

聖旨

皇考躬集醫方選要一書實仰體

天地生德壽衆至仁之心歲久傳布未廣覽爾奏進朕

選要疏

五

心嘉悅禮部便重加恭錄刻梓仍行兩京各省翻刻
以宣濟民之化欽此欽遵抄出送司案呈到部臣等
仰惟

先皇體

上天以興壽衆之心

皇上推

先皇以廣濟民之化雖爲闡軒黃之秘術實以成
堯舜之深仁蓋

睿志精勤似有待於今日而

聖衷感動益追念於當年乃嘉奏

進之臣遂下刊行之

命是繼述之孝無往而不存參贊之功至是而彌盛者

也臣等謬承秩典恭奉

綸音敢不仰體

孝思祇宣

德意謹將

欽發

睿宗獻皇帝御製諸方選要一部十卷卜日重加恭錄

刻梓俟刻完之日刷印裝潢成帙

進主

選要疏 六

御覽仍行兩京十三省照樣翻刻務俾遠近臣民皆得

如法治疾以廣

皇仁以宣

聖化緣係恭

進

先皇御製醫書以廣

聖孝及仰奉

欽依禮部便重加恭錄刻梓仍行兩京各省翻刻以宣

濟民之化事理謹具題

知

嘉靖壬午九月禮部尚書兼翰林院學士臣費家

傳耶兼詹事府詹事魏學士孫憲

右侍郎臣許成名

祠祭清吏司署郎中事王健

署員外郎事主事臣張惟

主事臣張子瑞

臣涂鉉

本月二十一日奉

聖旨是欽此

選要疏 七

禮部尚書兼翰林院學士臣費來等謹

題為恭

進

先皇御製醫書以光

聖孝事祠祭清吏司案呈奉本部送禮科抄出通政使

司右通政顧可學奏稱

睿宗獻皇帝御製醫方選要一部共十卷

勅下禮部修輯翻刻傳播以昭

大聖作述之盛典等因節奉

聖旨禮部便重加恭錄刻梓仍行兩京各省翻刻以宣

選要疏

濟民之化欽此欽遵抄出送司除具題外所有刊刻

前項

御製醫書應用紙張人匠梨板等項呈乞議處等因案

呈到部看得前項合用錢糧相應議取令候

命下行移各該衙門取辦供應緣係恭

進

先皇御製醫書以光

聖孝爰節奉

欽依禮部便重加恭錄刻梓仍行兩京各省翻刻以宣

濟民之化事理未敢擅便謹題請

旨

嘉靖三十七年十月五日禮部尚書兼翰林院學士臣費來

奏為恭錄御製醫書以光

聖孝事祠祭清吏司署郎中事書臣王健

署員外郎事主事臣張肅

主事臣張肅

主事臣張肅

臣涂鉉

本月二十三日奉

聖旨是欽此

選要疏

九

禮部尚書兼翰林院學士臣費來等謹

題為恭

進

先皇御製醫書以光

聖孝事祠祭清吏司案呈奉本部送禮科抄出通政使

司右通政顧可學奏稱

睿宗獻皇帝御製醫方選要一部共十卷

勅下禮部修輯翻刻傳播

皇上重加

宸翰續序以昭

選要疏

十

大聖作述之盛典等因節奉

聖旨禮部便重加恭錄刻梓仍行兩京各省翻刻以宣

濟民之化欽此欽遵抄出送司案呈到部臣等伏讀

先皇御製醫方選要一書

森蓐

宸範首叙憂時之旨宏綱細目條分對病之方開示愚

昧保全民命誠足與軒農之內經本草異世而同

功也今蒙

皇上發下通政顧可學所進一部

命臣等恭錄刻梓仍行京省徧刻以傳播天下後世則

先皇愛育之仁

皇上表章之孝輝然具備除臣等已欽遵

明旨外照得舊本頗窄於茲

盛舉未稱再舉謹復畫擬式樣選委本部儒士恭錄一

十五紙

進呈

御覽其原本刊印字畫恐有差訛合無通候

命下容臣等遵奉校正膳刊庶為全美再照顧可學奏

乞

皇上重加

選要疏

上

宸翰續序無非欲推廣

皇仁光昭

聖孝意實可嘉伏乞

俯從所

請容臣等恭候

御製序文一併恭錄梓行用以弘敷

德意惠心方惠藥溥

乾坤父母之心隨國醫人躋華夏仁壽之域則

先皇作之於前而既彰

皇上繼之於後而益盛矣臣等無任悚息待

命之至錄係恭

送

御製醫書以光

聖學及節奉

欽依禮部便重加恭錄刻梓仍行兩京各省翻刻以宣
濟民之化事理未敢擅便謹題請

旨

嘉靖三十五年十二月禮部尚書兼翰林院學士臣費案

存案查前奉聖旨禮部尚書兼翰林院學士臣費案

右侍郎臣許成者

選要疏 十二

祠祭清司署郎中事臣王健

署員外郎事主事臣張惟一

主事臣張子珩

臣余鉉

本月初三日奉

聖旨書樣依擬刊布序已有

皇考御製了欽此

禮部尚書兼翰林院學士臣費案等謹

題為恭

進

先皇御製醫書以光

聖孝事祠祭清吏司案呈照得先該通政使司右通政

顧可學奏進

睿宗獻皇帝御製醫方選要一部共十卷節奉

聖旨禮部便重加恭錄刻梓仍行兩京各省翻刻以宣

濟民之化欽此又該本官續

進外科集驗方二本節奉

選要疏 十五

聖旨禮部重加校錄同前書一體刊布欽此欽遵已經

本部委官校錄刊刻將完所據右通政顧可學并

本部題覆事宜章疏俱奉有

明旨呈乞題

請一併刊刻等因案呈到部看得前書各有

先皇御製前序後跋臣等擬奉後跋并移於前次附右

通政顧可學并本部欽奉

明旨章疏其良醫副周文采序原刻與

御製序相連今合移於醫方之後庶尊卑有等先後不

淆臣等未敢擅便謹題請

古

嘉靖二十四年片書禮部尚書兼翰林院學士臣費榮

左侍即臣許盛

祠祭清吏司郎中臣王健

署員外郎事主事臣張惟一

主事臣張子珩

臣余鉉

本月二十五日奉

聖旨是欽此

選要

十四

醫方選要卷之一目錄

諸風門 附論

八味順氣散 順風勻氣散 二香三建湯

小續命湯 麻黃續命湯 桂枝續命湯

白虎續命湯 葛根續命湯 附子續命湯

桂附續命湯 羌活連翹續命湯

烏藥順氣散 省風湯 大防風湯

三生飲 資壽解語湯 取竹瀝法

清氣宣風散 星香湯 防風通聖散

三化湯 搐鼻通天散 羌活愈風湯

大秦羌湯 滌痰湯 選要卷二目錄一

仙術芎散 獨活湯 人參順氣散

八風散 消風散 續命煮散

青州白圓子 排風湯 牛黃清心圓

貝母栝蒌湯 換骨丹 大醒風湯

禦風丹 追風如聖散 鐵彈圓 大聖一粒金丹

搜風順氣圓 三聖散 酒浸藥仙方

追風散 天麻圓 治風何首烏圓

虎睛圓 碧霞丹 勝金圓

五生圓 琥珀壽星圓 玉真散

金匱兒

羌活防風湯

白朮湯

江鱗圓

胡麻散

大風圓

通天再造散

醉仙散

樺皮散

升麻湯

白花蛇膏

諸寒門

附論

附子理中湯

沉附湯

生料五積散

理中湯

正氣散

理氣治中湯

肉桂散

溫中湯

木附理中圓

沉香桂附圓

熨法

中暑門

附論

選要卷二目錄二

香薷飲

黃連香薷飲

五物香薷湯

十味香薷飲

清暑益氣湯

冷香飲子

縮脾飲

消暑十全散

竹葉石膏湯

人參益氣湯

清暑六和湯

大順散

香朴飲子

五苓散

五聖湯

春澤湯

香薷圓

辰砂益原散

二氣丹

來復丹

中濕門

附論

防已黃氏湯

羌活勝濕湯

滲濕湯

清燥湯

生附湯

除濕湯

腎著湯

乳香沒藥圓

木瓜虎骨圓

除濕丹

瓜蒂摘鼻法

醫方選要卷之一目錄畢

選要卷二目錄二

醫方選要卷之一

諸風門

良醫副臣周文朱編集

夫風者百病之長以其善行而數變也然風之為病種類甚多大有四一曰偏枯謂血氣偏虛半身不遂肌肉枯瘦骨間疼痛二曰風痺謂神智不亂身體無痛四肢不舉臂不隨三曰風懿謂忽然迷仆舌強不語喉中窒塞噎噎有聲四曰風痺謂風寒濕三氣合而為痺其人身頑肉厚不知痛痒風多則走注寒多則疼痛濕多則重着在筋則筋屈而不伸在脉則血凝而不流在肉則不仁在骨則癱重是也有中

選要卷一

一

臟有中腑有中血脉中臟則性命危中腑則肢節癱中血脉則口眼歪斜三者之治各有不同若中血脉外有六經之形證當從小續命湯隨四時加減治之若中腑中臟者內有便溺之阻隔當從三化湯或麻仁圓之類通利之若外無六經之形證內無便溺之阻隔當養血通氣宜用大秦芩湯羌活愈風湯之類治之至若卒中口開眼閉手撒遺尿汗出不流口吐涎沫噴藥悶亂氣逆聲如鼾睡面赤或青黑髮直搖頭手足口鼻清冷此為中臟不可治也若氣虛陽脫卒然倒仆手足厥逆自汗出當用三建星香三生之

類溫經行濕以回陽氣凡中風初中卒倒牙關緊急

不省人事可用蘇合香圓灌之俟其甦醒便不可用

若痰涎壅盛宜用青州白圓子蘇合圓相合用竹瀝

薑汁灌之然後用順氣之藥治之切不可驟用腦麝

香燥治風之藥恐引風入於骨髓故也如風痺頑麻

半身不遂語言蹇澀者亦可用治風之藥如鐵彈圓

換骨如聖或浸酒之藥皆可用也又有風癰之證卒

然倒仆不知人手足痠癢口吐涎沫或如羊鳴不時

舉發此病多由風痰膠固胃中迷悶發作宜吐痰為

先然後以導痰湯壽星圓虎睛圓之類治之若破傷

選要卷一

二

風一證最為緊急此病因打撲傷損胃入風邪而得也發而為角弓反張不知人事多有不救治之須分表裏汗下之當以定風化痰為主如至真散江鯉圓皆可治也又如癘風俗謂之大風是也古人謂之惡疾以其惡厲腥穢敗壞肢體故也其病始得之使人不覺日久遂成大患凡人初覺肩臂脫落或渾身作痒時作時止此大風之漸也急須治之不可忽也當以苦參胡麻醉仙再造花蛇之類治之仍須清心寡慾淡薄白粥調理之不可恣食煎炒酒麵辛辣熱之物庶幾有可生者大抵中風之脉宜浮而遲緩者

可治若急疾而大數者為難治臨病審焉

選要卷一

諸風通治方

八味順氣散 治中風先宜服此藥以順其氣次用治風之藥

白朮 白茯苓 青皮 白芷

陳皮 烏藥 人參 甘草 各二錢

右咬咀分二貼水二鍾煎至八分去粗食遠服老痰盛加半夏二錢生薑三片

順風勻氣散 治中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜服此

白朮 天麻 沉香 白芷

青皮 甘草 人參 烏藥 各半錢

紫蘇 木瓜 各半錢

右咬咀分二貼每貼用水二鍾生薑二片煎至八分食遠溫服或風濕腰腿疼痛亦宜服之

香三建湯 治中風六脉虛極舌強不語痰涎壅盛

精神如癡手足偏廢不能舉用此等證候不可攻風

止可扶虛

天雄 附子 川烏 皆生用去皮

木香 沉香 水研碎

右咬咀分二貼每貼水二鍾薑十片煎至八分去粗

食遠溫服

小續命湯 治卒暴中風不省人事半身不遂口眼歪

斜手足顫掉語言蹇澀肢體麻痺神情昏亂頭目眩

暈痰涎壅盛筋脉拘攣及脚氣緩弱不能動履屈伸

防己

桂心

黃芩

杏仁

芍藥

甘草

川芎

麻黃

人參

各一錢

防風

二錢

附子

炮七分

右咬咀分二貼每貼水二鍾薑五片棗一枚煎八分

食遠溫服

精神恍惚加茯神遠志

骨節煩疼有熱者去附子倍芍藥

心煩多驚加犀角

骨節疼痛此有寒濕倍加官桂附子

嘔逆腹脹加半夏倍人參

燥悶大便澀去附子倍芍藥入竹瀝

臟寒下痢去防己黃芩倍附子加白朮

自汗去麻黃杏仁加白朮

脚膝弱加牛膝石斛

身疼加秦艽

腰痛加桃仁

去皮尖炒 杜仲 薑汁炒

凡治中風不審六經之形證加減雖治與不治無異也
加減法具于後

麻黃續命湯 治中風無汗惡寒

本方中麻黃防風杏仁各加一倍

桂枝續命湯 治中風有汗惡風

本方中桂枝芍藥杏仁各加一倍

白虎續命湯 治中風身熱無汗不惡寒而渴

本方中加知母石膏各一錢四分去附子

葛根續命湯 治中風身熱有汗惡風

本方中加葛根官桂茯苓各一錢半

附子續命湯 治中風無汗身涼

本方中加附子一倍乾薑一錢

桂附續命湯 治中風有汗無熱

本方中加桂附甘草各一倍

羌活連翹續命湯 治中風肢節攣痛不仁

本方中加羌活連翹各一錢半

烏藥順氣散 治男子婦人一切風氣攻注四肢骨節

疼痛遍身頑麻凡卒手足癱瘓言語蹇澀先宜多服

此藥以疎通氣道然後隨證投以風藥

烏藥

陳皮 各二錢 枳殼 去節 枳實 炒 去

川芎

松殼 麩炒

甘草 炙

桔梗

白芷 各一錢 乾薑 炮半錢

右咬咀作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食遠服

省風湯

治卒急中風口噤全不能言口眼喎斜筋脉

急掣疼痛風盛痰實頭目眩眩胃膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼恍惚不定神志昏憤一切風證

可服

防風 去蘆

天南星 各一錢 半夏 湯洗

黃芩 各二錢

甘草 一錢

選要卷一 七

右咬咀作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

大防風湯

去風順氣活血壯筋又治痢後脚痛緩弱

不能行履名曰痢風或兩膝腫痛脚脛枯細名曰鶴膝風

防風

熟地黄

白朮

羌活

人參

川芎

黃芪

牛膝 各錢

附子 炮去皮膽

當歸 酒洗

杜仲 薑汁炒

芍藥 各錢

甘草 炙半錢

右咬咀作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾

不拘時服

二生飲 治卒中風昏不知人口眼喎斜半身不遂并痰厥氣厥

南星 五錢生用

木香 一錢半 川烏 一錢 去皮 附子 一錢 生用

右咬咀作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服有卒中風不省人事者以蘇合香圓用生薑自然

汁化開擦牙

滋養解語湯

治心脾中風舌強不語半之不遂

附子 炮去皮膽

防風 去蘆

天麻

酸棗仁 各一錢

羚羊角 鎊

官桂

羌活 各一錢

甘草 五分

選要卷一 八

右咬咀作一服水二鍾煎至一鍾入竹瀝三匙不拘時服

取竹瀝法 用鮮竹數竿截長一尺餘許劈開作片用

磚兩塊對立置竹在上兩頭各出三寸許其中着火

燒炙其竹瀝自兩頭出用盥接之待瀝盡以絹濾澄

清用暑天冰冷水中以防酸壞若大熱有風痰人亦

可單服冷時隨意勿過度煎柴燒瀝法

清氣宣風散 治上焦風熱氣不升降隔上有痰熱治

兩目赤澀耳鳴耳塞不聽

川芎

羌活

半夏 湯洗

生地黄

鹽薑此各八分 當歸 白朮 芍藥各一錢

防風去蘆 甘菊花 枳殼麩炒 陳皮

荊芥 升麻 黃連 山梔子炒各五分

蟬蛻炒 茯苓各六分 甘草三分

右咬咀分二貼每貼水二鍾薑三片棗一枚煎八分

食遠溫服

星香湯 治中風痰盛服熱藥不得者

南星六錢 木香不見火

右咬咀作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服

服

選要卷一 九

防風通聖散 治一切風熱大便秘結小便赤澀頭面

生瘡咽喉腫痛眼目赤疼

防風 川芎 當歸 芍藥

大黃 薄荷葉 麻黃 連翹

芒硝各五分 石膏 黃芩 桔梗各錢

滑石三錢 甘草二錢 荊芥 梔子

白朮各二分半

右咬咀作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時

服如咳嗽加半夏一錢

三化湯 治中風外有六經之形證先以加減續命湯

隨證治之內有便溺之阻隔復以此導之

厚朴薑製 羌活各二錢 枳實一錢半 大黃四錢

右咬咀作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

搞鼻通天散 治卒暗中風倒地牙關緊急人事昏沉

川芎 細辛 菴蘆 白芷

防風 薄荷各一錢 猪牙皂角刮去皮

右爲細末用蘆筒納藥每用少許吹入口內中

羌活愈風湯 治腎肝虛筋骨弱語言艱澀精神昏憤

風濕內弱風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身

不遂心不寧自勞役則百病生心靜則萬病息此藥

能安心養神調陰陽無偏勝

羌活 甘草炙 防風去蘆 黃芪去蘆

人參去蘆 蔓荊子 川芎 細辛去苗

枳殼麩炒 地骨皮去骨 麻黃去節 知母去毛

杜仲炒去絲 秦艽去蘆 柴胡去苗 枸杞子

當歸去蘆 獨活 白芷 半夏薑製

厚朴薑製 防己 芍藥 黃芩

白茯苓 甘菊花 薄荷 前胡各七分

石膏 生地黃 熟地黃 蒼朮各錢

官桂 去皮半

右咬咀作二服每服水二鍾生薑三片煎至一鍾空心服臨睡相再煎服

大秦羌湯 治中風外無六經之形證內無便溺之阻

隔為血弱不能養於筋故手足不能運化舌強不能言宜養血而筋自榮

秦艽 石膏 各一錢 甘草 川芎

當歸 羌活 獨活 防風

黃芩 白芍藥 白芷 白朮

生地黃 熟地黃 白茯苓 各一錢細辛半錢

○選要卷一 十一

右咬咀作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時

服如心下痞加枳實一錢

滌痰湯 治中風痰迷心竅舌強不能言

南星 薑製 半夏 湯洗七次 枳實 炒二錢 茯苓 去皮二錢

橘紅 一錢半 石菖蒲 人參 各一錢 竹茹 七分

甘草 半錢

右咬咀作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

人參順氣散 治中風半身不遂語言蹇澀及感受風

邪頭疼鼻塞聲重

乾薑 炮 人參 各一兩 川芎 甘草 炙

桔梗 去蘆 厚朴 去皮薑製 白朮 陳皮 去白

白芷 麻黃 各四兩 葛根 二兩半

右咬咀每服五錢水二鍾薑三片葱白二根煎八分

食後服

仙木芒散 治風熱壅盛頭昏眩明目聰耳消痰清神

川芎 連翹 黃芩 山梔子

菊花 防風 大黃 當歸

芍藥 桔梗 藿香 各五錢 蒼朮 二兩米泔浸

石膏 二兩 甘草 滑石 各三兩 荆芥

薄荷 砂仁 各二錢

○選要卷一 十二

右咬咀每服五錢水二鍾煎至八分食後通口服

獨活湯 治風虛昏憤不自覺知手足痠痲坐卧不能

或發寒熱血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服

之

獨活 羌活 人參 防風 去蘆

當歸 細辛 茯苓 去水 半夏 湯炮

桂心 白薇 遠志 去心 菖蒲 去毛

川芎 各五錢 甘草 三錢

右咬咀每服一兩水二鍾生薑五片煎至八分食後

溫服

續命煮散 治體虛中風自汗心中昏憤四肢無力口
眼瞶動手足搐搦煩渴飲水此藥扶榮衛養氣血

防風 獨活 當歸 酒洗 人參 去蘆

細辛 葛根 芍藥 川芎

甘草 遠志 去心 荊芥 熟地黃 鑿

官桂 二錢半 半夏 四錢 湯

右吹咀每服一兩生薑三片水二鍾煎至八分不拘
時服

八風散 治風氣上攻頭昏眩肢體拘急皮膚癢痒癰
疹成瘡及治寒瘰不調鼻塞聲重

選要卷一 十三

藿香 半斤 白芷 前胡 各一升 黃芪

甘草 人參 各二升 羌活 防風 去蘆 各

右吹咀每服一兩水二鍾煎至八分食後溫服或為
末每服二錢薄荷湯調下

消風散 治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻塞聲重

耳作蟬鳴及皮膚頑麻癢癢癰疹婦人血風頭皮腫

痒並宜服之

荊芥 甘草 各二兩 陳皮 半兩 茯苓

防風 去蘆 羌活 一兩 藿香 去梗

蟬蛻 各一兩 厚朴 去皮製 羌活 一兩 人參 半兩

右吹咀每服八錢水二鍾煎白二根煎八分食後服
或為末每二錢蔥湯調下

牛黃清心圓 治諸風緩縱不隨語言蹇澁痰涎壅盛
心忪健忘或發癲狂並皆治之

羚羊角 研 麝香 另研 龍腦 另研 各

蒲黃 兩半 白茯苓 去皮 苦菊 柴胡

杏仁 另研 桔梗 各一兩二 防風 去蘆 白朮

白芍藥 麥門冬 黃芩 兩半 神麴 二兩

當歸 洗一 阿膠 炒 大黃 卷 肉桂 各半

乾薑 七錢半 牛黃 一兩二錢 犀角 二兩 樵黃 八錢

選要卷一 十四

甘草 五兩 乾山藥 七兩 白欬 七錢

右除大棗杏仁金箔羚羊角犀角麝香龍腦樵黃另
研餘藥別研為細末入羚羊角等藥七味入內再研

和勻將大蜜一匙去皮後搗爛如泥同煉蜜為圓每
一兩作十圓金箔為大每服一圓食後溫水化下

青州白圓子 治男子婦人手足癱瘓風痰壅盛嘔吐

涎沫各小兒驚風並皆治之

南星 生用 白附子 各二 川烏頭 半兩 半夏 七兩 水

右礱為細末以生絹袋盛於井華水內攪出未出者

更以手揉令出以滓更研再用絹袋攤盡為度於磁盆中日曬夜露每旦換新水攪而復澄春五夏三秋七冬十日去水曬乾如玉片碎研以糯米粉煎粥清為圓如菜豆大每服二三十圓生薑湯送下不拘時服如癱瘓風濕酒送下小兒驚風薄荷湯下三五圓排風湯 治中風邪氣入於五臟令人狂言妄語精神錯亂手足不仁痰涎壅盛

白鮮皮

當歸 去蘆

白桂 去粗皮

芍藥

杏仁

去皮尖

麻黃 去根節

甘草

防風 去蘆

川芎

獨活 各一錢

茯苓 去皮

白朮 各二錢

選要卷一 十五

右咬咀作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時

溫服

大醒風湯 治中風痰涎壅盛半身不遂歷節痛風筋

脉拘急

南星 四錢

防風 二錢

全蠍 半錢 微炒

附子 去皮臍

獨活

甘草 各一錢

右咬咀作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服

貝母栝蒌湯 治肥人中風口喎手足麻木左右俱作

痰治

貝母

栝蒌

南星

荊芥

防風 去蘆

羌活

黃蘗

黃芩

黃連

白朮

陳皮 去白

半夏 湯洗

薄桂

甘草 炙

威靈仙

天花粉 各半

右咬咀每服七錢水二盞薑三片煎八分至夜服

換骨丹 治癱瘓中風口眼歪斜半身不遂并一切風

癱暗風並宜服之

頌曰

我有換骨丹

傳之極幽秘

疎開病者心

扶起衰翁臂

氣壯即延年

神清自不睡

南山張仙翁

三百八十歲

槐皮苦木並

選要卷一 十六

仙人防首蔓

十件各停勻

苦味香咸半

龍麝即少許

硃砂作衣纏

麻黃煎膏圓

大小如指彈

修合在深房

勿使陰人見

夜卧服一粒

遍身汗津滿

萬病自消除

神仙為侶伴

槐角 取子

桑白皮

仙木

川芎

香白芷

威靈仙

人參

防風 去蘆

何首烏

蔓荊子 各四兩

苦參

五味子

木香 各二兩

硃砂 研

龍腦 研

麝香 研

麻黃 煎成膏

石件俱為細末用麻黃膏和勻入臼內杵一萬五千
下每兩分作十圓每服一圓研碎溫酒半盞浸化以
物蓋之不可透氣食後臨睡一呵嚥下用被蓋卧汗
出即差如不飲酒白湯化下

大聖一粒金丹 治中風昏仆舌強涎潮癱瘓偏枯頑

痺麻痺癱瘓倒地閉目作聲項強反張口噤直視

大川烏

炮去
皮尖

大附子

炮去
皮

白附子

炮去
皮

五靈脂

白茯苓

炮去
皮

白朮

炮去
皮

白朮

炮去
皮

硃砂

沒藥

另研
各

麝香

另研
各

右件為末用京墨半兩新汲水磨汁搜和藥勻每兩

選要卷一 十七

作六圓用金箔二百片為衣令自乾每服一圓用生

薑汁磨開溫酒半盞調服被蓋取微汗為効

御風丹 治一切中風半身不遂神昏語蹇口眼喎斜

婦人頭風血風暗風倒仆嘔噦涎痰手足麻痺

川芎

白芍藥

桔梗

細辛

去葉

羌活

羌活

南星

薑製各
半兩

麻黃

防風

白芷

各一兩

乾生薑

甘草

各三錢

硃砂

二錢半
為衣

右為細末煉密為圓如彈子大每服一圓溫酒化下

食前日三服

追風如聖散 治男子婦人大小諸般風證左癱右瘓

半身不遂口眼歪斜腰腿疼痛手足頑麻語言蹇澀

行步艱難遍身瘡疥上攻頭目耳內蟬鳴痰涎不利

皮膚瘙癢偏身頭風無問新舊及破傷風角弓反張

蛇犬咬傷金刀所傷出血不止敷貼立効

川烏

草烏

蒼朮

各四兩

川芎

五錢

石斛

一兩

白芷

細辛

當歸

酒洗

防風

麻黃

荊芥

何首烏

全蠍

天麻

蔓荊

各三錢

甘草

三兩

人參

三錢

兩頭尖

二錢

選要卷一 十八

右為細末每服半錢臨臥茶清調下溫酒亦可不計

多飲酒服藥後忌一切熱物飲食一時恐動藥力

鐵彈圓 治中風癱瘓偏枯筋骨骨痛麻木不仁皮膚

瘙癢及打撲傷損肢節疼痛並皆治之此藥能通經

絡活血脉

地龍

去土

防風

白膠香

沒藥

草烏

水濕炮

木鼈子

去殼

白芷

五靈脂

當歸

各一兩

京墨

三錢

麝香

另研二錢

乳香

五錢

右為末糯米糊為圓如彈子大每服一圓溫酒化下

溫酒化下不拘時

搜風順氣圓 治三十六種風七十二般氣去上熱下

冷脹肚疼痛四肢無力多睡少食漸漸羸瘦顏色不

定黃赤惡瘡下注口苦無味增寒毛聳積年癰癰氣

塊丈夫陽事斷絕女子久無子息久患寒瘧瀉痢吐

逆變成癆疾百節酸疼初生小兒及百歲老人皆可

服補精駐顏疎風順氣

車前子二兩 白檳榔

火麻子微炒 牛膝酒浸

郁李湯洗去 兔絲子酒洗

山藥各二兩 枳殼炒

防風去蘆 獨活各一兩

大黃五錢半

右為末煉密為圓如梧桐子大每服二十圓漸加至

選要卷一十九

四五十圓酒茶米飲任下百無所忌空心臨睡各一

服久服去腸中宿滯精神強健耳目聰明腰膝輕健

百病皆除老者返少孕婦勿服如服藥覺臍腹微動

以羊肚肺羹補之又治腸風下血中風癱瘓百病不

生無病不治

三聖散 治中風舌強不語

浸藥

琥珀研各二 乾姜七枚

右為細末每服三錢七用鵝梨汁半盞皂角末一錢

七盞煎湯一合與梨汁相和調下頃更吐出涎毒便

能語

酒浸藥仙方 凡患風疾四肢不舉服之三日舉手梳

頭十日漸舒十日行步半月遍身依舊覺得輕健服

目更明大有神効

甘菊花 防風去蘆

羌活

杜仲

杜蠟

栝蒌根

牡丹皮

紫菀

菖蒲

人參

白茯苓

牛蒡子

枸杞子各半

白芍

白蛇

桔梗

白朮

山茱萸去核

白茯苓

晚蠶沙

官桂

遠志去心

牛膝各二錢

虎腰骨

牛蒡根

乾薑

熟地黃

栢子仁

狗脊去毛

天雄炮去皮

草薢

蛇床子

附子

肉蓯蓉

兔絲子

續斷

芍藥去皮

石斛各三錢

石斛各三錢

右並要川廣好者依方揀擇為粗末用新絹袋盛藥

用新小甕兒一箇放藥在內以無灰酒二斗將藥浸

之密封其口春夏浸二七日秋冬浸三七日開甕早

晨臨午晚三時令病人自取冷酒三盞依時服之每

服不過一盞不多服亦不可添減亂開酒甕久病服

者不過一月近者十日輕者五日見効不問男子婦

人小兒骨節疼痛四肢浮腫眼目昏暗半身不遂語

言塞澁口眼喎斜中風失音並治之

追風散 治一切急風角弓反張四肢抽搐牙關緊急

骨節疼痛及破傷風

川烏 去皮臍 附子 去皮臍

白附子

白芷 酒浸

丹砂 研各一兩

蠍稍 七錢半

麝香 研各三分

膩粉 研各二錢半

南星 去臍一兩

右並生用搗羅六味為細末入別研藥和勻磁盒收

每服半錢至一錢豆淋酒或煎蔥白酒下口噤者用

少藥搯牙即開為妙

天麻圓 治中風四肢筋脉拘攣骨節疼痛少力

選要卷十一

天麻 半兩

蠍稍 微炒

沒藥 研

丹砂 研各一錢半

麝香 研各二錢半

麻黃 去根節

地龍 土炒

防風 去皮

乳香 研各半兩

川烏 生用去皮臍

自然銅 煨醋淬

安息香 研各二錢半

右除安息香外搗研為末却入別研藥以安息香膏

和劑為圓如梧桐子大每服二十圓不拘時以薄荷

酒下忌羊血有人患手臂不隨又有患腿膝無力行

步輒倒服之並効素有熱人減川烏一半

治風何首烏圓 王丰甫傳云其父禹王平生服此有

効

何首烏

西京者尤佳米泔浸一宿用竹刀刮去皮切片焙乾用一斤 熟地黃 四兩

懷州牛膝 酒浸一宿

右不得犯銅鐵器搗羅木煉蜜為劑再入木柏內

并一千下圓如梧桐子大每日空心溫酒下四五十

圓忌羊血生薑心蘿蔔藕不飲酒以飯飲下大有神効

虎睛圓 治癰疽發作涎潮搐搦精神恍惚時作謔語

大有神効

犀角 一兩

虎睛 微炒

大黃 一兩

遠志 去心

梔子仁 兩半

右為末煉密空圓如菉豆大每服二十圓食後溫酒

送下

選要卷一

碧霞丹 治痰涎壅塞牙關緊急目睛上視時作搐搦

斤五種風癰

石碌 九度飛

蠍稍 七箇

附子尖 七箇 烏頭尖 七箇

右為末入石碌

勻麵糊為圓如雞頭大每服薄荷酒半合溫服之須臾吐出痰涎然

後隨證治之如牙關緊急指開灌之

勝金圓 治風熱發厥不時旋運潮搐吐痰沫忽然倒

地不省人事名

南星

川烏

角 炙

白礬 煨

桔梗

癰

細辛

烏蛇 七用

威靈仙 何首烏 草烏 各一兩 荊芥穗

川芎 各二兩

右為末酒糊為圓如梧桐子大每服十圓食後溫酒

五生圓 治痢有神治陰脉弦細緩者

南星 半夏 川烏 白附子 各一兩

大豆 去皮一兩

右為細末滴水為圓每服三圓至五圓不過七圓薑

湯送下

琥珀壽星圓 治心膽被驚為神不守舍或痰迷心竅恍

惚健忘及風癰等證

天南星二斤搗坑深二尺用炭火五斤於坑內澆

熟紅取出炭掃坑淨用好酒一升澆之將南星趁

熱下坑內用盆急蓋訖泥壅合經一宿開取出再

焙乾為末入

琥珀 四兩 研 硃砂 一兩 各一

右三味和勻用猪心血三箇生薑汁打麴糊將心血

和入藥末圓如梧桐子大每服五十圓煎人參湯空

心送下日三服局方用南星一斤硃砂二兩琥珀一

兩無猪心血

玉真散 治破傷風發搐神効

南星 炮 防風 各等分

右為末每服二錢生薑酒調服仍以藥貼傷處若牙

關緊急角弓反張用童便酒調灌下

金棗兒 治一切諸風破傷風等證

白朮 半兩 蒼朮 六兩 麻黃 二兩 兩頭尖

全蠍 去毒 川烏 炮各 川芎 細辛

白芷 防風 天麻 各一兩 雄黃 五錢

辰砂 二錢

右為細末糯米糊為圓如小棗兒大金須為衣每服

一枚或半枚量病輕重用酒或茶薑湯隨引服之專

治一切無名腫毒惡瘡風癰紅絲魚眼對口及婦人

吹乳風狗咬傷諸風皆用新汲水磨汁半塗瘡腫

處一半服之牙疼先用漿水漱口淨次用豌豆大一

塊咬於疼牙上立止

羌活 防風 治破傷風邪初傳在表

羌活 防風 川芎 各一兩 苦茶本

常歸 芍藥 甘草 各一兩 地榆

華細辛 各二兩

右以咀每服五錢水一盞半同煎至七分去滓熱服

不拘時候量緊慢加減用之熱則加黃芩二兩大便
秘則加大黃一兩緩緩令過

白木湯 治破傷風大汗不止筋攣搐搦

白木 葛根 各一兩 升麻 黃芩 各半

芍藥 二兩 甘草 二錢半

右咬咀每服一兩水一盞半煎至一盞去滓溫服不

拘時候

江鱈圓 治破傷風驚而發搐臟腑秘澀知病在裏可

用此藥下之

江鱈 半兩 野鴿糞 半兩 雄黃 一錢 白礬 半兩

選要卷一 二十五

蜈蚣 一對 大麻 一兩

右件為細末又將藥末作三分用二分燒針為圓如

桐子大硃砂為衣後將一分入巴豆霜一錢同和亦

以燒針為圓如桐子大不用硃砂衣每服硃砂為衣

圓二十圓入巴豆霜一圓第二服二圓加至利為度

再服硃砂為衣藥病愈止

胡麻散 治風氣挾熱癰疹瘰癧

胡麻子 二兩 苦參 荆芥穗 何首烏 各一兩

威靈仙 防風 石菖蒲 牛蒡子 各半

菊花 蔓荊子 桑梨 甘草 各半

右為細末每服二錢食後薄荷湯調服或好茶亦可
大風圓 治疥癩

大楓子 一兩 金礬 半兩 蟬蛻 二錢 當歸 半兩

白礬 二錢 苦參 防風 羌活 各二兩

獨活 一兩 大黃 半兩 荆芥 二兩 烏蛇肉 二兩

川芎 兩半

右如法修製為細末用白米飯搗和為圓如桐子大

每服五十圓茶清送下

通天再造散 治大風惡疾

鬱金 一兩 大黃 一兩 白牽牛 六錢 烏鰂 一兩

選要卷一 二十六

右為末每服五錢日未出面向東以無灰酒調服盡

量為度至晚必利黑頭小蟲或如魚腸臭惡物忌食

毒物半年但食稠粥軟飯漸漸皮膚毛髮如常甚著

不過三兩次服須將息戒房室勞力及終身不可食

牛馬驢犬等肉

醉仙散 治大風疾遍身癰疹瘰癧麻木

胡麻子 牛蒡子 枸杞子 蔓荊子 各一兩

白茯苓 苦參 括實根 防風 各半

右為末每十五錢末入輕粉一錢拌勻每服一錢茶

清調下晨午各一服後五七日先於牙縫內出臭

黃延渾身疼痛昏悶如醉次後利下膿血惡臭氣病根乃去

按丹溪方輕粉二錢藥八味各半兩前四味為粗末炒紫色為度云須量人大小虛實與之證候重而急者須先以再造散下之候補養得遂復與此藥服此藥須斷鹽醋諸般魚肉椒料果實煨燒炙燂等止可淡粥及煮菰苽菜亦須淡食茹亦不可食惟諸般蛇以淡酒蒸熟食之可以助藥

樺皮散 治肺臟風毒遍身瘡疥及癰疹癢搔之成瘡又治面上風刺及粉刺

選要卷一 二十七

樺皮

四兩燒灰

荆芥穗

二兩甘草炙半兩

杏仁

二兩去皮尖用水於銀鍋內裝取出微令乾

枳殼

四兩去穢用炭火燒存性取出濕紙上令冷

右除杏仁另研極細外都搗羅為末入杏仁研勻每服二錢食後溫酒調下

升麻湯 治諸風熱癩肌肉極熱體上如鼠走口反縱皮色變皆治

升麻

三兩

茯神

去皮

人參

防風

犀角

鎊

羚羊角

鎊

羌活

各二兩官桂半兩

右為粗末每服五錢水二鍾薑三片入竹瀝少許煎

八分去滓溫服不拘時

花蛇膏

治風疾癰病遍身生瘡

白花蛇

四兩酒浸

天麻

七錢

荆芥

薄荷

各二錢半

右為細末好酒一升蜜四兩銀石器內裝成餅每服一酒盞溫服日二次煎餅壓下急於煖處汗出効

選要卷一 二十八

諸寒門

夫寒者乃天地嚴凝殺厲之氣也人以腎為根本惟腎則受寒惟寒則傷腎腎氣一虛寒邪交作急痛拘攣戰掉強直昏迷厥冷口噤失音此中寒也無汗惡寒頭疼面慘發熱拘急手足微冷此感寒也霍亂轉筋洞泄下痢乾嘔吐逆積飲停痰此寒邪入於腸胃也或為疝瘕或為脚氣痿痺或為腰膝冷痛或為虛勞陰痿或小腹急痛皆寒邪所為也惟腎氣不充踈於謹護非特霜凝冰沍之謂寒或者炎天暑月當風取涼卧地受冷寒邪之氣自皮膚而入經絡自經絡

○選要卷下 二十九

而入臟腑然後諸病作焉治法中寒者宜溫中禦寒如四逆理中湯圓或加桂附丁香茱萸之類甚者足厥冷腹中絞痛脣青氣冷可急於臍下三寸丹田穴上灸之俟其手足溫煖為度或二五壯壯或百壯視其輕重施之或用熨法亦可其感寒者當以五種止氣十神之類發散之若其他所感變證甚多當從各證門類而治之

附子理中湯 治五臟中寒口噤強直失音不語手足厥冷

附子 炮 大 人參

乾薑 炮

甘草 炙

白朮 各二錢

右咬咀分二貼每貼水二鍾煎至八分溫服如口噤指開口灌之

沉附湯 治虛寒無陽胃弱乾嘔

附子 炮

乾薑 炮 各半

沉香

白朮 各二錢 半

甘草 炙 一錢

右咬咀分二服每服用水二鍾生薑五片煎至八分食前服

生料五積散 治感冒寒邪頭疼身痛項強拘急惡寒

吐逆腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風無問內傷生冷

○選要卷一 三十

外感風寒及寒濕客於經絡腰脚酸疼及婦人經血不調或難產並治之

白芷 七分 陳皮 一錢

厚朴 薑 炙 八分

桔梗 九分

枳殼 半 枳實 八分 川芎 七分

甘草 炙 六分

茯苓 八分

蒼朮 二錢 羌活 八分 當歸 八分

麻黃 一錢

肉桂 六分

芍藥 八分 乾薑 炮 八分

半夏 湯洗 七次 七分

右作一服水二鍾生薑三片煎白三至煎二鍾不拘時服

理中湯 治五臟中寒口噤失音四肢強直兼治胃脘

停痰冷氣刺痛

人參

乾薑炮

甘草炙

白木各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

本方中加陳皮青皮各等分名治中湯治法同

若為未糊圓如梧桐子大每服八十圓米飲送下

名理中圓治中寒腹痛

正氣散 治傷寒陰證增寒惡風正氣逐冷

半夏湯泡

厚朴各三兩同為末以生薑四兩研爛同為餅子微炒

藿香葉

白木

陳皮各一兩

甘草各一兩

右為末每服四錢水一鍾半生薑三片棗一枚煎七分

分食前服常服除瘟疫

選要卷一 三十一

理氣治中湯

治寒氣攻心嘔逆心腹絞痛或泄瀉四

肢厥冷或疝氣攻築小腹疼痛並宜服之

青皮去穢

陳皮去白

人參

白木炒

乾薑炮

甘草炙各一錢

木香七分

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食前

溫服

肉桂散 治傷寒服冷藥過多心腹滿脹四肢逆冷昏

沉不識人變為陰毒惡證

肉桂三錢

白芍藥

陳皮

前胡

當歸

附子炮

人參各一兩

白木

木香

厚朴製

良薑各三錢

吳茱萸各二錢

右為粗末每服五錢水二鍾生薑三片紅棗三枚煎

至八分溫服不拘時

溫中湯 治病入脉沉遲或紫苔是胃中寒也及胃膈

滿悶身體拘急手足逆冷急宜溫之

丁皮

厚朴各一兩

乾薑炮

白木

陳皮

丁香各二錢

右為細末每服二錢蔥白煎湯調下不拘時

木附理中圓 治中寒急心腹痛

人參

附子炮去皮

乾薑炮

白木

選要卷一 三十二

甘草

木香

丁香各等分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服六七十圓用

白湯食前送下

沉香桂附圓

治中寒心腹冷痛霍亂轉筋等證

沉香

附子炮去皮

乾薑炮

良薑炒

官桂去麋皮

茴香炒

川烏頭炮去小塊如豆大

吳茱萸湯洗炒

右各等分為細末醋煮麋糊為圓如梧桐子大每服

五七十圓米飲下空腹食前日進二服忌生冷硬物

製法 治三陰中寒一切虛冷厥逆嘔噎陰盛陽虛及

陰毒傷寒四肢厥冷臍腹痛咽喉疼嘔吐下痢身背
強自汗脉沉細脣青面黑諸虛冷證皆宜用之

肥蔥細切 麥麩各三升 滄鹽二兩

右三件入水一大盞同和拌勻濕分作二次於鑊鍋
內同炒極熟用重絹縫作二包將一包熱熨臍上冷
更易一包蔥包既冷再用鹽水拌濕炒焦依前用之
至煤爛不用別取蔥麩日夜不住相續至身體溫熱
脉壯陽氣復來而守正氣養之和之

選要卷一 三十三

中暑門

夫暑者熱也夏令炎火之氣也按潔古云靜而得之
為中暑動而得之為中熱東垣謂避暑於深堂大厦
得之曰中暑宜以大順散主之曰中勞役得之曰中
熱白虎湯主之此其大法也有冒暑有中暑有傷暑
三者輕重之分腹痛水瀉者胃與大腸受之惡心嘔
吐者胃口有痰飲此二者冒暑也以黃連香薷飲五
苓散主之蓋黃連退熱香薷消暑五苓利水也或身
熱頭痛躁亂不寧身如針刺者此為傷暑即熱傷分
肉也以黃連解毒湯白虎湯加柴胡氣虛加人參主

選要卷一 三十四

之或咳嗽發寒熱汗出不止脉數者熱在肺經大承
金也或脉虛身寒即暑傷元氣也此為中暑宜以清
肺湯有熱加柴胡或天水散之類有寒宜冷香飲子
及加桂附主之若其人元氣素虛因於暑熱四肢困
倦不思飲食此熱傷脾胃也以清暑益氣神中益氣
湯之類主之若脾胃不和嘔吐不食宜以六和湯縮
脾飲之類調之若卒中昏冒倒仆角弓反張不省人
事手足或發搐搦此為暑風不可作風治之當以黃
連香薷飲加羌活服之自然愈矣方見于後

香薷飲

治一切暑熱腹痛霍亂吐利煩心等證

香薷 一斤 厚朴 薑製 白糯米 各半

右咬咀每服三四錢水二鍾煎八分不拘時服加黃

連四兩名黃連香薷飲最解秋暑

黃連香薷飲一兩加羌活二錢治暑風不省人事手足
搐搦

五物香薷湯 驅暑氣和脾胃

香薷 三兩 白糯米 厚朴 薑製 茯苓 各一兩半

甘草 炙一兩

右咬咀每服七錢水二鍾煎至七分去粗不拘時服

十味香薷飲 治伏暑身體倦怠急神昏頭重吐利

○選要卷一 三三五

香薷 一兩 人參 陳皮 白木

茯苓 黃芪 木瓜 厚朴 薑製

白糯米 炒 甘草 炙各半兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至八分不拘時服

清暑益氣湯 治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦精

神短少懶於動作胃滿氣促肢節疼痛或氣高而喘

身熱而煩心下膨悶小便赤而數大便溏而頻或痢

或渴不思飲食自汗身重

黃芪 升麻 蒼木 各一錢 人參 薑製

白木 神麴 炒 陳皮 各半錢 甘草 炙

黃蘗 麥門冬 當歸 各三分 葛根 一分

五味子 九箇 澤瀉 五分 青皮 二方

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分食遠服

冷香飲子 治老人虛人伏暑煩躁引飲無度惡心疲
倦服涼藥不得者

草果仁 五錢 附子 炮去 橘紅 甘草 炙各一錢

右咬咀作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾去粗并

水沉冷旋旋服不拘時

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止霍亂吐瀉和脾胃

胃

○選要卷一 三三六

砂仁 草果 烏梅肉 各二錢 甘草 炙一錢

白糯米 炒 乾葛 五分

右咬咀作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時

服

消暑十全散 治伏暑胃氣不和心腹滿痛

香薷 白糯米 炒 厚朴 薑製 甘草 炙

紫蘇 白木 茯苓 香薷

木瓜 檀香 各一錢

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食遠

服

竹葉石膏湯 治伏暑內外熱熾煩躁大渴

石膏 半兩 麥門冬 去心 人參 去蘆各 甘草 炙

半夏 湯洗七次

右咬咀作一服水二鍾生薑五片青竹葉十四片梗米一撮煎至一鍾不拘時服

人參益氣湯 治暑熱傷氣四肢困倦嗜卧兩手指麻木

黃芪 二錢半 甘草 二錢半 人參 一錢半 升麻 七分

白芍藥 一錢 五味子 二十 柴胡 八分

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分不拘時服

選集卷一 三十七

清暑六和湯 治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐

泄瀉寒熱交作痰喘咳嗽胃脘痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜卧倦怠小便赤澀并傷寒陰陽不分冒暑伏

熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食並皆治之

縮砂 半兩 杏仁 去皮尖 人參 去蘆

赤茯苓 去皮 藿香 去土 白糯米 炒 香薷

厚朴 去皮 木瓜 各一錢 甘草 炙五分

右咬咀作一服水一鍾生薑五片棗一枚煎至八分不拘時服

大順散 治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕不教不分

香薷散 治陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

甘草 七兩 乾薑 杏仁 去皮尖 肉桂 去蘆皮

右先將甘草用白蜜炒次入乾薑却下杏仁同炒過用篩篩淨合桂為細末每服二三錢不拘時白湯調下

香薷飲子 治大人小兒伏暑吐瀉虛煩悶亂

人參 去蘆 茯苓 去皮 甘草 炙 紫蘇

澤瀉 香薷 半真麴 白糯米

烏梅肉 木瓜 厚朴 去皮

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至八分

選集卷一 三十八

分食前服

五苓散 治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤色

澤瀉 二兩 肉桂 一兩 赤茯苓 白木

猪苓 各一兩

右咬咀每服五錢水二鍾煎至八分食前服或為末

每服二錢白湯調下一方加辰砂名辰砂五苓散

五苓湯 治暑病嘔惡每遇夏月不進飲食疲倦少力

凡目色則頭昏痛惡心多睡

茯苓去皮各半兩

已上五味咬咀分二服每服用二盞水煎取一盞去粗放冷候日午時先取香熟甜瓜一枚切去皮作十二片先嚼瓜一片呷藥一二呷送下了再如前嚼瓜一片呷藥一二呷看喫得幾片以藥汁盡為度不損脾胃不動臟腑須是覺大煩時服之

春澤湯 治伏暑發熱煩渴引飲小便不利兼治傷寒陰陽不分疑似之間最宜服此

澤瀉三錢 猪苓二錢 茯苓一錢 白朮二錢

桂心一錢 人參一錢半 柴胡一錢 麥門冬一錢

選要卷一 三十九

渴甚去桂加五味子黃連各二錢

右咬咀每服七錢水一鍾半燈心二十莖煎一鍾食遠服

香薷圓 治大人小兒傷暑伏熱燥渴昏悶頭目昏眩

胃膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋並宜服之

香薷一兩 紫蘇去蘆梗 乾木瓜 藿香洗淨

茯苓去水 甘草炙 檀香剉 丁香各半錢

右為細末煉蜜和圓如雞頭子大每服一圓至二圓溫湯下或新汲水化下亦得小兒每服半圓不

拘時候

辰砂益原散 治伏暑煩渴引飲小便不利心神恍惚

辰砂三錢 滑石六兩 甘草一兩

右為細末每服三錢不拘時白沸湯調下

二氣丹 治伏暑傷冷二氣交錯中脫痞悶或頭痛惡心並皆治之

礞石 硫黃各等分

右為末銀器內文武火炒令鴉黃色再碾細用糯米

煮糊為圓如梧桐子大每服四十圓新汲水送下

來復丹 治伏暑傷脾水瀉腹痛陰陽不分此藥大有

選要卷一 四

神効

方見痼冷門

中濕門

夫濕者火土相蒸之氣也在天為濕在地為土在人為脾體虛之人或為風雨所襲或則卑濕之地或涉大水或薄或汗出沾衣侵淫脾腎皆能成濕夫濕能傷脾脾土一虧諸證生焉滯而為喘嗽漬而為嘔吐滲而為泄瀉溢而為浮腫濕鬱脾中則發黃濕流腎內則重着身重腰痛濕入關節則一身盡痛挾風則頭目昏眩嘔噦心煩兼寒則拳攣掣痛無汗惡寒帶熱則煩渴引飲心腹疼痛多汗中濕之證其脉多沉緩而微其證四肢重痛不舉法當利其小便或輕汗以散之或溫燥以除之經云治濕不利小便非其治也其方于後隨證治之

防已黃芪湯 治風濕相搏客於皮膚四肢少力關節煩疼

防已二錢 黃芪四錢 白朮三錢 甘草一錢

右作一服水一鍾生薑三片芍藥一箇煎至一鍾不

拘時服

羌活勝濕湯 如脊痛項強腰似折項似拔上衝頭痛及足太陽經不行

羌活

獨活各二錢 藁本

防風

蔓荊子

川芎各一 甘草炙半錢

作一服水二鍾煎至一鍾食後溫服如身重腰沉沉然乃經中有濕氣也如黃蘗一錢附子半錢蒼朮二錢

滲濕湯 治坐卧濕地或為雨露所襲身重脚弱關節疼痛發熱惡寒或多汗惡風或小便不利大腑痞泄

白朮三錢 乾薑炮 白芍藥 附子炮去

白茯苓去步 人參各一錢 桂枝不見 甘草炙半錢

作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

清燥湯 六七月之間濕令大行子能令母實而熱旺濕熱相合而刑庚大腸故寒涼以救之燥金受濕熱

之邪寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰以下痿軟癱瘓不能行走不正兩足欹側以此藥主之

蒼朮米泔浸一錢半 五味子十四 線黃芪 黃連

白朮 橘皮 白茯苓去步 當歸各一

人參 生地黃各七 麥門冬各七 神龜步

猪苓 黃蘗酒炒 甘草 澤瀉各半

柴胡 升麻各三分

作一服水二鍾前至一鍾食前服

生附湯 治受濕腰疼痛

附子 生用 牛膝 酒浸

厚朴 薑製 乾薑 生用

白朮 茯苓

甘草 炙 蒼朮 炒

杜仲 薑炒 各

右咬咀每服五錢水一盞半生薑二片棗一枚煎至

八分去粗食前服

除濕湯 治寒濕所傷身體重著腰脚痠疼大便溏泄

小便赤澀

半夏 麴炒 一 厚朴 薑製 一 蒼朮 炙 一 藿香 一 錢

選要卷一 四三

陳皮 錢半 白茯苓 二錢 白朮 二錢 甘草 一錢

作一服水二鍾生薑七片紅棗一枚煎至一鍾食前

服

腎著湯 治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便

自利

乾薑 炮 茯苓 七錢 各 廿草 炙 白朮 各一

作一服用水二鍾煎至八分食前溫服

乳香沒藥圓 治遠年近日風濕脚氣攻注脚膝或腫

或痰筋攣不能屈伸脚不能踏地及一切疼痛不已

乳香 另研 沒藥 另研 骨碎補 去毛 五靈脂 去

砂仁 白附子 甜瓜子 牛膝 酒洗

當歸 酒洗 木瓜 地龍 去土 木龍子 炒

白牽牛 炒 三兩

右為細末酒糊圓如梧桐子大每服二十圓溫木瓜

湯下或溫酒亦得食前服

木瓜虎骨圓 治寒濕合而成痺脚痛不仁疼痛少力

足下癢痛不能踏地腰腿筋攣不能屈伸及項背拘

急手臂無力耳內蟬鳴頭眩目旋及脚氣行步艱難

木瓜 血竭 另研 沒藥 另研 虎脰骨 酒洗

木香 自然銅 醋淬 楓香 骨碎補 去毛

選要卷一 四四

當歸 酒洗 甜瓜仁 敗龜板 炙 肉桂 各一

安息香 酒炒 乳香 另研 地龍 去土 右為末酒糊圓如梧桐子大每服五六十圓食前溫

酒送下

除濕丹 治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脈拘急

津液凝澀便溺不利目赤癰疹疥癬走注脚氣濕骨

治之

檳榔 甘遂 威靈仙 澤瀉

赤芍藥 蒼朮 乳香 沒藥 各一

產牛 五錢 大戟 炒 三 陳皮 去白

右為末麪糊為圓如梧桐子大每服五六十圓漸加
八九十圓食前溫白湯送下服藥後忌酒濕麵二三
日一方有澤瀉陳皮各一兩無事磨
瓜蒂搗爛法 治傷濕鼻塞頭痛
右用甜瓜蒂為末令病人口含水搗一字在鼻中流
出黃水効

醫方選要卷之一

醫方選要卷之一

醫方選要卷之二目錄

傷寒門 附論

桂枝湯 麻黃湯 麻黃桂枝各半湯

柴胡桂枝湯 十神湯 養正氣散

人參敗毒散 香蘇散 升麻葛根湯

小柴胡湯 大柴胡湯 小青龍湯

大青龍湯 小承氣湯 大承氣湯

調胃承氣湯 白虎湯 黃連解毒湯

參蘇飲 十味和解散 十味芍蘇散

真武湯 四逆湯 溫膽湯

醫方選要卷之二目錄

大羌活湯 竹葉石膏湯 半夏瀉心湯

桃仁承氣湯 柴胡飲子 犀角地黃湯

小陷胃湯 大陷胃湯 小建中湯

玄參升麻湯 茵陳湯 抵當湯

奪命獨參湯 神効沃雪湯 桔梗枳殼湯

百合知母湯 百合散 梔子豆豉湯

瘧疾門 附論 七寶飲 四獸飲 清脾湯

人參養胃湯 小柴胡湯 濟生清脾湯

鼈甲飲子 驅瘴飲 常山飲

醫方選要卷之二

傷寒門

良醫副周文朱編集

經云冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃為傷寒耳又云冬不藏精者春必病溫夫中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變為溫病至夏變為暑病暑病者熱極重於溫也世醫均謂之傷寒也是以辛苦之徒房勞之人春夏多溫熱病皆由冬時觸寒不謹密所致也夫傷寒脉尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發以其脉上連風府故頭項痛腰脊強入寸俱長者陽明受病也當

卷之二

傷寒門

二三日發以其脉挾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得以尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脉循脇絡於耳故脅痛而耳聾此三經皆受病未入於腑可汗而已尺寸俱沉細者太陰受病也當四五日發以其脉布胃中絡於心故腹滿而噎乾尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脉貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脉循心器絡於肝故煩滿而囊縮此三經皆受病已入於腑可下而已若兩感於寒者一日太陽受之即俱病則頭痛口乾煩滿

卷之二

傷寒門

而渴二日陽明受之即與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日少陽受之即與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死其不兩感於寒更不傳經至七八日六經之邪漸退至十二日病人精神爽慧而愈也夫時行者春時應暖而復太寒夏時應大熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長切之病多相似者此則時行之氣也其證初感風寒傷寒相似但治法各不同耳凡傷寒初感頭項強無汗惡寒乃寒傷也宜麻黃湯汗之若自汗出謂之風傷衛也宜桂枝湯解之若在平表裏往來寒熱胃脇痛而耳聾此屬少陽也宜以小柴胡湯和解之若口嘔潮熱不惡寒反惡熱大便實者此屬陽明也宜用大柴胡湯或承氣之類隨病輕重下之至如傳入三陰經或熱深入裏至變為狂斑發黃譫語口燥煩渴諸熱等證又當以黃連解毒白虎承氣茵陳梔子等苦寒之藥隨證治之若傳入陰經身無大熱自利不渴或手足厥冷自汗亡陽宜用理中四逆輩或加桂附溫之至若時行之病初得之亦頭疼發熱惡寒身痛或嘔吐或胃滿皆其候也宜用十神散蘇

五積正氣敗毒之類發散之最為穩當然傷寒之病傳變證候甚多又當於仲景傷寒論活人指掌等書中參攷之茲不盡述

桂枝湯 治傷寒中風病頭痛發熱汗出惡風者

桂枝 芍藥 各二錢半 甘草 錢三

右作一服水二鍾生薑三片棗二枚煎至八分不拘時服

麻黃湯 治傷寒病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘者

麻黃 三錢 桂枝 二錢 杏仁 去皮 甘草 炙 各錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

選要卷二 三

麻黃桂枝各半湯 治傷寒七八日發熱惡寒如瘧狀

但不嘔小便清利六脉雖微而惡寒此乃陰陽俱虛不可更發汗及吐下此藥主之

麻黃 去節 桂枝 芍藥 各二錢半 甘草 炙 二錢

杏仁 十箇

右以咀作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾

不拘時服

柴胡桂枝湯 治傷寒六七日微有惡寒發熱表證未

解者

柴胡 三錢 芍藥 二錢 桂枝 甘草 炙

黃芩 各一錢半 半夏 一錢 人參 一錢
右以咀作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食遠服

十神湯 治傷寒時令下溫疫妄行感冒發熱或欲出疹不問陰陽兩感風八並皆治之

川芎 麻黃 乾葛 紫蘇

赤芍藥 升麻 白芷 甘草 炙

陳皮 香附 各半錢

右以咀每服一兩水一鍾生薑五片煎至八分不拘時服若發熱頭疼加連翹煎白二根中滿氣實加枳

選要卷二 四

散煎

藿香正氣散 治傷寒頭疼日寒壯熱或感濕氣霍亂

吐瀉常服除山嵐瘴氣

藿香 二錢 紫蘇 一錢 厚朴 薑汁 茯苓 去皮

陳皮 白芷 半夏 湯泡 桔梗 去蘆

大腹皮 白木 各一錢 甘草 炙 二錢

右以咀作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至八

分不拘時服

人參敗毒散 治傷寒頭痛壯熱惡寒及風痰咳嗽鼻

塞聲重如心中蘊熱口舌乾燥者加黃芩

柴胡

甘草

桔梗

人參

羌活

去苗

川芎

茯苓

枳殼

前胡

獨活

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至八分不拘時服

時服

香蘇散 治四時傷寒頭痛發熱惡寒

紫蘇

香附

陳皮

甘草

右咬咀每服八錢水二鍾生薑三片白芷二根煎至七分食前熱服如頭疼加川芎白芷各一兩名芎芷香蘇散

香蘇散

選要卷二

升麻葛根湯 治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱及瘡疹已發未發皆可服之

升麻

芍藥

甘草

乾葛

右咬咀作一服水二鍾生薑三片煎至八分不拘時服

小柴胡湯 治傷寒熱如瘧胃脘滿痛小便不利大便澀脇下痛

柴胡

黃芩

人參

半夏

甘草

右咬咀作一服水二鍾生薑三片煎至八分不拘時服

柴胡

甘草

右咬咀作一服水二鍾生薑三片煎至八分不拘時服

分食遠服

大柴胡湯 治傷寒十餘日不解邪熱結在裏身熱譫語大便不通繞臍刺者

柴胡

黃芩

大黃

枳實

芍藥

半夏

右咬咀作一服水二鍾生薑五片煎至八分食前服

分食前服

小青龍湯 治傷寒表證不解心下水氣乾嘔發熱咳嗽微喘又治肺經受寒喘急

麻黃

細辛

乾薑

芍藥

桂枝

肉桂

芍藥

甘草

五味子

右作一服水二鍾煎至八分食遠服

大青龍湯 治傷寒頭痛發熱惡寒無汗煩躁六脈浮

紫

麻黃

石膏

杏仁

甘草

桂枝

大棗

生薑

右咬咀作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

小承氣湯 治傷寒潮熱譫語大便六七日不通有燥

糞結滯此藥主之

大黃

厚朴

枳實

右吹咀作一服用水二鍾煎至一鍾食前通口服
大承氣湯 治陽明裏熱大便五六日不通日晡潮熱
譫語煩躁發渴

大黃 厚朴各三錢 枳實 芒硝各二錢

右吹咀作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服
調胃承氣湯 治傷寒不惡寒但熱十餘日過經譫語
當和胃氣

大黃 甘草 芒硝

右吹咀作一服用水二鍾煎至一鍾食前服
白虎湯 治傷寒脈浮滑者表裏有熱若汗下吐後七

八日不解熱結在裏大渴舌上乾燥欲飲水者宜服
之

知母 石膏 甘草 粳米

右吹咀作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服加人參
二錢名白虎加人參湯又名化斑湯治傷寒發斑口

燥煩渴

黃連解毒湯 治傷寒雜病熱毒煩悶乾嘔口燥呻吟
喘滿陽厥極深蓄熱於內傳為陰毒並皆治之

黃連 黃芩 山梔 黃蘗

右吹咀作一服用水二鍾煎至一鍾如腹滿嘔吐或

欲作利者加半夏三枚厚朴二錢茯苓二錢生薑三
片煎熱服名曰半夏黃連瀉心湯

參蘇飲 治感冒風邪發熱頭痛咳嗽聲重涕唾稠粘
此藥大解肌熱快膈

人參 紫蘇 茯苓 半夏

前胡 乾葛 枳殼 甘草

陳皮 桔梗 木香

右吹咀作一服用水二鍾生薑三片煎至八分不拘
時服

十味和解散 治感冒風寒頭疼發熱發散風邪

白朮 桔梗 人參 甘草

陳皮 枳殼 赤芍藥 厚朴

當歸 防風

右吹咀作一服用水二鍾生薑三片葱白三根煎至
一鍾不拘時服

十味芍蘇散 治四時傷寒發熱頭痛

川芎 紫蘇 桔梗 柴胡

茯苓 半夏 枳殼 陳皮

乾葛 甘草

右作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至八分食

遠服

真武湯 治傷寒數日已後發熱腹痛頭目昏沉大便

自利小便或利或澀或嘔或咳或已經汗不解仍復發熱心下忪悸頭目眩暈皆由渴後飲水停留中脘所致宜服之

芍藥 二錢 茯苓 二錢半 小便自利者去之

附子 炮去皮臍 生薑 三錢 白朮 二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服若咳者加五

味子一錢半乾薑二錢細辛一錢二分若下利者去

芍藥加乾薑三錢半若嘔者去附子加生薑三錢半

卷之二 九

四逆湯 治傷寒大下汗後自利清穀身疼身體微重

不渴四肢拘急手足厥冷乾嘔腹滿脉沉者

甘草 炙三錢 乾薑 炙三錢 附子 生用半箇

右作一服水二鍾煎至八分食遠服

溫膽湯 治傷寒一切病後虛煩不得睡卧兼治心膽

虛怯

半夏 湯泡 茯苓 去皮 陳皮 去白 枳實 炒各

甘草 半錢 竹茹 一錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

大羌活湯 解利兩感傷寒神方天之邪氣感則害人

五臟以是知內外兩感腑臟俱病欲表之則有裏欲

下之則有表表裏既不能一治云兩感者不治然

所稟有虛實所感有淺深虛而感之深者必死實而

感之淺者猶或可治治之而不救者有矣未有不治

而獲生者也予嘗用此間有生者十得二三故立此

方以待好生君子用之

羌活 獨活 防己 防風

黃芩 黃連 蒼朮 白朮

甘草 炙 川芎 細辛 各三錢 生地黃

知母 各一兩

卷之三 十

右以咀每服五錢水二鍾煎至一鍾執服不解再服

三四解之亦可病愈則止若有餘證並依仲景隨經

法

竹葉石膏湯 治傷寒已經汗下表裏俱虛津液枯竭

心煩發熱氣逆欲吐及諸虛煩熱並宜服之

方見中暑門

半夏瀉心湯 治心下痞滿而不痛乾嘔者

半夏 湯洗七次 人參 去蘆 甘草 炙 乾薑 炮

黃芩 各二錢 黃連 一錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二箇煎至一鍾不

拘時服

桃仁承氣湯 治傷寒蓄血熱結膀胱其人如狂但小腹結血下之愈

桃仁去皮 甘草各一 芒硝二錢 大黃四錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

柴胡飲子 治傷寒過經不解發熱煩躁大便不通

柴胡去蘆 人參去蘆 黃芩 當歸

芍藥 甘草各一 大黃二錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

犀角地黃湯 治傷寒蓄血大便黑及衄血脉微發狂

身黃當汗不汗內有瘀血

犀角如無升麻代之 生地黃 牡丹皮 芍藥各一

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

小陷胃湯 治小結胃病心下痞滿而軟按之則痛脉浮滑者

半夏湯洗 黃連二錢 栝蒌實三錢

右作一服水一鍾先煮栝蒌至一鍾半後入諸藥煎至一鍾不拘時服

大陷胃湯 治傷寒太陽表證未解醫反下之結胃熱實心下痛按之石硬脉沉而緊者

大黃七錢 芒硝三錢

右作一服水二鍾先煎大黃至一鍾去粗下硝再煎一沸下芒遂末不拘時服快利為度

小建中湯 治傷寒陽脉滯陰脉弦腹中急痛二三日中午悸而煩自汗者

芍藥三錢 桂枝 甘草二錢 膠飴一升

右作一服水二鍾生薑五片棗一枚煎至一鍾去粗下膠飴再煎化不拘時服

玄參升麻湯 治傷寒失下熱毒在胃發斑甚則煩躁譫語咽痛

玄參 升麻 甘草各一

選要卷二

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

茵陳湯 治陽明裏熱極甚煩渴鬱留飲不散以致濕熱相搏而身發黃疸但頭汗出身無汗小便不利渴飲水凝身必發黃宜茵陳湯主之

茵陳去梗 大黃二錢 大梔子五箇

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服以利為度若合五苓散名茵陳五苓散治法同

抵當湯 治傷寒太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胃其人發狂熱在下焦小腹硬滿小便自利

大黃七錢 芒硝三錢

右作一服水二鍾先煎大黃至一鍾去粗下硝再煎一沸下芒遂末不拘時服快利為度

小建中湯 治傷寒陽脉滯陰脉弦腹中急痛二三日中午悸而煩自汗者

芍藥三錢 桂枝 甘草二錢 膠飴一升

右作一服水二鍾生薑五片棗一枚煎至一鍾去粗下膠飴再煎化不拘時服

而狂大便黑色為有血也當下瘀血宜服之

大黃酒洗一兩 水蛭十枚炒去子并碎用石版炒妙

黃蠶十箇去足妙 桃仁七箇去皮尖

右作二服每服水二鍾煎至七分不拘時服若利下血再不可服

奪命獨參湯 治傷寒汗下後終日昏悶不省人事發

執發渴以有狂言一切危急之證宜服此藥服後額上鼻尖有微汗是其應也

揀人參一兩

右咬咀作一服用水一鍾半煎至七分去滓溫冷不

拘時服再煎服神効

神効沃雪湯 治傷寒陰陽二證未辨時行疫厲惡氣

相傳服之如湯沃雪此藥功力不可具述

蒼朮剉者 乾薑炮

甘草炙各 厚朴去皮

防風嫩者

白芍藥去皮 葛根各四兩

右咬咀每服四錢水二鍾煎至八分去滓熱服之不

拘時服少頃取生薑蔥作羹或粥投之避風坐臥身

體微潤即愈如疫氣正相傳染清晨進一服為佳

桔梗枳殼湯

治結胸心下痞欲死者

枳殼麩炒 甘草炙各

右咬咀作一服水一盞半生薑三片煎至七分去滓

不拘時服或不用生薑亦可痰多加半夏生薑有熱

加黃芩

百合知母湯 治百合傷寒已經汗後病人飲食復不

能食常默默欲臥復不能臥欲行復不能行有寒如

無寒有熱如無熱欲食或美不美如強健人而臥不

能行口苦小便赤藥入口即吐利此因虛勞大病之

後不平復變成此疾名百合病宜服

百合七枚 知母一兩

右先將百合擘碎用新汲水二盞浸一宿常有白沫

出去却沫水了却用新汲水二盞煮百合取汁一盞

去粗盛於淨器中又將知母亦用新汲水二盞煮取

一盞去粗後將百合知母汁相和同煎取一盞不拘

時分作二服服之

百合散 治傷寒百合病一月不解變如渴疾

百合 栝蒌根各一兩 牡蠣粉各一兩 麥門冬去心

山梔仁各七錢半 甘草炙半兩

右咬咀每服五錢水一盞入生薑三片竹葉十四片

煎至六分去粗不拘時服

梔子豆豉湯

治發汗吐下後虛煩不得眠及發顛倒

心中懊懷此藥主之

肥梔子四箇 香豉 半兩

右作一服水二鍾先將梔子煎至八分入豉同煎至七分不拘時服

通鑑卷二十一
十五

瘧疾門

瘧之為病其名不一有瘧瘧寒瘧濕瘧牝瘧牡瘧也夫瘧瘧者但熱不寒嘔而肌肉消瘦也寒瘧者無汗惡寒掌痛面慘先寒後熱也濕瘧者身重肢節煩疼嘔逆腹脹也牝瘧者寒多不熱氣虛而泄慘悽振振也牡瘧者飲食不節肌飽勞傷表裏俱虛也名雖不同其感受未有不由風寒暑濕六淫七情肌飽勞役而成也經云夏傷於暑秋必瘧瘧體虛之人易於受感脾胃不和痰留中脘因於風寒發為斯疾其初發也欠伸惡寒戰慄頭痛或先寒後熱或先熱後寒或單寒或單熱或寒多熱少或寒少熱多或一日一發或二日三日一發一日一發者受病淺則易治二日三日一發者受病深則難愈大抵瘧脉皆弦若弦而數者多熱弦而遲者多寒弦而緊者宜下弦而遲者宜溫弦而浮大者宜吐治瘧之法宜先發散寒邪及消化宿積痰飲寒多宜四獸飲養胃湯之類熱多宜小柴胡湯清脾湯之類久不愈方可用截法或吐法若截之太早則邪氣停蓄變生他證慎之慎之須待發之勢緩然後可截也亦有久瘧不愈致損元氣變成勞瘵者宜補養之或截之吐之尚不能愈則當調理

脾胃補養氣血佐以化痰消積之劑調之久則自然得汗而愈矣經云養正積自除此之謂也

七寶飲 治一切瘡或先寒後熱或先熱後寒不問寒瘡食瘡並皆治之

常山 去苗 厚朴 薑製 青皮 去穢 陳皮

甘草 炙 檳榔 草果 各一錢

右咬咀作一服於未發隔夜用水一鍾酒一鍾煎至一鍾去粗露宿再將粗如前煎另放亦露一宿來日當發之早湯溫面東先服頭服少歇再服藥粗大有神効

金鑑卷二十一

四獸飲 治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏發為瘡疾

人參 白朮 茯苓 橘紅

半夏 湯泡 草果 各一錢 烏梅 一錢 甘草 半錢

右作一服水二鍾生薑七片紅棗三枚煎一鍾不拘時服

清脾湯 治因食傷脾停滯痰飲發為寒熱瘡

厚朴 四兩 烏梅 半夏 湯泡 青皮 去穢

良薑 各二 草果 一兩 甘草 炙半

右咬咀每服七錢水二鍾薑三片棗二枚煎八分未

發時服

人參養胃湯 治瘧疾寒多熱少者必須先服此藥

人參 土蘆 厚朴 薑製 陳皮 各一錢 蒼朮 湯泡

茯苓 去皮 半夏 湯泡 草果 藿香

甘草 炙半

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

小柴胡湯 治瘧疾熱多寒少或單熱頭痛曾滿咽乾

方見傷寒門

濟生清脾湯 治瘧瘧來弦數但熱不寒或熱多寒

金鑑卷二十一

少口苦咽乾小便赤澀

青皮 去穢 厚朴 薑製 白朮 半夏 湯泡

黃芩 草果 柴胡 茯苓 各一錢

甘草 炙半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食遠服

發時飲子 治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰

瘧母

薑甲 醋炙 白朮 草果 檳榔

川芎 芍藥 厚朴 製 橘紅

甘草 炙各一錢 黃芪 一錢

右作一服用水二鍾生薑七片棗二枚煎至八分食

驅瘧飲 治諸瘧久瘧不愈者

草果 青皮去穢 陳皮 人參去蘆

茯苓去皮 半夏梨 厚朴梨 蒼朮炒

檳榔 白朮 甘草各一兩 良薑三錢

右又咀每服七錢水二鍾生薑五片棗二枚烏梅一箇煎至八分食遠服

常山飲 治瘧疾發散不愈漸成癆瘵

常山 知母 甘草各一兩

良薑 烏梅肉各五錢

右又咀每服七錢水二鍾生薑五片棗二枚煎至八分稍冷服

草果飲 治諸瘧通用

草果 白芷 良薑 青皮去穢

川芎 紫蘇 甘草各一錢

右作一服用水二鍾煎至八分食遠服

白朮散 治風寒入留經絡胸衛氣相併日發瘧疾寒

熱交作

麻黃 白朮 茯苓 桂心各一兩

陳皮 青皮去穢 桔梗 白芷

甘草炙 半夏 紫蘇 烏梅肉各八分

乾薑五分

右作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八分食

遠服

老瘧飲 治久瘧結成癥瘕癖在胃腸諸藥不愈者

蒼朮米泔 草果去皮 桔梗去蘆 青皮去穢

陳皮 良薑各一錢 白芷 茯苓去皮

半夏湯洗 枳殼炒 甘草炙 桂心

乾薑炮 紫蘇 川芎各五分

右作一服用水二鍾入鹽少許煎至八分食前服

桂枝黃芩湯 治瘧疾服藥寒熱轉大者知太陽陽明

少陽三陽合病也當以此藥治之

桂枝一錢 黃芩 半夏泡 人參各二錢

柴胡六錢 石膏四錢 知母一錢 甘草炙一錢

右又咀分作二服每服用水二鍾生薑三片煎至一

鍾食遠服

萬安散 治一切瘧疾得病之初以其氣壯進此藥以

取効氣虛胃弱及妊婦不宜服之

蒼朮米泔 厚朴薑汁 陳皮 檳榔

常山 酒浸 甘草 炙各一錢半

右以咀水二鍾煎至一鍾去粗露一宿臨發早溫服

忌熱物片時

勝金圓 治一切寒熱瘧疾胃膈停痰發散不愈者

檳榔 四兩 常山 一斤酒浸蒸焙

右為細末用麴糊為圓如梧桐子大每服三十圓當

發前一日臨卧時用涼酒吞下便睡至四更再吞一

服忌食熱物生冷

剋効餅子 治一切瘧疾發作有時先覺伸欠乃作寒

慄鼓振顫頤頷中外皆寒腰脊俱痛寒戰既已內外皆

選要卷二 二十一

熱頭痛如破渴欲飲冷或痰聚胃中煩滿欲嘔或先

熱後寒或先寒後熱或寒多熱少或熱多寒少或寒

熱相半或但熱不寒或但寒不熱或一日一發或一

發後六七日再發皆治之

甘草 炙 菜豆末 荷葉 五錢 定粉 研

龍腦 研 麝香 研各半兩 金箔 二十五信砒 醋煮一

硃砂 研一兩

右為細末煉蜜搜和每兩作二十圓捏匾以金箔為

衣每服一餅以新水磨化日發者未發前服之間日

者不發夜服隔數日發者前一日夜服連日者清晨

服

辰砂丹 治瘧疾久不愈者

硃砂 一兩用信砒 醋煮 雄黃 各五錢

右三味研極細入白麴六錢滴水成圓如菜豆大硃

砂為衣每服一圓至夜星宿全時無根水吞下

驅瘧丹 治久瘧不愈

常山末 草果末 菖蒲末 菜豆粉 各一

信砒 醋煮

右用稀麴糊搜和分作一百二十餅每用一餅用茶

清浸露一宿臨發日五更冷服痰飲在上即吐痰飲

選要卷二 二十一

在下即瀉小兒用一角依前法服忌雞魚濕麵猪

肉

諸痢門

痢之為病古方所謂滯下是也其病多由感受風寒暑濕之氣及飲食不節有傷脾胃宿積鬱結而成也其為證也大便窘迫裏急後重數至圊而不能便腹中疼痛所下或白或赤或赤白相雜或下鮮血或如豆汁或如魚腦膿血相雜或如屋漏水此為感之有輕重積之有淺深也古方謂赤者屬熱白者屬寒赤白者寒熱相雜劉河間以為赤白痢皆屬熱而無寒內經亦以為熱多而寒少丹溪以為有挾虛挾寒者不可執一而論也大抵此疾外感天地六氣內傷飲食

選要卷二 三

食積滯豈無寒熱哉要在察脉以驗之若脉數大者為有熱若脉沉細者為有寒若脉大而浮洪及身熱者多難治若脉微小身涼和者則易治若下純血及如屋漏水者亦難治也治之當先疎導其積滯如檳榔木香青皮黃連萊菔等散積導氣當歸芍藥白朮蒼朮之類和血去濕此其大法也若其人素實大便窘重不通亦可微下之以泄其滯也亦有痢而不食名噤口痢最為難治可用敗毒散加陳米煎服多有得生者凡痢疾初起切不可驟用罌粟訶子止瀉之劑恐邪毒停留不泄多致危殆至於日久不愈臟腑

虛脫滑而不禁者亦可用養臟湯木香圓之類收澀之要在臨病審察焉

胃風湯 治大人小兒風冷乘虛客於腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴腹痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血

白朮 白芍藥 川芎 人參

茯苓 去支 當歸 各二錢 肉桂 半錢

右作一服水二鍾粟米一撮煎至一鍾不拘時服

木香化滯湯 治赤白痢腹中疼痛裏急後重大便窘迫

選要卷二 四

木香 七分 檳榔 人參 陳皮

澤瀉 黃連 各錢 白朮 枳殼 各錢

厚朴 薑汁 芍藥 茯苓 各二錢 甘草 七分

右咬咀用水二鍾煎至八分食前服

導氣湯 治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥 三錢 當歸 一錢 大黃 一錢 黃連 三錢

黃芩 八分 木香 檳榔 各七

右作一服用水二鍾煎至八分食前服

木香黃連湯 治下痢赤白裏急後重腹痛小便澀神

効

木香一錢 木通 黃連

枳殼 陳皮錢各半

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服

白木安胃散 治一切瀉痢膿血相雜裏急後重腹中

作痛日夜無度

茯苓 白朮 車前子錢各二 五味子

烏梅錢各一 罌粟殼三錢

右以咀作一服用水二鍾煎至一鍾去粗食前服

芍藥湯 下血調氣洩而使膿血知氣行而血止行血

則便可愈調氣則後重自除

選要卷二 二十五

芍藥二錢 當歸 黃連 黃芩錢各一

肉桂五分 檳榔一錢 甘草炙 木香錢各六

大黃八分

右作一服用水二鍾煎至一鍾去粗溫服如痢不減

漸加大黃

含廩湯 治噤口痢有熱乃毒氣衝心食即吐逆

人參 茯苓 甘草炙 前胡

川芎 羌活 獨活 桔梗

柴胡 枳殼錢各半 陳倉米各等

右以咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至七分去

拒不拘時熱服

石蓮散 治噤口痢症妙

右用石蓮肉不以多少剝去殼皮將肉并心微炒碾

為細末每服二錢陳米飲調下便覺思食此疾蓋是

毒氣上衝華蓋心氣不通所以不食服此藥後心氣

通利當頓下而愈心一方用乾山藥剉如小豆大一半

銀銚內炒一半生用同為細末每服二三錢不拘時

米飲調下治噤口痢神效

真人養臟湯 治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿

血魚腦裏急後重膈腹疔痛或脫肛墜下酒毒便血

選要卷二 二十六

並皆治之

肉桂半錢 人參去蘆 當歸 訶子去核

木香 甘草炙 肉豆蔻錢各一 芍藥

白朮錢各半 粟殼錢各二

右以咀作一服用水二鍾煎至一鍾食前服臟寒者

加附子一錢

木香散 治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水穀不化

腹中痞痛久痢脾滑不禁

木香 赤石脂 訶子 附子錢各半

甘草各一 藿香 肉豆蔻錢各一 當歸二錢

丁香 五分

右作一服用水二鍾生薑三斤棗二枚煎至八分食前服

地榆散 治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下痢膿血赤多白少或純下鮮血裏急後重小便不利

地榆 炒 乾葛 錢各四 乾薑 錢一 當歸 去蘆 錢各二

茯苓 去皮 赤芍藥 錢各三 甘草 錢二 罌粟殼 蜜炒 錢六

右爲細末每服二錢用溫熱水調下不拘時服

升陽除濕防風湯 治大便閉或不通後重數至圍而不能便或少白膿或少有血慎勿利之舉其陽則陰

○選要卷三 主

火自降矣

防風 芍藥 錢各一 白朮 茯苓 錢各二

蒼朮 三錢 甘草 半錢

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分食前溫服

六神散 治瀉痢赤白腹痛不可忍痢久不止者

粟殼 炙一 青皮 去穢 陳皮 去白 烏梅肉

乾薑 五錢 甘草 錢三

右咬咀每服四錢水一鍾半乳香一分同煎至六分

去粗食前溫服

十寶湯 治冷痢如魚腦者三服見效甚疾

黃芪 四兩 熟地黃 酒浸 茯苓 人參

當歸 白朮 半夏 芍藥

五味子 官桂 各一 甘草 半兩

右咬咀每服五錢用水二鍾生薑三片烏梅一箇煎至八分食前服

祕傳斗門散 治八種毒痢臟腑脹痛膿血赤白或下

瘀血或成片子或有五色相雜日夜頻併兼治禁口

惡痢裏急後重久渴不止全不進食他藥不能治者

立見神効

黑豆 炒去皮 乾薑 錢四 罌粟殼 蜜炒 錢六 地榆 炒

合選要卷三 主

甘草 炙各六兩 白芍藥 三兩

右咬咀每服二錢水一盞煎至七分溫服

水煮木香圓 治一切下痢赤白膿血相雜裏急後重

木香 不見火 訶子 煨 當歸 洗去蘆 青皮 去穢

甘草 各二兩 罌粟殼 去穢 蜜二

右爲細末煉蜜爲圓如彈子大每服一圓用水一鍾

煎至六分空心服

變通圓 治赤白痢臍腹痛日夜無度膿血相雜裏急

後重及治腸風下血

吳茱萸 去梗 黃連 肥者去核 剉如豆大

右二味各等分用好酒拌濕過一宿同炒熟各自揀出礪為末各自用粟米飯為圓如梧桐子大每服三十圓如赤白痢相雜各十五圓用甘草乾薑湯下紅痢甘草湯下黃連圓三十圓白痢乾薑湯下茱萸圓三十圓一方為末米飲調下加當歸此方浙西河山純老以傳蘇軾光云數十年救人無數人多求方不敢輕授恐以其藥品之微而忽之軾光每以救人甚効洪氏方亦有脩製湯使少異

萬安圓 治新舊痢疾裏急後重肚腹痛甚

丁香

胡椒 各七粒
巴豆 十四箇
去油 乳香

沒藥 各一錢

右為細末用糯米糊為圓如麻子大每服三五圓空心服赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑湯下忘生冷魚腥之物

芍藥 治一切濕熱痢頻併瘡痛無問膿血並宜服之

芍藥

黃連 去皮各半
當歸 一兩

黃連 各半

石為末滴水為圓如梧桐子大每服三十圓熟水下

食前 駐軍圓 治冷熱不調下痢赤白日夜無度腹痛不可

忍著

黃連 六兩

阿膠 蛤粉

當歸 酒洗

乾薑 炮各三兩

右為細末醋煮米糊為圓如梧桐子大每服五十圓加至七十圓空心用米飲送下

香連圓 治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後重

黃連

十兩 用吳茱萸五兩酒拌 木香 不見火二

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服五七十圓食

前米湯送下

木香豆蔻圓 治臟腑極冷傷傷只落下泄米穀不化

飲食無味肌肉消瘦心多嗔怒婦人產後虛冷下泄

及一切水瀉冷痢脾泄此方於東坡家藏方內言用

此藥與人莫不神應備錄病愈人名姓茲不備述予

用此方十餘年無不取効脾泄者即愈而瀉痢者只

一眼見効惟熱痢熱瀉不治蓋藥性熱也隨證用之

木香

破故紙

良薑

砂仁

厚朴

錢各七

赤芍藥

陳皮

官桂

白木

各半

吳茱萸 湯泡

胡椒 各二錢半

肉桂 各二錢半

檳榔 一兩

右為細末用漿水煮猪肝和藥搜勻仍用些糊為圓如梧桐子大每服五七十圓空心米飲送下

白水調中圓 治脾胃不和心下堅痞兩脇脹滿膈腹
疼痛噎宿腐氣霍亂吐瀉米穀不消久痢赤白膿血
相雜多日羸瘦不思飲食

白朮

半兩

神麴

炒四兩

人參

去蘆

茯苓

去皮

猪苓

去皮

澤瀉

各一錢

木香

二錢

官桂

半錢

甘草

炙去

乾薑

炮各一兩

右為末麴糊為圓如梧桐子大每服五七十圓空心
淡薑湯送下

黃連烏梅圓

治諸熱痢不瘥者

烏梅肉

焙乾

黃連

各四兩

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓食前米
湯送下

戊巳圓

治脾經受濕瀉痢不止米穀不化臍腹刺痛

黃連

去蘆

具菜萸

去梗

白芍藥

各五兩

右為末麴糊為圓如梧桐子大每服五七十圓空心
用米飲湯下日三服

泄瀉門

泄瀉之證其名不同有胃泄有脾泄有大腸泄有小
腸泄有大瘕泄胃泄者飲食不化色黃脾泄者腹脹
滿泄注食即嘔逆大腸泄者食已窘迫大便色白腸
鳴切痛小腸泄者瘦而便膿血小腹痛入瘕泄者暴
急後重數至圓而不能便至中痛是也又有發泄洞
泄腎泄濡泄驚瀉之類名雖不同未有不由脾胃虛
弱飲食不節及為風寒暑濕之氣所傷也如傷於風
其脉必浮下必帶血以胃風湯主之傷於寒脉必沉
細腹中切痛下必青黑以附子理中湯主之傷於
暑則熱沉微煩渴引飲下必如水以五苓散主之復丹
等主之或挾食積而瀉者當以胃中湯下感應圓傷
於濕其脉沉緩腰脚冷痺小便自利不渴下必黃黑
色當以參濕湯正氣散及參朮桂附之劑主之又
有腎泄腰膝重痛面黑臍滑宜以金鎖正元丹二神圓
等主之若脾虛久泄者以四柱散卷附圓之類調之
若有積腹痛脹滿先用消積之藥推之然後補養胃
氣如無積滯惟當以參朮木香芍藥茯苓之類健理
脾胃分利水穀此其治要也

寶腸散 治泄瀉不止

四柱散 治元臟氣虛真陽耗散臍腹冷痛泄瀉不止

茯苓去皮 附子炮去 人參去蘆 木香各五分

一方加肉豆蔻訶子各一錢半名六柱散

右咬咀作一服用水二鍾生薑五片炒鹽三分煎至

八分食前服

良薑湯 治腸胃受風久為殮泄下痢嘔逆腹內疝痛

良薑炮二錢 木香各八分 檳榔各八分 赤茯苓去皮

人參錢半 肉豆蔻煨 吳茱萸湯洗 陳皮去白

砂仁錢各一 乾薑炮五

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分食前溫服

加味五苓散 治伏暑發熱及胃實泄瀉或煩渴小便

不利

赤茯苓去皮 木猪苓去皮 澤瀉 白朮各二錢

車前子 肉桂各一錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二箇煎至一鍾不

拘時服

平胃散 治傷濕泄瀉

蒼朮錢三 厚朴薑製 橘紅各二錢 甘草炙一錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二箇煎至一鍾不

拘時服

小腸湯 治一日大便三四次澹而不多有時泄瀉腹

中鳴小便黃

黃芪三錢 甘草二錢 陳皮一錢 升麻七分

柴胡 當歸 益智各五分 紅花少許

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分食前溫服

人參豆蔻散 治脾胃虛弱臍滑泄

人參 肉豆蔻炮 茯苓去皮 甘草炙

木香 乾薑炮 訶子煨 藿香洗淨

白朮各一錢

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分食前溫服

九寶飲子 分利水殺止泄瀉

栗殼蜜炙 青皮 陳皮 木通各一錢

赤茯苓 黃芪 厚朴製 甘草炙

車前子各一錢

右咬咀用水二鍾煎至八分食前服

調中湯 治腸虛泄瀉止嘔進食

藿香 縮砂 蓬朮炮 乾薑炮

肉桂 茴香炒 草果各一錢 麥芽炒

益智仁 橘紅 蒼朮 神麴炒

桔梗 甘草炙各半錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二箇鹽三分煎至一鍾不拘時服

四神圓 治脾泄腎泄

肉豆蔻麵煨 破故紙炒 木香不見 茴香炒

右為細末生薑煮棗肉為圓如梧桐子大每服七十圓空心鹽湯送下一方木香茴香用神麴麥蘖各炒一兩為圓

縮砂圓 治大便滑泄水穀不化腹中疼痛不思飲食

黃連上 附子地土 吳茱萸湯洗

訶子皮 肉豆蔻兩 乾薑地 木香各半

○選藥卷二 三七

右為細末水煮麵糊為圓如梧桐子大每服五七十

圓食前用米飲送下

實腸圓 治腸胃虛弱腹脹泄瀉時時刺痛

黃連一兩 肉豆蔻麵煨 乾薑地 白茯苓去皮

當歸洗 訶子煨 丁香各半 木香三錢

右為細末用猪膽汁煮麵糊和圓如梧桐子大每服

五十圓空心用米飲下

火輪圓 治腸胃虛寒心腹冷痛泄瀉不止神効

乾薑炮 附子地土 肉豆蔻麵煨

右為末米糊為圓如梧桐子大每服五十圓空心米

湯送下

補脾圓 治滑泄不禁

肉豆蔻麵煨 川厚朴薑製 白薑地 赤石脂

白木各一 神麴炒 麥蘖炒 附子地土

葶藶各五

右為細末醋煮糊為圓如梧桐子大每服五十圓空心用米飲送下

豆附圓 治腸胃虛弱內受風寒水穀不化世瀉注下

肉豆蔻麵煨 附子地土 白茯苓去皮 木香不見

乾薑地 肉桂各二 丁香不見

○選藥卷二 三八

右為細末生薑汁煮麵糊為圓如梧桐子大每服五

七十圓或至一二百圓用生薑湯送下粥飲亦可

霍亂門

夫霍亂者揮霍變亂也其證心腹卒痛嘔吐下利發熱憎寒頭眩暈或瀉而不吐或吐而不瀉先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛則吐瀉俱作甚則轉筋頰頰手足厥逆死生特反掌間耳蓋足陽明屬胃以養宗筋暴吐暴下津液驟亡宗筋失其所養故攣急甚則舌卷囊縮危於風燭矣然亦何以致此哉曰冒傷暑毒露臥卑濕當風取涼風冷邪氣入於腸胃加以嗜好肥腥飲啖生冷居處不節激而發焉於是邪正相干陰陽隔絕中脘閉塞氣不得通吐利暴

選要卷三

五九

作所謂脾受賊邪木來勝土者此也治法宜以霍香正氣散加生薑為上不惟可以溫散風邪抑亦可以調理吐瀉其若傷暑所致未可遽用香薷沉冷之劑自合先治中脘如橘皮半夏生薑之類開散滯結次則以香薷五苓溫服散暑解煩或挾寒氣手足厥逆腹中絞痛宜以四逆理中之類溫之亦不可遽用裝補兜瀉之劑恐補住寒邪邪氣得之愈盛愈作而變證百出矣抑又論之濕霍亂者有吐有瀉死者少乾霍亂者不得吐瀉死者多蓋所傷之物因吐瀉而出泄泄盡則止猶或可治若上不得吐下不得利所傷

之物壅閉正氣關兩陰陽躁擾喘脹其能生乎治之急須以鹽湯灌之令其大吐庶有可生者霍亂之後不可早與飲食恐胃中邪物吐瀉不盡若新穀入胃不能傳化則必危矣慎之慎之病安之後宜以粥飲漸漸養之候其胃氣平復則愈矣其脈浮洪者易治若脈微遲加以氣少不語昏沉者此為難治也

通脈四逆湯

治霍亂多寒身冷脈絕

甘草

附子

桂心

當歸

甘草

白芍藥

木通

細辛

右作一服用水二鍾酒半鍾生薑七片紅棗一枚煎

選要卷三

甲

至一鍾不拘時服

藿香湯 治外感風寒內傷飲食霍亂轉筋嘔吐泄瀉

藿香

厚朴

白朮

茯苓

甘草

紫蘇

大腹皮

白芷

桔梗

半夏

陳皮

肉桂

猪苓

澤瀉

石父咀作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食遠

服

二氣湯 治七情鬱結五臟之間互相剋剋揮霍變亂

吐利交作

半夏湯池

厚朴薑製

芍藥

茯苓錢各

肉桂

紫蘇

橘紅

人參錢各一

右作一服用水二鍾薑七片棗一枚煎至一鍾不拘時服

不換金正氣散

治霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼不上

蒼朮

橘皮

半夏薑製

厚朴薑製

藿香錢各二

甘草錢一

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二箇煎至一鍾食前服

二香散 治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香

白朮

厚朴薑製

陳皮

茯苓去皮

半夏薑製

紫蘇

桔梗去蘆

白芷

香薷

黃連

白扁豆錢各一

大腹皮

甘草錢各半

右作一服用水二鍾生薑五片蔥白三根煎至一鍾不拘時服

加減理中湯 治霍亂嘔吐

人參

乾薑炮

白朮錢各三

甘草錢一

右作一服水一鍾煎至一鍾不拘時服

若為寒氣濕所中者加附子錢一名附子理中湯

若霍亂吐瀉者加橘紅青皮錢各半名治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頻服候吐出令透即進此藥

若嘔吐者於治中湯內加丁皮半夏錢各一生薑十片煎服

若泄瀉者加橘紅茯苓錢各一名補中湯

若溲泄不已者於補中湯內加附子錢一不喜飲食

水穀不化者再加砂仁錢一

若霍亂嘔吐心腹作痛手足逆冷於本方內去白朮

加熟附子錢二名四順湯

若傷寒結胸先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸

吐利後胃痞欲絕心膈高起急痛手不可近者加枳

實白茯苓錢各一名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯內加栝蒌根錢一

若霍亂後轉筋者理中湯內加大煨石膏錢一

若臍上築者腎氣動也去朮加官桂錢一腎惡燥去

朮恐作奔豚故加官桂

若悸多者加茯苓錢一

若渴飲飲水者加木半錢

若寒者加乾薑半錢

若渴飲飲水者加木半錢

若腹滿者去白朮加附子一錢

若飲酒過多及啖炙博熱食發為鼻衄加川芎一錢

若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脉

只用本方

冷香湯 治夏秋傷暑引飲過食生冷脾胃不和遂成

霍亂之證

良薑

附子

地土

甘草

炙

檀香

各二錢

乾薑

地一錢

丁香

三分

草果

半錢

右咬咀分二服每服用水二鍾煎至八分去粗貯瓶

中沉井內待冷服之

○選要卷三

四十三

加味四君子湯 治霍亂吐瀉轉筋腹中痛體重脉沉

而細者

人參

白朮

茯苓

各一錢

甘草

炙

芍藥

良薑

各一錢

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八

分食遠服

回生散 治霍亂吐瀉但有一點胃氣存者服之回生

陳皮

去白

藿香

去土各半兩

右作一服水二鍾煎至八分不拘時服

正胃湯 治霍亂吐瀉不止者

枇杷葉

拭去毛

厚朴

去粗皮

陳皮

去白

桂心

各半錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分不拘時服

訶梨勒散 治霍亂嘔吐脾胃虛冷氣膈不思飲食

訶梨勒

即訶子

人參

各半兩

白朮

陳皮

去白

赤芍藥

乾薑

地一錢

厚朴

製各一兩

甘草

炙二錢半

右咬咀每服四錢用水一鍾生薑三片煎至六分不

拘時服

麥門冬湯

治霍亂已愈煩熱多渴小便不利

麥門冬

去心

茯苓

去皮

半夏

湯泡

陳皮

各一錢

白朮

各一錢半

人參

小麥

甘草

炙

各一錢

右作一服用水二鍾生薑五片烏梅半箇煎至一鍾

不拘時服

止渴湯

治霍亂煩渴

人參

去土

麥門冬

去心

茯苓

去皮

桂梗

各一錢

桔梗根

葛根

澤瀉

甘草

炙

各五錢

右為細末每服二錢不拘時用蜜湯調下

白朮散

治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱

保養衰老及治酒積嘔噦

白朮

茯苓

去皮

人參

藿香

各半兩

茯苓

去皮

人參

藿香

各半兩

各半兩

葛根一兩 不香二錢 甘草一兩

右為細末每服二錢用白湯調下如煩渴加滑石二兩甚者加薑汁續飲之不拘時服

木瓜圓 治霍亂腹中冷氣下利

木瓜乾者一兩 當歸切焙 熟艾微炒 官桂去粗

人參名半 陳橘皮湯浸 高良薑炒 訶梨勒皮

厚朴去粗皮 白朮上各 木香半兩 赤石脂二兩

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服三十圓空心

用米飲送下

人參散 治霍亂身體疼痛四肢逆冷服理中四順不

効者

人參去蘆 白芍藥 當歸剉碎 高良薑名一

附子炮去 陳皮湯浸 桂心 白朮各二

右搗篩每服四錢用水一中盞紅棗三枚煎至六分

去粗不拘時服

活命散 治男子婦人小兒上吐下瀉霍亂不止面色

俱青黑命欲臨死者宜服此藥

防風 羌活 獨活 乾薑

細辛各一 官桂去粗皮 草豆蔻 肉豆蔻

川芎各半 吳茱萸 乾木瓜各一

右為細末每服三錢濃煎木瓜湯空心調連粗服

絞腸沙方 有一證心腹絞痛冷汗出脈悶欲絕俗謂

之絞腸沙今考此證乃名乾霍亂此亦由山嵐瘴氣

或因飢飽失時陰陽暴亂而致急用吐法此法救人

不一

右用鹽半盞以熱湯數盞泡鹽令患人飲盡後却以

雞羽掃咽喉間即時吐所飲鹽湯出盡其證即愈

治霍亂轉筋方

附子炮去 白礬各三 桃枝切細 葱椒切細

垂柳切細 川椒三分 生薑一兩 蔥椒切細

右以水三斗煎三十沸已來看冷暖淋多時為妙

如急即加醋五升同煎用之

醫方選要卷之二

醫方選要卷之三目錄

嘔吐門 附論

藿香安胃散

木香白朮散

丁香養散

大養香散

藿香半夏湯

丁香治中湯

大養胃湯

加味二陳湯

旋覆花湯

竹茹湯

丁香圓

助胃膏

小丁沉圓

開胃圓

參香枳木圓

思食圓

秘結門 附論

三和散

當歸潤燥湯

大黃飲子

導滯通幽湯

雙子卷三目錄

大磨湯

脾約麻仁圓

滋腸五仁圓

疎風散

咳嗽門 附論

華蓋散

溫肺湯

金沸草散

否子湯

橘蘇散

平肺湯

蘇沉九寶湯

人參紫菀湯

桔梗湯

紫菀茸湯

人參平肺散

宣肺湯

知母茯苓湯

加減瀉白湯

清金湯

人參養肺湯

三拗湯

一服散

人參清肺湯

紫蘇半夏湯

人參潤肺散

欬花散

安眠散

人參潤肺圓

杏仁煎

天門冬圓

玉芝圓

人參欬花膏

玉液圓

癆瘵門 附論

樂令建中湯

黃芪鼈甲散

秦光扶羸湯

劫癆散

團參飲子

黃芪益損湯

柴胡梅連散

蛤蚧散

和肺飲子

保和湯

保真湯

太平圓

天門冬圓

潤華膏

麥煎散

人參黃芪散

犀角紫河車圓

百癆散

殺蟲神効散

選要卷三目錄

諸虛門 附論

四君子湯

十全大補湯

黃芪建中湯

人參養榮湯

鹿茸大補湯

黃芪十補湯

大建中湯

黃芪益損湯

固真飲子

八味圓

還少圓

無比山藥圓

加味虎潛圓

沉香大補圓

固真丹

滋陰益腎圓

抽胎換骨丹

加味白沙丹

草還丹

神仙滋補圓

五福延齡丹

滋補地黃圓

四聖朝元丹

從容大補圓

三仁五子圓

十精圓

家傳補腎養脾圓

神仙趙三公草靈丹

神仙延壽丹

免絲子圓

十味滋補丹

秘傳延壽丹

神仙巨勝子圓

何首烏圓

秋石圓

醫方選要卷之三 月錄

選要卷三 月錄

醫方選要卷之三

嘔吐門

良醫副臣周文英編集

夫嘔吐者飲食胃而復逆出也蓋人以胃氣為主受納五穀榮養以骸者也若胃虛之人不能攝養或為寒氣所中或為暑氣所干或為飲食所傷或氣結而痰聚皆能令嘔吐又有痰血停積胃口嘔吐之間雜以涎血亦六胃熱火邪衝上而作嘔吐者經云諸嘔吐逆衝上皆屬於火者是也治法當以脉證辨之中寒則脉沉示四肢厥冷飲食不下當以溫煖之藥調之按暑則脉弦數煩躁而渴法當清涼之停食痰積者則當順氣和胃而消導之積血者化其血大逆者瀉其火此六治要也又有婦人懷妊嘔吐者名曰惡阻或脚氣之心中毒因酒亦皆嘔吐此證多端所感不一須當從其類以求治之斯得之矣

藿香安胃散 治嘔吐不止

藿香

中夏製

厚朴 製

蒼朮

未用

陳皮 錄一

草 分五

右作一服用水

鍾生薑五片棗二枚煎至八分食

遠服

木香白朮散

治嘔而吐食胃持實擊強是無積也胃

強而乾嘔有聲無物彈痰而吐食時實擊注是以腹中痛當以和之一名一食半夏湯

丁香 不見 木香 不見 半夏 二兩 檳榔 二錢

白木 茯苓 各半 甘草 各四

右呖咀每服五錢水二鍾生薑三片煎八分食遠服或為細末每服二錢生薑少藥湯調下

丁香散 治脾胃虛冷嘔吐不食

丁香 不見 乾薑 炮 川烏 炮 甘草 各半

紅豆 去皮 良薑 炮 青皮 去穢 胡椒 各一錢

陳皮 二錢 益智 三錢

○選要卷三

右作一服用水二鍾生薑三片炒鹽二分煎至八分

食遠服

大藿香散 治七情傷感氣鬱在中變成吐作寒熱

眩暈痰滿不進飲食

藿香 水香 不見 白木 各一 半夏 二錢

茯苓 一錢 桔梗 各一 枇杷葉

官桂 甘草 七分

右作一服用水一鍾生薑五片棗二枚煎至八分食

遠服

霍香半夏湯 治胃虛中寒停痰留飲嘔吐噦逆

藿香 二錢 半夏 三錢 丁香 二錢

右作一服用水二鍾生薑七片煎至八分食遠溫服

丁附治中湯 治胃寒停痰嘔吐不已

丁香 不見 青皮 炒 陳皮 炒 白木 煨

人參 錢各二 附子 炮 甘草 一錢 乾薑 炮

右作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食前服

大養胃湯 治飲食傷脾宿食不化朝食暮吐暮食朝

吐上氣復熱四肢冷痺三焦不調及胃虛寒氣在上

憂氣在下二氣並爭但出不入嘔不得食

厚朴 去皮 生薑 各二 肥棗 三兩 白木

○選要卷三

山藥 人參 川芎 橘皮

當歸 五味子 藿香 黃芪

枇杷葉 剉去毛 甘草 各一

右呖咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚煎七

分去粗空心服或為細末米湯調下亦可

加味二陳湯 治胃熱嘔吐不已

半夏 七次 陳皮 各半 茯苓 二錢 甘草 錢一

竹茹 四錢

右呖咀分二服每服用水二鍾生薑七片煎至八分

食遠服

旋覆花湯 治中脘伏痰吐逆眩暈

旋覆花 去梗半夏 湯泡七次 橘紅 乾薑 炮各一錢半

檳榔 人參 白木 甘草 各一錢

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服

竹茹湯 治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不食

葛根 三兩 半夏 湯泡七次 甘草 炙一兩

右呖咀每服五錢水二盞入竹茹如棗許生薑五片

煎至七分去滓取清汁微冷細服不拘時身熱手

足心熱政和中一人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐

藥與飲食俱不下醫者皆進丁香藿香滑石等藥下

選要卷三

四

咽即吐予曰此正汗後餘熱留胃孫兆竹茹湯正相

當爾亟治藥與之即時愈良方槐花散亦相類一方

加棗一枚同煎

丁香圓 治因食冷物凝滯間胃寒不消嘔吐不止

丁香 不見火 木香 不見火 胡椒 藿香

甘草 炙各二錢 乾薑 炮 肉桂 各二錢

右為細末蒸餅打糊為圓如棗豆大焙乾時時乾嚼

不必飲湯水水入即愈吐如覺疲弱更加附子隨意

助胃膏 治嘔吐不食

人參 白木 茯苓 橘皮

砂仁 各二錢 丁香 不見火 木香 不見火 肉豆蔻 各一錢

草果 去皮各一錢半 白豆蔻 一錢

右為細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓生薑煎湯

化下

小丁沉圓 治乾嘔和調胃氣

丁香 不見火 藿香子 炒各半兩 木香 不見火 縮砂仁

白芷 炒 益智 去皮 陳皮 湯浸去白 沉香

甘草 炙 生薑 一斤細切入青鹽四兩拌勻

阿魏 升發為膏

右為細末入阿魏膏拌勻用醋煮麴糊和圓如雞頭

選要卷三

五

實大研丹砂麝香細末各少許同為衣每服一圓細

嚼用薑鹽湯送下空心服

開胃圓 治乾嘔氣逆不止

半夏 麴三兩 人參 一兩 白豆蔻 去皮 陳皮 焙白

白木 各二錢

右為細末用生薑汁同棗肉和圓如梧桐子大每服

二十圓加至三十圓不拘時用粥飲送下

參香枳木圓 開胃進食止嘔吐

人參 木香 不見火 枳實 一錢半 白木 一兩

陳皮 四錢 乾生薑 二錢

右為細末用荷葉包米煨飯和圓如梧桐子大每服

五七十圓不拘時用米湯送下

思食圓 助脾胃消導飲食止吐逆

烏梅肉 五錢

神麴 炒

麥蘖 炒

人參

乾薑 炮

甘草 炙

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服三五十圓食前用米飲湯送下

金匱要略卷三 六

秘結門

秘結之證其名有五有風秘氣秘濕秘寒秘熱秘風秘者風痰結於大腸秘而不通也氣秘者氣滯後重煩悶脹滿大便結燥而不通也寒秘者年高腸冷及痙瘳冷氣結滯大便而不利也熱秘者內腑積熱消耗津液大便結燥而不通也濕秘者濕熱鬱結津液不行大便秘結也比證皆由體虛之人攝養乖方三焦氣滯運掉不行而壅滯於腸胃之間遂成秘結之患又有老年之人新產之婦氣血虛少腸胃枯澀而秘結者不可妄用通利之藥恐傷元氣惟當滋血潤燥而已大抵秘結治法燥則潤之澀則滑之秘則通之寒則溫之熱則涼之風則散之氣則順之要在隨證審察焉

和散 治七情之氣結於五臟不能流通以致脾胃不和心腹痞悶大便秘結

羌活

紫蘇

木瓜

沉香 兩各

木香 下見

白朮

檳榔 各七

川芎 三兩

甘草

陳皮 各七

大腹皮 一兩

右咬咀每服四錢水一鍾半煎至七分食前服當歸潤燥湯 治大便秘結不通

一 生地黃 升麻各一錢半 當歸尾酒洗 麻仁去殼
 熟地黃 大黃煨 桃仁另研 甘草炙各錢
 紅花半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

大黃飲子 治身熱煩躁大便不通

大黃煨二錢 杏仁炒去 枳殼炒 梔子各一錢
 升麻一錢 生地黃錢 人參 黃芩各七

甘草炙五

右作一服用水二鍾生薑五片豆豉二十一粒烏梅一箇煎至一鍾食前服

導滯通幽湯 治大便難幽門不通上衝吸門不開噎

塞不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸 桃仁各一錢 生地黃 熟地黃各二錢
 升麻一錢 紅花 甘草各半

右作一服用水二鍾煎至一鍾去粗調檳榔細末二錢稍溫服

六磨湯 治氣滯腹急大便便秘

沉香 木香不見 檳榔 烏藥
 枳殼 大黃各等分

右各件用熱湯磨細服之

疎風散 治風毒秘結

枳殼剉炒 防風 羌活 獨活
 檳榔 白芷 威靈仙 蒺藜炒去

麻仁去殼 杏仁去皮 甘草炙各

右為籠末每服二錢半生薑五片蜜一匙慢火煎不

拘時服

脾約麻仁圓 治腸胃熱燥大便秘結

麻仁另研 大黃二斤 厚朴薑汁 枳實炒
 芍藥各二兩 杏仁去皮尖炒

右為細末煉蜜為圓如梧桐子六每服三四十圓臨

睡溫湯送下

滋腸五仁圓 治津液枯竭大渴不止通利難

桃仁去皮 杏仁去皮尖 梔子仁各一錢 仁各一錢
 郁李仁炒 陳皮四錢另

右將五仁另研為泥入陳皮末研勻蜜一匙為圓如梧桐子大每服三五十圓空心用茶送下

檳榔圓 治大腸積熱氣壅不運心腹脹滿大便秘結

大黃蒸 黃芩 枳實炒 麻子仁炒
 牽牛炒 檳榔 羌活 杏仁去皮

白芷已上各一兩 人參半兩

右爲細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五七十圓空
心白湯送下

選要卷三

十

咳嗽門

大咳者傷於肺也謂有聲而無痰也嗽者動於脾也
謂無聲而有痰也咳嗽者謂有聲有痰者也蓋因傷
於肺氣動於脾濕而爲咳嗽也肺爲五臟之華蓋聲
音之所從出合於皮毛而司於外故風寒先能傷之
也若腠理不密外爲風寒暑濕之氣所干故能令人
咳嗽傷於風則脉浮憎寒身熱自汗煩躁鼻流清涕
語未竟而咳嗽傷於寒則脉緊無汗惡寒煩躁不渴
而咳嗽傷於熱則脉數煩渴引飲咽燥乾咳唾稠
粘傷於濕則脉細咳則四肢重骨節煩疼又有七情
之氣干於五臟六腑傳於肺經亦能令人咳嗽內經
云五臟六腑皆能令人咳非獨肺也喜傷心者咳而
喉中介介如腫狀不已則小腸受之咳狀與氣俱失
怒傷肺者咳而兩脇下痛不已則膽受之嘔吐苦汁
思傷脾者咳而右腋痛引至肩背不已則胃受之
嘔吐痰沫憂傷肺者咳而喘息不止甚則唾血不已
則大腸受之咳而遺大便也恐傷腎者咳而腰背相
引而痛不已則膀胱受之咳而遺溺也咳而不已則
三焦受之咳而腹滿不欲食治療之法當詳審其
證若小感風寒而得則當發散之內因七情而得又

當隨其各經之證而治之其脉浮緊者為虛寒沉數者為實熱弦滑者為少血洪滑者則多痰大抵咳嗽肺大者易治沉微者難愈必當順氣化痰為要寒者溫之熱者清之肺虛者常補之肺實者宜瀉之又

有停飲而咳嗽者則當消而逐之凡咳嗽初得便不可驟用栗殼訶子之劑止瀉之恐邪氣不得發散而成後患也如或不謹因而咳嗽日久變成癆瘵則難治矣

華蓋散 治肺受風寒咳嗽痰壅

麻黃去節 紫蘇子炒 杏仁皮尖 桑白皮炒

赤茯苓去皮 橘紅絲 甘草一錢

右作一服用水二鍾生薑五片棗一枚煎至八分食後服

溫肺湯 治肺虛感冷咳嗽嘔吐沫

乾薑炮 官桂 半夏薑製 五味子

杏仁去尖 陳皮 甘草以上各一錢五分 細辛

阿膠五錢

右作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至八分食後服

金沸草散 治肺感寒邪鼻塞聲重咳嗽痰已憎寒發熱

熱無汗惡寒煩躁或風熱壅在膈間唾濁痰甚者咯血

荊芥一錢 麻黃 前胡各五錢 甘草一錢

赤芍藥 半夏一錢 旋覆花一錢

右作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至八分食後服

遠服

杏子湯 治一切咳嗽不問外感風寒內傷生冷及痰飲停積悉皆治之

杏仁去皮 人參 茯苓

半夏湯洗 官桂 乾薑 芍藥

五味子 甘草各一錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

治傷風咳嗽身熱有汗惡風脉浮病人挾熱

湯不得者此藥穩當

桑白皮炒 貝母去心 五味子

杏仁去皮 白木已上各一錢半

右作一服用水一鍾生薑三片煎至八分食後服

治咳嗽痰實寒熱性來咽乾口燥

桔梗炒 薄荷

右作一服用水一鍾生薑三片煎至八分食後服

治咳嗽痰實寒熱性來咽乾口燥

桔梗炒 薄荷

紫蘇	烏梅	紫苑	知母
杏仁	桑白皮	五味子	罌粟殼
甘草	桑白皮	五味子	罌粟殼
右作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食後服			
蘇沉九寶湯	治老人小兒素有喘急遇寒喧不常發		
則連綿不已咳嗽哮喘夜不得睡			
桑白皮	甘草	大腹皮	官桂
麻黃	薄荷	陳皮	紫蘇
杏仁	桑白皮	甘草	大腹皮
右作一服用水二鍾生薑三片烏梅一箇煎至八分			
食後服			
人參紫苑湯	治肺氣不調咳嗽喘急久不愈者		
人參	紫苑	桂枝	五味子
杏仁	甘草	砂仁	果殼
右作一服用水二鍾生薑五片烏梅一箇煎至八分			
食後服			
桔梗湯	治肺癰咳嗽膿血咽乾多渴大便難小便赤		
桔梗	貝母	薏苡仁	桑白皮
當歸	枳殼	枳實	防己

黃芪	甘草節	杏仁	百合
右作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食遠服大			
便秘加大黃一錢小便少加木通一錢			
紫苑茸湯	治飲食過度或食煎煇邪熱傷肺咳嗽咽		
痰多唾血喘急胸滿不得安卧			
紫苑	桑葉	欵花	百合
杏仁	阿膠	貝母	半夏
蒲黃	犀角	人參	甘草
右吹咀作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食後			
服			
人參平肺散	治心火剋肺傳為肺痿咳嗽喘急痰涎		
壅盛胃膈痞滿咽嗑不利			
人參	青皮	茯苓	天門冬
陳皮	地骨皮	甘草	五味子
知母	桑白皮		
右作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食遠服			
寧肺湯	治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰涎		
人參	當歸	白朮	熟地黃
川芎	白芍藥	五味子	麥門冬
桑白皮	白茯苓	甘草	阿膠

右次咀作一服用水二鍾生薑三片紫蘇五葉煎至八分食後服

知母茯苓湯 治肺痿咳嗽氣喘不已往來寒熱自汗

知母

白木分

茯苓去皮

五味子

人參

半夏

柴胡

甘草炙

薄荷

川芎

阿膠分

款冬花

桔梗

麥門冬

黃芩以上各七分

右作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食遠服

加減瀉白散 治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐痰喘

桑白皮

地骨皮分

陳皮去白

人參

○選要卷三

十六

甘草各一錢

白茯苓

青皮各一錢

五味子十粒

右作一服用水二鍾加梗米百粒煎至八分食後服

清金湯 治丈夫婦人遠年近日咳嗽上氣喘息喉中

涎聲聲滿氣逆坐卧不寧飲食不下

陳皮去白

薏苡仁

五味子

阿膠成

茯苓去皮

紫蘇

桑白皮

杏仁去皮

貝母去心

款冬花

半夏麩

百合以上各一錢

罌粟殼蜜炙

人參

甘草一分

右作一服用水二鍾生薑三片棗二枚烏梅一箇煎

至一鍾食後服

人參養肺湯 治肺痿咳嗽有痰午後熱并聲嘶者

人參

阿膠分

貝母

杏仁去皮

桔梗

茯苓

桑白皮

枳實

甘草各一錢

柴胡二錢

五味子二十箇

右作一服用水二鍾生薑二片棗二枚煎至八分食

後服

三拗湯 治寒嗽不常暴嗽喘急鼻塞痰壅

麻黃不去節

杏仁不去皮

甘草不炙各二錢半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

一服散 治暴嗽

○選要卷三

十七

阿膠二片

生薑十片

烏梅二箇

甘草一錢

紫蘇十葉

杏仁七箇

大半夏三箇

罌粟殼三箇

右吹咀用水二鍾煎至八分去粗臨睡服

人參清肺湯 治肺胃虛寒咳嗽喘急坐卧不安年久

勞嗽唾痰腥臭

人參

阿膠成

杏仁炒去尖

罌粟殼蜜炙

知母

桑白皮炒

烏梅去核

地骨皮

甘草炙各一錢

右作一服用水二鍾紅棗一箇煎至一鍾食遠服

紫蘇半夏湯 治喘嗽痰涎

紫蘇

半夏湯泡七次

紫苑茸

陳皮去白

五味子各一錢

杏仁去皮尖

桑白皮各二錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分日進三服

人參潤肺散 治咳嗽氣急痰壅鼻塞

人參三錢

麻黃去根

杏仁去皮尖

貝母去心

阿膠蛤粉炒

桔梗去蘆

甘草各一錢

橘紅五分

右作一服用水二鍾紫蘇三五葉煎至一鍾食後服

欬花散 治寒熱交壅肺氣不利咳嗽喘滿痰實涎盛

喉中呀呷宜服之

欬冬花

桑白皮

半夏湯泡

知母各七錢半

選要卷三

人

貝母去心

阿膠蛤粉炒

麻黃各三錢

杏仁去皮尖

甘草各二錢

右作二服每服用水二鍾生薑三片煎至八分不拘

時服

安眠散 治上喘咳嗽久而不愈者

欬冬花

麥門冬去心

烏梅肉

佛耳草各二錢半

陳皮去白

粟殼七錢半

甘草各三錢半

右為細末每服三錢水一盞入黃蠟如棗核許同煎

至八分去粗臨睡溫服

人參潤肺圓 治肺氣不足咳嗽喘急久年不愈漸成

虛癆及瘵風壅痰實頭目眩暈口舌乾燥涕唾稠粘

人參

欬冬花

細辛

杏仁湯洗

甘草各四兩

官桂去皮

桔梗各五兩

知母六兩

右為細末煉蜜和圓如雞頭實大每服一二圓臨睡

細嚼淡薑湯送下

杏仁煎 治老人久患喘嗽不已睡卧不得者服之立

効

杏仁去皮

胡桃肉各等分

右二味共碾為膏入煉蜜少許搜和得所圓如彈子

大每服一圓食後細嚼薑湯送下

選要卷三

人

天門冬圓 治肺寒外內合邪咳嗽聲不出口中如

含霜雪停飲寒痰咽嗆妨悶狀如梅核噎塞不通隔

氣噎氣皆可服之大効

天門冬去心

紫苑去土

百合

杏仁湯洗

麥門冬去心

貝母

人參

半夏湯洗

桔梗各

桂心

阿膠炒

生地黃

陳皮去白

甘草各二兩

右為細末煮糯米粉并黃蠟一兩成粥更入蜜再熬

勻和前藥末圓如櫻桃大每服一圓同生薑細嚼下

臨睡時服咳嗽膿血者極効

玉圓 治風壅痰實頭目昏眩咳嗽聲重咽膈不利

人參

茯苓

白礬

南星

浸焙

薄荷

半夏

右為細末生薑汁煮麩糊為圓如梧桐子大每服五

十圓食後薑湯送下如痰盛躁熱薄荷湯送下

人參欬花膏 治肺受虛寒久嗽不已咽膈滿悶痰涎

嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽及遠年

近日一切嗽病服諸藥不効者皆治

欬花

去梗

麥門冬

去心

五味子

去梗

紫苑

洗

桑白皮

各一

選要卷三

十

右為細末煉蜜為圓如雞頭實大每服一圓細嚼薑

湯送下食後服

玉液圓 治風壅化痰涎利咽膈清頭目止咳嗽除煩

熱

寒水石

煅令赤出火毒

半夏

湯洗

白礬

右研和勻用麩糊和圓如梧桐子大每服三十圓食

後生薑湯送下

癆瘵門

癆瘵之證最為難療得病之由非止一端有因氣體

虛弱勞傷心腎而得者有因外感風寒傷肺咳嗽而

得者有因大病後及瘡疾後不能將理而得者有因

傷力吐血而得者有因色慾過多而得者有因久嗽

不已而得者有因傳染而得者所得之因雖不同而

其為癆則一也其為證也肌體羸瘦皮毛乾枯寒熱

盜汗遺精白濁或腹中有塊或項上結核或咳嗽痰

涎咯唾膿血傳變而為骨蒸尸疰其名狀甚多然所

傷不過五臟故傳於肝者面白目枯口苦自汗心煩

選要卷三

二十一

驚怖傳於心者面黑鼻乾口瘡喜忘大便或秘或泄

傳於脾者面青唇黃舌強喉哽吐涎體瘦飲食無味

傳於肺者面赤鼻白痰咯血喘咳毛枯傳於腎者

面黃耳枯胸滿肝痛遺精白濁此五臟所傳之證形

也又有二十四種骨蒸可因證驗之蒸盡則死矣若

傳屍者名曰復連更相傳染至於滅門者有之素無

治法其證有蟲其形狀不同齒人五臟骨髓人死其

蟲出而復着人也治癆之法當補養其氣血降心火

滋腎水清其骨熱保肺化痰追蠱涼血此其大法也

更能灸膏肓及崔氏四化穴則多有可救者具方于

後隨證用之

樂令建中湯 治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗將成癆瘵此藥大能退熱補虛生血氣

前胡

去蘆

細辛

當歸

白芍藥

人參

陳皮

桂心

麥門冬

黃芪

茯苓

甘草

半夏

右作一服用水二鍾生薑五片棗一枚煎至八分食

遠服

黃芪藍甲散 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗減食多渴咳嗽有血

金匱要略

卷三

二十三

黃芪

藍甲

桑白皮

半夏

秦朮

地骨皮

茯苓

天門冬

人參

赤芍藥

生地黃

桔梗

紫苑

知母

肉桂

柴胡

甘草

八分

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食後服

秦朮扶羸湯 治肺痿骨蒸已成癆嗽或寒或熱聲啞

不出體虛自汗四肢倦怠

秦朮

龍甲

人參

當歸

紫苑

半夏

甘草

地骨皮

紫胡

右作一服用水二鍾生薑五片烏梅紅棗各一枚煎至八分食後服

劫癆散 治心腎俱虛癆嗽時復三四聲潮熱過即

有盜汗四肢倦怠體瘦恍惚異夢喉中有血名曰肺

癆

白芍藥

黃芪

人參

白茯苓

熟地黃

當歸

半夏

五味子

阿膠

甘草

右作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八分食

金匱要略

卷三

二十三

遠服

團參飲子 治憂思喜怒飢飽失宜以致臟氣不安咳

唾膿血增壯熱肌膚消瘦將成癆瘵

人參

紫苑

阿膠

細辛

杏仁

欬冬花

天門冬

桑葉

半夏

五味子

百合

甘草

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食後服

因氣而成咳者加木香

吐血有絲者加生地黃

咳而唾血有痰者加鍾乳粉

因疲極而咳嗽者加黃芪一錢

因損嗽而唾血者加沒藥五分藕節二箇

咳而嘔逆腹滿不食者加白朮一錢仍倍加生薑

咳而小便多者加益智仁八分

咳而大便溏者去杏仁加白朮一錢

咳而氣逆者加沉香七分橘皮一錢

黃芪益損湯 治男子婦人童男室女諸虛不足榮衛

虛弱五勞七傷骨蒸潮熱腰背拘急百節酸疼夜多

盜汗心傷驚悸咽燥骨蒸嗜睡少力肌膚瘦悴咳嗽

多痰咯唾血絲寒熱往來煩赤神昏全不思食服藥

藥者則煩燥衝滿上焦進藥涼者則膈滿而腹痛及

治大病後榮衛不調及婦人產後血氣未復宜服此

藥

黃芪 人參 石斛去根 木香不見火

白朮 當歸酒洗 肉桂 茯苓去皮

芍藥 半夏製 川芎 熟地黃酒炒

山藥 牡丹皮 麥門冬去心 五味子

甘草炙

右以咀作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至八

分食遠服

柴胡梅連散 治骨蒸癆久而不痊三服除根其効如

神又治五癆七傷虛弱羸瘦發熱者宜服之

柴胡 前胡 烏梅 胡黃連各二錢

右以咀作一服用童子小便二盞猪膽一箇猪脊髓

一條韭白半錢同煎至一鍾不拘時服

蛤蚧散 治虛癆咳嗽咯血潮熱盜汗不思飲食

蛤蚧一對洗淨酥炙 人參 百部 款冬花

紫苑各三錢 貝母 阿膠蛤粉炒 鼈甲酥炙

柴胡 肉桂 黃芪蜜炙 甘草炙

杏仁炒去皮尖 半夏製

右以咀每服五錢水二鍾生薑三片煎至八分食遠

服熱甚去肉桂加細辛

和肺飲子 治咯血後肺虛咳嗽多痰

阿膠 人參 麥門冬志 山藥

貝母 茯苓 百合 杏仁去皮炒

甘草炙

右以咀作一服用水二鍾入黃蠟如皂角子大一塊

煎至八分食後服

保和湯 治癆證久嗽肺燥成痿者服之効

知母 貝母 天門冬 麥門冬各二錢

欽冬花^{各三錢} 薏苡仁^{二錢} 杏仁^{去皮} 五味子

甘草 馬兜鈴 紫苑 百合

桔梗 阿膠 當歸 生地黃^{各一錢}

紫蘇 薄荷^{各一錢}

右吹咀每服八錢水二鍾生薑三片煎至八分食後服

保真湯 治癆瘵骨蒸體虛服之決効

當歸^{酒浸} 人參 生地黃 熟地黃

黃芪^{蜜炙} 白朮^{各三錢} 赤茯苓 白茯苓

甘草 陳皮 厚朴 赤芍藥^{各一錢}

選要卷三 主

白芍藥 天門冬^{去心} 麥門冬^{去心} 黃蘗^炒

五味子 柴胡 地骨皮 知母^{各一錢}

右吹咀每服八錢水二鍾生薑三片棗二枚煎至八分食後服

分食後服

大平圓 治癆瘵久嗽肺痿肺癰並宜輸服決定除根

天門冬 麥門冬^{各一錢} 知母 貝母

欽冬花 杏仁^{去皮} 當歸 生地黃

黃連 熟地黃 阿膠^{蛤粉炒} 蒲黃

京墨 桔梗 薄荷^{各一錢} 麝香^{少許}

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服一圓臨睡細嚼

薄荷湯送下

天門冬圓 治吐血咯血大壅肺氣止咳

天門冬^{去心} 杏仁^炒 貝母 茯苓

阿膠^{蛤粉炒} 五錢

右為末煉蜜為圓如彈子大每服一圓食後臨睡皆可一日進二三圓

潤華膏 治一切癆嗽肺痿喘急悉能治之

人參 麥門冬^{去心} 阿膠^{蛤粉炒} 欽冬花

五味子 紫蘇 貝母 杏仁^{去皮}

白礬 百藥煎 栗殼^{蜜炙} 烏梅^{去核}

選要卷三 主

訶子^{去核} 桔梗^{二兩}

右為末煉蜜為圓如彈子大每服一圓臨睡嚼化或

又用白湯化下亦可

麥煎散 治少男室女骨蒸婦人血氣攻注四肢

赤茯苓^{去心} 當歸^{酒浸} 乾漆^{醋炒} 龍甲^{醋炙}

常山 大黃^煨 柴胡^{去蘆} 白朮

生地黃 石膏^{各一錢} 甘草^炙

右吹咀分二服每服入小麥百粒水二盞煎八分去

粗食後臨卧服有虛汗加麻黃根一錢半

人參黃芪散 治虛癆客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心

煩熱口渴咽乾煩赤心忪日晚潮熱夜多盜汗胃膈不利咳嗽膿血稠粘

人參 六分

秦艽

芍藥

茯苓

黃芩 各一錢

知母 八分

桑白皮 九分

桔梗 六分

紫苑 九分

紫胡 一錢

黃芪 各一錢

生地黃 各一錢

半夏 九分

龍甲 各一錢

天門冬 各一錢

生地黄 各一錢

右以咀分二服每服二盞水薑三片煎八分去粗不拘時服

犀角

紫河車圓 治傳尸癆服三月必平復其餘癆證只數服愈

選要卷三

二十八

紫河車 一具

淨洗乾用男婦兒妙

龍甲 酥炙

桔梗

胡黃連

芍藥

大黃

敗鼓皮心 酥炙

貝母

龍膽草

黃藥子

知母 已上各二錢半

廣茂

犀角 各一錢

芒硝 各一錢半

硃砂 二錢

右為末煉蜜和圓如梧桐子大硃砂為衣每服二十圓空心溫酒下

百癆散 治骨蒸癆熱等證

天仙藤

芍藥

川芎

茯苓

半夏 湯洗

黃芪 蜜炒

知母

當歸 酒洗

貝母

五味子

黃芩

地骨皮

柴胡

甘草

白芷

桔梗

人參 各一錢

右以咀每服一兩水二鍾薑三片煎至八分食後服

欬嗽神効散 此方傳之于河源郡王府濟世極多功不可量

不可量

川椒

一升俾去子及合口者炒出干

右為細末每服二錢空心米飲調下必麻痺暈悶少頃不能禁者即以酒糊為圓如梧桐子大每服三五

十圓亦可

選要卷三

二十九

諸虛門

夫虛者虛損也難經所謂五損脈者亦因虛而致損也一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脉血脉虛少不能榮於五臟六腑三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不為肌膚四損損於筋筋緩不能自收持五損損於骨骨痿不能起於床反此者至脈之病也從上下者骨痿不能起於床者死從下上者皮聚而毛落者死治損之法奈何然損其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精此治損之法也夫諸虛與

還要卷三

三

勞極未始不由氣體虛弱心腎有虧水火不自升降而致也或為寒暑勞役所傷或因色慾過度俱能賊真氣以致肌體羸弱腰膝無力小便頻數大便滑泄目眩耳聾遺精自汗甚則虛火上攻面赤發喘此皆諸虛之證也勞極者七情傷乎五臟也盡力謀慮勞傷乎肝應乎筋極曲運神機勞傷乎心應乎脉極意外過思勞傷乎脾應乎肉極預事而憂勞傷乎肺應乎氣極矜持志節勞傷乎腎應乎骨極此五勞應乎五極者也勞極精氣變生諸證治療之法當隨其五臟六腑寒熱調之內經曰形不足者溫之以氣精

不足者補之以味然滋補之藥貴乎平和不可驟用峻補丹石燥熱之劑恐腎水枯竭虛火愈熾惟當斟酌輕重而用之斯得之矣

四君子湯 治肺氣虛損皮聚毛落補益元氣

人參 白茯苓 白朮 黃芪

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食後服

十全大補湯 治男子婦人諸虛不足五勞七傷此藥

性溫補常服生血壯脾胃

人參 肉桂 熟地黃 白芍藥

還要卷三

三十一

川芎 茯苓 當歸 黃芪

白朮 甘草 右咬咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八

分食後服

黃芪建中湯 治男子婦人諸虛不足羸乏少力此藥

大生血補氣榮衛

黃芪 白芍藥 肉桂 甘草

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八

分食後服

人參養榮湯 治積勞虛損四肢倦怠肌肉消瘦而少

顏色淡短氣飲食無味

人參 當歸 陳皮 黃芪

桂心 白木 甘草 白芍藥

熟地黃 茯苓 五味子 遠志

右吹咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至一

鍾食遠服

鹿茸大補湯 治男子諸虛不足婦人亡血一切虛損

鹿茸 黃芪 肉苁蓉 杜仲

白茯苓 當歸 白芍藥 附子

肉桂 石斛 五味子 白木

還要卷三 三十二

半夏 人參 甘草 熟地黃

右吹咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至一

鍾食前服

黃芪十補湯 補虛勞養血氣

黃芪 當歸 熟地黃 扶神

沉香 木香 麥門冬 烏藥

肉桂 五味子 半夏 酸棗仁

白木 人參 白芍藥 陳皮

甘草

右吹咀用水二鍾生薑三片棗二枚煎八分食送服

建中湯 治諸虛不足小腹疼痛脇肋脹骨酸痛短氣喘咳痰嗽潮熱多汗心下驚悸腰背疆直多則少起

黃芪 附子 地骨皮 鹿茸

石斛 人參 當歸 白芍藥

續斷 川芎 甘草

右吹咀作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食遠

服咳嗽者加款冬花八分唾血者加阿膠一錢便

精遺泄加龍骨怔忡者加茯神

黃芪益損湯 治諸虛勞倦

還要卷三 三十三

黃芪 白芍藥 白木 石斛

當歸 川芎 肉桂 熟地黃

半夏 甘草 木香 枳實

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾

食前服有熱加柴胡一錢

固真飲子 治中年已上之人陰陽兩虛血氣不足頭

每痛日晡微熱食少力倦精氣時脫腰痛斷服之

皆每得良驗因錄于左

人參 乾山藥 當歸身 黃芪

熟地黃 黃蘗 白木 澤瀉

山茱萸肉 補腎脂 五味子 陳皮

白茯苓 杜仲 甘草

右以咀作一服用水二鍾於沙鉢或銀器內煎至八

分食前溫服按仙經云服餌不備五味久則臟腑偏

傾而反生疾病矣如服金石之劑久則陽燥或致消

渴瘡癰病變不可勝紀服固本圓瓊玉膏皆天麥門

冬生熟地黃之類雖本於滋陰胃弱者必滯隔而反

食少或經滯而生癰腫服養氣丹安腎圓皆茴香已

戟附子川練之類雖本於助陽久則積溫成熱必耗

損真陰肺痿氣虛痰熱火動不可易治唯已上方廢

幾近理大補原氣不足陰陽兩虛飲食少五心熱自

汗日晡潮熱精氣滑脫行步無力腰膝疼痛泄瀉脉

沉弱嗽少痰多或乾咳者或氣血精神不足肢體倦

怠頭目昏眩食少脉虛而數時發潮熱將成癆證者

或傷力氣虛脉弱腰背疼痛動輒鼻衄者或便血過

多面黃瘦悴食少氣促者或婦人虛瘦悴食少虛

熱自汗腰膝痛面浮腫痛赤白帶下者並宜服之此方

藥備五味合氣中和無寒熱偏併太過不及之失養

氣血理脾胃充益轉運補五臟之真精益三焦之原

氣生津液而熱衛充實利機關而飲食自倍矣

八味圓 治下元冷憊心火炎上渴飲飲水或腎水不

能攝養多吐痰唾及男子消渴小便反多婦人轉胞

小便不通

附子 桂心 牡丹皮 澤瀉

山茱萸 熟地黃 茯苓

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓空心

淡鹽湯送下

還少圓 大補真氣虛損肌體瘦瘠目暗耳鳴氣血凝

滯脾胃怯弱飲食無味並皆治之

牛膝 山藥 白茯苓 山茱萸

肉苁蓉 遠志 茴香 杜仲

楮實子 五味子 石菖蒲 枸杞子

熟地黃 右為細末煉蜜同蒸熟藥肉和搗三二百杵圓如梧

桐子大每服五十圓空心溫酒鹽湯任下

無比山藥圓 治諸虛百損五勞七傷肌體消瘦目暗

耳鳴四肢倦怠常服壯筋骨益腎水

赤石脂 茯苓 山茱萸 熟地黃

巴戟 牛膝 澤瀉 杜仲

毛絲子 山藥 五味子 肉苁蓉

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓空心溫酒送下

加味虎潛圓 治諸虛不足腰腿疼痛行步無力此藥久服壯元陽滋腎水

熟地黃八兩 黃蘗酒炒 人參去蘆 黃芪蜜炙

當歸酒浸 破故紙酒炒 瑣陽酒浸 敗龜板炙

茯苓去皮 杜仲酥炙 牛膝酒浸 知母酒炒

虎脛骨酥炙 山藥炒 枸杞子炒 芍藥各三

兔絲子酒浸 一方加沉香二兩

右為細末煉蜜和猪脊髓一條為圓如梧桐子大每

服五六十圓空心溫酒送下如不飲酒用淡鹽湯送

下

沉香大補圓 專治下焦虛弱補益元氣久服身輕體健五臟調和百脉通泰功效甚妙

黃蘗酒浸 知母酒炒 熟地黃酒炒 人參去蘆

敗龜板炙 沉香 芍藥 陳皮去白

牛膝酒浸 瑣陽酒浸 虎脛骨酥炙 當歸酒浸

山藥去核 山藥 茯苓去皮 牡丹皮

杜仲酥炙 澤瀉 大茴香炒已上

右仕為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五六十圓

空心溫酒鹽湯任下

固真丹 治諸虛百損五勞七傷水火不能升降下元虛冷臍腹疼痛

山藥半兩 人參去蘆 黃芪蜜炙 黃蘗酒炒

白朮 杜仲酥炙 補骨脂炒 白茯苓去皮

牡丹皮 山藥去核 五味子炒 澤瀉各半

熟地黃酒浸 右為細末和地黃膏搜勻入煉蜜為圓如梧桐子大

每服七八十圓空心淡鹽湯送下腰腿無力加牛膝

酒炒敗龜板炙

滋陰益腎圓 補元氣益腎水降心火生精補血壯筋

骨悅顏色益壽延年久服大功效

黃蘗酒浸 兔絲子酒浸 熟地黃酒浸 牛膝酒浸

敗龜板炙 虎骨酥炙 知母酒炒 白芍藥

白朮 山藥 當歸酒浸 枸杞子各三

人參去蘆 黃芪蜜炙 瑣陽酒浸 破故紙酒浸

杜仲酥炙 陳皮各二

右為末酒糊為圓或煉蜜為圓如梧桐子大每服七

八十圓空心淡鹽湯送下

抽胎換骨丸 補元氣固精治遺滑

川椒皮二斤揀去合口者淮慶牛膝一錢半酒

生地黃熟地黃各二

右為末不化鐵器煉蜜為圓如梧桐子大每服四五
十圓空心溫酒送下須從三十圓漸加至五十圓不
可太多

歌曰

其椒備五行 其神通六義 欲知先有以

夜間且不起 服之半年餘 脚心汗如雨

四體去煩勞 五臟無風氣 明目腰不疼

身輕心健記 別更有異能 三年精自砂

金邊卷三 三十八

顏貌若嬰童 精爽又少睡 但服此神妙

一生無瘡癩 若能志心服 三屍自然棄

更有九般蟲 各各自迴避 儻逢此色人

第一須傳意 雖未遇神仙 初緣已得地

加味白沙丹 治男子諸虛不足頭目眩運腰膝無力

小便頻數顏色不完下元積冷小腹急痛四肢痠疼

盜汗遺精

人參去蘆 茯苓去皮 熟地黃酒浸 大茴香炒

甘草炙 川烏炮去 當歸酒浸 山藥已上各

川椒二兩半 蒼朮四兩半

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服四十圓空心
溫白湯送下或溫酒送下

草還丹 益精髓補腎經固元陽輕腰脚安五臟通九
竅令人耳目聰明延年益壽乃仙家之良劑

蒼朮四兩酒浸一兩米泔浸一兩 胡蘆巴酒浸

破故紙二兩酒浸一兩 覆盆子二錢 茴香二兩 川烏一兩

川練子一兩 木香不見火 山藥二兩 穿山甲酥

地龍去土 茯苓去皮 枸杞子三錢 牛膝酒浸

右為細末酒糊圓如梧桐子大每服五十圓空心溫
酒或鹽湯下乾物壓之

金邊卷三 三十九

神仙滋補圓 治三焦不和元氣虛弱常服壯筋骨補

腎水健脾胃進飲食

杜仲酥炙 牛膝酒浸 免絲子酒蒸 肉蓯蓉酒浸

巴戟去心 乾山藥各一兩 人參去蘆 白茯苓皮

生地黃酒浸 熟地黃酒浸 五味子 山茱萸

天門冬去心 赤石脂炒 覆盆子 車前子炒

遠志去心 真施椒炒 石菖蒲去根 澤瀉炒

栝子仁去殼 地骨皮洗淨已上

右二十三味為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三
五十圓空心溫酒或鹽湯送下

五福延齡丹 治一切元氣虛弱五勞七傷身體羸瘦
腰膝痠疼此藥服之百病消除功效不可盡述常服
延年耐老

五味子 二兩 肉從蓉 四兩 遠志 二兩 枸杞子 二兩

熟地黃 二兩 杜仲 三兩 覆盆子 一兩 人茴香 二兩

山藥 三兩 生地黃 二兩 白茯苓 二兩 牛膝 酒浸 二兩

山藥 一兩 兔絲子 三兩 黃蘗 八錢 石菖蒲 二兩

縮砂仁 一兩 知母 一兩 川椒 錢半 木瓜 一兩

人參 二兩

右件為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服四五十圓

空心好酒或鹽湯送下

滋補地黃圓 專治諸虛百損腎經不足腰膝無力久

服能烏髭髮補元氣生精養血延年益壽

熟地黃 酒浸 茯苓 去皮 乾山藥 黃蘗 酒浸

知母 酒浸 枸杞子 七兩 牛膝 酒浸 牡丹皮

當歸 酒洗 山藥 六兩 澤瀉 五兩 敗龜板 酥炙

右件為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓空

心用好酒或淡鹽湯送下

四聖朝元丹 治諸虛不足下元虧損腿脚無力脾胃

虛弱頭目昏眩四肢倦怠常服益精神補元陽清耳

日去下焦濕神効

人參 一兩 茯苓 二兩 沉香 五錢 熟地黃 二兩

木香 二兩 川椒 四兩 何首烏 二兩 核桃肉 三兩

牛膝 酒浸 小茴香 四兩 乾山藥 三兩 杜仲 酥炙

枸杞子 二兩 當歸 二兩 肉桂 一兩

蒼朮 一兩 酒浸 四兩 醋浸 四兩 鹽湯浸 四兩 才附

右件各製度為細末用好酒糊為圓如梧桐子大每

服五十圓空心用溫酒送下如不飲酒用淡鹽湯送

下

從容大補圓 治陰陽偏勝上盛下虛久服寧心養腎

滋補氣血調和陰陽

當歸 酒洗 熟地黃 酒浸 人參 去蘗 兔絲子 酒浸

巴戟 去心 鹿茸 酥炙 石蓮肉 志 黃芪 蜜炙

龍齒 茯苓 去皮 五味子 遠志 心 去苗

山藥 酸棗仁 二兩 肉從蓉 二兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓空

溫酒或淡鹽湯送下

三仁五子圓 治血氣耗損五臟不足睡中驚悸盜汗

常服養心益腎生血補氣

兔絲子 酒煮 五味子 沉香 覆盆子

枸杞子	當歸 <small>酒洗</small>	車前子	酸棗仁
鹿茸 <small>酥炙</small>	栝子仁	蕙苡仁	茯苓 <small>去皮</small>
肉苁蓉 <small>酒洗</small>	熟地黄	巴戟 <small>去心</small>	乳香 <small>剉碎 各三兩</small>
右件為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服六十圓空心淡鹽湯送下			
十精圓 此藥升降陰陽既濟水火調和氣血平補心腎			
遠志 <small>去心</small>	白茯苓 <small>去皮</small>	青鹽 <small>炒別研 已上各二兩</small>	當歸 <small>酒洗</small>
牛膝 <small>酒洗 已上各二兩</small>	破故紙 <small>炒</small>	益智仁 <small>一兩</small>	免絲子 <small>酒洗 二兩</small>
石菖蒲 <small>五錢</small>	山茱萸 <small>五錢 去核</small>		
右為細末用獾猪腰子一雙去膜和酒研爛者麪糊為圓如梧桐子大每服五十圓空心用淡鹽湯或好酒送下			
家傳補腎養脾圓 治腎經虛損腰脚無力脾土虛弱飲食少進常服補腎養脾益氣血長精神此藥不寒不熱大有功效			
人參 <small>去蘆</small>	黃芪 <small>蜜炙</small>	白朮 <small>已上各二兩</small>	熟地黄 <small>四兩</small>
當歸 <small>酒洗 二兩</small>	知母 <small>酒炒 一兩</small>	肉苁蓉 <small>酒洗 三兩</small>	黃蘗 <small>酒洗 一兩</small>
肉桂 <small>七錢半 去皮</small>	白茯苓 <small>三兩</small>	杜仲 <small>一兩半 去絲</small>	乾山藥 <small>三兩</small>
破故紙 <small>半炒 二兩</small>	芍藥 <small>一兩</small>	川牛膝 <small>酒洗 一兩半</small>	五味子 <small>一兩</small>

沉香 <small>七錢</small>		甘草 <small>五錢</small>	
右件為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服六十圓空心溫酒或鹽湯送下			
神仙趙三公草靈丹 此藥延年益壽添精補髓烏髭髮堅牙齒壯筋骨助氣血返老還童久服耳目聰明身體強健冬不畏寒夏不畏熱其効神異			
白茯苓 <small>二兩 去皮</small>	川椒 <small>四兩 去目</small>	川芎 <small>三兩</small>	甘草 <small>二兩 炙</small>
小茴香 <small>二兩 炒</small>	蒼朮 <small>二兩 米泔浸</small>	枸杞子 <small>二兩 酒洗</small>	山藥 <small>二兩</small>
熟地黄 <small>二兩</small>			
右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五六十圓溫酒或淡鹽湯送下			
神仙延壽丹 此藥常服祛除百病延年益壽			
天門冬 <small>去心 各二兩</small>	遠志 <small>去心</small>	乾山藥	巴戟 <small>各二兩 志各</small>
赤石脂 <small>煨</small>	車前子	石菖蒲	栝子仁
澤瀉	川椒 <small>炒 去日</small>	生地黃	熟地黄 <small>酒洗</small>
枸杞子 <small>酒洗</small>	茯苓 <small>去皮</small>	覆盆子 <small>已上各二兩</small>	川牛膝 <small>酒洗 去苗</small>
杜仲 <small>各三兩 去絲</small>	兔絲子 <small>酒洗</small>	肉苁蓉 <small>酒洗 四兩</small>	當歸 <small>酒洗</small>
地骨皮 <small>洗淨</small>	五味子	人參 <small>去蘆</small>	山茱萸 <small>去核</small>
右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五六十圓空心溫酒或淡鹽湯送下			

神子圓 此藥能補骨髓續絕傷補五臟去百病明
視聽益顏色輕身延年生精補腎

石蓮肉四兩 山藥四兩

免絲子十兩 白茯苓三兩

右為細末用蒸餅打糊為圓如梧桐子大每服五十
圓用淡鹽湯空心送下

十味滋補丹 一名十精圓

此藥能補五臟真氣益精

神養氣血延年耐老

枸杞子酒蒸 茯苓去皮

熟地黃酒洗 甘菊花去梗

肉桂去皮 天門冬去心

免絲子酒蒸 川椒去目及

肉苁蓉酒洗 山茱萸去核已上

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服四五十圓空

心鹽湯送下

秘傳延壽丹 治腰膝無力腎氣虛憊及寒濕腳氣久

服壯筋骨益氣血能食少睡

松香凡水煮七次

熟地黃酒洗焙乾

烏梅蒸爛去核

破故紙酒炒焙乾

杜仲酥炙去絲

平胃散細末

右件和勻用好酒打糊為圓如梧桐子大每服五十

圓空心溫酒鹽湯任下

神仙巨勝子圓 安竟定鬼改易容顏通神仙延壽命

添髓駐精補虛益氣壯筋骨潤肌膚髮白再黑齒落
更生目視有光心力無倦行步如飛寒暑不侵能除
百病

巨勝子焙一

生地黃 熟地黃

何首烏各二

枸杞子

免絲子

五味子

酸棗仁

破故紙炒

栢子仁

覆盆子

雞頭實

廣木香

蓮花藥

巴戟天去

肉苁蓉酒洗

牛膝酒洗

天門冬酒洗

官桂

人參

茯苓去皮

楮實子

韭子

天雄炮去

蓮肉

川續斷

山藥已上各

右為細末春夏煉蜜為圓秋冬蒸棗肉入胡桃肉一

十箇搗如泥同藥末和更搗千餘杵圓如梧桐子大

每服三十圓空心用溫酒送下鹽湯亦可日二服如

久服去天雄用鹿茸亦得此藥服後耳聾復聰眼昏

再明服一月元臟強勝六十日髮白變黑一百日容

顏改變目明可黑處穿鍼冬月單衣不寒若將白雞

用藥拌飯喂六十日則變為黑雞矣

何首烏圓 治男子元臟虛損髮白再黑填精補髓

何首烏半斤 肉苁蓉六兩 牛膝四兩

右為何首烏用棗一層何首烏醃內蒸棗軟用竹刀

切焙同為末用棗肉和圓如梧桐子大每服五七同
 爵馬蘭子服酒下食前一服加一圓目三服至四十
 九圓即止却減應數服其効如神修合不可犯鐵器
 秋石圓 益精生血補心腎

秋石 一兩 白茯苓

龍骨 煨 山藥 已上各

沉香 一錢 辰砂 二錢半 別研留一

右為細末鹿角煮酒為圓如梧桐子大每服三四十
 圓空心用溫酒或鹽湯送下

四十六

醫方選要卷之四目錄

脾胃門 附論

參朮調中湯 參朮白朮散 補中益氣湯

養胃湯 四君子湯 平胃散

調中益氣湯 人參益胃湯 升陽益胃湯

人參開胃湯 嘉禾散 加味進食散

人參啓脾湯 木香啓中湯 葛花醒酒湯

感應圓 二十四味養脾圓 紫沉消積圓

參朮壯脾圓 養脾圓 千金大養脾圓

枳木圓 香砂枳木圓 半夏枳木圓

魏薤枳木圓 木香枳木圓 枳朮枳木圓

加味枳木圓 沉香溫胃圓 啓脾圓

木香和中圓 參朮健脾圓 養胃進食圓

香砂理中圓 和中益氣圓

諸氣門 附論

七氣湯 木香調氣散 分心氣飲

木香流氣飲 蟾蜍散 聚香飲子

流氣飲子 指迷七氣湯 紫沉通氣湯

三香正氣散 分心氣飲 四七湯

蘇子降氣湯 雞舌香散 三和散

分氣紫蘇飲	順氣木香散	勻氣散
蘇合香圓	烏沉湯	撞氣阿魏圓
復原通氣散	沉香化氣圓	導氣枳殼圓
木香檳榔圓	沉香降氣湯	木香分氣圓
集香圓	沉香降氣圓	
積聚門 附論		
散聚湯	枳殼散	大七氣湯
半夏湯	枳實散	勻氣湯
蓬莪茂散	奔豚湯	思貴湯
木香化滯湯	廣茂潰堅湯	勝紅圓
香稜圓		
肥氣圓	伏梁圓	三稜煎圓
白豆蔻散	磨積三稜圓	千金不換內消圓
丁香脾積圓		
水腫脹滿門 附論		
葶藶木香散	白木木香散	踈鑿飲子
分氣補心湯	當歸散	蘿蔔子飲
神助散	五皮散	木香分氣湯
中滿分消湯	廣茂潰堅湯	半夏厚朴湯
參香散	大半夏湯	大異香散

中滿分消湯	平肝飲子	大橘皮湯
大沉香尊重圓	十棗圓	茯苓琥珀圓
海金沙散	三花神祐圓	木香分氣圓
沉香琥珀圓	三台散	
醫方選要卷之四目錄 畢		

醫方選要卷之四

脾胃門

良醫副臣周文來編集

大脾胃者屬乎中州土也消化水穀榮養五臟六腑
四肢百骸此上能生萬物之義也經云飲食入胃遊
溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下
輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽按
度以為常也凡人之生皆以胃氣為本又經曰穀入
於胃脉道乃行水入於經其血乃成又曰安穀則昌
絕穀則亡蓋脾胃胃豈可不保養乎保養之法在乎調
其飲食適其寒溫時其飢飽不以生冷傷之不便寒

暑侵之

暑侵之為七情六慾所動則五臟自然平和百病
何由而生矣其或攝生不謹將理失宜或為生冷寒
暑七情六慾所傷則變病百出而脾胃虛矣脾胃既
虛而五臟六腑四肢百骸又將何所榮養耶經云飲
食勞倦則傷脾脾傷則內閉九竅外壅肌肉衛氣解
散此謂自傷氣之劑也蓋飲食傷胃勞倦傷脾治療
之法當審其脾胃之虛實別其所傷之緣由若傷於
飲者飲乃無形之物或微汗散之於表或淡滲利之
於下傷於食者或損穀以和之或強脾以磨之果因
食物停滯甚盛而作悶亂者吐下以奪之傷於寒者

則溫之傷於熱者則清之寒熱共傷者各從其性以
和之傷於魚肉果菜之類求其氣之相剋而相制者
用之如硃砂阿魏消肉積胡黃連麝香消果積至於
酒積食積痰積非神麴麥蘖礞石巴豆之藥又何以
消之是皆有形之物填塞胃腑不能消化必待驅逐
然後得安不可一例過用香燥之藥恐鬱滯久而火
邪盛則反劇矣若夫飲食勞倦傷其脾胃使元氣下
陷而為中氣不足之證又當從東垣治內傷法心用
升補氣血之劑以調之和之溫之養之使生生之氣
增益則脾胃壯而完復矣

參朮調中湯

治脾胃虛弱不進飲食發熱咳嗽氣喘

短氣

黃芪

去蘆

桑白皮

人參

各二錢

甘草炙六

白茯苓

一錢

五味子

二十

白朮

一錢

地骨皮

麥門冬

去心

陳皮

青皮

各八

右以咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八

分食速服

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉

又大病後調助脾胃此藥最好

白朮

人參

甘草炙

乾山藥

白茯苓 白扁豆炒各一錢半 蓮肉去皮 薏苡仁

砂仁 桔梗一錢

右吹咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八

分食遠服或為細末每服二錢食遠薑棗湯調下

補中益氣湯 治中氣不足飲食勞倦清氣下陷以致

脾胃虛弱發熱頭痛四肢倦怠心煩肌瘦日漸羸弱

此藥能升元氣退虛熱補脾胃生氣血

黃芪去蘆二錢 人參 甘草炙各一錢半 陳皮

白朮 當歸各一錢一分 升麻 柴胡各八分

右吹咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八

分食遠服

養胃湯

治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脹痛腸鳴泄瀉

或有外感寒熱如瘧骨節煩疼宜服之

藿香洗去土 厚朴薑製 半夏湯泡七次 茯苓各一錢半

草果去皮 陳皮去白 人參 附子地

甘草炙各一錢半 白朮七分

右吹咀作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至八

分食遠服

四君子湯 治脾胃不和不思飲食

人參去蘆 茯苓去皮 白朮 甘草炙各二錢

右吹咀作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至八分食遠服加陳皮半夏名六君子湯腰滿者減甘草一半

平胃散 治脾胃不和嘔吐惡心不思飲食

蒼朮米泔水浸三錢 厚朴去皮薑製 陳皮去白 甘草炙各一錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食

遠服一方加草果心草果平胃散或為細末每服二

錢用鹽湯調服亦可

調中益氣湯 治脾胃虛弱四肢滿閉肢節煩疼難以

屈伸身體沉重心煩口中無味不思飲食大小便不

調或後泄米穀不化胃滿短氣咽膈不通嗜卧無力

並宜服之

升麻三分 黃芪一錢 甘草五分 蒼朮一錢

木香二分 人參一錢 柴胡 橘皮各八分

右吹咀作一服用水一鍾煎至八分食遠服

人參黃芪湯 治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠

惰腰熱短口不知味腸鳴大便微澀黃色身體昏

悶口乾不喜食冷

蒼朮一錢 當歸 升麻 陳皮各五分

人參 白朮各一錢 柴胡 益智

甘草分各八

12

升陽益胃湯 治脾胃病怠惰嗜卧四肢不收體重節

疼口舌乾燥大小便不調無肺病洒淅惡寒慘慘不
樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃時

值秋燥令行尤宜此服之

自來藥

茯苓

黄氏一钱五分

1

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八
八食遠服

食
參開胃湯 治脾胃不和不思飲食此藥能助胃進

木香

泉

石字朴

1

如五噎五膈並皆治之

方見翻胃膈噎門

加味進食散 治脾胃虛冷及久病入胃弱全不食者

半夏 薑製
草果

附子炮去皮 肉豆蔻

陳皮各八分
人參

右作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八分食

遠服

人參啓脾湯
治脾胃虛弱不進飲食此藥最効

人參去蘆
三錢 白朮

藿香洗淨
砂仁

麥蘖炒
黃連

口渴加乾葛一錢

腹脹加蒼朮一錢米泔浸炒
惡心嘔吐加白豆蔻

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至

鍾食遠服

木香啓中湯 補脾胃進飲食寬膈順氣

木香
人參

茯苓

陳皮 半夏 枳殼 香附子

縮砂 白豆蔻 甘草

右咬咀作一服用水二鍾生薑五片棗一枚煎至八分去粗食遠溫服

葛花醒酒湯 治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胃膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

白豆蔻 砂仁 葛花 木香

陳皮 白朮 青皮 白茯苓

猪苓 澤瀉 神麴 人參

右咬咀每服七錢水二鍾生薑三片煎至八分去粗

食遠服得微汗酒病去矣或為末服亦可

感應圖 治男子婦人小兒停積宿食冷物不能消化

有傷脾胃或泄瀉臭如抱壞雞子或下痢膿血並皆治之

杏仁 百草霜 乾薑 肉豆蔻

巴豆 乾薑 肉豆蔻

木香 丁香

右除巴豆百草霜杏仁三味外餘四味杵為細末同研勻用蠟置先將蠟六兩鎔化作汁以重綿濾淨更

以好酒一升於銀石器內煮蠟鎔滾數沸傾出候酒

冷其蠟自浮於上取蠟稱用凡春夏修合清油一兩

秋冬用清油一兩半於冷銚內熬令香熟次下酒黃

蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末成劑分作小錠子以油單紙裹衣旋圓服餌每服三十圓

空心生薑湯送下

二十四味養脾圓 治風冷寒濕邪氣腹脹痞滿刺痛

腸鳴泄瀉吐逆吞酸羸弱困倦無力不思飲食一切

脾胃之疾宜服之

丁香 沉香 木香 附子

陳皮 大腹皮 神麴 麥蘖

肉桂 白朮 厚朴 訶子

人參 茯苓 砂仁 草薢

白附子 良薑 紅豆 胡椒

草撥 川薑 甘草 生薑

右為細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓細嚼用白

湯送下食前服

紫沉消積圓 治久積伏滯胃膈膨脹心腹滿飲食不

化及治婦人血氣疼痛

沉香 阿魏 巴豆 硃砂

右四味同所用蜜一升酒二盞生熟成膏以磁盒貯

之和下項藥

丹砂研二兩

硫黃去毒

青皮去穢

良薑

檳榔

官桂去皮

人參

木香不見火

胡椒已上各四兩

丁香不見火

乾薑炮各二兩

右十一味同為細末將前四味蜜酒熬成膏和勻搗

千百杵圓如菉豆大每服五七圓不拘時溫橘皮湯

送下如心痛溫酒下婦人血氣當歸湯下一方有沒

藥一兩

參參壯脾圓 治脾胃虛弱胃膈痞悶脇肋脹滿心腹

刺痛翻胃吐食口苦吞酸胃滿短氣肢體怠惰面色

痿黃及中焦痞悶不任攻擊臟腑虛寒不受峻補或

因病後氣衰食不復常或元稟受怯弱不能飲食及

久患瀉痢腸胃虛滑者並宜服之

人參

茯苓去皮

白朮

肉桂不見火

乾薑炮

砂仁

胡椒

麥蘖炒

神麴炒

山藥

白藕豆炒各二兩

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服一圓空心細嚼

用白湯或溫酒送下常服育神養氣和脾補胃進美

飲食

養脾圓 治脾胃虛寒心腹脹滿嘔逆惡心臍寒泄瀉

人參去蘆

茯苓去皮

麥蘖炒已上各四兩

白朮二兩

縮砂去皮

乾薑炮各八兩

甘草炙五兩

右為細末煉蜜為圓每兩作八圓每服一圓不拘時

細嚼生薑湯送下

千金大養脾圓 治脾胃虛弱停寒留飲膈塞氣噎翻

胃吐食常服養脾壯氣多進飲食

枳殼麩炒

神麴炒

陳皮去白

麥蘖炒

三稜煨

茴香炒

白薑炮

肉豆蔻

縮砂去皮

蓬茂煨

茯苓去皮

良薑

益智去殼

胡椒

木香不見火

藿香去梗

薏苡仁

紅豆

白朮

丁香不見火

人參

白藕豆炒

苦楝

山藥

甘草各等分炙

右為細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓食遠細嚼

用白湯或溫酒送下

枳木圓 治胃膈痞滿宿食不消能強胃

枳實麩炒

白朮八兩

右為末荷葉煨飯為圓如梧桐子大每服五六十圓

食遠白湯送下

香砂枳木圓 治脾胃虛弱飲食減少胃膈痞悶

枳實二兩 白木二兩 砂仁 香附子各五錢

右為細末荷葉煨飯為圓如梧桐子大每服五十圓食遠白湯送下

半夏枳木圓 治食冷傷脾胃胃中有痰

白木四兩 枳實二兩 半夏各二兩

右為細末荷葉煨飯為圓如梧桐子大每服五十圓食遠白湯送下

麴藥枳木圓 治飲食過多不能消化以致心腹脹悶不快

神麴炒 麥藥炒 枳實二兩 白木四兩

右為細末荷葉煨飯為圓如梧桐子大每服五十圓食遠白湯送下

木香枳木圓 破痰順氣消化宿滯開胃進食

枳實二兩 白木四兩 木香不見火

右為細末荷葉煨飯為圓如梧桐子大每服五十圓食遠白湯送下

橘皮枳木圓 治老幼元氣虛弱飲食不消或臍膈不調心下痞悶

橘皮 枳實二兩 白木四兩 右為細末荷葉煨飯為圓如梧桐子大每服五十圓

食遠白湯送下

加味枳木圓 治痞消食化痰止嗽寬中利膈助胃和脾

白木二兩 枳實二兩 半夏各二兩 神麴炒

麥藥炒 山查各一兩 薑黃 陳皮各五錢

木香不見火 右為末蒸餅打糊和圓如梧桐子大每服七八十圓食遠薑湯送下

沉香溫胃圓 治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不調和臟腑積冷心腹疼痛大便滑泄腹中雷鳴霍亂

吐瀉手足厥逆大便秘度又治下焦陽虛臍腹冷痛及療傷寒陰濕形氣沉困自汗

沉香 甘草炙 當歸 良薑

三葉更清 人參去蘆 木香不見火 茯苓去皮

白木 白芍藥各一兩 附子炮 巴戟酒浸

乾薑炮 茴香各一兩 官桂半兩 丁香六錢

右為細末用好醋打麵糊和圓如梧桐子大每服五十圓空米飲送下口忌生冷之物

啓脾圓 治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心腹膨脹腸鳴泄瀉不思飲食服此最良

人參

白朮

青皮

陳皮

神麴炒

麥蘖炒

砂仁

乾薑炮

厚朴薑汁炒

甘草炙

右為細末煉蜜為圓如梧子大每服一圓食前細嚼

米飲送下

木香和中圓 治病久虛弱懨懨不能食而臟腑或秘

或澹此胃氣虛弱也常服則和中理氣消痰去濕厚

腸胃進飲食

厚朴製一兩

白朮一兩

半夏製

陳皮去白

檳榔四錢

木香二錢

甘草炙

右為末薑汁浸蒸餅和圓如梧子大每服五七十

圓食前白湯送下

參朮健脾圓 滋養脾胃補益元氣進美飲食溫中下

氣膈腹冷痛亦能治之此藥溫補可宜常服

蒼朮八兩

白朮二兩

人參

白朮

白茯苓

乾山藥

破故紙酒浸

枸杞子

兔絲子酒浸

蓮肉去心

川練子半兩

五味子

牛膝各一兩

川椒去目

小茴香鹽炒

陳皮

木香不見火

遠志炙

右為末酒糊為圓如梧子大每服八十圓至一百

圓空心鹽湯送下以乾物壓之

養胃進食圓 治脾胃虛弱心腹脹滿面色痿黃肌肉

消瘦怠惰嗜卧全不思食常服滋養脾胃進美飲食

消痰逐飲辟風寒濕冷邪氣

蒼朮五兩

神麴二兩

白茯苓去皮

厚朴薑製

大麥蘖炒

陳皮去白

白朮二兩

人參炙

甘草炙

右九味為末水麴糊為圓如梧子大每服三十圓

至五十圓食前溫薑湯送下粥飲亦得

香砂理中圓 治脾胃虛弱感寒停飲心腹卒痛手足

厥冷嘔吐清水飲食不進

人參

乾薑炮

甘草炙

白朮已上各

木香不見火

砂仁已上各

右為細末煉蜜為圓如梧子大每服七八十圓空

心白湯送下

和中益氣圓 治脾胃不和氣不升降嘔吐減食口苦

吞酸胃滿短氣肢體怠惰面色痿黃中焦虛痞不任

攻擊臟氣久寒不受峻補又療心胃痞滿如滿五飲

停滯不散常服和中益氣進美飲食或大便不通尤

宜服之

木香不見 丁香各半 肉豆蔻 茴香微
 京三棱炮制 白豆蔻 人參天蘆 官桂去粗皮
 縮砂仁二兩 青皮去穢 陳皮玉白各
 右為細末用白麪糊為圓如梧桐子大每服六十圓
 至七十圓食遠用溫生薑湯送下

諸氣門

夫氣者周流一身以為生者也陽往則陰來陰往則
 陽來一升一降無有窮也人稟天地陰陽之氣以生
 藉血肉以成其形一氣周流於其中以成其神形神
 俱備乃為全體苟內不動於七情外不感於六淫其
 為氣也何病之有至若調攝非宜致生多證故舉痛
 論云百病皆生於氣是也夫怒則氣上喜則氣緩憂
 則氣散悲則氣消恐則氣下寒則氣收火則氣泄驚
 則氣亂思則氣結此九氣之不調也體虛之人而為
 七情六淫所干以致發而為諸氣證或為脹滿或為

喘促或為水腫或為痰痛以致為膈為噎為痞為癥
 為嘔吐為積聚為泄為厥為痰為風其證不可勝數
 惟當隨其諸證而治之故婦人宜耗其氣而調其經
 男子宜養其氣以全其神惟氣得煖則行貴乎流通
 者也其脉弦緊牢強者可治若虛細而弱者為難治
 臨證之際宜詳察焉

七氣湯 治七情之氣鬱結于中心腹絞痛不可忍者
 人參去虛 甘草炙 同桂各半 半夏湯洗七
 右咬咀作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食遠

木香調氣散 治氣滯胃膈虛痞惡心宿冷不消心腹

刺痛

白豆蔻

丁香

檀香

木香

藿香

甘草

縮砂

右砂咀每服五錢用水一鍾半生薑三片鹽一捻煎

至七分食遠服或為細末用淡鹽湯調二錢服亦可

分心氣飲 治一切氣留滯於胃膈之間不能流暢以

致痞悶噎塞不通大便虛秘

木香

丁香

人參

麥門冬

大腹皮

大腹子

桑白皮

草果

厚朴

白木

香附子

桔梗

厚朴

白木

香附子

藿香

紫蘇葉

陳皮

甘草

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚燈心十莖

煎至一鍾食遠服

木香流氣飲 治諸氣痞塞不通胃膈膨脹面目虛浮

四肢腫滿口苦咽乾大小便秘

陳皮

半夏

厚朴

青皮

紫蘇葉

香附子

肉桂

蓬莪茂

丁皮

大腹皮

檳榔

藿香葉

木香

草果

甘草

木通

麥門冬 香白芷 赤茯苓 白木

乾木瓜

人參

石菖蒲

右作一服用水二鍾生薑二片紅棗二枚煎至一鍾

不拘時熱服

蟠蔥散 治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹

痛膀胱小腸腎氣疼痛及婦人血氣刺痛並皆治之

延胡索

肉桂

乾薑

蒼朮

甘草

縮砂

檳榔

丁皮

三稜

蓬莪茂

茯苓

青皮

右作一服用水二鍾連根蔥白一莖煎至一鍾空心

熱服

聚香飲子

治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可俯仰

檀香

木香

乳香

沉香

丁香

藿香

延胡索

片薑黃

川烏

桔梗

桂心

甘草

右作一服用水二鍾生薑五片棗子一枚煎至一鍾

食遠服

流氣飲子

治男子婦人五臟不和三焦氣壅心胃痞

門咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不食上氣喘急咳嗽痰

盛面目浮四肢腫大便祕澁小便不通憂思太過鬱結不散腹脹脇肋走注疼痛脚氣腫痛並皆治之

紫蘇葉

青皮去穢

當歸洗

芍藥

烏藥

茯苓去皮

桔梗

半夏湯洗

川芎

黃芪

枳實炒

防風去蘖

陳皮去白

甘草炙

木香下瓦

大腹皮

檳榔

枳殼炒

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾

去滓不拘時服

指迷七氣湯 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯

攻衝作疼宜服

香附子二錢

青皮去穢

陳皮去白

桔梗

蓬茂

官桂

藿香

益智仁

半夏湯洗

甘草炙

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾

食遠服

紫沉通氣湯 治三焦氣滯不能宣通腹脹滿大便

祕澁

紫蘇葉

枳殼炒

陳皮去白

赤茯苓

檳榔

甘草炙

沉香

麥門冬

木香不見

五味子

桑白皮

黃芪

乾薑

薄荷葉

荊芥穗

枳實炒

右作一服用水二鍾煎至一鍾空心溫服

三香正氣散 治陰多陽少手足厥冷氣刺壅滯胃膈

噎塞心下堅痞嘔噦酸水

木香不見

丁香各五

陳皮去白

厚朴去粗皮

益智仁

縮砂仁

香附子炒

甘草炙

乾薑

丁香皮

蓬莪茂炒

烏藥

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾

去滓不拘時服

分心氣飲 治男婦一切氣不和或因憂愁思慮或酒

色過傷或臨食憂煩或事不遂意鬱滯膈脇痞痛

悶嘔吐頭眩倦怠面目瘡黃口舌乾燥飲食減少漸

覺羸瘦常服和陰陽順三焦

紫蘇葉二錢

羌活

半夏湯洗

官桂

青皮去穢

陳皮去白

大腹皮

桑白皮炒

木通

芍藥

甘草炙

赤茯苓

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚燈心十葉煎

至八分食遠服

七湯 治善怒憂思悲恐驚心氣成痰涎狀如破

絮或如梅核在咽喉之間咯不出熱不下此七情所為也中脘痞滿氣不舒快或痰飲嘔逆惡心並治之

半夏湯泡七次 茯苓去皮各三錢 紫蘇 厚朴去粗皮一錢

右作一服用水二鍾生薑七片棗二枚煎至八分食遠服

蘇子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎

壅盛喘促短氣煩悶胃膈噎塞中脘不快心腹脹滿咳嗽痰涎留飲停積不消並宜服之

紫蘇子炒 半夏湯泡各二錢半 前胡去蘆 甘草炙

厚朴去粗皮 陳皮去白各一錢 當歸半錢 肉桂去粗皮七分

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食遠服

雞舌香散 治心脾引痛中脘氣滯停積痰飲胃膈脹

滿陰陽不和臟腑虛弱並宜服之

香附子炒去毛 肉桂去皮 赤芍藥 烏藥

良薑炒各二錢 甘草炙一錢

右作一服用水二鍾入鹽少許煎至八分食遠服

三和散 治五臟不調三焦不和心腹痞滿脇肋脹

風氣壅滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澀

大便祕難通高氣弱並可服之

方見祕結門

分氣紫蘇飲 治男子婦人脾胃不和胃膈噎塞腸痛

氣促喘急心下脹滿飲食不思嘔逆不止

紫蘇二錢 五味子去梗七分 桑白皮炙 陳皮去白

桔梗去蘆 草果仁 大腹皮 茯苓各錢二分

甘草炙八分

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾入鹽少許

食遠服

順氣木香散 治氣不升降胃膈痞悶時或引痛

食過度噯氣吞酸心脾刺痛女人切血氣刺痛並

皆治之

木香不見火 蒼朮米泔水浸 桔梗去蘆 茴香炒

乾薑炮 陳皮去白 縮砂仁 厚朴去粗皮

丁香 良薑炒 肉桂去粗皮 甘草炙

右作一服用水二鍾生薑二片紅棗二枚煎至一鍾

不拘時熱服入鹽少許亦可

勻氣散 治氣滯不勻胃膈脹滿痞痞宿冷不消心腹

刺痛噎塞嘔吐惡心並皆治之

丁香 檀香 木香不見火 白豆蔻各二

藿香葉 甘草炙各八兩 縮砂四兩

右為細末每服二錢入鹽一字沸湯調服不拘時

合香圓 專能順氣化痰傳屍骨蒸諸虛癆瘵卒暴心痛鬼魅瘴癘赤白下痢小兒驚搐等證並皆治之

沉香 麝香 訶梨勒 丁香

青皮 去穢 安息香 別研為末用無 香附子 炒去毛

萆撥 白朮 白檀香 犀角 磨

硃砂 研水飛 薰陸香 別研 蘇合油 入安息香內 龍腦 研各

右件研為極細末和勻用安息香膏并煉蜜和劑每

一兩作五圓不拘時用溫湯化下一圓或溫酒化服

或生薑湯磨化服亦可

烏沉湯 治一切氣除一切冷調中補五臟益精壯陽

道暖腰膝去邪氣治吐瀉轉筋癱瘓痺痛風水毒冷

風麻痺又主中惡心腹痛膀胱腎間氣攻衝背脊

俯仰不利婦人血氣攻擊心腹撮痛並宜服之

天名藥 一百 沉香 五十 人參 三兩 甘草 兩半

右為細末每服二錢用薑湯入鹽少許食前點服

撞氣阿魏圓 治五種噎疾九般心痛痞癖氣塊冷氣

攻刺腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣刺

痛並皆治之

茴香 青皮 去穢 陳皮 去白 蓬茂 地

川芎 甘草 炙各 一兩 生薑 四兩切片鹽半兩

胡桂 細砂 丁香皮 白芷

胡椒 阿魏 為糊各二錢

右為細末用阿魏和麴糊圓如梧桐子大用硃砂為

衣每服二三十圓丈夫氣痛炒薑鹽湯下婦人血氣

刺痛淡醋湯下

復原通氣散 治氣不宜流或成瘡癰并閃挫腰脇氣

滯疼痛並皆治之

舶上茴香 穿山甲 用蛤粉炒去 延胡索

白牽牛 炒 陳皮 去白 甘草 炙 南木香 兩

右為細末每服一錢用熱酒調服病在上食後服病

在下食前服不飲酒者煎南木香湯調下

沉香化氣圓 治一切氣疾

茯苓 人參 去蘆 木香 不見 青皮 兩

丁香 沉香 不見 白朮 山藥

砂仁 三稜 蓬茂 薑蒲

檳榔 橘皮 白豆蔻 各六錢 官桂 一兩

蘿蔔子 炒二 香附子 一兩 黑牽牛頭末 八兩

右為細末醋煮麴糊和圓如梧桐子大每服五七十

圓不拘時薑湯送下

導氣枳殼圓 治氣結不散心胃痞痛氣逆上攻分氣

逐水

枳殼炒

木通

青皮去穢

陳皮去白

桑白皮炒

蘿蔔子炒

白牽牛炒

蓬茂煨

茴香炒

三稜煨

右為細末薑汁煮麪糊為圓如梧桐子大每服三五

十圓不拘時橘皮湯送下

木香檳榔圓 治一切氣滯心腹滿悶脇肋膨脹大小

便結滯不快利噦逆酸臭宿食不消

木香不見火

檳榔

青皮去穢

枳殼炒

陳皮

蓬茂煨

黃連各一兩

黃蘗

香附子

太黃各三兩

黑牽牛頭末四兩

右為細末滴水為圓如梧桐子大每服三十圓或五

十圓加至微利為度食遠薑湯送下常服快氣消食

通利大腸一方無牽牛有當歸黃芩各一兩

沉香降氣湯 治陰陽壅滯氣不升降胃膈痞塞喘促

短氣又治脾胃留飲噎醋吞酸脇下妨悶

沉香不見火

縮砂仁十二兩

甘草多三兩

香附子炒去毛

右為細末每服二錢入鹽一分沸湯調服不拘時

小香分氣圓 治一切氣逆心胃痞悶腹肋虛脹

木香不見火

甘草

砂仁

香附子炒去毛

蓬茂煨

丁皮各四兩

藿香洗去上

薑黃

甘松

檀香各一兩

右曬乾不見火搗為末稀麪糊為圓如梧桐子大每

服三十圓生薑橘皮湯下不拘時服寬中進食

集香圓 治一切氣胃膈痛悶脇肋脹滿心腹疼痛噎

氣吞酸嘔逆惡心不思飲食或因飲酒過傷脾胃不

和並皆治之

白豆蔻仁

縮砂

木香不見火

薑黃四兩

丁香不見火

麝香別研

甘草一兩

香附子炒去毛

右為極細末入麝香末和勻用甘草膏和為圓如梧

桐子大每服一二圓不拘時細嚼津嚥下常服寬中

順氣消宿酒進飲食磨積滯去癥塊

沉香降氣圓 治胃膈痞滿升降水火調順陰陽和中

益氣推陳政新美進飲食

沉香

木香不見火

革澄茄

枳殼去穢

砂仁

白豆蔻仁

青皮去穢

陳皮去白

廣茂

枳實炒

黃連

半夏各製

蘿蔔子研各

白茯苓去皮

香附子炒去毛

右為細末薑汁浸蒸餅糊為圓如梧桐子大每服七

十圓臨睡煎橘皮湯送下薑湯亦可忌生冷

行聚門

夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚積之始發也有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚之始發也無根本上下無所留止其痛無常處是積聚臟腑陰陽之別也肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯久不已令人發欬逆痰瘧連歲不已心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下久不已令人病煩心心痛脾之積名曰痞氣在胃脘大如盤久不已令人四肢不收發黃疸飲食不

金匱要略

卷七

為肌膚肺之積名曰息貫在右脇下如覆杯久不已令人洒淅寒熱喘咳發肺癰腎之積名曰奔豚發於小腹上至心下若豚狀或上或下無時久不已令人喘逆骨疼少氣此五積之狀各隨五臟發病故不同也有言積聚者有言癥瘕者有言痞癖者名雖異而病則同也原其所得之由本因六淫七情所干積久而成也治療之法當察其所痛以知其應有餘不足可補則補可瀉則瀉無逆天時詳臟腑之高下辨積聚之虛實如寒者溫之結者散之客者除之留者行之堅者削之又當節飲食慎起居和其中外使可畢

已若驟以毒之劑攻之積不能除反傷其氣終難治矣故潔古云養正積自除此之謂也今集古今經驗之方于左治積者宜留意選而用之

散聚湯 治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹絞痛攻刺腰脇小腹膜脹大小便不利

半夏

湯泡
七次

檳榔

當歸

杏仁
湯泡
去毒

附子

炮去
皮

陳皮

茯苓

枳殼
去毒

厚朴

薑製

桂心

小芩

吳茱萸

甘草

炙各

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服大

金匱要略

卷八

便不利加大黃

枳殼散 治五種積氣三焦痞塞胃腸滿悶嘔吐痰涎

口苦吞酸常服順氣寬中除痞癖消積聚

枳殼

麩炒

益智

陳皮

京三稜

義茂

檳榔

肉桂

已上各

肉豆蔻

厚朴

去毒

木香

不見

乾薑

甘草

炙五

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾

不拘時服

大七氣湯 治五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作有

時心腹疼痛上氣壅塞小腹脹滿大小便不利

益智 陳皮去白 蓬茂 京三棱

青皮去穢 枳梗去蘆 香附炒 蒼術

肉桂已上各一錢半 甘草炙一錢半

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

半夏湯 治古脇下有塊令人洒淅寒熱咳嗽名之曰

肺積息音丸藥主之

半夏湯泡七次 細辛 桑白皮炙 前胡炒

桔梗 貝母 柴胡 訶子炒

人參去蘆 白朮 甘草炙七分

右作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至一鍾食

後熱服

枳實散 治肺積息音腹脇脹硬咳嗽見血痰不利

枳實炒 木香不見火 檳榔 荳蔻炒

赤茯苓去皮 五昧子 訶黎勒去核 甘草炙上

杏仁兩去 右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食

後服

勻氣湯 治脾之積名曰痞氣胃脘不安肌瘦減食

神麴炒 麥蘖炒 桂心去粗 郁李仁半生

厚朴薑炒 白朮各一兩 大腹子二枚 牽牛兩半

良薑炮 甘草炙二兩

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾半生薑三片棗二枚煎至

七分食遠服

蓬莪散 治久積癥瘕氣不消散脇下如覆盆多吐

酸水面色痿黃或腹中疝痛並宜服之

蓬茂 肉桂 枳殼炒 三棱

大黃炒 當歸 檳榔 木香炒

柴胡一錢 熟薑炮 赤芍藥炒 龍甲炙

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食遠服

奔豚湯 治腎積發於小腹上至心如豚奔走之狀上

下無時久不愈病喘逆骨痛少氣其脉沉而滑

甘李根皮炒 乾葛 川芎 當歸

白芍藥 黃芩 甘草炙各一兩 半夏湯洗

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

息賁湯 治肺積在右脇下大如覆杯久不愈病洒洒

寒熱氣逆喘發為肺癰其脉浮而毛

半夏湯洗 桂心 人參去蘆 吳茱萸湯洗

桑白皮炙 葶藶 甘草炙

右作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食

前服

水香化滯湯 治因憂氣食濕麪結於中脘腹皮微痛

心下痞滿不思飲食食之後不散常痞氣

木香 不見

芫胡

橘皮

草薢 七本

當歸

枳實 一錢

半夏 湯丸

紅花

甘草 半錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

廣茂漬堅湯 治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人

坐卧不能大小便澀滯上氣喘促面色痿黃通身虛

腫

方見水腫脹滿門

勝紅圓 治脾積氣滯胃脘悶腹疼痛氣促不安

嘔吐清水丈夫酒積婦人血積小兒食積並皆治之

青皮 去穢

陳皮

三稜 醋煮

蓬茂 鹽煮

乾薑 炮

良薑 已上各

香附子 炒土毛

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服五十圓食前

薑湯送下

香稜圓 治五積破痰癖消癥塊散積聚

木香

丁香 並不見

青皮 去穢

川練子 炒

茴香 炒已上

三稜 酒浸

枳殼 錢炒各

蓬茂 一兩去殼巴豆三十粒

右為細末醋糊為圓如梧桐子大以硃砂為衣每服

五十圓用薑湯或鹽湯溫酒不拘時任下

剪紅圓 追蟲取積利五臟不損六腑遠年近日諸般

蟲積及血塊宿食不消婦人赤白痢疾並皆治之

檳榔 六錢

巴豆 一兩

土硃 三錢

蕪荑 六兩

白牽牛 頭末十

雷丸 五兩

右為細末滴水為圓如梧桐子大每服一圓薑湯送

下取下病積為驗以白粥補之或以硃砂為衣亦妙

荆蓬煎圓 治癥瘕痞癖冷熱積聚宿食不消嘔吐辛

酸久服消積聚進飲食止嘔吐

荆三稜 酒浸蓬茂醋煮

木香 不見

枳殼 錢炒

茴香 炒

青皮 鹽煮

檳榔 已上各

右為細末薑糊為圓如梧桐子大每服五十圓食後

用白湯送下或用生薑湯下亦可

肥氣圓 治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜龜

狀久不愈發咬逆嘔其脉弦而細

當歸 頭

蒼朮 各一

青皮 去穢

礞石 礞石

三稜

蓬茂

鐵華粉 各三兩與三錢蓬茂

右為細末醋煮米糊為圓如葉豆大每服四十圓用
當歸浸酒下食遠服

伏梁圓 治心積起臍上至心大如臂久不已病煩心
體髀股皆腫環臍而痛其脉沉而乳

茯苓 去皮 厚朴 去皮薑 人參 去蘆 枳殼 去穢

三稜 煨 半夏 湯泡 白木 各等

右為細末麴糊和圓如梧桐子大每服五十圓食後
用米飲湯送下

三稜煎圓 消癥瘕積聚化痰飲寬中順氣治心腹堅
脹脇下紫硬常滿短氣不進飲食大便或泄或閉

荆三稜 生剉另為末以酒神麴 炒 蘿蔔子 炒

麥蘖 炒 硃砂 飛研如膏皮 去蘆 乾漆 炒已上

杏仁 去皮尖 炒一兩

右為細末以三稜膏和圓如梧桐子大每服十五圓
至二十圓食前米飲下加阿魏半兩名阿魏圓

白豆蔻散 治積聚心腹脹滿宿食不消氣刺疔痛泄
瀉善噫吞酸食即嘔吐手足厥冷

白豆蔻 去皮 肉豆蔻 去殼 高良薑 木香 已上各

桂心 去粗 附子 炮去 枳殼 炒 陳橘皮 炒

人參 丁香 甘草 炙已上

右為細末每服二錢食前用木瓜生薑煎湯調服
磨積三稜圓 治遠年日近諸般積聚癰瘕氣塊或氣
積酒積諸般所傷無問男子婦人老幼並宜服之常
服進飲食

木香 不見 麥蘖 京三稜 炮 廣茂 炮

枳殼 煨炒 石三稜 去皮 杏仁 煨炒各 乾漆 煨炒

雞爪三稜 煨 葛根 三錢 官桂 二錢 墨犀 半兩

丁香 香附子 青皮 煨各 縮砂 三錢

白牽牛 生半兩 熟陳皮 三錢

右為末醋糊圓如梧桐子大每服二十圓生薑湯下

食後日二服痛大者四十日消溫水送下亦得
千金不換內消圓 專治積聚氣滯膈膨脹肚腹飽

滿心緊束等證

蒼朮 半斤米泔水浸 枳殼 一兩五錢溫水浸

青皮 水浸 三稜 煨 蓬茂 煨 香附子 煨

大茴香 炒 乾漆 煨 藿香 土洗去 陳皮 已上各

厚朴 薑製 杏仁 皮尖 砂仁 破故紙 各兩

猪牙皂角 煨去皮 黑牽牛 各二兩 草果 去皮 百草霜 二兩

右十八味為細末麴糊為圓如梧桐子大每服七十
圓量人稟氣飲食厚薄加減臨卧好酒或茶清或鹽

湯白湯送下不拘時照依前圓數湯引服之暫待一
二時間便食飯飲酒自覺肚腹內寬快不分多寡服
並無肚腹嚮洩有體健扶陽之益及治小兒五六歲
已上飲食停滯飽懣使用十數圓已上增添圓子咬
碎用茶清米湯送下服之即愈此圓男女皆可服惟
孕婦不可服

丁香脾積圓 治食積心腹膨脹不得剋化

丁香

木香

巴豆

高薑

各半兩

蓬莪茂

三兩

荊三稜

二兩

青皮

一兩

皂角

三兩

各半兩

右入百草霜三匙同碾爲末麪糊爲圓如麻子大每

合選藥要由

五五

五五

五五

服十圓至二十圓止脾積氣陳皮湯下口吐酸水淡
薑湯下嘔吐藿香甘草湯下小腸氣炒茴香酒下婦
人血氣刺痛醋湯送下

水腫脹滿門

大水腫者蓋因脾土虛弱不能防制腎水以致水溢
妄行浸漬脾土凝而不流遂成腫滿其爲證也發見
之初目窠微腫有若卧蠶纒起之狀微而至大以手
按之則隨手而起如裹水在內上則喘急咳嗽下則
足膝胛腫面目虛浮外腎或腫小便不利此其候也
治之當辨其陰陽脉證若陰水爲病者脉來沉遲色
多青白不煩不渴小便澀少而清大便多泄陽水爲
病者脉來沉數色多黃赤或煩或渴小便赤澀大便
多秘腰已上腫者宜發汗腰已下腫者宜利小便然

合選藥要由

五五

五五

五五

後實其脾土土盛自能攝伏腎水其腫自消虛弱者
又當溫補下元健養脾胃此其大法也若腫而肌肉
崩潰足脛流水脣黑缺盆平臍凸背平足心滿此爲
五臟損敗不可治也若夫脹滿之疾亦由脾胃虛弱
或病後失調外爲四氣所侵內爲七情所動及飲食
不節生冷過多有傷脾胃以致五臟傳剋陰陽之氣
不得升降痰飲結聚中焦遂成脹滿之疾其爲病也
或腸鳴氣走漉漉有聲或兩脇腰背痛連上下或頭
疼嘔逆胃滿不食或腹脹喘欬二便不通治療之法
當視其久近虛實寒熱以健理脾胃爲先分利化積

次之不可過用行下之藥恐脾胃愈虛而難治也大抵水腫脹滿之疾脉浮大者易治虛小細沉者難治臨證審焉

葶藶木香散 治暑濕傷脾水腫腹脹小便赤大便滑

葶藶 木香不見火 茯苓 肉桂

猪苓 澤瀉 木通已上各錢 滑石五錢

白朮二錢 甘草五分

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

白朮木香散 治喘嗽腫滿變成水病者不能食不能

卧小便秘者宜服之

白朮 猪苓去皮 檳榔 赤茯苓

澤瀉已上各錢五分 滑石三錢 官桂七分 木香不見火

甘草已上各錢 陳皮二錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食前服

疎鑿飲子 治水氣通身浮腫喘呼氣急煩躁多渴大

小便不利服熱藥不得者

澤瀉 赤小豆炒 商陸 羌活

大腹皮 椒目 木通 秦艽

檳榔 茯苓皮已上各錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

分氣補心湯 治心氣鬱結發為四肢浮腫上氣喘急

木通 川芎 前胡 大腹皮炒

青皮去穢 白朮 枳殼炒 甘草炙

香附炒去毛 茯苓 桔梗已上各錢五分 細辛

木香不見火

右作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至八分食

前服

當歸散 水腫之疾多由腎水不能攝養心火心火不

能滋養脾土故土不能制水水氣盈溢氣脉閉塞透

透經絡發為浮腫之證心腰堅脹喘滿不安

當歸酒洗 木香不見火 赤茯苓 芍藥

牡丹皮 桂心 檳榔 陳皮

木通炒 白朮 木瓜 紫蘇炒

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

蘿蔔子飲 治水病浮腫

蘿蔔子 半夏製 川芎 青木香

商陸 青皮去穢 訶梨炒 赤茯苓

陳皮 牽牛末炒 檳榔 甘草炙

官桂七分

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

神助散 治十種水氣面目四肢浮腫以手按之隨手

而起咳嗽喘急不得安卧小便赤澀大便秘不利

黑牽牛炒取澤瀉各二錢猪苓各二錢椒目各二錢

荳蔻五錢

右作一服用水二鍾葱白三根煎至一鍾入酒半盞

絕早向東立服如人行十里又以漿水煎葱白煮稀粥

候魚爛入酒五合量人所飲多少須啜一升許自早

至午當利小便三四升或大便微利喘定腫減隔日

再服忌鹽麪房事

五皮散 治風濕客邪於脾經氣血凝滯以致面目虛

浮四肢腫滿心腹膨脹上氣喘促

五加皮 地骨皮 大腹皮 茯苓皮

生薑皮已上各二錢五分

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服切忌生冷

膩堅硬之物澹寮方去五加皮地骨皮加陳皮桑白

皮亦同名

木香分氣湯

治氣留滯四肢腹急中滿胃膈脇肋膨

脹虛氣上衝小便臭濁

木香不見猪苓 澤瀉 赤茯苓

半夏 枳殼 檳榔 燈心草

紫蘇子各一錢

右以咀作一服用水二鍾入麝少許煎至一鍾食前

服

中滿分消湯 治中滿寒脹寒疝大小便不通四肢厥

冷食入反出下虛中滿腹中寒心下痞躁寒厥奔豚

不收並治之

益智 半夏炮 木香不見 茯苓

升麻各一錢 人參 青皮去穢 川烏炮去

當歸 柴胡 乾薑 華澄茄

黃連各六分 黃芪 黃蘗 吳茱萸

草豆蔻 厚朴 麻黃 澤瀉各五分

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食前服大

忌房勞酒濕麵大寒生冷之物

唐茂濟堅湯 治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人

坐卧不安大小便塞滯上喘氣促面身癢重通身虛

腫

廣茂煨 黃連 柴胡 甘草生用

神麴炒 澤瀉已上各五分 陳皮 三葉黃連

青皮去穢 升麻已上各一錢 黃芩 苦豆蔻

當歸梢 益智已上各五分 紅花一分 半夏泡七

乾葛 二分

右作一服用水二鍾先浸藥少時煎至一鍾食遠服忌酒濕麪中滿服後漸減積塊未潰再服後半夏厚朴湯

半夏厚朴湯 治證與前同能消脹化積

半夏 一錢 厚朴 八分 神麪 六分 杭仁 十五箇

黃芩 澤瀉 紅花 茯苓

橘紅 蘇木 青皮 吳茱萸

蒼朮 草豆蔻 黃連 當歸梢

猪苓 三稜 升麻 乾生薑

肉桂 甘草 柴胡 木香

昆布 乾葛 各一分

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

參香散 治一切氣脾虛作脹痞氣

人參 肉桂 甘草 桑白皮

桔梗 陳皮 枳實 麥門冬

青皮 大腹皮 半夏 紫蘇子

茯苓 香附子 木香 各一分

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食

前品

大半夏湯 治肝氣大盛勝剋於脾脾不運化結聚涎沫閉塞臌氣胃冷中虛遂成脹滿之病其脉多弦遲

半夏 二錢 附子 枳實 厚朴

桂心 當歸 茯苓 川椒

甘草 人參

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服大異香散 治失飢傷飽痞悶停酸旦食不能暮食病名穀脹

三稜 蓬朮 青皮 半夏麪

陳皮 藿香 桔梗 枳殼

香附 益智 甘草

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

速服

中滿分消湯 治中滿寒脹寒疝大小便不通四肢厥

冷食入反出下虛中滿腹中寒心下痞躁寒厥奔豚不收並治之 原本重出而治法少異

益智 半夏 木香 茯苓

升麻 人參 青皮 川烏

當歸 訶胡 乾薑 薑澄茄

黃連 黃蘗 吳茱萸

草豆蔻	厚朴	麻黃	澤瀉
右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服大忌			已上各五分
房勞酒濕麪生冷硬物			
平肝飲子 治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹			
滿頭眩嘔逆脉來浮弦			
防風	枳殼	桔梗	赤芍藥
桂枝	木香	人參	檳榔
川芎	當歸	陳皮	甘草
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服			各八分
大橘皮湯 治濕熱內攻心腹脹滿并水腫小便不利			
大便滑泄並宜服之			
橘皮	木香	滑石	檳榔
白朮	茯苓	猪苓	澤瀉
肉桂	甘草		
右作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食前服			
大沉香厚薑圓 治蠱脹腹滿水腫遍身腫滿氣逆嘔			
喘喘乏小便赤澁大便不調一切中滿下虛危困之			
病且効如神			
沉香	丁香	人參	車前子
葶藶	損柳	胡椒	海金沙

蠟柏	木香	肉豆蔻	茯苓
青皮	白牽牛	枳實	木通
白丁香	蘿蔔子	滑石	郁李仁
右為細末用生薑汁打			
二三十圓不拘時薑湯			
麵食只可食米粥			
十棗圓 治水氣四肢浮腫上氣喘急大小便不通			
甘遂	大戟	芫花	
右為細末用紅棗煮爛			
梧桐子大每服四十圓			
為度否則次早再服			
茯苓琥珀圓 治水氣			
升降咳嗽喘促小便不利			
赤茯苓	防己	苦薏	紫蘇子
琥珀	郁李仁	杏仁	陳皮
右為細末煉蜜為圓			
人參湯食前送下			
海金沙散 治脾濕太過			
鼓			
海金沙	甘遂	黑牽牛	

右為細末每服二錢用倒流水煎湯空心調下

三花神祐圓 治中滿腹脹喘嗽淋閉一切水濕腫滿

濕熱腸垢沉積變生疾病久病不已黃瘦困倦氣血

壅滯不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛風

痰涎嗽頭旋運瘧疾不已癰瘕積聚堅滿痞悶酒積

食積一切痰飲嘔逆及婦人經病不快帶下淋瀝無

問赤白并男子婦人傷寒濕熱腹滿實痛久新瘦弱

俗不能別辨或泛常只為轉動之藥無治久新腰痛

并一切下痢及小兒驚癇積熱乳癖腫滿並宜服之

甘遂 大戟 芫花 輕粉 大黃 一兩 輕粉 一錢

右為末水圓如小豆大每服十圓量虛實加減忌熱

物甘草等 木香 分氣圓 治脾胃不和心腹兩脇膨脹胃膈疼痛

痰喘喘息惡心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之 有効

右為細末糊圓如梧桐子大每服五七十圓食後薑

湯送下

沉香琥珀圓 治水腫一服忌難證小便不通者

琥珀 杏仁 紫蘇 赤茯苓 澤瀉 半兩 各 荳蔻 炒 郁李仁 去皮 沉香 一兩 半

陳皮 去白 防己 七 右為細末煉蜜為圓如梧桐子大以麝香為衣每服

二十五圓加至五十圓空心用人參煎湯送下量虛

實加減 三白散 治膀胱蘊熱風熱相乘陰囊腫脹大小便不

利 白牽牛 二兩 桑白皮 微炒 白朮 木通 陳皮 各半

右為細末每服二錢六分薑湯調服小兒服半錢

西方選要卷之四

醫方選要卷之五日錄

心腹痛門 附論

加味七氣湯 加味四七湯 訶子散

順氣木香散 卻痛散 延胡散

鐵刷湯 神保圓 勝金散

愈痛散 參朮散 手拈散

九痛圓 二薑圓 烏梅圓

大沉香圓 燒脾散 蘇合香圓

倉卒散 草豆蔻圓 蟠蔥散

撞氣阿魏圓

翻胃膈噎門 附論

五膈寬中散 安脾散 丁沉透膈湯

五噎散 五膈散 嘉禾散

人參丁香散 附子黃芪草果飲 丁香煮散

透膈湯 旋覆花散 華澄茄散

沉香開膈散 紫蘇子飲 沉香散

奪命回生散 大倉圓 人參利膈圓

卜膈氣散 丁香餅子 玉浮圓

寬中散 沉香散

效逆門 附論

橘皮竹茹湯 半夏生薑湯 丁香柿蒂散

橘皮乾薑湯 羌活附子散 柿蒂湯

桂苓白朮圓 華澄茄散 灸效逆法

小柴胡湯 治寒氣攻胃效逆

硫黃煎法

頭痛門 附論

芎朮湯 天香散 芎辛導痰湯

小芎辛湯 川芎散 菊花散

川芎羌活散 落蓋湯 川芎茶調散

如聖餅子 都梁圓 定風餅子

川芎散 抽刀一字散 芎辛圓

川芎石膏湯 調中益氣湯 止痛太陽丹

治頭痛方

眩暈門 附論

半夏白朮天麻湯 仙木芎散 三五七散

人參前胡湯 蔓荊子散 川芎散

人參湯 白朮散 香橘飲

芎菊散 羌活湯 天麻羌活圓

芎犀圓 人參圓 沉香磁石圓

增損黑錫丹 川芎散 祛痰圓

芎藭散

腰脇痛門 附論

獨活寄生湯

獨活湯

麻黃蒼朮湯

當歸拈痛湯

舒經湯

木附湯

五積散

木香沆氣飲

腎着湯

獨活散

養腎散

青娥圓

立安圓

橘香圓

沉香圓

如神湯

蒼朮圓

治腰痛如神方

芎藭湯

分氣紫蘇飲

枳殼煮散

香橘湯

芎歸芍藥湯

加味小柴胡湯

異香散

流氣飲子

聚氣湯

推氣散

木通散

白木圓

枳芍散

芍藥散

當歸龍會圓

醫方選要卷之五

醫方選要卷之五

心腹痛門

良醫副日 周文采編集

心腹痛者皆由外感邪氣內傷生冷及七情之氣結聚痰飲寒熱之氣停滯於心胞腸胃之間發而為痛也然心痛有九種謂蟲痛症痛風痛悸痛食痛飲痛寒痛熱痛來去痛是也又有所謂寒厥痛熱厥痛大實心痛及真心痛其痛雖不同俱有可治之法惟真心痛者旦發夕死夕發旦死其心痛甚手足青是也若於腹痛者有寒氣客於中焦干於脾胃而痛者有宿積停於腸胃結滯不散而痛者有痛而嘔者有痛而泄者有痛而大便不通者其證各不同也治之皆當辨其寒熱虛實隨其所得之證施之若外邪者散之於外內結者逐之於內寒則溫之熱則清之虛則補之實則瀉之泄則調之秘則通之血則消之氣則散之蟲則追之積則削之加以健理脾胃調養氣血斯得治之要也

加味七氣湯 治喜怒憂思悲恐驚七氣為病發則心

腹刺痛不可忍者或外感風寒濕氣作痛亦宜服之

半夏 湯泡

三錢 桂心 土粗

延胡索 炒各二錢 人參 去蘆

乳香

甘草 炙各一錢

右作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至八分食遠服

加味四七湯 治風冷寒邪各搏心腹作痛

桂枝 白芍藥 半夏 人參 枳殼

紫蘇 茯苓 厚朴 枳殼

甘草 二錢

右作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至八分食遠服

訶子散 治心脾冷痛不忍一服効又治九種心痛霍亂吐瀉

訶子 甘草 厚朴 乾薑

草果 陳皮 良薑 茯苓

神麴 麥蘖

右吹咀作一服用水二鍾入鹽少許煎至八分食遠服

順氣木香散 治氣不升降嘔逆惡心胃膈痞悶脇肋

脹滿及婦人血氣刺痛常服寬中順氣和胃進食

丁香 砂仁 官桂 良薑 厚朴

乾薑 陳皮 甘草 厚朴

蒼朮 桔梗 茴香 木香

右作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至八分食遠服

卻痛散 治心氣冷痛不可忍者

五靈脂 蒲黃 肉桂 石菖蒲

當歸 木香 胡椒

右作一服用水二鍾煎至一鍾入鹽少許米醋少許食前服

延胡散 治冷氣心痛及疝氣心腹疔痛

延胡索 胡椒

右爲細末每服二錢食前用溫酒調服

鐵刷湯 治心脾積痛婦人血氣刺痛中酒惡心腸滑

泄瀉 良薑 茴香 蒼朮 甘草

右爲細末每服二錢空心薑鹽湯送下

神保圓 治心膈氣痛甚者及氣滯腹痛又治諸氣

刺痛流入背脊及脇下者

木香 胡椒 全蠍 巴豆

右爲細末湯浸蒸餅圓如麻子大硃砂爲衣每服五

圓柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂生薑湯下若血刺痛炒

薑醋湯下

小全散 治卒心痛

桂枝 延胡索炒 五靈脂 當歸各一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾去滓入鹽少許食前服

愈痛散 治急心痛胃痛

五靈脂去砂 延胡索炒 蓬莪朮煨 良薑剉

當歸去蘆

右各等分爲細末每服二錢不拘時用熱醋湯調服

參朮散 治虛弱人脾疼

人參 白朮炒 乾薑炮 白豆蔻

砂仁 丁香不見火 陳皮 甘草炙

右件咬咀各等分每服三四錢用水一鍾半生薑三片煎至七分去粗調炒過直蛤粉一錢併服

手拈散 主心脾疼

草果仁 延胡索 五靈脂 沒藥

右件各等分爲細末每服二三錢溫酒調下米飲亦可

九痛圓 治九種心痛蟲痛症痛風痛悸痛食痛飲痛

冷痛熱痛往來痛兼治卒中惡腹脹痛口不能言又

治連年積冷流在心胃并冷腫痛上氣落馬墜重等

疾

附子一兩炮 狼毒炙 巴豆去皮心 人參

乾薑炮 吳茱萸洗炒各一兩

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三圓空腹溫酒送下卒中惡心痛不能言服三圓

二薑圓 治心腹冷痛緩胃消痰

乾薑炮 良薑去皮各等分

右爲細末麪糊和圓如梧桐子大每服三五十圓食後橘皮湯下

烏梅圓 治胃氣虛冷蛔蟲上攻心腹作痛嘔吐四肢

逆冷

烏梅三百 黃蘗炙 細辛 肉桂去皮

附子炮 人參各六兩 川椒炒 當歸各四兩

乾薑炮 黃連各十六兩

右爲細末取烏梅肉和蜜圓如梧桐子大每服五十圓空心鹽湯送下或川椒湯下亦可

大沉香圓 治冷氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香不見火 乾薑炮 薑黃 辣桂

檀香不見火已洗 甘松洗 白芷 天台烏藥

甘草已上各八兩 香附一升 白豆蔻仁二兩

右爲細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓食前細嚼
用生薑湯送下

燒脾散 治食咬生冷果菜寒留中焦心脾冷痛不可
忍及老人霍亂吐瀉

乾薑炮 厚朴薑製 麥蘖炒 草果仁

神麴炒 良薑剉炒 橘紅 縮砂仁

甘草炙各等分

右爲細末每服三錢不拘時用熱鹽湯調服

蘇合香圓 治卒心痛用生薑橘皮湯化下

方見氣門

金匱要略卷五 六

倉卒散 治氣自腰腹間拘急不可屈伸腹中冷如石
痛不忍自汗如洗手足冰冷久不差垂死方

山梔四十九枚連皮 附子一枚地

右咬咀每服三錢酒一小盞入鹽少許煎服又治胃

痞切痛

豆蔻圓 治客寒犯胃痛者宜此圓熱亦可服止可

一二服

草豆蔻四錢炒 益智 橘皮 礞石炒

人參 黃芪 吳茱萸湯洗各八分 半夏一錢

生甘草 炙甘草 歸身 青皮各六分

神麴炒 薑黃各四分 澤瀉一錢小便 桃仁七分

麥蘖錢半 柴胡四分 右除桃仁餘爲末浸蒸餅糊和圓如梧桐子大每服

三十圓白湯下

蟠蔥散 治脾胃虛冷攻築心腹脇肋刺痛胃痞背膊

拘急嘔逆不思飲食膀胱氣刺小腸及外腎腫痛及

女人血氣攻刺癥瘕攻作一切疼痛並治

方見氣門

撞氣阿魏圓 治心腹急痛氣刺痛并積氣腹痛疝氣

上攻疼痛

金匱要略卷五 七

方見氣門

翻胃膈噎門

夫翻胃者謂朝食而暮吐暮食而朝吐或食已即吐是也膈噎者謂五膈五噎也五膈謂憂急寒熱氣五噎為憂急勞食氣是也膈者謂膈在心脾之間上下不通若拒格之狀也或結於咽喉時覺有所礙吐之不出噎之不下由氣鬱痰搏而然久則漸妨飲食而為膈也噎者飲食之際氣卒阻滯飲食不下而為噎也翻胃也膈也噎也三者名雖不同而其所受之病所治之法相去不遠矣大抵翻胃未有不由膈噎而起也其病皆由憂愁憤怒思慮鬱結痰飲滯於胃膈

選要卷之二

八

之間使氣道壅塞大便自結結則氣上不下食不得入入則反出俾腸潤胃空上吐下結遂成此疾也治之當以透膈疎氣化痰和胃為主氣虛者補其氣血弱者養其血調順陰陽氣順痰下陰陽和勻其證自平不可峻用香燥之劑治之恐胃中停結痰火精液衰涸如抱薪救火寧不誤耶其脉浮緩者生沉瀯者死若大便秘如羊屎者亦不可治也臨證審焉

五膈寬中散 治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不和胸膈痞滿停痰氣逆遂成五膈之病一切冷氣並皆治之

青皮 大棗

陳皮 去白

丁香 不見火

厚朴 去皮

白豆蔻 去白

縮砂仁

香附子 毛

木香 不見火

甘草 炙五兩

右吹咀每服七錢水二鍾生薑五片鹽一捻煎八分

食遠服或為細末每服二錢用薑鹽湯調服亦妙

安脾散 治胃氣先逆飲食過傷憂急蓄怒宿食積滯

積聚冷痰動擾脾胃不能消磨穀食致成斯疾女人

得之皆由血氣虛損男子得之多因下元虛備有食

罷即吐有朝食暮吐暮食朝吐所吐酸臭可畏或吐

黃水凡有斯疾乃是脾敗惟當速療遲則發煩渴大

選要卷之三

九

便秘水飲不得入口而不旋踵斃矣

高良薑 兩用百年薑上七三合

草果 煨

陳皮 去白

人參 去蘆

茯苓 去白

南香 不見火

白朮

胡椒

丁香 不見火

甘草 炙

右吹咀每服五錢水一鍾半入鹽少許煎至七分食

遠溫服或為細末每服二錢用鹽米飲調下

丁沉透膈湯 治脾胃不和痰逆惡心或時嘔吐飲食

不進十膈五噎痞塞不通並皆治之

丁香 不見火

白豆蔻 去白

肉豆蔻 去白

青皮 去白

麥蘖 炒

半夏 湯洗

神麴 炒

草果 炙

三

子 41-614

半夏湯泡七分

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

丁香煮散 治翻胃嘔吐

丁香不見火

石蓮肉各四枚 生薑七片

北棗七枚切碎

黃黍米淘淨

右四味用水一盞半煎去滓入黃黍米煮稀粥食之

透膈湯 治脾胃不和中脘氣滯胃膈滿悶噎塞不通

噎氣吞酸脇肋刺脹嘔逆痰涎食飲不下並皆治之

木香不見火

白豆蔻

縮砂仁

檳榔

○還藥卷五

三

枳殼麩炒

厚朴薑製

半夏湯泡

青皮去穢

陳皮去白

大黃

朴硝

甘草炙

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食

遠服

旋覆花散 治胃中痰結痞塞不通不能飲食

旋覆花

大腹皮

附子炮去

木香不見火

赤茯苓

白朮

前胡去蘆

半夏湯泡

桂心

芎藭

人參各一兩

青皮去穢

右咬咀每服五錢水二鍾生薑三片煎至八分食遠

服

葶藶散 治膈氣壅滯脾胃虛弱宿食不消四肢乏

力

葶藶

訶梨勒去核

細辛各一兩

人參去蘆

草豆蔻

三稜煨

木香不見火

半夏湯泡

五味子

高良薑

青皮去穢

甘草炙

白朮

大腹皮錢七

右咬咀每服五錢水一鍾半生薑三片棗二枚煎至八分食遠服

沉香開膈散

治五膈五噎痞滿嘔吐心腹刺痛腸脇

脹滿

沉香不見火

京三稜

蓬朮

白豆蔻

葶藶

縮砂

草果去皮

益智

川白薑

丁香不見火

人參錢七

丁皮半兩

木香不見火

茯苓

香附子炒

藿香

半夏湯泡

青皮去穢

陳皮各一兩

甘草炙

右為粗末每服五錢用水一鍾半生薑三片棗二枚

煎至八分食遠服

紫蘇子飲 治欬逆上氣膈噎因怒氣叫喊未定便夾

氣飲食或飲食甫畢使用性志怒以致食與氣相逆

氣下得下或咳嗽不透氣逆惡心

真蘇子炒

訶子煨去

蘿蔔子微炒

杏仁去皮尖

木香一錢

人參錢半

青皮

甘草錢

右以咀分二服每服用水二鍾生薑三片煎至八分食遠服

沉香散 治五膈五噎胃中又寒諸氣結聚逆噎塞飲食不化結氣不消常服順氣通噎寬中進食

白朮

茯苓錢二

木通

大腹皮

陳皮

當歸

青皮

檳榔

芍藥

甘草錢五

白芷

紫蘇

枳殼

沉香錢一分

木香錢七分

金匱要略

下

右作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八分食遠服

奪命回生散 治五膈五噎翻胃嘔吐不進飲食此藥多有神効不可輕視

丁香

川芎錢半

白薑錢半

南木香錢半

肉桂

新羅人參

神麴錢半

訶子錢半

縮砂

義茂錢半

粉草錢半

查東錢半

巴豆

水浸一宿別研為膏解就餅中

右日乾為末入乳鉢內和勻巴豆膏再篩過入瓦盒內以油紙蓋盒口却用黃蠟和松脂鑄如法封固盒

終每以十二月上辰日或初八黃道生氣天月二德

日至誠脩合於高地爽處埋土中三尺深至次年六

月中伏節擇晴明吉日取向當風處攤去濕氣以不

漏瓦瓶收貯密封壯實人每服半錢臨睡百沸湯調

半盞頓服仰臥片時徐以溫白粥壓下若羸弱只服

一字二三服即能進食止嘔吐續以寬中散丁沉透

膈湯橘皮煎圓厚朴煎圓等兼進佐助胃氣忌生冷

魚腥黏膩硬物一兩月則全愈矣孕婦不可服

太倉圓 治脾胃虛弱不思飲食翻胃不食亦宜服之

白豆蔻仁

縮砂仁

各二陳倉米一升用黃土炒

右為細末用生薑自然汁和圓如梧桐子大每服一

百圓食後用淡生薑湯送下

人參利膈圓 治胃中不利痰嗽喘滿利脾胃滯滯推

陳致新治膈氣聖藥

人參

去蘆

當歸

洗淨

藿香

洗淨

枳實錢半

甘草

錢半

木香

錢半

檳榔

錢半

厚朴錢半

大黃

酒浸各

右為細末湯浸蒸餅為圓如梧桐子大每服五十圓

食前用水飲送下

十膈氣散 專治十般膈氣冷膈風膈氣膈熱膈痰膈

憂膈悲膈水膈食膈喜膈

人參去蘆

茯苓去皮

官桂去粗

枳殼麩炒

神麴炒

麥蘖炒

乾生薑炒

訶梨勒炒

二稜炒

蓬茂炒

陳皮去白

甘草炙

白朮各一

厚朴薑製

檳榔炒

木香不見火

右為細末每服二錢入鹽少許白湯調服如脾胃不和腹脇脹滿用水一鍾生薑七片棗一枚鹽少許煎七分服

丁香餅子

治脾胃虛寒痰逆嘔吐飲食減少十膈五噎翻胃惡心並宜服之

丁香

木香各一

白豆蔻

半夏麴

神麴各半

白朮

白薑

陳皮各一

人參

華澄茄各三

肉豆蔻半兩

甘草炙一

右為細末用生薑汁煮麴糊和圓捏作餅如棗子大每服一餅食後細嚼薑湯送下

玉浮圓 治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐及久新翻

胃皆可服之真良方也

人參

白礬炒

白朮

乾薑炮

丁香

肉豆蔻炒

橘紅

麥蘖炒

檳榔

白豆蔻

南星炮

木香不見火

附子炮去

半夏湯洗

甘草炙各

右為細末用白麴一分與生薑自然汁搜和作棗子

大餅入百沸湯煮令浮極漉出搗爛和前藥末為圓

如梧桐子大每服五十圓用淡生薑湯送下不拘時

服病甚者不過三服如惡熱藥者去附子大便秘者

除肉豆蔻

寬中散 治因憂患鬱結或作寒熱遂成膈氣不進飲

食

白豆蔻

青皮去穢

縮砂土皮

丁香各二

木香不見火

甘草炙三

陳皮去白

香附子毛

厚朴去粗皮薑製

沉香不見火

檳榔二兩

右為細末每服二錢不拘時用生薑鹽湯調服

沉香散 治膈氣効秘方

沉香不見火

木香不見火

枳殼各二錢

烏藥四錢

右為細末每服三錢淡鹽湯調下

欬逆門

欬逆者氣逆上衝而作聲也俗謂之吃忒是也其發也或三五聲而止或八九聲而止或連續不絕收氣不回者然所得之由不同有因久病胃虛而得者有因傷寒失下而得者有因痰熱內鬱火氣衝上而得者有因過服寒劑胃寒而得者有因水氣停痰心下痞悸而得者大抵欬逆者不順之義謂氣不得下降而上衝逆也經云諸逆衝上皆屬於火則其欬逆亦火炎上之義也治法當以降氣化痰和胃為主若胃虛者補其胃傷寒失下者宜下之火逆上衝者宜降之過服寒劑者宜溫之水氣停痰者宜逐之斯其治法也其或病久脾胃衰弱而發欬逆額上汗出連聲不絕者又為惡候不可治也若傷寒欬逆上氣其脉散者死謂其形損故也

橘皮竹茹湯 治吐利後胃虛膈熱而欬逆者

橘皮 三錢 竹茹 二錢 人參 二錢 甘草 錢一

石作一服水二鍾棗二枚生薑五片煎至八分不拘時服

半夏生薑湯 治噦欲死

半夏 湯泡七次 生薑 五錢 水六錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾分二服不拘時服
丁香柿蒂散 治吐利及病後胃中虛寒欬逆至七八聲相連收氣不同者難治

丁香 柿蒂 人參 茯苓

橘皮 良薑 炒 半夏 湯泡七次已 生薑 一兩

甘草 錢七

右為末每服三錢水一鍾煎至六分乘熱頓服

橘皮乾薑湯 專治胃虛寒噦

人參 一錢 通草 桂心 橘皮

乾薑 甘草 二錢

○選要卷五 九

右吹咀作一服用水二鍾煎至八分食遠溫服

羌活附子散 治傷寒後胃虛寒及吐利後胃欬逆

附子 炮去 羌活 去蘆 茴香 炒各 木香 不見

丁香 乾薑 炮各 二兩

右為末每服二錢水一鍾鹽一捻煎十數沸不拘時

熱服

柿蒂湯 治胃膈痞滿欬逆

柿蒂 五錢 丁香 三錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至八分食遠熱服

桂苓白朮圓 治欬逆止咳嗽散痞滿壅塞關堅結痛

悶進飲食調和五臟

辣桂

乾生薑

各二錢半夏湯泡七次

茯苓

去皮各一兩

白朮

陳皮

去白澤瀉五錢

右為細末麴糊和圓如小豆大每服二三十圓生薑湯下日三服病在上食後服病在下食前服病在中不拘時服一方用黃蘗黃連各半兩水同服効

單澄茄散 治噫氣欬逆亦治傷寒欬逆日夜不定

單澄茄

良薑

各二兩

右為末每服二錢水一盞煎六分沸投醋半盞取出呷之

灸欬逆法

其法於患人乳下一指許正與乳相值骨間陷處如婦人即屈乳頭下乳頭齊處是穴灸之艾炷如豆大灸三壯男左女右只灸一處火到肌即瘥如不瘥者難治其穴當取乳下動脉處

小柴胡湯 治傷寒熱證欬逆嘔噦

方見傷寒門加柿蒂煎服

治寒氣攻胃欬噫

草豆蔻

去皮

益智

去皮各一兩

乾柿蒂

二兩

右以咀每服三錢用水一鍾生薑三片煎至五分去粗不拘時熱服

硫黃煅法 治欬逆服藥無効者

硫黃

乳香

右各一錢半為末用酒一盞煎至七分急令患人喫其熱氣即止

頭痛

夫頭者諸陽之會其圓象天故居人身之上若頭痛不止乃三陽受病也難經云手三陽之脉受風寒伏留而不去名厥頭痛如痛引腦顛陷至泥丸宮者名真頭痛其真頭痛者旦發夕死夕發旦死不可治也蓋頭居其上當風寒之衝一有間隙則若頭若腦若耳若鼻風邪乘虛皆得而入之矣體虛之人或為風寒之氣所侵邪正相搏伏而不散發為偏正頭疼其脉多浮緊又有胸膈停痰厥而頭痛蓋厥者逆也逆壅而衝於頭也痰厥之脉特伏特見亦有腎虛而氣

金匱要略

卷五

五

厥并新沐之後當風露臥皆能令人頭痛當究其所因風邪則驅散之痰厥則溫利之腎虛則補煖之有頭風之證與頭痛無異但有新久去留之分耳淺而近者名頭痛其痛卒然而至易於解散速安也深而遠者名頭風其痛作止不常愈後觸感復發也此頭痛頭風深淺之不同也其脉短滑者難治浮滑者易治若細分六經用藥之法以明濕熱寒濕之證東垣論之詳矣茲不復論

芎朮湯 治濕頭痛眩暈痛極

川芎

附子 生去

白朮 已上

桂心 去皮

甘草 各一錢

右作一服用水二鍾生薑七片棗二枚煎至八分食遠服

天香散 治年久頭風不得愈者

天南星 半夏 湯泡 川烏 去皮 白芷 各二錢

右咬咀作一服用水二鍾入生薑自然汁小半盞煎至八分食遠服

芎辛通痰湯 治痰厥頭痛

川芎 細辛 產星 陳皮 去白

茯苓 已上各一錢半 半夏 湯泡七錢 枳實 麩炒 甘草 各一錢

金匱要略

卷五

五

右咬咀作一服用水一鍾生薑七片煎至八分食後服

小芎辛湯 治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不止

川芎 三錢 細辛 洗去 白朮 甘草 各一錢

右作一服用水二鍾生薑五片芽茶撮煎至一鍾去粗食後服

川芎散 治風盛腦壅鼻塞清涕熱氣上攻眼目多淚

生膠及偏正頭痛

川芎 柴胡 各二錢 細辛 半夏 麩炒

人參 前胡 防風 甘菊 花

甘草 各一兩 海狗 半條

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

菊花散 治風熱上攻頭痛不止

甘菊花 去梗 旋覆花 去梗 防風 去蘆 枳殼 麩炒

羌活 去蘆 蔓荊子 石膏 甘草 各一兩 半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

川芎羌活散 專治頭風頭痛

川芎 細辛 蔓荊子 藜蘆 各一兩 半

羌活 防風 各半 白芷 半錢

右咬咀作一服水二鍾煎至八分食後臨臥熱服

落盡湯 治偏正頭疼頭風

麻黃 二錢 人參 半錢 陳皮 去白 二錢 甘草 錢二

御米殼 去腸 穢 頂 半

右咬咀用水二鍾生薑七片煎至八分食後溫服

川芎茶調散 治諸風上攻頭昏重偏正頭疼鼻塞聲重

川芎 荆芥 各四 細辛 去葉 白芷

羌活 各一 防風 半兩 薄荷 各一兩 半

右為細末每服二錢食後茶清調服

如聖餅子 治風寒伏留陽經氣發痰飲一切頭痛

防風 去蘆 半夏 生用 天麻 已上各 南星 湯泡

川烏 炮去 乾薑 炮已上 川芎 甘草 各一兩 半

右為細末用薑糊和圓如雞頭實大捻作餅子每服

三五餅食後用荆芥湯或茶酒細嚼送下一方加細

辛

都梁圓 治風項背頭目昏眩以及腦痛婦人產前產

後傷風頭痛並皆治之

香白芷 擇白色大塊者用湯 淨洗四五次曬乾

右為細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓食後荆芥

湯點茶細嚼下

定風餅子 治偏正頭風腦頂疼痛不可忍者

草烏 炮半兩 白芷 一兩 川芎 二兩 防風 去蘆

天麻 甘草 薄荷 各一 川烏 去蘆 半兩

細辛 五錢 石膏 水飛 一方無川烏石膏

右為細末薑糊和圓如龍眼大捻作餅子食後細嚼

茶清送下忌熱物一時

川芎散 治頭風偏正疼痛

羌活 細辛 川芎 香附 各一兩 半

槐花 甘草 炙 石膏 錢各七 荆芥 穗

薄荷 菊花 茵陳 防風 去蘆 各一兩 半

右為細末每服二錢食後茶清調下

抽刀一字散 治偏正頭痛頭風

烏頭生去皮鹽水浸一宿取出切片更以生薑汁浸一宿炒乾切急用之炮去皮尖

細辛 川芎各半錢 蟬蛻一處炒

右為細末每服一斗食後茶清調下一方有雄黃半兩

兩

芎辛圓 治頭痛面赤煩悶咽乾上膈風痰頭目昏

百餘疼痛項背拘急

川芎 防風 礬石已上各一兩 獨活已上各一兩

桔梗三兩 細辛 羌活 白附子

合連子末三 三六

甘草已上各半兩 天麻四兩 薄荷 荊芥各一兩半

右為細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓食後茶酒

化下

川芎石膏湯 治風熱上攻頭目昏眩痛悶風痰喘嗽

鼻塞口瘡煩渴淋閉眼生翳膜此藥清神利頭目

川芎 山梔子 芍藥 荊芥

當歸 黃芩 大黃 菊花

人參 白朮各半錢 石膏 防風去蘆

薄荷 連翹各錢 桔梗 寒水石

甘草 滑石各二錢半 砂仁二分

右咬咀分二服每服用水一鍾半煎至八分食後溫服忌薑蒜熱物

調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛其効如神

方見脾胃門內少加川芎蔓荊子細辛

止痛太陽丹

天南星 川芎各等分

右為細末用連翹白同搗爛作餅貼於太陽痛處

治頭痛方

右用水調草決明子末貼兩太陽穴効

合連子末五 三七

眩暈門

眩暈者痰火動於風也經云諸風掉眩皆屬肝木風火皆屬乎陽多為兼化陽主乎動兩動相搏則為旋轉也其為證也發於卒然之間眼目昏花如室旋轉起則眩倒也體虛之人外為四氣所困內為七情所傷鬱結成痰皆能令人一時眩暈目暗口噤頭痛項強因於風則脉浮自汗項強不仁因於寒則脉緊無汗筋掣掣痛因於暑則脉虛煩悶因於濕則脉沉帶吐逆此為異耳至於七情內傷者使臟氣不平鬱結中焦而為痰飲隨氣上攻令人頭眩眉稜骨疼目不

選要卷下

可開其證婦人得之最最多蓋婦人性多偏怒經云天之氣曰風人之氣曰怒怒則致傷肝木木動生風令人頭目旋運皆由於此亦有因醉飽房勞致傷精血腎氣不能歸元而諸氣逆上則為頭目眩暈矣治之當分內外因及寒熱虛實氣虛者補氣血虛者養血外挾風邪者發而祛之內挾痰飲者消而導之要在活法施治焉

半夏白朮天麻湯 治頭旋惡心煩悶氣喘短促心神顛倒兀兀欲吐目不敢開如在風雲中若頭痛眩暈身重如山不得安臥並皆治之

半夏 治風 白朮 茯苓 赤苓 去皮

陳皮 蒼朮 人參 神麴 炒

麥蘗 黃芪 澤瀉 乾薑 炮

黃蘗 錢半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

參苓白朮散 治風熱壅塞頭目昏眩消痰飲明耳目清

神

方見風門

三五七散 治陽虛風寒入腦頭痛目眩轉運如在舟車之上耳內蟬鳴風寒濕脾腳氣緩弱等疾

天雄 炮去 細辛 去土各 山茱萸 去核 乾薑 炮各

防風 去蘆 山藥 各七

右為細末每服二錢食前用溫酒調服

人參前胡湯 治風痰頭暈目眩

人參 八分 前胡 去蘆 南星 湯泡 半夏 麴

木香 枳殼 炒 橘紅 赤茯苓

紫蘇 甘草 炙已上各 一錢二分

右咬咀作一服 用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後

服

蔓荊子散 治風 頭旋運悶起則欲倒

<p>蔓荊子 半夏 羚羊角 蘇</p> <p>枳殼 麩炒 茯神 去木 黃芩</p> <p>防風 已上各 麥門冬 去心 石膏 各一兩 地骨皮</p> <p>赤箭 細辛 甘草 炙已上 各半兩</p> <p>右以咀每服六錢水二鍾生薑三片煎至八分去粗不拘時服</p>	<p>川芎散 治眩暈惡風自汗或身體不仁氣上衝胃戰搖如在舟車之上</p> <p>川芎 白朮 各三錢 北細辛 白茯苓</p> <p>粉草 已上各 桂枝 半錢</p> <p>右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服有痰兼青州白圓子服之</p>	<p>人參 白朮 麥門冬 去心 當歸 酒洗</p> <p>防風 各一兩 獨活 去苗 官桂 去皮 黃芪</p> <p>右以咀每服五錢水一鍾半煎至八分去粗食遠服</p> <p>白朮散 治風邪在胃頭旋不止復加嘔逆</p> <p>白朮 厚朴 去皮 甘菊花 各半兩 防風 去叉</p> <p>白芷 人參 已上各 一兩</p>
---	---	---

<p>右以咀每服五錢用水一鍾半生薑五片煎至八分食遠溫服</p> <p>香橘飲 治氣虛眩暈</p> <p>木香 橘皮 去白 白朮 半夏 麩</p> <p>白茯苓 縮砂 已上各 丁香 甘草 炙已上 各半兩</p> <p>右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服</p>	<p>芎藭散 治諸陽受風頭目旋運目視昏暗肝氣不清</p> <p>芎藭 甘菊花 各一兩 白朮 麩炒 細辛 去葉</p> <p>防風 去叉 羌活 已上各 旋覆花 草決明</p> <p>蟬蛻 洗已上 天麻 蜜蒙花 荊芥穗</p> <p>甘草 炙已上 各半兩</p> <p>右為細末每服二錢水一盞煎七分食後溫服湯煎亦可</p>	<p>羌活湯 治風頭眩筋脉拘急痰涎壅滯肢節煩疼</p> <p>羌活 前胡 去苗 石膏 研碎 白茯苓</p> <p>芎藭 枳殼 麩炒 黃芩 去心 甘菊花</p> <p>防風 細辛 去葉 甘草 炙已上 蔓荊子</p> <p>麻黃 去根節 黃連 去木 各一兩</p> <p>右以咀每服三錢水一盞生薑三片雞蘇三葉同煎至七分去粗不拘時服</p>
--	---	---

天麻羌活圓 治頭目風眩邪氣鼓作時或旋運

天麻 羌活 白芷 藁本

芎藭 芍藥 細辛 麻黃

牛黃 麝香 右為細末煉蜜和圓如皂角子大每服一二圓不拘時研薄荷酒下

芎藭圓 治偏正頭疼及風眩目運一邊鼻不聞香臭常流清涕或作臭氣一陣服芎藭等藥不効者服此

不十服愈及治噴嚏稠濃

川芎 硃砂 石膏 片腦

人參 茯苓 甘草 細辛

犀角 梔子 阿膠 麥門冬

右為細末煉蜜和圓如彈子大用硃砂為衣每服一圓或二圓食後細嚼茶酒任下

人參圓 治風頭眩目眩痰逆惡心胃膈痞滯咳嗽痰涎喘滿嘔逆不欲飲食

人參 白朮 延胡索 白芍

麥門冬 枳殼 前胡 木香

右為細末湯浸蒸餅和圓如梧桐子大每服五十圓食後溫生薑湯送下

沉香磁石圓 治上盛下虛頭目眩暈耳鳴耳聾

沉香 蔓荊子 青鹽 甘菊

巴戟 胡蘆巴 山藥 磁石

右為細末用酒煮米糊和圓如梧桐子大每服五十圓加至七十圓空心用鹽湯送下

增損黑錫丹 治陰陽不升降上熱下冷頭目眩暈病至危篤或煖上僭愈甚者

黑錫丹 肉豆蔻 附子 破故紙

葫蘆巴 官桂 茴香 青皮

川練子 陽起石 木香 沉香

烏藥 磁石 右為細末酒煮糊和圓如梧桐子大每服五七十圓濃煎人參茯苓生薑棗湯送下空心服一方無磁石

川芎散 治風眩頭暈

山藥 山藥 甘菊花 人參

右為末每服二錢溫酒調服不拘時日三服祛痰圓 治風頭眩痰逆惡心胃膈不利

南星 半夏 赤茯苓 陳皮

乾薑炮合

右爲細末麪糊和圓如梧桐子大每服五十圓不拘時用溫米飲送下

芎藭散 治風頭旋眼目昏痛眩暈倦怠心忪

芎藭

前胡

白礬炮合

人參已上各一兩

蔓荊子

天麻

防風去叉已上各半兩

右爲細末每服二錢食後溫酒調下

腰脇痛門一

夫腰者腎之外候一身所恃以轉移闔闔者也蓋諸經皆貫於腎而絡於腰脊腎氣一虛腰必痛矣腰痛有五所感不同一曰陽氣不足少陰腎衰是以腰痛二曰風痺風寒濕著腰而痛三曰腎虛勞役傷腎而痛四曰墜墮險地傷腰而痛五曰寢臥濕地而痛又有三因而分之蓋太陽少陰多中寒少陽厥陰多中風陽明太陰多中濕此六經腰痛者爲外因也若失志傷腎鬱怒傷肝憂思傷脾若此腰痛爲內因也墜墮險地傷腰而痛爲不內不外因也當於五種三因而推之不過從其所由汗下補瀉之法以療之其脉浮弦爲風弦緊爲寒沉細爲濕沉實爲熱沉澁爲氣與血也風則散之寒則溫之濕則燥之熱則清之氣則順之血則和之此治之法也至若脇痛者厥陰肝經爲病也其痛自兩脇下痛引小腹亦當視內外所感之邪而治之若因暴怒傷觸悲哀氣結飲食過度冷熱失調顛仆傷形或痰積流注於脇與血相搏皆能爲痛此內因也若傷寒少陽耳聾脇痛風寒所襲而爲脇痛此外因也治之當以散結順氣化痰和血爲主平其肝而導其滯則無不愈矣

獨活寄生湯 治風傷腎經腰痛如掣久不治流入脚
膝為偏枯冷痺緩弱之患及婦人新產腰脚掣急寒
痛除風活血

獨活

桑寄生如無以川
續斷代之

白芍藥

細辛

桂心

芎藭

防風

人參

熟地黃

川當歸

秦朮

牛膝

茯苓

杜仲去皮切
炒去絲

甘草炙各
一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

獨活湯 治因勞役腰痛如折沉重如山

獨活

羌活

防風

肉桂

大黃

煨

澤瀉已上各
二錢半

當歸梢

防已

酒拌

黃蘗

酒拌

甘草炙已上
各一錢

桃仁二十
五箇

右作一服水二鍾好酒半盞煎至一鍾食前服

麻黃蒼朮湯 治寒濕所客身體沉重腰痛面色痿黃

不澤

麻黃

澤瀉

炒麴

茯苓

陳皮

各一
錢

半夏

薑製

桂枝

草豆蔻

猪苓

各半
錢

黃芪

三錢

杏仁去皮尖
十箇

蒼朮

浸
米泔

甘草

炙各
二錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服

當歸拈痛湯 治濕熱為病肢節煩疼有背沉重胃脘

不利及遍身疼痛下注於足脛痛腫不可忍

當歸身

知母

酒洗

茯苓

去皮

澤瀉

猪苓

白朮

已上各
八分

苦參

酒洗

人參

葛根

升麻

已上各
七分

茵陳

酒洗

黃芩

羌活

甘草

炙各一
錢

防風

去蘆

蒼朮

各八
分

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

舒經湯 治臂痛不能舉有人常苦左臂痛或以為飲

或以為風為濕諸藥悉投繼以鍼灸俱不得効用此

方而愈蓋是氣血凝滯經絡不行所致非風非濕腰

以下食前服腰以上食後服

片薑黃

二錢如無則以
蘇合代

赤芍藥

當歸

海桐皮

去粗

白朮

已上各
一錢半

羌活

甘草

炙各
一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓磨沉

香汁許食前服

木附湯 治濕傷腎經腰重冷痛小便自利

白朮

四錢

附子

炮去
皮

杜仲

去皮炒去
絲

各三錢

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾空心服

五積散 治寒濕傷於腎經腰痛不可俛仰

方見寒門

木香流氣飲 治氣滯腰痛

方見氣門

腎着湯 治居處卑濕或雨露所襲濕傷腎經腰重冷痛如帶五千錢冷水洗如將熟物着痛處方小寬不渴小便自利

茯苓

乾薑炮各五錢

白朮二錢半

甘草炙一錢

右咬咀分二服 每服用水二鍾煎至八分食遠服

獨活散 治冷滯風氣攻刺腰膝疼痛

獨活

附子炮各一兩

牛膝

赤芍藥

桂心

馬薊

當歸微炒已上各三分

桃仁半兩湯浸去皮尖雙仁麩少微黃

右咬咀每服五錢水一鍾半生薑三片煎至八分

滓食前溫服

養腎散 治腰脚筋骨痠痛不能步履其効如神

蒼朮

去尖各一兩

全蠍去毒半兩

天麻三錢

附子炮主

草烏二錢

右爲細末每服二錢淋黑豆酒調下藥氣所至麻痺

少時須更疾藥氣頓愈

青娥圓 治腎虛腰腿疼痛常服壯筋補虛止遺精

白濁

杜仲一斤炒去絲 破故紙一斤炒 生薑十兩炒

右爲細末用胡桃一百二十箇湯浸去皮研成膏入少熟蜜和圓如梧桐子大每服五十圓空心鹽酒量湯任下

立安圓 治五種腰痛常服補煖腎經壯健腰脚

破故紙

乾木瓜

杜仲去皮薑炒 牛膝酒洗

續斷已上各一兩 草薢二兩

右爲細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五十圓空心用溫酒或鹽湯送下

橘香圓 治腰痛經久不瘥

橘核炒

茴香

葫蘆巴炒

菴蘭子炒

破故紙炒 附子炮各半兩

右爲細末酒煮麪糊和圓如梧桐子大每服三四十圓空心淡鹽湯送下

沉香圓 治腎臟風虛冷滯腰間久痛連腿膝麻痺或時疼痛乏力羸瘦

沉香

桂心

草薢

熟乾地黄

白茯苓

海桐皮

栝櫚

杜仲去粗皮

石斛去根

牛膝

羌活

漏蘆已上各七錢半

芍藥

木香

當歸剉微

白朮

防風已上各半兩 附子炮去 補骨脂微炒已上

右為細末煉蜜和搗三五百杵圓如梧桐子大每服三十圓空心用溫酒送下晚間食前再服

如神湯一名舒筋湯 治男子婦人腰痛閃肋血滯腹中

疝痛產後服之更妙

延胡索微炒 當歸各半 桂心各半

右為細末每服二錢不拘時用溫酒調服一方加杜仲或加桃仁牛膝續斷亦可

養蘭圓 治墜隨閃肋血氣凝滯腰痛

養蘭子 當歸酒浸 威靈仙 破故紙炒

杜仲炒 桂心已上各五錢 乳香別研 沒藥別研各

右為細末酒煮麴糊和圓如梧桐子大每服七十圓空心用鹽湯或鹽酒任下

治腰痛如神方

杜仲絲去 木香各四兩 官桂一兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下

脇痛通治方

芍藥湯 治脇下痛不可忍者

川芎 乾葛 桂枝 枳殼微炒 細辛 芍藥 麻黃 人參去蘆

防風去蘆已上各一錢 甘草炙半

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食遠服分氣紫蘇飲 治腹脇疼痛氣促喘急

紫蘇 桑皮炙 五味子去核 桔梗去蘆

草果仁 人腹皮 白茯苓 陳皮

甘草各半

右作一服水二鍾生薑三片入鹽少許煎至一鍾空心服

枳殼煮散 治悲哀傷肝氣引兩脇疼痛

枳殼微炒 細辛 川芎 乾葛

防風 甘草 桔梗各一錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服香橘湯 治七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附子炒 橘紅 半夏薑製各二錢 甘草炙一錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食遠服

遠服

芍歸芍藥湯 治肝積氣滯在左脇下遇發作手足頭

面昏痛

川芎 當歸 芍藥 桂枝 防風 枳實 羌活 甘草已上各一錢

乾葛四分 麻黃三分 側子二分
去皮

右咬咀分作二服每服用水二鍾生薑三片煎至七分去粗不拘時服有汗避風

加味小柴胡湯 治傷寒脇痛

柴胡 黃芩各二錢 人參 半夏各一錢半

牡蠣粉 枳殼各炒 甘草各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至一鍾食

遠服

異香散 治腹脇膨脹痞悶噎塞一切氣痞腰脇刺痛

蓬茂根 益智 甘草 三稜各一錢半

青皮 陳皮各一錢 石蓮肉七分 厚朴各八分

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片鹽一捻煎八分

食遠服

流氣飲子 治五臟不和三焦氣壅心胃痞悶噎塞不

通腹脇脹痛嘔吐不食

方見氣門

聚氣湯 治氣或一邊或左或右不循上下或肌肉之

間如錐刀所刺其氣不得見令人腹中痛滿由驚憂

患奴感受寒執留而不散為鬱伏之氣因氣流行隨

經上下相搏而痛父令人痞悶其脉短澁謂之聚氣

狀如癥瘕攻刺腰脇上下室塞小腹膜脹大小便不

利或泄瀉淋瀝無度並宜服之一名大七氣湯

三稜 蓬茂 青皮去穢 陳皮去白

桂心不見火 藿香 桔梗去蘆 益智

香附子炒各一錢 甘草分五

右作一服用水二鍾煎至一鍾去粗食前溫服

推氣散 治右脇疼痛脹滿不食

片薑黃 枳殼炒 桂心不見火 甘草各二錢

右為細末每服二錢薑棗湯調下

木通散 治男子婦人脇肋苦痛

木通去節 青皮去穢 蘿蔔子炒 茴香炒

川楝子取肉用巴豆半兩同炒黃 滑石另研

義茂 木香已上各半兩

右為細末每服三錢不拘時用蔥白湯調服即愈甚

者不過三服

白木圓 治息積病脇下滿逆妨悶喘息不便呼吸引

痛不可鍼灸宜導引服藥

白木 枳實 官桂已上各一兩 人參二兩

陳皮 桔梗醋炒 甘草各一兩

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五十圓不拘

時溫酒送下日三服

枳芎散 治左脇刺痛不可忍者

枳實熟炒 川芎各半 粉甘草炙

右為細末每服二錢濃煎蔥白湯調下或薑棗湯調下酒調亦可食遠服

芍藥散 治婦人脇痛

白芍藥 延胡索 肉桂已上各

香附子二兩醋一升鹽

右為細末每服二錢不拘時白湯調服

當歸龍會圓 治肝火盛濕熱內鬱兩脇疼痛

草龍膽酒洗 當歸 大梔子 黃連

黃芩各一兩半 大黃 蘆薈各半 木香一錢

黃蘗一兩 麝香少許

右為細末麪糊圓如梧桐子大每服三五十圓薑湯

下一方加川芎柴胡各半

醫方選要卷之五

醫方選要卷之六目錄

痰飲門 附論

導痰湯 海藏五飲湯 二陳湯

橘皮湯 俞山人降氣湯 茯苓半夏湯

御愛紫宸湯 柴胡半夏湯 半夏白朮天麻湯

枇杷葉散 驅痰飲子 丁香茯苓湯

旋覆花散 茯苓圓 辰砂化痰圓

大人參半夏圓 清氣化痰圓 滾痰圓

中和圓 溫胃化痰圓 神仙墜痰圓

控涎丹 丁香五香圓 八珍圓

快活圓 清氣化痰圓 利膈化痰圓

喘門 附論

人參定喘湯 定喘湯 五味子湯

千緡湯 杏蘇散 玉華散

紫蘇子湯 杏參散 元寶湯

神祕湯 四磨湯 人參理肺湯

麻黃散 調降湯 八仙圓

沉香散 五味子散 百花膏

定喘丹 紫金丹 人參紫苑湯

消渴門 附論

痰飲門

良醫副主周文采編集

痰飲為病所感不同有因氣脉閉塞津液不通水飲
停留脾胃鬱結而成痰者有脾胃虛弱不能運行水
穀而成痰者有因酒後飲水停滯胃中而成痰者有
風寒濕熱之氣入脾相搏而成痰者或喜怒哀樂之
過情飲食起居之不節濕熱內蘊風寒外持皆為痰
飲所得之由不同而所變之病甚多或為寒或為熱
或為喘嗽嘔吐或為翻胃膈噎以致為腫滿為眩暈
為風癰為嘔氣為吞酸為嘈雜為痞膈為痰痛為怔

忡此皆痰之為病也又有五飲一曰懸飲者飲水流
於腸下咳嗽引痛二曰溢飲者飲水流於四肢當汗
不汗身體疼痛重三曰支飲者飲逆倚息短氣不得臥
其形如腫四曰痰飲者其人素虛腸間漚漚有聲五
曰留飲者背惡寒或短氣而渴四肢歷節疼痛脇下
滿飲飲益咳嗽轉甚此五飲為病不同也東垣謂脾
土上應於天亦屬濕土所以水較津液不行即停聚
而為痰飲也故有五痰之分言其濕熱相乘也如濕
在心經為熱痰結而如膠其色紅濕在肝經為風痰
其色青如沫濕在脾經為濕痰濕久而熱其色黃濕

在肺經為氣痰其色白咯出如米粒濕在腎經為寒
痰其色黑如唾由此言之歲氣淫邪乘於脾胃津液
不布積為痰飲也亦必從其所乘之氣無化而為五
痰也夫人之氣貴乎順氣順則津液流通而無痰飲
之患也其脉偏弦為飲浮而滑為痰治法宜先順氣
除濕次消導之或汗或下或溫或利在乎臨病消息
焉

導痰湯 治一切痰涎壅盛或胃膈留飲痞塞不通

半夏湯泡 天南星炮 枳實去穢 赤茯苓去皮

橘紅已上各二錢 甘草一錢

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾食後服

海藏五飲湯 一留飲心下二潏飲脇下三痰飲胃中

四溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後飲冷過多

故有此疾

旋覆花去梗 人參去蘆 陳皮去白 枳實去穢

茯苓去皮 白朮 厚朴薑製 半夏湯泡

猪苓 澤瀉 前胡 桂心

芍藥 甘草炙已上各一錢

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服

或因飲酒多加乾葛砂仁

二陳湯 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中
皖不快或因食生冷或飲食過多脾胃不和並皆治
之

陳皮 去白 茯苓 去皮 半夏 湯泡 甘草 炙各

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

橘皮湯 治胃膈停痰

橘皮 茯苓 去皮 半夏 薑製各 旋覆花

青皮 去穢 桔梗 枳殼 薑製 細辛

人參 已上各 甘草 一錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

俞山入降氣湯

治上盛下虛痰涎壅盛或喘或滿咽

乾不利并治脚氣上攻煩渴引飲

前胡 去蘆 黃芪 厚朴 薑製 五加皮 薑製

當歸 去蘆 桔梗 羌活 半夏 麴

人參 土蘆 陳皮 已上各 乾薑 炮 附子 炮去

官桂 已上各 紫蘇子 一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

茯苓 半夏湯 治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪

羈絆於脾胃之間當先實於脾胃

茯苓 白朮 半夏 薑製 神麴 炒各

麥蘖 炒一 陳皮 天麻 各二

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

御愛紫宸湯 解宿酒嘔噦惡心痰唾不進飲食

木香 半兩不砂仁 葛花 檀香 不見

茯苓 官桂 藿香 已上各 陳皮

乾葛 良薑 丁香 不見 甘草 炙已上

右吹咀每服四錢水一盞半煎至八分去粗不拘時

服

柴胡半夏湯 治風證不敢見風眼眩頭痛有痰眼黑

惡心兀兀欲吐風來覺皮肉緊手足重難舉居暖處

有微汗便減如見風即復作一名補肝湯

此胡 蒼朮 錢各一 半夏 二錢 皂莢 二錢

神麴 炒 藁本 錢各一 升麻 半錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

半夏白朮天麻湯 治頭目眩暈惡心煩悶氣促上喘

無力心神顛倒兀兀欲吐目不敢開如在風雲中痰

厥頭痛如裂身重如山脾胃虛損停痰並皆治之

方見眩暈門

枇杷葉散 治痰逆此藥溫胃可思飲食

青皮 焙去穢 草豆蔻 各半 前胡 枇杷葉 炙去毛

半夏

湯泡

茯苓

去皮

人參

大腹皮

白朮

厚朴

去粗皮薑汁炙
已上各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾生薑三片煎至六分去粗不拘時熱服

驅痰飲子 治痰飲如人頭痛背疼飲食嘔惡皆痰飲之證

天南星

切竹十二
湯洗七次

半夏

湯浸
七次 青皮

陳皮

去白各一兩

赤茯苓

草果仁

甘草

右咬咀每服四錢水一盞生薑七片紅棗一枚煎至七分去粗不拘時通口服如遇飲酒先進一服後再

一服或次日夜醒又一服永無痰飲

丁香茯苓湯 治脾胃虛寒宿飲留滯以致嘔吐痰沫或有酸水不思飲食

丁香

茯苓

去皮

木香

各二兩 乾薑

附子

炮去

半夏

湯泡

肉桂

土粗
各二兩 陳皮

縮砂

半兩

右咬咀每服四錢水一鍾半生薑七片棗一枚煎至七分食遠服

旋覆花散 治心胃痰熱頭目旋痛飲食不下

旋覆花

甘草

炙各半兩

枳殼

麩炒
石膏各二兩
細研

麥門冬

去心 赤茯苓

柴胡

人參

犀角屑

防風

去叉

黃芩

已上各七錢半

右咬咀每服五錢水一鍾半生薑三片煎至七分食後服

茯苓圓 本治臂痛具指迷方中云有人臂痛不能舉

手足或左右時復轉移由伏痰在內中腕停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾脾滯而氣不下故上行攻臂其脉沉細者是也後人謂臂痛乃痰證也但治痰而臂痛自止

半夏

二兩 茯苓

一兩

枳殼

去穢
麩炒半兩

朴硝

六錢

六

右為細末生薑汁煮麩糊圓如梧桐子大每服三十圓生薑湯送下風化朴硝一時未易成但以朴硝撒在竹盤中少時成水置當風處即乾如芒硝刮取用亦可

累有人為痰所苦夜間兩臂常覺有如人抽牽兩手戰掉至於茶盞亦不能舉隨服隨愈痰藥方多立見功效者未有如此神妙

辰砂化痰圓 治風痰安神定志利咽膈清頭目

辰砂

水飛研
為長

白礬

枯研各半兩

天南星

炮一兩

半夏

三兩

右為細末薑汁煮麩糊和圓如梧桐子大用辰砂為

衣每服三十圓食後生薑湯送下

大人參半夏圓 墜化痰涎止嗽定喘治諸痰不可盡述

人參 去蘆 茯苓 去皮 天南星 薄荷 已上各半兩

白礬 生用 乾生薑 寒水石 半夏 已上各一兩

蛤粉 二兩 藿香 二錢

右為細末麴糊和圓如菉豆大每服五十圓食後用生薑湯送下白湯亦可一方加黃連半兩黃蘗二兩取効愈妙又治酒病調和臟腑尤宜服之

清氣化痰圓 治上焦痰火壅盛或嗽或喘煩熱口乾

胃膈痞悶

天南星 三兩 半夏 湯泡 黃連 去蘆 黃芩 各五兩

栝婁仁 去殼 茯苓 去皮 杏仁 去皮尖 陳皮

枳實 炒各 甘草 二兩

右為細末薑汁煮麴糊和圓如梧桐子大每服七十

圓食後薑湯送下

滾痰圓 專治一切宿滯之痰及風熱痰

大黃 八兩 礬黃 八兩 沉香 半兩

青礬石 一兩半 同煅硝 一兩半 用一方加硃砂 一兩

右為細末麴糊為圓如菉豆大每服五十圓食後白

湯或茶酒任下

中和圓 治濕熱痰氣

蒼朮 黃芩 半夏 薑製 香附子 各等分

右為細末粥圓如梧桐子大每服五七十圓食後薑湯送下

溫胃化痰圓 治膈內有寒脾胃傷飲胃膈不快痰涎不已

半夏 三兩 陳皮 乾薑 炮 白朮 各二兩

右為細末用薑汁煮麴糊為圓如梧桐子大每服五十圓食後薑湯或白湯送下

神仙墜痰圓 治痰飲胃膈痞塞此藥下痰

皂角 無蟲性者剉去皮弦斷炙 白礬 一兩

黑牽牛 一斤取頭末四兩

右為細末滴水圓如梧桐子大每服三十圓漸加至百圓空心用溫酒送下青病輕重輕者五日十日

愈重者半月一月愈久服小無癰瘕之疾

控涎丹 治痰飲停積胃膈結為塊喘滿不安痛連

腎脇走注不定決不可誤作風痛癰瘕等證治之

甘遂 去心 紫大戟 去沙 白芥子 真者各等分

右為細末水煮麴糊和圓如梧桐子大曬乾每服三

十圓臨睡用淡生薑湯或熱水送下以下痰飲為愈

丁香五套圓 治胃氣虛弱三焦痞塞不能宣行水穀

故為痰飲結聚胸膈之間嘔吐惡心腹滿不食

丁香不見火 木香不見火 陳皮去白 青皮已上各半兩

白朮 乾薑炮 茯苓去皮 畏薑已上各半兩

半夏 天南星各二兩同半夏浸三日

右為細末用神麴一兩麥蘖二兩同研取麴糲糊和圓如梧桐子大每服二十圓不拘時熱水送下常服

溫脾順氣

八珍圓 治膈痰結實胸膈不利喘嗽嘔逆

丹砂研半 犀角鎔 羚羊角鎔 茯神去木

牛黃研 龍腦研已上 一分牛膽南星 鵬砂研各一錢

右為細末研勻煉蜜和圓如雞頭實大每服一圓食後嚼細用人參煎茶湯送下

快活圓 常服消食化痰養生之家不可缺

枳殼半兩 官桂一兩 半夏湯洗 桔梗各二兩

右為細末用生薑汁煮麴糊和圓如梧桐子大每服

二十圓不拘時用生薑湯送下日進一二服

消氣化痰圓 清利胸膈順氣化痰寬中健脾消導飲

食治痰之聖藥也

半夏八兩 南星六兩 枳實去白 黃連去須

紫蘇子炒 陳皮去白 枳實麩炒 茯苓去皮

蘿蔔子炒 山查已上各二兩 乾生薑二兩 甘草炙

香附子炒 黃芩已上各二兩

右將南星切作十字塊半夏每箇切作二塊皂莢六兩白礬三兩多用水將南星半夏皂莢白礬一處浸三宿煮至南星心黑潤為度取出去皂莢不用將南星半夏曬乾同眾藥為末水糊為圓如梧桐子大每服七八十圓加至百圓食遠或臨睡茶清送下

利膈化痰圓 治痰火大盛胸膈迷悶嘔吐煩燥頭眩

咳嗽

南星湯泡燉 蛤粉研細 半夏薑製 香附子童便

枳實去白 貝母去心各半兩 枳實麩炒

右為末用猪牙皂角十四挺敲碎水一盞半煮杏仁去皮尖一兩煮水將乾去皂角搗杏仁如泥入前藥搜和再入薑汁泡蒸餅圓如棗豆大青黛為衣每服五十圓薑湯下

喘門

夫喘者肺病也肺主氣一呼一吸上升下降榮衛息數往來流通安有所謂喘耶唯夫邪氣伏藏痰涎浮湧呼不得呼吸不得吸於是上氣促急填塞肺脫激亂爭鳴如鼎之沸而喘之形壯具矣有肺虛挾寒而喘者有肺實挾熱而喘者有水氣乘肺而喘者有驚憂氣鬱肺脹而喘者有胃絡不和而喘者有腎氣虛損而喘者如是等類皆當審證而主治之若肺虛肺寒必有氣乏表怯冷痰如水之證法當溫補之肺實肺熱必有壅盛胃滿外關上炎之狀法當清利之水

氣者漉漉有聲怔忡浮腫法當逐水利小便驚憂者惕惕然引息鼻張法當寬中下氣胃絡不和者宜分氣化痰以和之腎氣虛損者宜助陽接真以補之至若傷寒發汗表汗裏下脚氣喘滿躁動收功此則但療本病其喘自安雖然喘有利下而愈者亦有因瀉而喘者喘有數年沉痾而復喘者亦有忽因他疾大喘而不救者右汗出髮澀喘不休者為肺絕身汗如油而喘者為命絕直視譫語喘滿者不治及諸篤病正氣欲絕之時邪氣必行壅逆而為喘然則喘之危惡又安可以尋常治之耶

人參定喘湯 治肺氣上喘喉中有聲坐臥不安胃膈

緊痛及治肺感寒邪咳嗽聲重

人參 去蘆 麻黃 上節 阿膠 炒粉 半夏 麴

五味子 罌粟殼 去毒 甘草 已上各 桑白皮 二錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

定喘湯 治上氣喘嗽一名定肺湯

紫菀 橘紅 杏仁 去皮 五味子

枳殼 炒 半夏 薑製 桑皮 炒 紫蘇子 炒

甘草 已上各 一錢半

右以咀作一服用水二鍾生薑三片紫蘇葉五葉煎

至一鍾食後服

五味子湯 治喘促脉伏而數者

五味子 二錢 人參 去蘆 麥門冬 去心 杏仁 去皮

橘皮 已上各 一錢

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗三枚煎至一鍾

去滓不拘時服

千縷湯 治痰喘

半夏 七錢 已上各 每 皂角 去皮 炙 一錢

甘草節 一寸

右作一服用水二鍾生薑如指大一塊煎至半鍾去

粗頭服數貼瘥

杏蘇飲 治上氣喘嗽浮腫

杏仁 去皮尖炒

烏梅 去核

麻黃 去節

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

王華散 治咳嗽上喘調順肺經清利咽膈安和神氣

甜葶藶 焙

天門冬 去心

百合 蒸

人參 已上各

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾食後服

紫蘇子湯

治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣走澆澆有聲大小便不利脉虛緊而瀉

紫蘇子

木香 下見

枳實 麸炒

白木

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾去粗不拘時服

杏參散

治墜墮驚恐或渡水跌仆疲極喘息

杏仁 炒去

橘紅

白木

桂心 炙

右作一服用水二鍾生薑三片紫蘇一葉煎至一鍾去粗不拘時服

九寶湯

治經年喘嗽通用

方見咳嗽門

神祕湯

治上氣喘急不得臥者

陳皮

桔梗

紫蘇

五味子

右作二服每服用水二鍾煎至一鍾食遠服臥則喘者水氣逆上乘於肺也一方無桔梗五味子有桑白皮木香茯苓生薑煎服

四磨湯

治七情鬱結上氣喘急

沉香

檀榔

人參

右各濃磨水共取七分煎前三五沸不拘時服一方無人參有枳殼亦佳

人參理肺湯

治喘不止

人參

大腹皮

半夏 湯洗

甘草 炙

桑白皮

紫苑

杏仁 炙

枳實 麸炒

白木

桔梗

紫蘇

五味子

陳皮

神祕湯

治上氣喘急不得臥者

四磨湯

治七情鬱結上氣喘急

沉香

檀榔

人參

右各濃磨水共取七分煎前三五沸不拘時服一方無人參有枳殼亦佳

人參理肺湯

治喘不止

人參

杏仁 炒

橘紅

白木

桂心 炙

右作一服用水二鍾生薑三片紫蘇一葉煎至一鍾去粗不拘時服

九寶湯

治經年喘嗽通用

方見咳嗽門

神祕湯

治上氣喘急不得臥者

陳皮

桔梗

紫蘇

五味子

右作二服每服用水二鍾煎至一鍾食遠服臥則喘者水氣逆上乘於肺也一方無桔梗五味子有桑白皮木香茯苓生薑煎服

四磨湯

治七情鬱結上氣喘急

沉香

檀榔

人參

右各濃磨水共取七分煎前三五沸不拘時服一方無人參有枳殼亦佳

人參理肺湯

治喘不止

人參

杏仁 炒

右吹咀作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

麻黃散 治傷風喘急坐臥不安痰涎壅盛涕唾稠粘手足冷痺

麻黃 去節 四錢 款冬花 三錢 肉桂 二錢 杏仁 去皮尖炒 一錢半

訶子肉 二錢 甘草 炙 一錢

右作二服每服用水二鍾好茶一錢煎至八分食後服

調降湯 治喘嗽

枳殼 一兩 半夏 薑製 桔梗 青皮

陳皮 檳榔 茯苓 紫蘇子

甘草 炙 三錢 縮砂 白豆蔻 紫蘇葉 炙 五錢

右側作散每服三錢生薑五片水一鍾煎至七分不拘時服

八仙圓 治喘嗽神效

天南星 一兩 半夏 汁 款冬花 小皂角 炙 去

白礬 煅 三錢 甘草 炙 一兩 巴豆 七錢 杏仁 去皮尖炒 十五錢

大棗 三箇 炙 巴豆

右為細末醋煮大麵糊和圓如梧桐子大每服二十圓食後用溫滾漿汁送下或細嚼蘿蔔果子生薑

下

沉香散 定喘止咳

沉香 阿膠 炒 珠 二錢 人參 紫蘇

陳皮 各半 桑皮 二兩 微炒 氣 二錢 甘草 炙 半

右為細末每服二錢食後薑湯調下

五味子散 治肺虛寒喘下氣去痰飲務觀即中妙忽發喘嗽服諸藥不効得此三服遂愈

五味子 官桂 去粗 皮 一兩 茯苓 已上 各 一兩 陳皮 去白 三錢

右吹咀每服五錢水一大盞煎至六分食遠熱服陳

皮三分即七錢半

百花膏 治喘嗽不已痰中有血

百合 各半 款冬花 各半

右為細末煉蜜為圓如龍眼大每服一二圓食後細嚼安湯送下喻化尤佳

定喘丹 治久患咳嗽肺氣喘促倚息不得睡臥胸膈

久嗽亦宜服 累年不瘥漸至面目浮腫者神效

杏仁 去皮尖炒 大 二錢 馬兜零 蟬蛻 洗 去土 并足翅 已上 各一兩

右為細末蒸棗肉為圓如葵子大每服六七圓臨睡

用蔥茶清放冷送下忌熱物半日一名定喘瑞應丹

紫金丹 治喘喘

信石

半錢

淡豉

一兩

水煎去

右共研和圓如粟豆大每服七圓或十圓臨睡用冷茶清送下只一服二服後不可喫一應物湯水之類今以信八分豉一兩每服二十圓一法二件成膏搽枕內艾熏入生真珠末為圓服亦効有一親戚婦人患喘嗽十年遍求醫者皆不効忽有一道人貨此藥謾贖一服是夜減半數服頓愈遂多金丐得此方予屢用以救人特為神異

人參紫菀湯 治喘嗽久不愈者

方見咳嗽門

消渴門

消渴之證乃水火不能既濟陰虛陽盛之病也夫天一生水腎實主之膀胱為津液之府所以宣行腎水上潤於肺故識者以肺為津液之臟自上而下三焦臟腑皆圓乎天一真水之中素問以水之本在腎末在肺者此也真水不竭安有所謂渴哉人惟淫慾恣情酒麪無節酷嗜炙博糟藏醎酸酢醢肥甘腥羶之屬復以丹砂五石濟其私於是炎火上薰臟腑生熱燥氣熾盛津液乾焦渴引水漿而不能自禁矣渴之為病有三曰消渴曰消中曰消腎分上中下三焦而

合選要卷六

十八

應焉若熱氣上騰心虛受之心火散漫不能收斂胃中煩燥舌赤脣紅此渴引飲常多小便數而少病屬上焦謂之消渴熱蓄於中脾虛受之伏陽蒸胃消穀善饑飲食倍常不生肌肉此渴亦不甚煩但欲飲冷小便數而如泔病屬中焦謂之消中熱伏於下腎虛受之腿膝枯細骨節酸疼精走髓虛引水自救此渴飲水不多隨即溺下小便多而渴病屬下焦謂之消腎自消腎而析之又有五石過度之人真氣盡虛石氣獨留而腎為之虛熱陽道興強不交精泄謂之強中消渴輕也消中甚焉消腎又甚焉至於強中則不

可治也然真水不生日漸枯涸小便或油膩或赤黃或甘白或渴而且利或渴而不利或不渴而利但所食之物多從小便出焉甚而水氣浸漬溢於肌膚則肝為腫滿猛火自炎留於分肉則發為癰疽此又病之深而證之變者也其脉數大者生虛小者死治法其在滋陰水抑陽火使腎水上升心火下降陰陽停勻水火既濟三焦和平二火守位斯疾愈矣

降心湯 治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

天花粉 二錢 人參 去蘆 當歸 遠志 去心 薑汁炒

茯苓 去皮 黃芪 蜜炙 川芎 五味子

熟地黄 甘草 一錢 微炙各

右作一服水二鍾棗二枚煎至一鍾食前服

黃芪六一湯 治諸不足胸中煩悸時常消渴或先渴而欲發瘡或病癰疽而後渴者宜服之

黃芪 去蘆 蜜炙 甘草 錢半

右作一服用水二鍾棗二枚煎至一鍾不拘時服

地黃飲子 治消渴咽乾面赤煩燥

生地黃 熟地黄 天門冬 去心 麥門冬 去心

人參 去蘆 黃芪 蜜炙 石斛 去心 批把葉 蜜炙

枳殼 炒 澤瀉 去毛 甘草 一錢

石咬咀作一服用水二鍾煎至一鍾食後服
麥門冬飲子 治肺消胸滿心煩津液短少多為消渴病

麥門冬 去心 五味子 栝蒌實 生地黄

人參 去蘆 茯苓 上小 乾葛 知母

甘草 一錢 已上各 錢二分

右作一服用水二鍾竹葉十四片煎至一鍾不拘時服

六神湯 治三消渴疾

杜杞葉 去毛 栝蒌根 黃芪 乾葛

蓮房 甘草 錢二分

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服小便不利加

茯苓

黃芪湯 治諸渴疾

黃芪 蜜炙 茯苓 去皮 栝蒌根 麥門冬 去心

生地黃 五味子 甘草 錢半

右咬咀作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時服

人參散 治消腎等飲而食後數小便溺者

人參 砂仁 白朮 山梔子

桔梗 栝蒌 連翹 澤瀉 已上各 錢二分

<p>高根 黃芩 大黃 白茯苓</p>		<p>甘草 生用 薄荷 錢各一 石膏 寒水石</p>		<p>消石 錢各一</p>		<p>石作一服用水二鍾入蜜少許煎至一鍾不拘時服</p>		<p>天花散 治消渴</p>		<p>天花粉 生地黃 麥門冬 去心 乾葛 已上各一</p>		<p>五味子 甘草 已上各一</p>		<p>石作一服用水一鍾梗米百粒煎至一鍾食遠服</p>		<p>和血益氣湯 治消渴消中諸方只止燥渴殊不知足</p>		<p>陽明胃主血所生病手陽明大腸主津所生病此方</p>		<p>治口舌乾小便數舌上赤脉生津液除乾燥長肌肉</p>		<p>生地黃 酒浸 黃蘗 酒浸 升麻 已上各一 杏仁 已上各一</p>		<p>防己 酒浸 知母 酒炒 羌活 已上各一 桃仁 已上各一</p>		<p>石膏 八分 黃連 酒浸 當歸 酒浸 麻黃 二分</p>		<p>紅花 二分 柴胡 四分 甘草 主用三分</p>		<p>右以咀作一服用水二鍾煎至八分不拘時服</p>		<p>三和甘露飲 大治消渴有此證者每日須進一二服</p>		<p>滑石 石膏 二錢 知母 人參</p>		<p>白木 茯苓 猪苓 澤瀉 已上各一</p>		<p>甘草 半錢</p>	
---------------------	--	----------------------------	--	---------------	--	-----------------------------	--	----------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	----------------------------	--	------------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------------------	--	------------------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------	--	------------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------	--

<p>小咀咀用水二鍾煎至一鍾食遠溫服</p>		<p>參芪湯 治消渴</p>		<p>人參 去蘆 桔梗 去蘆 天花粉 甘草 已上各一</p>		<p>黃芪 益氣 白芍藥 各二 白茯苓 五味子 各一</p>		<p>右剉碎每服四錢水一鍾半煎至八分日進四服</p>		<p>滓合煎一方有乾葛木瓜烏梅</p>		<p>止渴潤燥湯 治消中大便秘澀燥硬無苦溫飲陰頭</p>		<p>退縮舌白乾燥唇口乾眼澀黑處見浮雲</p>		<p>升麻 一錢 黃蘗 酒浸 當歸 升 荊芥穗</p>		<p>桃仁泥 麻仁泥 知母 防風 已上各一</p>		<p>柴胡 石膏 各七 杏仁泥 一箇 熟地黃 三</p>		<p>甘草梢 小椒 各三 細辛 一分 紅花 少許</p>		<p>右以咀作一服水二鍾煎至一鍾食遠溫服忌辛熱</p>		<p>烏梅五味子湯 治消渴生津液</p>		<p>烏梅 五味子 百藥煎 巴戟 已上各一</p>		<p>甘草 二錢</p>		<p>右作一服用水二鍾煎至一鍾空心服</p>		<p>加味錢氏白朮散 治消中消殺善飢</p>		<p>人參 去蘆 白茯苓 去皮 白朮 已上各一 枳殼 錢各一</p>	
------------------------	--	----------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------------	--	---------------------	--	------------------------------	--	-------------------------	--	-----------------------------	--	---------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	-----------------------------	--	----------------------	--	---------------------------	--	--------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------------------	--

柴胡 藿香 乾葛 五味子

木香 甘草 一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

人參石膏湯 治膈消上焦燥渴不飲多食

人參 三錢 石膏 四錢 知母 二錢 甘草

黃芩 杏仁 一錢

右作一服水二鍾粳米一撮煎至一鍾不拘時服

加減八味圓 治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能

既濟心煩燥渴小便頻數白濁陰痿弱飲食不多肌

膚漸漸如削或腿腫脚先瘦小宜降心火生腎水其

煩煩止

白茯苓 去皮 牡丹皮 去骨 澤瀉 酒浸焙 五味子 炒

山茱萸 取肉 肉桂 去粗皮 熟地黃 蒸焙 山藥 二兩

右各研末秤和勻煉蜜為圓如梧桐子大每服五六

十圓五更初溫酒或鹽湯任下午前晚間空腹再服

此藥不惟止渴亦免生癰疽久服永除渴疾氣血加

壯

括葉散 治壯盛之時不自謹惜恣情縱慾年長腎氣

虛弱不能房事多服丹石真氣既盡石氣孤乏唇口

乾焦精液自泄小便赤黃大便乾實小便日夜百十

行須當除熱補虛

天花粉 宣黃連 白扁豆 白茯苓 去皮

寒水石 甘草節 人參 去蘆 白木 去蘆

石膏 猪苓 各等分

右為細末每服二錢不拘時用白湯調服

天王補心丹 寧心保神益血固精壯力強志令人不

忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸瘰癧乾口燥育養

心氣

人參 去蘆 丹參 洗 白茯苓 去皮 酸棗仁 洗

遠志 去心 百部 洗 石菖蒲 去毛 栝子仁

桔梗 去蘆 玄參 天門冬 去心 五味子

茯神 去木 當歸 熟地黃 各等分

右為細末煉蜜為圓每兩作十圓以金箔為衣燈心

棗湯化下食後臨臥服或圓如梧桐子每服五六十

圓亦可

平補圓 治消腎不渴肌肉瘦削小便澀數而滲如欲

滲之狀

兔絲子 酒洗 山茱萸 酒洗 益智仁 當歸 已上各

川練子 去核 牛膝 酒洗 胡蘆巴 炒 杜仲 去粗皮

肉苁蓉 酒洗 巴戟 去心 各 乳香 二兩

右為細末用糯米糊圓如梧桐子大每服五十圓食前
前素湯或鹽湯送下

天花粉圓 治消渴飲水多身體瘦弱

天花粉 人參去蘆各

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓食前
用麥門冬煎湯送下

硃砂黃連圓 治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴

辰砂一兩 官黃連三兩 生地黃二兩

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五十圓食前
燈心素湯送下

梅蘇圓 治消渴膈熱煩燥最能生津液

白梅肉 紫蘇葉 烏梅肉各半 麥門冬去心

百藥煎三兩 訶梨勒煨去核 人參各半 甘草炙一兩

右為細末煉黃蠟汁拌和為圓如雞頭實大每服一
圓不拘時噙化嚥津路行可解渴

肉苁蓉酒洗 地骨皮 澤瀉 五味子

巴戟去心 當歸酒洗 牡蠣炙 熟地黃炙

牡丹皮 白龍骨 甘草炙 磁石煅

赤石脂 人參已上各 禹餘糧煅 桑螵蛸炙

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服二十圓用牛
乳或白湯送下日進三服

茯苓丹 治三消渴通用亦治白濁

白茯苓五兩 兔絲子酒浸三宿蒸 五味子七兩

石蓮肉三兩

右為細末用山藥末六兩打糊搜和搗三五百杵圓
如梧桐子大每服五十圓食前用米飲湯送下

玉泉圓 治煩渴口乾

麥門冬去心 人參去蘆 茯苓去皮 黃芪半兩

烏梅肉煨 甘草已上各 天花粉 乾葛已上各

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服一圓不拘時細
嚼用白湯送下

梅花聚香湯 治消渴飲水至石斗病極者可服之即
愈

天花粉 烏梅肉 枇杷葉 麥門冬

五味子 枳實 人參 黃芪

乾葛已上各 檀香半兩

右為細末每服三錢熱水調下隨意不時服之

黃連猪肚圓 治消渴強中

黃連 梁米 枳實根 茯苓各四兩

海金沙散 治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施化或五種淋疾癰閉不通

海金沙 木通 滑石 瞿麥穗

通草 已上各一錢半 杏仁 去皮尖 麩

右作一服用水二鍾燈心二十莖煎至一鍾食前服

五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不止臍腹急痛或尿如豆汁或如沙石膏淋尿血並宜服之

山茵陳 淡竹葉 各一錢 木通 滑石

甘草 炙各一錢半 山梔子 炒 赤芍藥 赤茯苓 各一錢

右改咀作一服用水二鍾煎至一鍾食前服

導赤散 治心虛蘊熱小便赤淋或成淋痛

生地黃 四錢 木通 三錢 甘草 三錢

右作一服用水二鍾竹葉十片煎至一鍾不拘時服

清肺飲子 治渴而小便不利邪熱在上焦氣分也

茯苓 去皮 猪苓 去皮 澤瀉 各二錢 車前子 炒

琥珀 木通 瞿麥 篇蓄 各一錢

通草 燈心 各半錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

木香湯 治冷氣凝結小便淋瀝作痛身體寒冷

木香 木通 檳榔 當歸

遺精白濁門

夫精者五臟六腑皆有而腎為都會關司之所又聽命於心焉經云陰平陽秘精神乃治陰陽離決精神乃竭若腎水衰弱心火妄動然後遺精之病生焉蓋遺精之症有四一曰夢中交而遺者乃心虛神交也二曰下元虛敗精不禁而遺者乃腎虛精滑故也三曰壯年氣盛久節房慾經絡壅滯而遺者乃曠夫滿而溢也四曰情動於中而遺者乃為情不遂欲而泄也若夫壯年氣盛及情動於中者但舒其情自愈雖不餌藥可也至若夢中交泄則當治其心

遺精白濁

腎虛精滑則當固其真斯治之要也至如赤白濁者由腎水虛少膀胱火盛小便去泄所以成濁也蓋因思慮過度嗜慾無常俾心腎不交精元失守以為赤白二濁之患焉赤濁者為心虛有熱由思慮而得之白濁者為腎虛有寒因嗜慾而致也劉河間又謂白濁亦屬乎熱如清水作湯則有白脚夏熱則水濁濁冬寒則水澄清此理亦或然也雖然遺精白濁皆由心腎不交相火妄動而得泄所出之路非為一途其可一例言之蓋遺精則自精氣道中而出赤白濁則於小便尿孔中出所以不同也其濁澄定脚有濁濁

其狀凝面或如油或如膏糊或有五色光彩多則漸令人虛損而成癆也治法濁而赤者清其心濁而白者溫其經順其氣而調其榮養生者存其神而安其心節其慾而寶其精使水火既濟心腎平寧則斯患不作而復保其長生矣

加味清心飲 治心中客熱煩燥赤濁肥胎

白茯苓 去皮 石連肉 各一錢 益智仁 遠志 去心

麥門冬 去心 人參 去蘆 石菖蒲 車前子

白木 澤瀉 甘草 炙已上

右作一服用水二鍾燈心二十莖煎至一鍾食前服

有熱加薄荷少許

龍齒補心湯 治諸虛不足虛熱潮來心神驚悸腰臥

不寧小便油濁

龍齒 煨碾 人參 去蘆 熟地黃 洗焙 當歸 酒浸

桔梗 去蘆 酸棗仁 炒 白茯苓 去皮 茯神 去木

肉桂 去粗皮 麥門冬 去心 綿黃芪 蜜炙 遠志 去心 汁炒

枳殼 麩炒 半夏 麩 白朮 已上各一錢 甘草 炙半錢

右作一服用水二鍾生薑三片粳米一撮煎至一鍾

不拘時服

分清飲 治思慮過度清濁相干小便白濁

益智仁 片洗 石菖蒲 去毛 白茯苓 烏藥

川草薢 錢二分 甘草 炙八分

右咬咀作一服用水二鍾入鹽少許煎至八分食前服或為末每服二錢用鹽湯調服亦可

益智湯 治腎經虛寒遺精白濁四肢煩倦時發熱

鹿茸 去毛 已戟 去心 肉蓯蓉 酒洗 益智仁

熟地黃 酒浸 附子 炮去 桂心 山茱萸 煮

白芍藥 防風 去蘆 狗杞子 牛膝 酒洗

甘草 炙各一錢

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片鹽一捻煎至一

鍾空心服

小溫金散 治心虛觸冒暑熱旋下或赤或白淋瀝不

行時煩自汗

人參 去蘆 石連肉 去心 巴戟天 去心 益智仁

黃芪 蜜炙 草薢 酒浸 麥門冬 去心 赤茯苓 煮

甘草 炙各一錢

右咬咀用水二鍾燈心十根棗一枚煎至八分食前服

服

清心蓮子飲 治心中發熱煩燥思慮憂愁抑鬱小便

白濁或有沙膜夜夢走泄遺瀝澀痛便赤如或酒色

過度上盛下虛心火炎上肺金受剋故口乾燥漸成消渴四肢倦怠男子五淋婦人帶下赤白五心煩熱此藥溫平清心養神祕精神効

黃芩

麥門冬 去心

地骨皮

車前子 各錢半

甘草

白茯苓 去皮

黃芪 蜜炙

石蓮肉 去心

人參

錢半二

右咬咀分二服每服用水二鍾煎至八分食前服熱多加柴胡薄荷 各一錢半

大寶圓 治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固面少顏色驚悸健忘夢寐不安小便赤澀遺精白濁

蓮花 各二

夜神 去木

足脛痠疼耳聾目昏口乾脚弱

芡實

蒸去

蓮花 各二

夜神 去木

山茱萸 蜜炙

龍骨

生用

五味子

韭子 炒

肉苁蓉 酒洗

熟地黃

酒蒸

紫石英 煨七

牛膝 去苗酒洗

枸杞子 蜜炙

右為細末酒煮山藥糊為圓如梧桐子大每服七十

圓空心用鹽酒或鹽湯送下

全鎖正元丹 治真氣不足元臟虛弱飲食減少恍惚

多忘氣促喘乏夜多異夢心忪盜汗小便滑數遺精

白濁一切元臟虛冷之病並宜治之

五倍子

茯苓 各八

紫石 各十

補骨脂 酒洗

肉苁蓉

洗焙

胡蘆巴 炒

龍骨

砂砂 各二兩

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓空心溫酒鹽湯任下

秘真圓 治思想無窮所願得而不得意淫於外入房

太甚則發筋痠白淫隨洩而下餘瀝不止精氣不固

夜夢遺泄立効

龍骨

另研

訶子 大者五

砂仁 五錢

辰砂 錢半

右為細末米糊為圓如菉豆大每服十五圓漸加至二三十圓空心溫酒送下臨睡用白湯送下

瑞蓮圓 治思慮傷心便下赤濁

白茯苓

去皮

石蓮肉 炒

龍骨 生用

天門冬 去心

麥門冬

去心

栢子仁 炒

紫石英 研

遠志 蜜炙

當歸

酒洗

酸棗仁 炒

龍齒 一兩

乳香 另研

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大以硃砂為衣每服七十圓空心用溫酒或棗湯送下

心腎圓 治水人不既濟心下怔忡夜多盜汗便赤夢

遺

牛膝

酒洗

熟地黃

肉苁蓉 酒洗

鹿茸 酒洗

鹿茸

酒洗

附子 炮去

人參 去蘆

黃芪 蜜炙

五味子

茯苓

去木

山藥 炒

當歸 酒洗

龍骨散

遠志用升草水煮刺去心葉汁炒水一兩

右為細末酒煮糊為圓如梧桐子大每服七十圓空心用棗湯送下

鉅精圓 治精滑不禁

川獨活

川續斷

穀精草

石蓮肉去殼

乾菱米

金櫻子

白茯苓

川練子酥炒

木猪苓

小茴香

乾藕節

生雞頭煮

蓮蕊

聚龍骨五色者各等分

右為細末用雞子清為圓如梧桐子大每服四五十圓空心用鹽湯送下以乾物壓之

香茸圓

滋補精血益養真元治下焦陽竭臍腹痞痛

飲食減少目視茫茫夜夢鬼交遺世失精肌肉消瘦

鹿茸

麋茸二味俱用大者去毛酥炙各二兩

麝香別研

麝香半兩

沉香

五味子

白茯苓去皮

白龍骨煮

肉從蓉

酒浸一夜切焙乾五味各一兩

右為細末和勻用熟地黃三兩焙乾為細末以酒二

升熬成膏子搜藥入臼內搗千杵如硬更入酒少許

圓如梧桐子大每服五十圓空心溫酒鹽湯任下

紫石英圓

治虛勞夢與鬼交失精虛竭至甚

紫石英經火

桑螵蛸微炒

人參去蘆

栢子仁去殼

龍骨已上各二兩

硃砂細研水飛

肉從蓉

酒浸一宿刺去核皮炙乾各一兩

麝香半兩

右為細末入別研藥令勻煉蜜和搗三百杵圓如梧桐子大每服二十圓食前用溫酒送下

威喜圓

治精氣不固夢泄白濁

白茯苓

水浸至二十解沸取出焙乾研為細末四兩

黃蠟四兩

右將黃蠟溶化搜和茯苓末為圓如彈子大空心細嚼滿口生津徐徐嚥津服以小便清為度仍忌食醋

本草卷六 十四

諸淋門

淋者小便淋瀝澀痛因腎虛而膀胱生熱也夫水火不交心腎氣鬱遂使陽平外清濁相干畜在下焦故膀胱受病焉膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出矣若風寒濕熱之邪客於胞中則不能化而出故有五淋之證焉夫五淋者謂氣淋石淋血淋膏淋勞淋是也氣淋為病小便澀而常有餘瀝也石淋者莖中痛尿不得卒出則有沙石也膏淋者尿似脂膏而出也勞淋者勞傷即發痛引氣衝也血淋者遇熱即發小便澀痛而溺血也治法並用流行滯氣疎利小便清解邪熱其於調平心火又三者之綱領焉心清則小便自利心平則血不妄行最不可過用補劑蓋氣得補而愈脹血得補而愈澀熱得補而愈盛水實不行加之穀道閉遏未見其有能生者也然而腎氣虛弱囊中受寒亦有挾冷而小便淋澀者其莊先寒戰而後澀便蓋冷氣與正氣交爭冷氣勝則寒戰而成淋正氣勝則寒戰解而得便溺也治之當遂散寒邪扶養正氣則自平矣其餘癰閉澀痛皆一類也臨病之際當詳審焉

八正散

治心經蘊熱臟腑秘結小便亦澀癰閉不通

及熱淋血淋並皆治之

大黃

瞿麥

篇蓄

車前子

木通

山梔

甘草

滑石

右咬咀用水一鍾燈心二十莖煎至一鍾食前服一

方加水香一錢尤佳

之効散 治熱結淋悶作痛尿血

甘草

山梔子

瞿麥

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片蔥三根燈心五

莖煎至一鍾食前服

清心蓮子飲 治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴

微熱小便赤澀淋瀝不通

方見遺精白濁門

石葦散

治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出

臍腹急痛當作有時勞倦即發或尿如豆汁或出沙

石並皆治之

石葦

葵子

木通

瞿麥

芍藥

白木

滑石

當歸

甘草

王不留行

一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服或為末每服

一錢用小麥煎湯調服

麥門冬 去心 知母 各二兩

右為細末內猪肚中縫定置甑中蒸極爛取出藥搗猪肚為膏和藥再少入蜜并干餘下圓如梧桐子大每服五十圓人參湯送下米飲亦得一方加生地黃乾葛一方去知母梁米用小麥

神仙減水法 治三焦虛熱三消渴疾日夜飲水無度此藥主之不可輕易其効如神

人參 去蘆 天花粉 知母 宣黃連

苦參 麥門冬 去心 浮萍 鹽水 白扁豆

黃芪 各一兩 黃丹 二錢

右為細末每服二錢新汲水調下妙不可言

舶上茴香 炒 青皮 去穢 澤瀉 赤芍藥

辣桂 橘紅 甘草 炙

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

參苓琥珀湯 治小便淋瀝莖中痛不可忍相引脇下痛

人參 五分 茯苓 去皮 琥珀 當歸梢

柴胡 澤瀉 已上各三分 延胡索 七分 川練子 炒

甘草 生用各一錢

右咬咀作一服用長流水三盞煎至一盞去粗食前服數服大効

榆皮散 治小便卒暴淋瀝不通

榆白皮 洗 瞿麥穗 梔子仁 郁李仁 微

赤茯苓 去皮 雞蘇葉 木通 絲

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分不拘時服

沉香散 治膏淋臍下妨悶不得快利

沉香 陳皮 去白 黃芪 各七錢半 瞿麥 三兩

榆皮 韭子 炒 滑石 各一兩 黃芩

甘草 炙

右為細末每服二錢食前米飲調下

瞿麥湯 治氣淋澀滯

瞿麥穗

黃連去毒

大黃蒸

枳殼去穢炒

當歸切焙

羌活去蘆

木通

牽牛

延胡索

桔梗

大腹皮

射干已上各半

桂心去粗皮

右以咀每服四錢匕水一盞半生薑七片煎至八分

去滓不拘時溫服

益原散 治心經蘊熱及傷暑小便赤澀痛閉作淋煩

渴口乾並宜服之

滑石六兩

甘草一兩

右為細末每服三錢用燈心煎湯食前調下

神効琥珀散 治石淋水道澀痛頻下沙石

琥珀

桂心

滑石

大黃微炒

葵二

膩粉

木通

不香不見

磁石加紅酒率七次細研水飛過各半兩

右為細末每服二錢食前用燈心葱白湯調下

火府丹 治心經蘊熱赤澀淋痛

木通

黃芩兩

生地黃一兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓木通

煎湯送下

石鷲圓 治小便澀痛不可忍出沙石而後方通

石燕燒紅水淬

滑石

石葦去毛

瞿麥穗各等分

右為末麵糊為圓如梧桐子大每服五十圓瞿麥燈

心煎湯送下日三次

五苓散 治伏暑積熱小便赤澀如淋

方見中暑門

王不留行散 治熱淋痰痛不止

王不留行

車前子

木通已上各一兩

滑石各一兩半

當歸微炒

蒲黃

赤芍藥

甘遂煨

桂心各半

右為細末每服一錢食前用粥飲調服

兔絲圓 治膏淋

兔絲子去塵土水淘酒浸乾

桑螵蛸炙各半兩

澤瀉一分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服二十圓空心

用清米飲送下

地黃圓 治腎虛勞膀胱結淋澀

生地黃切焙

黃芪兩

防風去叉

遠志去心

茯神去木

鹿茸去毛

黃芩去心

栝蒌已上各

人參一分

石葦去毛

當歸半兩

赤芍藥

戎鹽研

蒲黃

甘草三分

車前子

木通 俗三

右為末每服二大錢水二盞生薑七片燈心二十莖
蜜半匙煎七分空心服

澤瀉散 治冷淋小便澀痛脹滿

澤瀉

雞蘇

石葦

赤茯苓

蒲黃

當歸

琥珀

檳榔

枳殼

桑螵蛸

官桂

右為細末每服二錢匕不拘時用冬葵子煎湯調服
或不通煎湯調亦可

醫方選要卷之六

醫方選要卷之六

醫方選要卷之七目錄

五疳門 附論

加減五苓散

茵陳湯

秦艽飲子

山茵陳散

加味四君子湯

茵陳湯

當歸白朮散

白朮湯

桂枝加黃芪湯

茵陳散

黃芪湯

滑石散

當歸瓜蒂散

黃連湯

眉角散

紫金圓

大溫中圓

金黃圓

救痘圓

治黃痘効方

腳氣痿痺門 附論

附論

檳蘇散

烏藥平氣湯

神祕左經湯

蒼朮散

羌活導滯湯

常歸拈痛湯

加味敗毒散

清燥湯

溫腎湯

獨活湯

道氣飲

紫蘇散

桑白皮散

藿香養胃湯

補肝湯

蠲痺湯

五寶湯

附子人物湯

三痺湯

茯苓湯

巴戟天湯

雞鳴散

十寶

五斤圓

不老地仙丹

擒虎丹

午睡圓

續斷圓

乳香宣經圓

自汗盜汗門 附論

木附湯 桂枝湯 當歸大黃湯

黃芪湯 大黃湯 麥煎散

建中湯 牡蠣散 周衛湯

四白散 牡蠣白朮散 撫芎湯

圓麥湯 五倍子散 白朮散

止汗溫粉 又止汗粉

怔忡健忘動悸門 附論

益榮湯 茯苓飲子 歸脾湯

干味溫膽湯 養心湯 葉氏鎮心爽神湯

葉氏定心湯 人參固本圓 八物定志圓

寧志膏 平補鎮心丹 妙香散

定志圓 壽星圓 二丹圓

祕傳酸棗仁湯 安神圓 十四友圓

參乳圓

仙氣門 附論

聚香飲子 蟠蔥散 補腎湯

益智仁湯 木香散 沉附湯

桂薑湯 祕傳萊菔內消圓 橘核圓

茴香散 沉香內消圓 金鈴圓

三菜圓 木香導滯圓

積熱門 附論

涼膈散 洗心散 四順清涼飲子

清氣散 消毒犀角飲 黃連解毒湯

黃芩湯 既濟清神散 三黃圓

薄荷煎 大金花圓 神芎圓

龍腦雞蘇圓 喻化三黃圓 牛黃涼膈圓

玄明粉 酒蒸黃連圓

醫方選要卷之七目錄 畢

醫方選要卷之七目錄 二

夫疸者謂濕與熱鬱於脾而目肢體為之發黃是也疸之名有五一日黃汗者身體俱腫汗出不渴其汗能染衣黃如藥汁此由脾胃有熱汗出為風所閉熱結於中其汗黃也二曰黃疸食已即飢遍身俱黃但欲臥小便澀黃憎寒壯熱此酒麪炙燻濕熱滯而得也三曰穀疸食畢即頭眩心中怫鬱不安遍身發黃此脾胃有熱因大飢過食有傷胃氣所致也四曰酒疸身目俱黃心中懊痛足脛滿小便黃面發赤

五疸門

斑此由飢中飲酒大醉當風入水所致也五曰女勞疸大勞淫慾大熱交接牀席未幾遽就浴室以致發熱惡寒小腹滿急而身目俱黃也五者之證雖不同而其為黃則一也原其所自未有不有濕熱而致者也濕也熱也又豈無輕重之別乎濕氣勝則如黃而晦熱氣勝則如橘黃而明蓋脾主肌肉上色本黃濕熱內蒸或重或輕自然見於外矣自其濕熱瘀而傷血此又為血證發黃何以明之疸證之黃小便不利血證之黃小便自利耳夫脾受濕熱鬱而不行亦多有腹脹之候治法大要疎導濕熱於大小便之中

如茵陳五苓黃連三黃之劑皆要藥也然又單陽無

陰病勢已極疸而不渴猶為可療疸而復渴其或腹

膨則為難治矣甚者可口無脉鼻出冷氣與夫形如

煙薰搖頭直視為心絕環口鰓黑茶汗發黃為脾絕

雖遇盧扁亦將不救醫謂黑疸其可療乎

加減五苓散 治飲食伏暑鬱發為疸煩渴引飲小便

不利

茵陳 猪苓 白朮 赤茯苓

澤瀉 各二錢 右咬咀作一服用水二鍾煎至一鍾食前服一方有

桂心 七分

葛根湯 治酒疸

乾葛 三錢 山梔仁 枳實 豆豉

甘草 炙一錢

右作一服用水二鍾煎至八分不拘時服

秦艽 欬子 治五疸口淡舌乾發熱微寒

秦艽 當歸 芍藥 白朮

官桂 茯苓 熟地黃 陳皮

小草 川芎 半夏 甘草

右作一服用水二鍾生薑五片煎至八分不拘時服

山茵陳散 治痘證發熱大小便秘並

山茵陳

梔子各二錢

赤茯苓

枳實各一錢半

葦蘆

甘草各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

加味四君子湯 治色瘰

人參

白朮

白茯苓

白芍藥

黃芪各一錢

白扁豆各二錢

甘草各一錢

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗三枚煎至一鍾

不拘時服

茵陳湯 治時行痧熱在裏鬱蒸不散通身發黃

茵陳

大黃

梔子仁

茵陳

大黃

梔子仁

右作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時服

當歸白朮湯 治酒疸發黃心胃堅滿不進飲食小便

黃赤其脉弦濇

當歸

黃芩

茵陳

甘草

白朮

半夏

杏仁

枳實

前胡

茯苓

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

白朮湯 治酒疸因下後變為黑疸目青面黑心下如

啖絲蘆狀大便黑皮膚不仁其脉微而數

白朮

桂心

豆豉

枳實

乾薑

杏仁

甘草

右吹咀作一服用水二鍾煎至一鍾食前服

桂枝加黃芪湯 治黃汗身腫汗出已輒輕久久必身

潤胃中痛腰已下無汗其腰施痛如有物在皮中劇

者不能飲食煩躁小便不利

桂枝

芍藥

甘草

黃芪

右作一服水二鍾生薑五片紅棗三枚煎至一鍾食

速服仍飲熱粥以助藥力

茵陳散 治黃疸食已即飢身體面目爪甲牙齒及小

便悉黃寒熱或身體多赤多青皆由酒食過度為風

濕所搏熱氣鬱蒸而致

茵陳

木通

大黃

石膏

枳實

甘草

梔子

石膏

枳實

甘草

梔子

右吹咀每服五錢水一盞半生薑五片蔥白一莖同

煎至八分去粗不拘時服大小便秘加枳實赤茯苓

葦蘆又有傷寒瘀血不解鬱發於表發為黃疸其脉

浮緊當以汗解獨煎黃芪湯飲之

黃芪湯 治黃汗身體腫發熱不渴汗出染衣黃色

黃芪

赤芍藥

茵陳

石膏

麥門冬 去心 淡鼓 各一兩 甘草 半兩

右吹咀每服五錢用水一盞生薑三片竹葉十四片煎至七分去粗食煎服

滑石散 治女勞疸

滑石 半兩 白礬 一兩

右為細末每服二錢用大麥粥湯食前調服以小便出黃水為度

留藥瓜蒂散 治黃疸遍身如金色累效

瓜蒂 二錢 母丁香 一錢 黍米 四十粒 赤小豆 半兩

右為細末每夜用少許吹兩鼻孔內嚔入便睡明日

合選要卷七

五

取下黃水次服黃連散

黃連散 治黃疸大小便秘澀臟腑壅熱

黃連 各二兩 大黃 兩 黃芩 兩 甘草 各一兩

右為極細末每服二錢食後溫白湯調下日三服

犀角散 治急黃心膈煩躁目赤痛

犀角屑 黃芩 升麻 梔子 各一兩

茵陳 朴硝 各二兩

右吹咀每服五錢水煎竹葉三七片煎至六分去粗不拘時服

紫金圓 治脾胃食積結塊令人四肢怠惰身面俱黃

肚腹膨脹俗名黃胖病此藥能理脾胃消積聚退黃去服進飲食

針砂 無錫內醃 紫金皮 各一兩 香附子 炒 三稜 煨

蒼朮 洗 陳皮 青皮 厚朴 製

砂仁 各一兩

右為細末麴糊為圓如梧桐子大每服三十圓食前白湯送下或酒或川椒湯亦可忌沙魚牛肉等物

大溫中圓 治食積黃腫病

陳皮 蒼朮 洗 厚朴 製 三稜 煨

蓬朮 煨 青皮 各五兩 香附子 甘草 二兩

合選要卷七

六

針砂 醋炒紅

右為細末醋糊圓如梧桐子大每服五十圓空心薑湯下午後溫湯下臨卧溫酒下

金黃圓 治酒積食積諸積面黃疸積硬塊

荆三稜 牽牛 各二兩 巴豆 各十粒 黍米粉

香附子 各半兩 澤瀉 一錢

右為細末用梔子煎湯和圓如菉豆大每服三圓至五圓食遠用白湯送下

穀疸圓 專治穀疸

苦參 三兩 龍膽草 一兩 牛膽 一枚

右爲細末用牛膽汁入少煉蜜和圓如梧桐子大每服五十圓空心熱水或生薑甘草煎湯送下
治黃疸効方 用生蘿菔切焙爲末白湯調下日三服不拘時每服二錢

脚氣虛癰門

脚氣之疾內經名爲痺病至漢名爲緩風宋齊之後始謂之脚氣名雖不同其實一也所得之由皆因脾腎兩經虛弱坐卧行動之間而爲風寒暑濕之氣所干流注而成此疾得病之始多不令人便覺會因他病乃始發動或爲然大悶經二兩日方覺之先從脚起或緩弱痿痺行起忽倒或脛腫滿或足膝枯細或心中忪悸小腹不仁大小便秘澀或舉體轉筋骨節痠疼或惡聞食氣見食吐逆或胃滿氣急壯熱增寒傳足六經外證與傷寒類焉但卒然脚痛爲異耳其

爲候也不一治法當究其所自來若寒中三陽所患少冷暑中二陰所患必熱脉浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而濇者起於寒也風者汗之濕者燥之熱者清之寒者溫之又當隨四時表裏虛實而治之切不可用補劑及湯淋洗此醫家之大戒也蓋補則氣實多致不收淋洗則邪毒入內亦難治矣治之不早使毒氣入腹衝心攻築作痛喘滿上氣嘔吐異常此漸致傾危其言忽耶若夫痿者謂足痿弱不能行也經云肺熱葉焦傳於五臟因肺熱脾虛相搏而爲足痿躄也難經云骨痿不能

起於床者是也治痿之法當補腎水瀉心火則愈矣
何以言之蓋補腎水則心火自降而肺金不虛瀉心
火則肺金自清而肝木不實肝木不實則脾不受傷
心火不盛則肺不燥熱治痿之法無出於此矣至於
痺者亦有五種謂筋痺脉痺肌痺皮痺骨痺是也此
病多由體虛之人腠理空疎而為風寒濕三氣所侵
不能隨時驅散流注經絡久而為痺其為病也寒多
則掣痛風多則引注濕多則重着其病在筋者屈而
不伸應乎肝其證夜卧多驚飲食少小便數其病在
脉者則血凝而不流應乎心其證令人痿黃心下鼓

◎運氣卷七

氣卒然逆喘不通喘乾善噫其病在骨者則重而不
能舉應乎腎其證手足不遂而多痛心腹脹滿其病
在皮者多寒遇寒則急遇熱則縱應乎肺其證皮膚
無所知覺氣奔喘滿其病在肌者多不仁應乎脾其
證四肢懈急發咳嘔吐眈眈其脉大而濇或來急而緊
俱為痺之候也治法當視其所感風寒濕三氣注於
何部分其表裏有從偏勝者主以藥餌又有停滯受
飲亦令人痺當隨證治之至如白虎歷節遍身疼痛
者無非風寒濕三氣乘之也若飲酒當風汗出入水
亦成斯疾久而不愈令人骨節蹉跎恐為癰瘤之病

治疾者誠心辨別脚氣痿痺之證則庶乎其不差矣
橫蘇散 治風濕脚氣疼痛通氣造

檳榔 木瓜 香附子 紫蘇

陳皮 甘草 右作一服用水二鍾生薑五片葱白二根煎至一鍾

食前服 烏藥平氣湯 治脚氣上攻頭目昏眩脚膝酸疼行步

艱苦氣不和喘滿迫促並皆治之 烏藥 茯神 白芷 當歸

白朮 五味子 川芎 紫蘇子

人參 木瓜 甘草 右作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食

前服 神祕左經湯 治風寒暑濕流注足三陽經手足拘攣

疼痛行步艱難增寒發熱自汗惡風頭眩腰重關節

掣痛大小便秘澀或腹痛嘔吐下利兩腿頑麻並皆

治之 麻黃 乾葛 細辛 厚朴

茯苓 防己 羌活 枳殼 防風 麥門冬 黃芩 肉桂

柴胡 土蘆

半夏 湯洗

小草

白薑 炮

甘草 五分

右作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至一鍾空

心服自汗加牡蠣白朮云麻黃腫滿加澤瀉木通熱

甚無汗加乾葛橘皮煎明腹痛吐利去黃芩加芍藥

及炮附子大便秘加大黃竹瀝喘滿加杏仁桑白皮

紫蘇凡有此病參詳一加減無不愈者

蒼朮散 治一切風寒濕熱令足膝痛或赤腫骨間作

熱痛及腰膝臂髀大痛癢痛令人痿痺一切腳氣百

用百効

蒼朮

用米泔浸一

黃蘗

去粗皮酒洗一日

右又咀作一服用水

一鍾煎至一鍾食前服日進二

三服

羌活導滯湯 治脚氣初發一身盡疼或肢節腫痛便

溺阻隔先用此藥送之後用當歸拈痛湯

羌活

獨活

當歸 已上各

防已 一錢

大黃 四錢

枳實 炒

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

當歸拈痛湯 治濕熱為病肢節煩疼脊沉重胃腸

不利及遍身疼痛下注足脛腫痛不可忍

方見腰脇痛門

加味敗毒散 治三陽經脚氣流注脚蹠上掀熱赤腫

寒熱如瘡自汗惡風或無汗惡寒

羌活

獨活

羌胡 去蘆

前胡 去蘆

枳殼 麩炒

桔梗 去蘆

人參 去蘆

茯苓 去皮

川芎

甘草 炙已上

蒼朮 米泔水

大黃 二錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服皮膚

癢癢赤疹加蟬蛻煎服

清燥湯 治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪絕寒水生

化之源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓

不能動履者宜服

方見中濕門

溫腎湯 治面色痿黃脚痿弱無力陰汗出

麻黃

羌胡 各六

白朮

黃蘗 酒炒

猪苓

白茯苓 去皮

升麻 已上各

防風 去蘆

蒼朮 各一

澤瀉 二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前熱服候一時方可

飲食

獨活湯 治脚痺

獨活 二錢

乾薑 炮

大豆 粒五十

附子 炮

當歸	防風	茯苓	芍藥
黃芪	葛根	人參	甘草
右作一服用水二鍾酒半鍾煎至一鍾食前服	導氣飲	治寒濕脚氣腫赤疼痛心腹膨脹頭面手足浮腫身體腰背疼痛並皆治之	羌活
羌活	獨活	木瓜	薏苡仁
青皮	陳皮	枳殼	桑白皮
紫蘇	檳榔	木通	大腹皮
赤茯苓	大腹子	青木香	甘草
右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服有熱加大黃	寒加蒼朮	紫蘇散	治風毒脚氣
紫蘇	木通	桑皮	小茴香
枳殼	羌活	獨活	荊芥
木瓜	青皮	甘草	大腹子
右作一服用水二鍾生薑三片蔥白一莖煎至八分	空心溫服	桑白皮散	治脚氣盛發
滿氣急坐臥不得	赤茯苓	木香	

防風	大腹子	紫蘇子	木通
檳榔	青皮	神麴	白茯苓
右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食遠溫服	藿香養胃湯	治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽明經虛宗筋無所養遂成痿痺	烏藥
烏藥	砂仁	半夏	薏苡仁
人參	甘草	草澄茄	
右作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾不拘時服	補肝湯	治前陰如冰冷并陰汗兩脚痿軟無力	黃芪
黃芪	人參	乾葛	白茯苓
猪苓	升麻	柴胡	當歸身
羌活	連翹	黃蘗	澤瀉
蒼朮	神麴	知母	防風
陳皮	甘草		
右以咀作一服用水二鍾煎至一鍾食前服	蠲痺湯	治冷痺手足腰痛重及身體煩疼背項拘急	當歸
當歸	赤芍藥	黃芪	片薑黃

羌活二錢上各 甘草錢一

右作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食前服一方加防風二錢

五痺湯 治風寒濕之氣谷留肌體手足緩弱麻痺不仁

片薑黃 羌活 白朮 防己各二錢半

甘草錢一

右作一服用水二鍾生薑七片煎至一鍾病在上食後服病在下食前服

附子八物湯 治白虎歷節風身痛如錐不可忍

選要卷七 十五

附子炮去 乾薑炮 芍藥已上各 白朮二錢

茯苓去皮 桂心去皮 人參去蘆 甘草錢一各

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服一方去桂加熟地黃二錢

三痺湯 治血氣滯滯手足拘攣風痺等疾並宜服之

杜仲鹽炒 防風 桂心 川續斷

人參 當歸 秦艽 生地黃

茯苓 川芎 黃芪 細辛

芍藥 獨活 牛膝 甘草錢一各

右作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至一鍾不

拘時服

茯苓湯 治心痺神思昏塞四肢不利胃中煩悶時後恐悸

茯苓去才 羌活去蘆 麻黃去根節 麥門冬志

龍齒已上各 遠志去心 犀角屑 薏苡仁

人參去蘆 蔓荊子 防風已上各 赤芍藥

甘草錢一各

右咬咀每服五錢水一鍾半生薑五片煎至八分不拘時服

巴戟天湯 治冷痺脚膝痠痛行履艱難

選要卷七 十六

巴戟天去心 附子炮去 甘草炙 五加皮各

牛膝酒浸 石斛去根 革薢 白茯苓去

防風去蘆又各

右咬咀每服五錢用水一鍾半生薑三片煎至八分食前溫服

雞鳴散 治脚氣第一品藥不問男女皆可服如人感

風濕流注脚足痛不可忍用索懸吊叫聲不絕筋脉

腫大

檳榔七枚 陳皮 木瓜各一 吳茱萸二

生薑連皮 桔梗各半 紫蘇葉三

右爲粗末分作八服每服隔宿用水三大盃慢火煎至盤半去粗再用水二盃煎取一小盃去粗兩水煎汁相和安臥頭次日五更分二二服只是冷服冬月亦得服了用餅餌壓下如服不盡留次日漸漸漸亦可服此藥至天明大便當下一盃許黑糞水即是原腎家感寒濕毒氣下來也至早晚前後病住腫消但只是放遲遲喫物候藥力過此藥不是宣藥並無所忌

一全丹 治脚氣上攻心腎相繫足心隱痛小腹不仁煩渴小便或秘或利關節痺痛神効不可盡述

選要卷七

十七

肉從蓉 酒浸

狗脊 燒去毛

草薢

茯苓 去皮

牛膝 酒浸

遠志 炒去心

地膚子

石斛 一兩

熟地黃 酒浸

杜仲 各三兩

右爲細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五十圓食前用溫酒鹽湯任下

五斤圓 治筋血不足腰脚緩弱行步艱難一切寒濕脚氣

沒藥 另研

川烏 炮去

虎脛骨 酥炙

山藥 已上各

天麻 焙

牛膝 酒浸

肉從蓉 酒浸

木瓜 已上各

右除木瓜餘藥並爲細末將木瓜爛蒸研作糊和藥

不如不就將原浸牛膝酒打糊搜和杵一二千下圓如梧桐子大每服五十圓食前用溫酒鹽湯送下若只用後四味名四斤圓治法亦同

不老地仙丹 治腎臟風毒此藥常服能壯脚膝壯筋骨補腎駐顏

牛膝 酒浸

虎脛骨 炙

當歸 酒浸

肉從蓉 酒浸

疾藥 炒去

川椒 出汁

草薢 炙

川芎 一兩

赤小豆

木鼈子 去油

地龍 去土

茴香 炒

乳香 另研

防風 去蘆

血竭 已上各

杜仲 炙

沒藥 另研

羌活 去蘆

獨活 已上各

天南星 炮

選要卷七

十八

白附子 炮

何首烏

黃芪 炙

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服四五十圓空心用木瓜陳皮煎湯送下

擒虎丹 治風寒濕走注脚痺腰膝重痛

五靈脂

荆芥

川烏 炮去

當歸 酒浸

白膠香

自然銅 火煅

各一兩

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服二十圓用溫酒食後服日進二服

牛膝圓 治腎肝損骨廢不能起於床筋弱不能收持宜益精緩其中

牛膝酒浸

草薢

杜仲炒去

白茯苓

防風去蘆

羌活酒浸已上

獨活酒浸已上

肉桂去皮

右爲細末用酒煮猪腰子爛搗和爲圓如梧桐子大每服五十圓空心溫酒送下

續斷圓 治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

續斷

當歸炒

草薢

附子炮去

防風去蘆

天麻各一

乳香另研

沒藥各半兩

川芎去根

天麻各一

乳香另研

沒藥各半兩

右爲細末煉蜜和圓如梧桐子大每服四十圓空心溫酒或米飲送下

乳香宣經圓 治風寒濕痺四肢拘攣筋骨疼痛行步艱難脚氣諸疾並宜服之

乳香另研

附子炮去

木香不見火

黑豆三合

草烏去皮

川練子取肉

五靈脂二兩

防風去義

陳皮去白

黑牽牛生用

威靈和土

烏藥

草薢已上各

黑牽牛生用

威靈和土

右爲細末酒煮麴糊和圓如梧桐子大每服三十圓漸加至五七十圓空心用溫酒送下

自汗盜汗門

內經云衛氣者所以溫分肉充皮毛肥腠理司開闔者也又曰陽氣者衛外而爲固者也是以體虛之人或爲風暑濕邪所干遂使分肉不溫皮毛不充腠理不密開闔不固則陽氣外泄而汗爲之出也夫汗者心之液也心動則惕然而汗出也有自汗有盜汗自汗者不因發散而自然出也盜汗者睡而汗出及覺則不出矣自汗盜汗其一液也其出異也若陽蒸陽分而液出者爲自汗陽蒸陰分而液出者爲盜汗故陰虛陽必湊發熱而盜汗陽虛陰必乘發厥而自汗

此陰陽偏勝之所致也又有驚怖房室勞極歷節腸癰痰飲產後及傷寒風溫濕溫等病皆能令人自汗其盜汗乃心虛所致也其脉多微而虛濡而虛治法風者固之暑者清之濕者燥之驚怖者鎮之房勞虛極者溫而補之其汗多亡陽者宜溫其經而收斂之其餘各隨其證而治之大法收斂心氣補益腎水俾陰陽調和其汗自止矣

水附湯 治汗多亡陽手足厥逆及中濕脉細自汗體重

白木四錢

附子炮去皮

甘草炙一錢

右改咀作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至八分食前溫服

桂枝湯 治傷風脉浮自汗惡風

方見傷寒門

當歸六黃湯 治盜汗之聖藥也

當歸

黃蘗

生地黃

熟地黃

黃芩

黃連已上各一錢半

黃芪二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾臨卧服

黃芪湯 治喜怒驚恐房室虛勞以致陰陽偏虛或發厥自汗或盜汗不止並宜服之

黃芪去蘆蜜炙二錢

天門冬

麻黃根

龍骨已上各一錢

五味子

浮小麥炒

防風去蘆各八分

當歸酒洗

甘草七分

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服發

厥自汗加熟附子發熱自汗加石斛

大建中湯 治虛熱盜汗百節酸疼腰痛肢體倦怠日漸羸弱口苦舌乾怔忡短氣

綿黃芪炙

遠志燈心煮去心

當歸酒洗

澤瀉已上各二錢

白芍藥

龍骨炙

人參已上各一錢半

甘草炙一錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服氣

弱加炮附子二錢腰痛筋急加官桂去皮一錢

麥煎散

治榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼飲食少進面黃肌瘦並皆治之

柴胡

秦艽

乾漆炒盡

人參

川烏炮生

玄參已上各一兩

右為細末每服二錢先用小麥三七粒煎湯下盡去

麥入藥再煎三五沸食後服

建中湯 治表虛自汗

芍藥五錢

官桂

甘草炙各二錢

右作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食

前服加黃芪二錢名黃芪建中湯治虛勞自汗加當

歸名當歸建中湯治婦人血虛自汗共自汗漏不止

者加桂一錢熟附子半箇名桂枝附子湯煎空心服

牡蠣散 治諸虛體常自汗驚悸不寧

左顧牡蠣用米泔洗

白朮半兩

甘草炙二錢

小麥百餘粒

黃芪蜜炙

麻黃根各二錢

右改咀每服三四錢用水二鍾煎至一鍾食後服

周衛湯 治自汗

麻黃根

黃芪各一錢

甘草梢生用

當歸梢

黃芩各半

生地黃

麥門冬各三

五味子各一

猪苓二分

羌活七分

蘇木

紅花各一

右咬咀作一服用水二鍾煎至七分食前服

四百散 治男子婦人血虛發熱夜多盜汗羸瘦脚痛

不能行

白朮

白藺豆

藿香

益智

厚朴薑製

黃芪

陳皮已上各一兩

白茯苓

人參

半夏薑製

烏藥

白豆蔻

甘草已上各半兩

芍藥半兩

檀香

沉香各半

右咬咀每服五錢用水二鍾生薑三片棗一枚煎至

選要卷七

子三

八分食前溫服

牡蠣白朮散 治漏風證飲酒中風汗多食則汗出如

洗久不治必為消渴

牡蠣煅三兩

白朮錢半

防風二兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至七分食後溫服惡風

倍防風白朮汗多面腫倍牡蠣

無名湯 治自汗頭眩逆惡心

川芎

白朮炒

陳皮已上各二錢

甘草一錢

右咬咀作一服水二盞生薑三片煎至七分不拘時

服

團參湯 治大人小兒腋汗大人乃心血液盛面常發

赤者是也小兒因驚而得宜服珍珠散史丞相苦常

盜汗不止氣弱體羸治之不愈一日洪舍人相見一

醫人云心血液盛亦為汗非虛也宜用藥收斂心經

遂傳此方服之而愈

人參新羅

川當歸去蘆焙各半兩

右咬咀用猪心一箇切作三片藥三分服每服用水

一盞猪心一片煎至一盞去粗服食前三次服一方

加黃芪

五倍子散 治虛汗盜汗不止者

選要卷七

子中

用五倍子為細末臨睡以自已津唾調搗臍中神効

白朮散 治盜汗極驗

白朮

不拘多少剉作小塊或磨大

浮麥一升

右用水煮乾如白朮尚硬又加水一二升煮軟取出

去麥不用切作片焙乾研為細末每服二三錢不拘

時另用浮麥煎湯調服

止汗濕粉

川芎

白芷

藥本各一

米粉三兩

右為細末每用綿絹包裹撲於身上

又止汗粉

麻黃根

牡蠣粉

敗扇灰

枯蔓

白木二兩

米粉三升

右爲末和米粉攪勻以細絹袋盛用撲身體上日三
兩度忌桃李雀肉仍灸大椎五六百柱日灸二七五
七柱任意灸亦得汗即漸止

選要卷七

二十二

怔忡健忘動悸門

夫怔忡者心血不足心中躁動不寧也蓋心主血血
旺則心主自安矣一或爲喜怒哀怨所動則真血虛
耗心主失輔而成怔忡矣又或外感風寒暑濕之氣
閉塞諸經及協飲停留中皖皆能令人怔忡至於健
忘者謂陡然而忘其事也主於心脾二經蓋心之官
則思脾亦主思此由思慮過度有傷心脾而得也傷
於心則真血耗散神不守舍傷於脾則胃氣虛憊而
慮愈深二者皆能令人健忘也或停飲而氣鬱生痰
使心脾之氣不得舒亦成斯疾若夫動悸者謂心中
惕然動悸而驚也心下怯怯如人將捕由心膽虛怯
之所致也蓋心者君主之官神明出焉膽者中正之
官決斷出焉或因事有所大驚或見異相登高涉險
驚忤心神氣與涎鬱則必驚悸驚悸不已變生諸證
或短氣悸乏或體倦自汗四肢浮腫飲食無味心虛
煩悶坐臥不寧此皆心膽虛怯之候也夫怔忡也健
忘也動悸也三者名雖不同未有不由心血不足脾
氣虛弱積飲停痰而成也治之唯在補養心血調和
脾氣寧其神化其痰使神氣充滿心安氣舒則無三
者之患矣

選要卷七

十六

益榮湯 治思慮過多耗傷心血 血既傷神無所守

是以怔忡恍惚善悲憂少顏色夜多不寐小便或濁

當歸酒浸 黃芪 去蘆 小草 酸棗仁 炒

栝子仁 炒 茯神 去木 木香 不見火 麥門冬 志

白芍藥 人參 去蘆 紫石英 煅 甘草 炙各

右作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至一鍾不

拘時服

茯苓飲子 治痰飲蓄於心胃怔忡不已

茯苓 去皮 半夏 湯洗七次 茯神 去木 麥門冬 志

橘紅 各一錢半 沉香 不見火 檳榔 甘草 炙各

通靈藥 二十七

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

歸脾湯 治思慮過多勞傷心脾健忘怔忡

人參 去蘆 木香 各一錢 茯神 去木 龍眼肉

黃芪 去蘆 酸棗仁 白木 去蘆 甘草 炙各

右作一服用水二鍾生薑五片棗一枚煎至一鍾不

拘時服

卜味溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥異象

相感遂致心驚氣鬱生痰涎與氣搏變生諸訕或

短氣悸乏或復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶

坐卧不安

半夏 湯洗 枳實 麩炒 橘紅 各一錢

酸棗仁 遠志 去心 甘草 炙 五味子 熟地黃 酒洗

人參 去蘆 各一錢 甘草 炙 半

右作一服用水二鍾生薑五片棗一枚煎至一鍾不

拘時服

養心湯 治虛損心血不足驚惕不寧

黃芪 炙 茯神 去木 白茯苓 去皮 半夏 麩

當歸 川芎 已上各一錢 遠志 去心 薑 酸棗仁 炒

肉桂 去皮 栝子仁 五味子 人參 已上各

甘草 炙半

通靈藥 七

右作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食

前服

葉氏鎮心爽神湯 治心腎不交上盛下虛心神恍惚

睡多驚悸小便頻數遺精白濁常服鎮心安神

石菖蒲 去毛 甘草 炙 人參 去蘆 赤茯苓 去

酸棗仁 炒 當歸 酒浸 焙 南星 錢半 陳皮 去白

山藥 細辛 去苗 紫苑 去蘆 半夏 湯洗

川芎 五味子 各三錢 通草 麥門冬 志

覆盆子 各一錢 栝子仁 炒 枸杞子

右咬咀每服四錢用水一鍾蜜一匙煎至五分去粗

入麝香少許再煎一二沸不拘時溫服

葉氏定心湯 理心氣不足榮血衰少精神恍惚夢中

失精

人參 去蘆 白茯苓 去皮 茯神 去皮 黃芪 蜜炙

白木 赤石脂 研 川芎 厚朴 薑炙

官桂 去皮 紫苑茸 防風 各二 麥門冬 去心

甘草 炙

右咬咀每服三錢用水一鍾亦小豆七十粒煎至七

分食後服

人參同本圖 夫人心生血血生氣氣生精精盛發夢

通聖卷七 二十九

不白容貌不哀今人滋補氣血多用性熱之藥殊非

其治此方蓋用生地黄能生精血用天門冬引入所

生之地熟地黄能補精血用麥門冬引入所補之地

又以人參能通心氣使五味併用實補益心血又名

二黃圖

生地黄 洗蒸 熟地黄 洗蒸 天門冬 去心 麥門冬 去心

人參 去蘆

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五十圓空心

溫酒或鹽湯任下

八物定志圖 補益心神安定魂魄治痰去胃中邪熱

人參 去蘆 石蒲莖 遠志 去心 茯苓 去皮

茯神 去心 砂砂 為衣 白木 麥門冬 去心

牛黃 二錢

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大以砂砂為衣每服

五十圓不拘時米飲送下

寧志膏 治心神恍惚一時健忘

辰砂 研細 乳香 另研各 酸棗仁 炒去 人參 去蘆

右為末和勻煉蜜為圓如彈子大每服一圓空心用

溫酒或棗湯送下

平補鎮心丹 治心血不足時或怔忡夜多異夢如墮

通聖卷七

層崖常服安心腎益榮衛

白茯苓 去蘆 五味子 車前子 茯神 去皮

麥門冬 去心 肉桂 去皮各一 遠志 去心 天門冬 去心

山藥 蜜製各 酸棗仁 二錢 熟地黄 酒蒸 人參 去蘆

龍齒 一兩 砂砂 研為衣

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五十圓空心

未飲溫酒任下

主治散 治心氣不足志意不定驚悸恐怖悲憂慘戚

虛煩少睡喜怒不常夜多盜汗飲食無味頭目昏眩

常服補益氣血安神鎮心

<p>五十圓加至百圓空心煎愈風湯送下</p> <p>右為細末煉蜜和圓以硃砂半兩研極細為衣每服</p> <p>麥門冬 去心 甘草 已上各一兩 遠志 去心 人參 去心 各半兩</p> <p>熟地黃 丹參 已上各半兩 白茯苓 去心</p> <p>天明冬 去心</p> <p>二丹圓 治健忘養神定志和血安神外華勝理</p>	<p>右各為細末和勻用生薑汁煮麩糊和圓如梧桐子大每服三十圓加至五十圓食後煎人參石菖蒲湯送下</p> <p>天南星 一斤先用炭三十斤燒一地坑通紅去炭火以盆要坑周圍用灰填定硃砂二兩 琥珀一兩 勿令走氣次日取出為末</p> <p>右為末煉蜜和圓如梧桐子大以細研硃砂為衣每服三五圓米飲食後服</p> <p>壽星圓 治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘</p>	<p>分選要藥 上</p>	<p> 爵香 一錢 山藥 一兩 人參 半兩 木香 二錢 茯苓 去心 各一兩 黃芪 各一兩 桔梗 半兩 甘草 炙半兩 遠志 去心 各一兩 辰砂 三錢 右為末每服二錢不拘時溫酒調服 </p> <p> 定志圓 治心氣不足恍惚多忘常服安神定志 遠志 去心 二兩 人參 去心 三兩 菖蒲 二兩 白茯苓 去心 三兩 右為末煉蜜和圓如梧桐子大以細研硃砂為衣每服三五圓米飲食後服 </p>	<p> 秘傳酸棗仁湯 治心腎水火不交精血虛耗痰飲內畜怔忡恍惚夜卧不安 酸棗仁 去心 大 遠志 去心 各一兩 黃芪 各一兩 白茯苓 去心 各一兩 蓮肉 去心 當歸 酒洗 人參 各一兩 陳皮 粉草 炙 各半兩 右咬咀每服四錢水一盞半生薑一片棗一枚以瓦罍煎七分日二服臨卧一服 </p> <p> 安神圓 治心神煩亂怔忡兀兀欲吐胃中氣亂而熱有似懊憹之狀皆膈上血中伏火蒸蒸然不安宜用權衡法以鎮陰火之浮行以養上焦之元氣經云熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒去心煩除濕熱為君以甘草生地黃之甘寒瀉火補氣滋生陰血為臣以當歸補血不足以硃砂納浮溜之火而安神明也 </p> <p> 黃連 一錢 分酒浸 硃砂 一錢 水飛 酒生地黃 酒當歸身 甘草 炙 已上各五分 </p> <p> 石件除硃砂水飛外搗四味為細末同和勻湯浸蒸餅為圓如黍米大每服十五圓津唾嚥下食後 </p> <p> 十四交圓 治心血俱虛怔忡驚湯 柏子仁 研 遠志 去心 薑汁 紫石英 煨 酸棗仁 炒 </p>
---	---	---------------	---	--

熟地黃

當歸去蘆

白茯苓去皮

白茯苓去皮

人參去蘆

苦艾炙

阿膠炒

辣桂去皮

龍齒研各一兩

硃砂研各半兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓食後用棗湯送下

參乳圓 治心氣不足怔忡自汗

人參去蘆

乳香三錢

當歸二兩

右為細末研勻山藥煮糊和圓如梧桐子大每服三十圓食後棗湯送下

選要卷二

五十三

疝氣門

夫疝者辜左連小腹急痛也素問靈樞經所論疝證最多難以盡舉姑以七疝論之一曰厥疝謂厥逆心痛足寒飲食吐逆不下二曰癰疝腹中氣乍痛心下盡痛氣積如臂三曰寒疝因寒飲食積脇下腹中盡痛四曰盤疝腹中氣痛盤結臍傍五曰氣疝腹中乍滿乍減而痛六曰附疝腹中臍下有積聚七曰狼疝小腹與陰相引而痛大便難此七疝之形證也又有所謂心疝飢疝疝瘕小腸氣膀胱氣奔豚氣橫弦豎弦偏墜木腎腎餘陰腫其名不同要皆疝之類也

選要卷七

疝

原其所得之由未有不因七情四氣之所干也內經云任脉之為病男子內結七疝女子帶下癥聚然則諸疝皆任脉之本源也劉河間以為聚寒朱丹溪以為濕熱陳無擇以為有寒有熱而張子和以為專屬厥陰肝經四者之論各有至理存焉觀內經等所論則五臟皆有疝而太陽小腸膀胱與厥陰肝經為疝之主其氣相通連為外腎系於辜凡此三經乃相連相會者也蓋肝者筋之合也聚於陰器凡疝之發皆其部分故曰疝本肝經是也治法當以疎導為主或溫之或散之要在隨其各經之證施治之則無不愈

矣

聚香飲子 治七情所傷遂成七疝心腹脹痛引腰連

脇不可俛仰

檀香

木香

乳香

沉香

丁香

藿香各一錢

川烏地

延胡索炒

桔梗炒

桂心

甘草炙

片薑黃各五分

右作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至八分食

前濕服

蟠蔥散 治男子脾胃虛寒氣滯不行政刺心腹痛連

胃脇及膀胱小腸疝氣又治婦人血氣刺痛並宜服

方見諸氣門

補腎湯

治寒疝入腹小腹疝痛時復泄瀉胃膈痞塞

沉香五分

人參

茯苓

附子地黃

黃芪

白朮

木瓜已上各一錢

羌活

芍藥

紫蘇

甘草炙各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至一鍾食

前服嘔吐加半錢一錢生薑七片煎服

益智仁湯 治疝氣痛連小腹攣搐不已其脉沉緊是

腎經積冷所致

益智

乾薑

甘草炙

茴香炒各一錢

烏頭炮去

生薑各一錢

青皮一錢

右作一服用水二鍾入鹽少許煎至八分食前服

木香散 治心疝小腹痛悶不已者

木香

陳皮

良薑

乾薑炮

訶子去核

枳實各一錢

草豆蔻

黑牽牛

川芎已上各一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服或為細末每

服二錢空心白湯調下

沉附湯 治腎虛無陽小腸氣痛小腹外腎時冷兼治

濕證

附子生用

香附各二錢

沉香

華澄茄

辣桂

甘草炙各一錢

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾空心服

桂薑湯 治無陽膽冷疝氣兼治濕證

辣桂

川白薑

吳茱萸用酒醋浸一宿焙乾已上各一錢

良薑

茴香炒

華澄茄

縮砂仁

木香

茯苓

益智仁

甘草炙各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

秘傳集效內消圓 治腎虛為邪所襲伏留作痛陰囊

偏大或生瘡出黃水

<p>吳茱萸 <small>半兩半醋浸</small></p>	<p>山茱萸 <small>蒸去</small></p>	<p>馬蘭花 <small>酒浸</small></p>
<p>黑牽牛 <small>炒取</small></p>	<p>川練子 <small>蒸去</small></p>	<p>海藻 <small>酒去</small></p>
<p>船上茴香 <small>炒</small></p>	<p>青皮 <small>去穢</small></p>	<p>官桂 <small>已上各</small></p>
<p>桃仁 <small>去皮</small></p>	<p>木香 <small>各半</small></p>	
<p>右為細末酒煮稀糊為圓如梧桐子大每服四十圓空心用溫酒或鹽湯送下</p>		
<p>摘核圓 治四種癰病即核腫脹倘有大小或堅硬如石或引臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡毒輕則時出黃水甚則成癰潰爛</p>		
<p>橘核 <small>炒</small></p>	<p>海藻 <small>洗</small></p>	<p>桃仁</p>
<p>川練肉 <small>炒</small></p>	<p>海帶 <small>洗已上</small></p>	<p>厚朴 <small>蒸去</small></p>
<p>枳實 <small>炒</small></p>	<p>桂心 <small>不見</small></p>	<p>木通 <small>已上各</small></p>
<p>右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服四十圓食前溫酒或鹽湯送下</p>		
<p>茴香散 治膀胱氣痛</p>	<p>茴香</p>	<p>金鈴子肉 三稜 <small>各一</small></p>
<p>甘草 <small>炙半</small></p>	<p>右為細末每服三錢食前熱酒調下</p>	
<p>沉香內消圓 治小腸疝氣陰囊腫大或左右偏腎結核痛難忍下元虛冷久不愈者並宜服之</p>		

<p>沉香 小香 <small>各半</small> 葫蘆巴 <small>酒浸</small> 小茴香 <small>酒浸</small></p>		
<p>右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服五七十圓空心鹽湯或鹽酒送下</p>		
<p>金鈴圓 治膀胱腫痛小腸氣陰囊腫水出不乾</p>	<p>金鈴子 <small>取肉</small></p>	<p>茴香 <small>炒</small> 海蛤 馬蘭花 <small>炒</small></p>
<p>破故紙</p>	<p>海帶</p>	<p>木香 兔絲子</p>
<p>丁香 <small>各二</small> 右為細末麪糊為圓如梧桐子大每服五十圓空心用溫酒或鹽湯送下</p>		
<p>三菜圓 治小腸氣痛外腎腫墜</p>		
<p>山茱萸 <small>去核</small> 吳茱萸 <small>去核</small> 食茱萸 <small>去核已上</small></p>	<p>川練子 <small>一兩用鹽酒四十箇去翅</small></p>	<p>破故紙 <small>炒</small></p>
<p>右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服五十圓用桃仁十五箇炒煎酒送下或茴香酒亦可空心服</p>		
<p>木香導氣圓 治男子小腸氣肚疼一切氣積以補下元虛冷脾胃不和並宜服之有効</p>		
<p>木香 乳香 川練子 <small>去核</small> 八角茴香</p>	<p>丁香 香附子 破故紙 葫蘆巴</p>	<p>荆三稜 甘草 <small>已上各</small> 杜仲 <small>半兩炒</small></p>

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服三十圓加
五十圓空心用溫酒或鹽湯送下日進三服

選要卷三

子九

積熱門

夫積熱者謂溫熱之毒久而蘊積於內也蓋心主熱
屬火然人久蘊積熱毒之氣於三焦必與心火相從
陽氣太盛而作熱或素嗜辛辣芳馨肥甘之味或飲
醇酒或服丹石之藥以致燥熱積於臟腑之中火熱
炎熾上乘心肺或口舌生瘡或咽喉腫痛或目赤頭
眩或痰涎稠濁或大小便秘結此皆積熱之所致也
其有陰虛生內熱或爲消渴或爲癰疽諸熱之病又
當隨其證而論之若但蘊積熱毒發於上焦者宜清
涼之結於臟腑者宜蕩滌之陰虛內熱者宜滋補腎
水以攝伏之斯得治之要矣

選要卷三

早

涼膈散 治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利

煩燥多渴腸胃秘澀便溺不利一切風熱並皆治之

大黃二錢

連翹四錢

黃芩

薄荷

梔子

朴硝

甘草各一錢

右作一服用水二鍾入蜜一匙竹葉十片煎至一鍾
不拘時服或爲細末每服二錢白湯調下亦得

洗心散 治風熱痰滯心經積熱口苦唇燥眼澀多淚
大便秘結小便赤澀

白朮一錢

麻黃

當歸

荆芥穗

大黃煨 芍藥 甘草炙

右作一服用水二鍾生薑三片薄荷少許煎至一鍾不拘時服

四順清涼飲子 治血熱蘊結壅滯

大黃 當歸 甘草炙 赤芍藥炙

右作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時熱服

清氣散 治風壅疹涎上膈煩熱

枳殼 川芎 柴胡 前胡

茯苓 羌活 獨活 青皮

白朮 人參 甘草炙

金匱要略 卷之七 中

右作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時服

消毒犀角飲 治大人小兒內蘊邪熱痰涎壅滯或腮

項結核遍生瘡癰已潰並宜服之

防風去苗 鼠黏子炒 荊芥穗二錢 甘草炙

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後溫服

黃連解毒湯 治熱毒煩悶口燥呻吟畜熱內甚者藥

不能退其熱勢者

方見火門

黃芩湯 治心勞實熱口瘡心煩腹滿小便不利

黃芩 澤瀉 梔子仁 生乾地黄

不通 黃連去鹽 麥門冬去心 甘草炙

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前溫服

既濟清神散 益腎水降心火清上實下

桔梗 黃芩 川芎 山梔子

當歸 羌活 白朮 茯苓已上各

知母 甘草 薄荷各半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去粗入蜜調

服

三黃圓 治丈夫婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈燥煩

金匱要略 卷之七 中

小便赤澀大便秘結

黃連去鹽 黃芩去鹽 大黃煨

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服四十圓白湯

食後送下

薄荷煎 治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛

薄荷一升取頭 縮砂半兩取 川芎半兩取

片腦半錢 甘草一兩取半

右為細末煉蜜和同如龍眼大不拘時任意含化利

劑方中無片腦有桔梗

大金花圓 治三焦積熱心火炎上口舌生瘡咽喉腫

痛大便秘結小便赤澀

黃連

黃蘗

黃芩

大黃各等

右為末滴水為圓如梧桐子大每服三十圓熱水送下不拘時一方去大黃加梔子名梔子金花圓

神芎圓 治上焦頭目一切風熱證神効

大黃生用

黃芩各二

牽牛生用

滑石各四

黃連

薄荷

川芎各半

右為細末滴水和圓如梧桐子大每服五十圓食後用溫湯送下

龍腦雞蘇圓

消煩渴涼上膈解酒毒除邪熱并治咳嗽

蓮花葉

中土

嗽唾血鼻衄吐血諸淋下血胃熱口臭肺熱癰腫疳疔口甜膽疸口苦並宜服之

苡胡

銀州赤二兩和木通以湯洗

生地黃各六兩

黃芪

麥門冬各二兩

木通同苡

人參去蘆

蒲黃

阿膠炒已上

雞蘇爭葉一斤

甘草

甘草

右除別煨藥外餘藥為細末用好蜜二斤先煉一二沸然後下生地黃末不住手攪令勻取水通涎胡汁慢火熬成膏勿令焦然後入餘藥末同和為圓如豌豆大每服二十圓嚼破熱水下虛寒煩熱消渴驚悸

人參湯下咳嗽吐血鼻衄麥門冬煎湯下惟諸淋車前子煎湯下

禽化三黃圓

大黃

黃芩

黃連各二

黃蘗子

白藥子各一

黃蘗

苦參

山豆根

硼砂各一

京墨三錢

片腦一錢

麝香少許

右為細末用猪膽汁調勻攤在盤內乾上蒸三次露一宿後入腦麝硼砂為圓如豆大每服一圓食後化冬加知母一方有甘草

牛黃涼腦圓

治上焦壅熱口乾咽痛煩躁涎潮

蓮花葉

中土

牛黃

片腦

麝香各二

紫石英研碎

馬牙硝

寒水石

硬石膏各二

甘草一兩

牛膽南星七錢

右為細末煉蜜為圓每兩作四十圓每服一圓食後溫薄荷人參湯下

溫薄荷人參湯下

玄明粉 此藥大治邪熱所干上氣滯五臟秘澀

右用朴硝煎過澄濾五七遍至夜於星月下露至天明自然結成青白塊子用磁罐子按實於炭火內從慢至緊自然成汁煎沸直候不響再加頂火一煨便取出於淨地上倒下用盆子合蓋了以去火毒然後

研為細末每三斤入生熟甘草末二兩一處攪勻臨
卧斟量用之或一錢二錢以桃花煎湯或葱白湯下
此藥本性寒燒過性溫無毒忌諸般魚及毒物等

酒蒸黃連圓 治膈熱解酒毒厚腸胃

黃連 半斤淨用酒二升浸以煮至

置觀上果蒸至爛取出攪乾

右為細末滴水為圓如梧桐子大每服五十圓食前
用溫水送下

選要卷七

胃

醫方選要卷之七

醫方選要卷之八目錄

痢冷門 附論

三建湯

沉附湯

參附湯

沉香葶澄茄散

附子茴香散

茸附湯

接真湯

附子理中圓

來復丹

保元丹

黑錫丹

諸血門 附論

茯苓補心湯

犀角地黄湯

是齋白朮散

人參救肺散

升陽去熱和血湯

犀角地黄湯

必勝散

大薊散

涼血地黄湯

選要卷八目錄

石膏散

門冬飲子

生地黄飲子

天門冬湯

麥門冬飲子

當歸地黄湯

當歸湯

雞蘇圓

腸辟痔漏脫肛門

附論

秦艽防風湯

紅花桃仁湯

秦艽當歸湯

地榆散

當歸郁李仁湯

乾葛湯

橘皮湯

逐瘀湯

槐角散

秦艽白朮圓

乳香圓

蟬皮散

槐角圓

釣腸圓

寬腸圓

神效散

蟬皮圓

香散圓

熊膽膏

猪臟圓

木賊散

眼目門 附論

明目流氣飲

撥雲散

柴胡散

止痛散

聖効散

桑白皮散

散熱飲子

四物龍膽湯

洗肝散

决明子散

地黃湯

菊花散

湯泡散

爐甘石散

蟬花無比散

明目地黃圓

菊睛圓

還睛補肝圓

羊肝圓

春雪膏

助陽活血湯

加減駐景圓

甘菊湯

磁石圓

○選要卷八目錄十

蜜蒙花散

驅風一字散

秘傳羊肝圓

熟乾地黃圓

杞菊圓

白龍散

點眼珍珠散

點眼膏子

撥翳紫金膏

青金圓

琥珀散

耳鼻門 附論

犀角飲子

芷芍散

益氣聰明湯

茯苓散

羚羊角散

芍藥散

地黃湯

菖蒲圓

通氣散

從容圓

塞耳丹

通神散

紅綿散

清神散

黃麻圓

羊腎附子圓

三黃散

白龍散

人參湯

辛夷散

增損通聖散

細辛散

溫衛湯

防風湯

離澤通氣湯

辛夷湯

通關散

犀角散

防風散

蒼玉散

工金細辛膏

大楓油

硫黃散

硝黃散

鼻赤方

醫方選要卷之八目錄畢

○選要卷八目錄三

醫方選要卷之八

痼冷門

良醫副臣周文采編集

痼冷者謂痼久而冷者也。痼者固久也。冷者寒之甚也。人之臟腑稟受不同，亦或將理失宜，遂致偏勝。故方中有痼冷積熱之說，痼冷者中寒也。其病多由真陽虛弱，胃氣不實，復受生冷，水雪水酪諸寒之物，或坐臥陰寒，又濕之處，日漸侵奪陽氣，以致臟腑久痼而冷。其為病也，或手足厥逆，或腹中久痛，瀉泄無度，或腰腿重痛，如坐水中，或陰痿不舉，寒精自出，或久嘔吐不進飲食，或自汗戰慄，或大腑洞泄，或小便頻數。此皆痼冷之為病也。治之當宜溫補腎元，健養脾胃，祛寒邪，固真氣，使陽氣得復，陰陽和平，則無偏勝之患而疾斯愈矣。

選要卷八

三建湯 治真氣不足，元陽久虛，寒邪攻衝，肢節煩疼。

腰背痠困，自汗厥冷，大便滑泄，小便白濁，及中風痰潮，不省人事，傷寒陰證，厥逆脉微，皆可服之。

大烏頭

附子

天雄

已上俱炮去

右作一服，用水二鍾，生薑十片煎至一鍾，不拘時服。沉附湯 治上盛下虛，氣不升降，陰陽不和，胃膈痞滿，飲食不進，肢節倦痛。

沉香

錢半

附子

炮去皮

右作一服，用水二鍾，生薑十片煎至一鍾，食前服。

參附湯 治真陽不足，上氣喘急，自汗盜汗，氣短眩暈，但是陽虛氣弱之證，並宜服之。

人參

去蘆

附子

炮去皮

右作一服，用水二鍾，生薑十片煎至八分，不拘時服。

沉香華澄茄散 治內挾積冷，膈腹弦急，痛引腰背，面色痿黃，臟腑自利，小便滑數，小腸氣痛，並皆治之。

沉香

去粗

華澄茄

附子

炮去皮

胡蘆巴

肉桂

去粗

補骨脂

川練子

去核

巴戟

選要卷八

二

茴香

炒

木香

已上各

桃仁

去皮尖

川烏

右作一服，用水二鍾，入鹽少許煎至八分，空心服。

附子茴香散 治氣虛積冷，心腹絞痛。

附子

炮去皮

茴香

炒

肉豆蔻

煨

乾薑

人參

去蘆

白朮

白茯苓

去皮

木香

丁香

甘草

炙

半錢

右作一服，用水二鍾，入鹽少許煎至八分，空心服。

茸附湯 治精血俱虛，榮衛耗損，潮熱自汗，怔忡驚悸。

肢體倦乏，但是一切虛弱之證，並治之。

鹿茸

酒炙

附子

炮去皮

各四錢

右作一服水二鍾生薑十片煎至八分食前服

接真湯 治陰病手足厥冷臍腹疼痛真氣不足虛僞

飲

沉香

丁香 各一錢

麝香 一錢

附子 炮去皮

右改咀用水二鍾生薑七片棗二枚煎至七分空心服或為末每服二錢亦可

附子理中圓 治脾胃冷弱心腹疼痛嘔吐泄利霍亂

轉筋體冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦

不止飲食不進一切沉寒痼冷並皆治之

附子 炮去皮

人參 去蘆

乾薑 炮

白朮

甘草

炙已上各三兩

右為細末煉蜜為圓每兩作十圓每服一圓用水一

鍾化開前至七分空心服

來復丹 一此藥配類二氣均調陰陽奪天地中和之

氣乃水火既濟之方可冷可熱可緩可急善治禁衛

不交滋養心腎氣不升降上實下虛氣閉痰厥心腹

冷痛臟腑虛滑不問男女老幼危急之證但有胃氣

無不獲安補損扶虛救陰助陽為効殊勝

舶上硫黃 用透明不

硝石 各一兩同硫黃並為末

用細篩子不伴手攪令陰陽氣相入

青皮 去穢

陳皮 去白

五靈脂 酒拌

太陰玄精石 一兩另

右將五靈脂去皮陳皮為細末入玄精石末及硝石

硫黃末拌勻以好酒醋煮麵糊和圓如豌豆大每服

三十粒空心粥飲吞下甚者五十粒新生嬰兒一粒

小兒慢驚風或吐利不止變成虛風搐搦者非風也

胃氣欲絕故也用五粒碾碎米飲送下老人伏暑迷

悶紫蘇湯下婦人產後血迷上搶悶絕并惡寒不止

及赤白帶下並用醋湯下常服和陰陽益精神散腰

腎陰濕止腹脇冷疼立効諸疾不辨陰陽證者並宜

服之

保元丹

治老弱諸沉寒痼冷小便滑數大便時泄腰

腿膝腹疼痛瀉因體瘦虛食減

附子 炮

白朮

山藥

肉豆蔻

赤石脂

乾薑 炮

肉桂 半兩

右為細末麵糊為圓如梧桐子大每服一二十圓空

心用溫酒送下

黑錫丹 治元陽虛冷真陽不固三焦不和上熱下冷

耳內虛鳴腰膝疼痛心氣虛乏飲食無味膀胱久冷

夜多小便婦人月事愆期血海久冷赤白帶下及陰

毒傷寒四肢厥冷不省人事急用棗湯吞一二百粒
即便回陽此藥大能調治榮衛升降陰陽補虛損益
元陽逆陰

茴香炒

附子製

葫蘆巴

破故紙炒

川練子

巴戟已上各

肉豆蔻製

木香不見

沉香不見

桂心已上各

錫硫砂四兩

右為末同研勻酒煮麪糊和圓如梧桐子大陰乾以
布袋擦令光瑩每服四十圓空心薑鹽湯送下

選要卷八

五

諸血門

夫血氣形之所待以生者血陰而氣陽也蓋人身之
血猶水行地中隨氣而行通貫經絡無處不到血為
榮氣為衛榮行脉中衛行脉外相隨上下榮養五臟
六腑四肢百骸者也苟或榮衛失調而為七情四氣
所干然後變病生焉蓋血者主於心藏於肝而統於
脾者也夫血之妄行固由積熱所致然其證多端難
以一舉而論有因飲食過飽胃重傷胃而吐者有因
思慮傷心及積熱而吐血者有勞傷心脾而吐血咳
血者有思慮過多傷脾而吐血者有因肺生癰疽而
吐血者有從高墜下傷損內臟而吐血者有傷寒不
解邪熱在經隨氣上湧而為吐血者治療之法當
究所因傷胃者調胃安血勞心者益其心志積熱則
清之氣鬱則順之傷脾則安之肺癰則消之墜傷則
下之傷寒邪不解當分其經而解之若因吐血後而
咳嗽及嗽中帶紅絲者久則必成癆瘵之證為難治
也又有使血尿血者血便血乃臟腑積滯濕熱之毒
而成也或因氣鬱酒色過度及多食炙煖熱毒之物
或風邪入胃或七情六淫所傷使血氣逆亂榮衛失
度皆能令人下血其尿血乃膀胱蘊熱所致也治法

選要卷八

六

風濕者則祛散之寒則溫之熱則涼之停滯則疎導之氣鬱則調順之有毒宜解利之尿血者則當清利膀胱通其化源使血得歸源矣大抵血得熱則行得寒則止凡諸見血其脉沉細者順洪大弦數者逆臨病詳焉

茯苓補心湯 治心氣虛耗不能藏血以致面色黃瘁五心煩熱咳嗽唾血及婦人懷娠惡阻嘔吐亦宜服之

茯苓

去皮

人參

去蘆 前胡 去蘆 半夏 湯泡

陳皮

枳殼 麸炒

紫蘇

白芍藥

選要卷八

七

桔梗

上蘆

乾葛

當歸 洗 熟地黃

川芎

甘草 各一錢

右作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食

遠服

犀角地黄湯 治主脉浮客脉乳浮乳相合血積胃中

執之甚血在上佳此藥主之

犀角

大黃 各一錢

黃芩

黃連 各二錢

生地黃

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

是齋白木散 治積熱吐血咳血若因飲酒過度負重

傷胃而吐血者最宜服之

白木

三錢 茯苓 去皮

黃芪 蜜炙

人參 去蘆 各一錢半

白合

去心 柴胡

山藥

前胡 去蘆 各一錢

甘草

炙七錢半

右作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至八分食

遠服

人參救肺散 治咳血吐血

人參

去蘆 黃芪

當歸 用尾

熟地黃 已上各一錢

蒼朮

升麻

柴胡

白芍藥 已上各一錢

蘇木

陳皮

甘草 已上各半錢

選要卷八

八

右又咀作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

升陽去熱和血湯 治腸癖下血作派其血唧出有力而射四散散大作痛乃陽明氣衝熱毒作也當去濕

白芍藥

二錢 生地黃

牡丹皮

生甘草

橘皮

各一錢 甘草 炙

黃芪 各一錢半

當歸身

熟地黃

蒼朮 湯浸

秦艽 去蘆

肉桂 去皮

升麻

各半錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾空心服

犀角地黄湯 治傷寒汗下不解鬱于經絡隨氣涌泄

為衄血或清道閉塞流入胃脘吐血如鼻衄吐血不

盡餘血停留致面色痿黃大便黑者更宜服之

犀角屑 生地黃 白芍藥 牡丹皮各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服如潮熱發狂加黃芩大黃

必勝散 治男子婦人血妄流溢或吐或咳衄血並宜服之

小蓴連根用 人參去蘆 蒲黃炒 熟地黃

當歸去蘆 烏梅去核 川芎錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

大蓴散 治食啖辛物傷於肺經嘔吐出血名曰肺疽

大蓴連根用 犀角鎔 升麻 桑白皮去灰

蒲黃炒 杏仁去皮 甘草炙各錢 桔梗炒半錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

涼血地黃湯 治飲食不節起居不時陰受之則入五

臟腹滿閉塞下為瘕泄久為腸癖水穀與血作一派

呬出

當歸 槐花炒 青皮去穢 熟地黃各二錢

黃蘗炒 知母各二錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

石膏散 治心胃煩熱吐血不止口舌乾燥頭疼

石膏 麥門冬錢各 黃芩 甘草炙半錢

生地黃 升麻 青竹茹 葛根

括萎根錢各

右作一服水二鍾煎至八分不拘時服

門冬飲子 治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

麥門冬去心 當歸身 人參已上各五分 紫苑一錢半

芍藥 甘草炙 黃芪已上各一錢 五味子五箇

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

生地黃飲子 治諸吐血下血溺血衄血

生地黃 熟地黃 枸杞子 地骨皮

天門冬去心 黃芪去蘆 芍藥 黃芩

甘草炙已一錢

右作一服用水二鍾煎至八分食遠溫服如脉微身

涼惡風加桂半錢

天門冬湯 治思慮傷心吐血衄血

天門冬去心 遠志去心甘 黃芪去蘆 白芍藥

麥門冬去心 藕節 阿膠炒粉 生地黃

當歸去蘆 人參 沒藥 甘草炙各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

麥門冬飲子一名清肺飲子 治衄血吐血久不愈

麥門冬去心 五味子三錢 當歸身 人參各一錢半

黃芪去蘆 三錢 生地黃 二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服以三稜針於

氣衝出血三愈

當歸地黃湯 治嗽血衄血大小便血或婦人經候不

調月水過喘嗽

當歸 川芎 芍藥 黃藥子

白朮 槐花各一錢 茯苓去皮 生地黃

黃芩 白龍骨 甘草各一錢半

○選要卷八 十一

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

當歸湯 治三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦

起或因熱損發或因酒發悉皆治之

當歸 乾薑炮 黃藥 熟地黃

小薊 羚羊角鎊 阿膠蛤粉炒各三錢半 白朮

芍藥各半兩 黃芩 甘草一分

右以咀每服三錢水二盞入竹茹如指大煎至八分

去滓入伏龍肝頭髮及蒲黃各半錢再煎至七分不

拘時溫服一方無白朮

雞蘇圓 治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉八兩 黃芪 防風去蘆 荊芥各一兩

菊花二錢 片腦半錢 川芎 生地黃

桔梗 甘草各半兩

右為細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓細嚼麥門

冬去心煎湯下不拘時服又治肺損吐血日漸乏力

行步不得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀

加車前子三錢用桑枝剉炒香煎湯嚼下

○選要卷八 十一

腸癖痔漏脫肛門

腸癖者大便下血也經云風客淫氣其精乃亡邪傷肝也因而飽食筋脉橫解腸癖為痔蓋緣風氣通於肝肝生風風生熱風客則淫氣傷精精亡則邪熱傷肝因飽行房則筋脉橫解而腸癖痔漏之證生焉人之不避風寒恣飲醇酒炙煇之物縱慾喜怒無常臟腑鬱抑飲食自倍腸胃乃傷陰陽不和關格壅滯熱毒下注血滲大腸而成腸癖痔漏之疾矣俗謂之腸風臘毒是也其病身寒脉沉者生身熱脉浮者死治法宜祛風消毒解熱涼臟和血潤燥則愈矣痔漏者

○通要卷八

十三

肛門造內外有瘡是也若成漏不破者曰痔破潰而出膿血黃水浸淫淋瀝久不止者曰漏也此疾皆由濕熱風燥四氣相合而致也痔有五種謂牡痔牝痔脉痔腸痔血痔也古方又有酒痔氣痔重痔翻花雙結等痔之名不一究其所因亦不過久嗜辛熱炙煇新酒及房勞憂思蘊積熱毒憤鬱之氣所致也或藏於肛門之內或突於肛門之外若蘊毒深者其狀大如牛舐雞心櫻桃之類或流膿水或出鮮血有妨行坐久而不愈則成漏矣治法在外者宜點之洗之在

內者宜祛其風而除其濕消其熱而解其毒斯得治之法矣若夫脫肛者乃虛寒下脫其病或由腸風痔漏久服寒劑坐努而下脫或因久痢裏急窘迫而脫也其有產婦用力過多及小兒叫號努氣久痢不止風邪襲虛而脫也治法內宜溫胃厚腸收斂解毒之劑外宜溫湯頻洗令軟然後摩掌而入則自愈矣秦艽防風湯治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛非痔漏也此藥主之

秦艽

防風

當歸

白朮

黃蘗

橘皮

柴胡

太黃

澤瀉

紅花

桃仁

升麻

甘草

分六

右作一服用水二鍾煎至一鍾空心服

紅花桃仁湯

治痔疾經年因飽食筋脉橫解腸癖為痔當去其筋脉橫解破血絡是也治法當補北方瀉

中央

紅花

桃仁

麻黃

生地黄

黃蘗

錢半

猪苓

澤瀉

防己

當歸尾

蒼朮

防風

錢二

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

秦光當歸湯 治痔漏大便結燥疼痛

秦光 枳實錢各半 當歸 皂角仁生

桃仁 澤瀉 白朮錢各一 大黃錢五

紅花半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

地榆散 治痔瘡腫痛

地榆 黃芪 枳殼 檳榔

川芎 黃芩 槐花 赤芍藥

羌活錢各一 白欬 蜂房炒 甘草炙各半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

○選要素人 主

當歸郁李仁湯 治痔漏大便結硬大腸下墜多血苦

痛不能忍

當歸尾 郁李仁 澤瀉 生地黃

煨大黃 枳實 蒼朮 秦光已上各一錢

麻子仁一錢 皂角仁一錢另為細末調服

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服忌風寒處大小

便

乾葛湯 治酒痔

乾葛 枳殼炒 半夏 生薑

茯苓 杏仁錢各半 黃芩 甘草

右作一服水二鍾黑豆一百粒生薑五片白梅一箇煎至一鍾食前服

橘皮湯 治氣痔

橘皮 枳殼炒 槐花炒 川芎錢各一

桃仁炒去皮 木香炙 檳榔 紫蘇

香附 甘草炙各一錢

右作一服水二鍾生薑三片棗二枚煎至一鍾食前

服

逐瘀湯 通利大小腸取下惡物凡痔漏熱證用之有

瘀血作痛服之見効

○選要素人 主

川芎 白芷 枳殼炒 赤芍藥

阿膠炒成 茯苓去皮 蓬朮炙 生地黃

茯神去木 木通 甘草生用 五靈脂各一錢

桃仁去皮炒 大黃錢各一

右作二服每服用水二鍾生薑三片蜜三匙煎至一

鍾食前服以利為度

槐角散 治脾胃不調脹滿下血

槐角二兩 枳殼 當歸 蒼朮

陳皮 厚朴各一兩 烏梅 甘草炙各半

右咬咀每服五錢水一鍾煎至七分食前服

秦尤白木圓 治痔疾并漏有膿血大便燥硬作疼痛不可忍

秦尤 土產 桃仁 另研 皂角仁 性各一兩

枳實 炒 當歸尾 酒製 澤瀉 白木 已上各

地榆 三錢

右為細末與桃仁沉礶勻湯煮麪糊和圓如梧桐子大令藥光滑焙乾每服一百圓白湯送下空心服少時以美食壓之忌食硬物冷水菜濕麪酒及五辛辛辣大料物之類犯之則藥無驗矣數服而愈
乳香圓 治脫肛腸出

乳香 另研 白丁香 各二 枳殼 炒 芫青 土產

大黃 乾 鶴虱草 炒 蕪荖茄 牡蠣 煅

右為細末粟米糊為圓如梧桐子大每服三十圓腸風膿茶清送下諸痔前難白湯送下諸漏鐵屑煎湯下空心服

蠟皮散 治肛門脫出不收

蠟皮 另研 磁石 半兩火煨於醋

珠桂 一錢 龜頭 一枚煨火

右為細末分三錢食前米飲調下用鞋底炙熱熨按肛上托入

槐角圓 治五種腫風下血痔漏脫肛下血並宜服之

槐角 炒一兩 地榆 黃芩 當歸 酒洗

防風 土產 枳殼 炒 各

右為細末酒糊圓如梧桐子大每服三十五圓空心米湯送下

釣腸圓 治新久諸痔肛邊腫痛或時瘡瘻有膿血

栝蒌 二箇 燒 蛻皮 三箇 燒 白礬 炒 白附子 生用

綠礬 炒 天南星 雞冠花 炒 半夏 各五

胡桃仁 不油者 枳殼 炒 附子 炮去 訶子 去核

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服三五十圓睡用溫酒送下連年不瘥者服十日効久服除根

寬腸圓 治內外痔

枳殼 炒 黃連 百藥煎 各等分

右為細末水糊為圓如梧桐子大每服三十圓食前米湯送下

神効散 治洗痔凡富貴之人多因嗜慾酒色過度喜怒不常致生痔漏或如鼠乳連珠或塞門腫腸頭腫

流膿漏血其痛如割不可忍名但是諸腫瘡痔漏及腸風漏血此藥治之

苦參 川椒 苦葫蘆 芫荽子

槐花

枳殼

荆芥

金銀花

白芷

連翹

獨活

小茴香

麻黃

牡蠣

威靈仙

椿樹皮

右以咀每用五錢水六七盞蔥白二莖煎五七沸去滓以益盛藥水上坐先蒸後洗甚驗加黃老茄子二箇尤妙

蠟皮圓 治諸痔出血暴急疼痛

蠟皮

槐花

艾葉

白芍藥

枳殼

地榆

川芎

當歸

白礬

黃芪

貫衆

頭髮

選要卷八

十一

猪後懸蹄垂甲

盈天皂角

核去諸

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五十圓食前用米飲送下

香鼓圓 治濕熱內甚因而飽食腸澀為痔久而成漏

速治乘愈也

木香

黃蘗

厚朴

枳殼

黃連

蠟皮

當歸

荆芥穗

右為末麪糊圓如梧桐子大每服三五十圓食前付湯下日三服

能應膏 治痔極効

能應

片腦

右各等分研細用井華水調以雞羽掃痔上

猪臟圓 治大人小兒大便下血日久多食易飢腹不痛裏不急先用海螵蛸炙黃去皮白者為末以木賊草煎湯調下服之三日後効

黃連

嫩猪臟

右以黃連塞滿猪臟繫兩頭煮十分爛研細添糕糊圓如梧桐子大每服三五十圓食前米飲送下

木賊散 治脫肛下熱

右用木賊燒存性為末摻肛門上按之

選要卷八

十一

眼目時

眼為五臟之精華一身之至要蓋屬乎五臟而主乎肝者也夫眼之大小皆角屬心其滿眼白睛屬肺為睛圓大者屬肝上下肉胞屬脾烏睛中黑瞳一點如漆者屬腎此眼目之屬乎五臟也蓋肝者血之海也開竅於目故為之主也五臟或蘊積風熱或因七情之氣鬱結不散上攻眼目各隨五臟所屬而見或赤腫而痛羞澀多淚或生障膜昏暗失明其證七十有二不可枚舉然所得之由或因生食五辛多啖炙博熱食麪食飲酒不已房勞無節極目遠視數看日月

選要

主

頻視星火夜讀細字月下觀書抄寫多年彫鑿細作博奕不休久處烟火津淚過多刺頭出血過多若此者俱喪明之本因於風者則為風眼其證瞳青胞白癢而清淚不赤不疼因於熱者則為熱眼其證烏輪突起胞硬腫紅眵淚濺裏熱刺痛因於氣者則為氣眼其證眼渾而淚胞腫而軟生壅朦朧酸澀微赤是也治之當究其所因風則驅散之熱則清涼之氣則調順之虛則補益之又當辨其肝之有餘不足而治之有餘則當瀉心火不足則當補腎水何以言之肝者木也心者火也腎者水也火為木之子水為木

之如此淬七次去黃連不用將鹽甘石研令極細用水飛過澄去沙脚陰乾再入乳鉢內復研過每煨甘石末一兩入片腦一錢研勻每用少許先以井華水洗眼淨用金銀簪脚點入眼大小皆頭若多年風爛眼只入麝香少許點之

點眼膏子 治諸般眼疾
羊膽一箇入蜜一錢

右用線削定砂鍋內入水煮熟再入冷水內浸取出候水乾開膽傾入磁角罐內每用少許點眼角內神効

選要

主

撥翳紫金膏 治諸般赤眼血膜內障等眼點用此藥

奪魁仙方

麝仁一兩去皮 石蟹 真珠 琥珀
麝香 片腦 硼砂 青鹽

石燕子 金精石 銀精石 白丁香

紅珊瑚 乳香已上各半 辰砂二錢

爐甘石一兩火煨用黃連湯淨七次研

右件俱研極細和勻後有餘藥七味煎汁

當歸 生地黃 陳皮 赤芍藥

防風 羌活 黃連 黃芩

無活

惟日羞明一切風毒眼疾並皆治之

羌活 防風 柴胡 甘草各二錢

右咬咀作一服用水二鍾煎至一鍾食後溫服或加

薄荷甘菊花皆可

柴胡散 治肝風實熱頭疼目眩眼赤心煩

柴胡去苗 地骨皮去心 玄參 羚羊角鎔

甘菊花去梗 赤芍藥 黃芩各一錢 甘草炙五分

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食後溫服

芎藭散 治兩額角痛目睛痛時見黑花及目赤腫痛

欲作內障得之於飢飽勞役

合運要人 手

柴胡一錢 甘草炙五分 枳實一錢 當歸二錢

生地黃七分 黃芩酒浸炒半錢

右作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八分食

後服

聖効散 治眼目諸般風熱痒毒及生翳膜血筋一切

外障並皆治之

黃芩 細辛 甘草 熟地黃

大黃 梔子 赤芍藥 當歸尾

牛蒡子 桑白皮炙 甘菊花二錢

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分食後溫服日三

服

桑白皮散 治肺氣壅塞熱毒上攻眼目白睛腫脹目

夜疼痛心胃煩悶

玄參 桑白皮 枳殼 升麻

杏仁炒去尖 旋覆花 防風去蘆 赤芍藥

黃芩 甘草 甘菊花 龍薤各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後溫服

散熱飲子 治眼目暴赤痛腫

防風 羌活 黃芩 黃連各二錢

右作一服水二鍾煎至七分食後溫服如大便秘結

合運要人 手

大黃 如痛甚者加當歸生地黃 如虛煩不得眠

加山梔子

四物龍膽湯 治目赤暴發作生雲翳疼不忍

當歸酒洗 川芎 芍藥 生薑各一錢

羌活 防風去蘆 草龍膽酒洗 防已各一錢

右作一服水二鍾煎至八分食後溫服

芎藭散 治風毒上攻眼目暴赤腫子腫痛難開癢澀

眵淚

薄荷 當歸 羌活 甘草

大黃 防風去蘆 梔子 川芎各一錢

右作一服用水二鍾煎至八分食後熱服

决明子散 治風熱上攻眼目腫痛

黃芩 甘菊花 草决明子 木賊草

石膏 赤芍藥 川芎 羌活

甘草 蔓荊子 石决明已上各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食後溫服

地黃湯 治眼各病昏翳因發而久不愈

防風去塵 羌活 當歸酒洗 熟地黃

黃芩 黃連 人參去蘆 茯苓各錢

右作二服用水二鍾煎至八分食後服

手

菊花散 治肝受風毒眼目昏朦翳生翳膜

甘菊花四兩 蟬蛻去足 白蒺藜炒去刺 羌活

木賊草童便浸 荆芥穗 甘草炙各兩

石為細末每服二錢食後茶清調下

湯泡散 治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜

杏仁 防風 黃連 赤芍藥

當歸錢各一 銅青三分 薄荷五分

右吹咀作一服用極沸湯泡乘熱先著然後洗冷則再

煖復洗日二三欠一方入鹽少閉目沃洗鹽亦去風

散血

爐甘石散 治一切目疾又名珍珠散

爐甘石六錢 黃連八錢

右剉碎用銀石鍋內文武火煮一晝夜取出黃連

不用將爐甘石研極細水飛過入片腦半錢入礞石

內收貯不可泄氣每用少許點眼上極妙臨點時用

新汲水先洗眼淨然後點之一方入麝香少許能治

風爛赤眼

蟬花無比散 治大人小兒遠年近日一切風眼氣眼

攻注眼目昏暗臉生風粟或痛或痒漸生翳膜侵睛

遮障視物不明及久患偏正頭風牽搐兩眼漸漸細

小連翳赤爛及小兒瘡疹風眼白膜遮睛赤澀流淚

並皆治之常服祛風退翳明目

蛇蛻一兩 蟬蛻去足 羌活 當歸洗焙

石决明用鹽水煮 川芎各三兩 防風去蘆

茯苓去皮 甘草各四兩 赤芍藥三兩 白蒺藜炒

右為細末食後米泔調服三錢或茶清亦可忌食發

風毒等物

明目地黃圓 治男子婦人肝虛積熱上攻眼目翳膜

遮睛羞澀多淚此藥多治肝腎兩經俱虛風邪所乘

并治暴赤熱眼祛風明目其効不可具述

生地黃洗焙 熟地黃洗焙各一斤 牛膝去蘆酒浸二兩 石斛去苗

枳殼剉炒 防風去蘆各四兩 杏仁去皮尖炒細

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服五十圓空心溫酒或鹽湯任下

菊睛圓 治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多有冷淚久服補不足強目力

巴戟主心 枸杞子六兩 肉蓯蓉酒浸四兩 甘菊花揀入

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服五十圓用溫酒鹽湯任下食後空心各一服楊氏家藏方有五味

子六兩

遠睛補肝圓 治肝虛兩目昏暗衝風淚下

白朮 細辛去苗 芎藭 決明子微炒

人參 羌活 當歸切焙 白茯苓去皮

苦參 防風去義 官桂去粗皮 地骨皮

玄參 黃芩去黑心 五味子 車前子微炒

菊花 青箱子 甘草炙分

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三十圓加至四十圓不拘時米飲送下

羊肝圓 鎮肝明目

羌活 甘菊花 細辛 栢子仁

官桂 五味子 白朮已上各半兩 黃連三分

羯羊肝一斤新瓦焙乾更焙

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三四十圓食前用溫水送下一方有地黃無栢子仁

春雪膏 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澁難開及多眵赤腫怕日羞明不能遠視迎風有淚多見黑花

片腦二錢 麝仁去皮殼細研

右用生蜜二錢重將片腦麝仁同攪和用銅筋子或

以金銀釵股時復點放皆頭連眶赤爛以油紙塗膏貼之

助陽活血湯 治眼發之後上熱壅甚白睛紅多眵淚

無疼痛而隱澁難開此因服苦寒藥過多真氣不能通九竅也故眼昏花不明宜助陽活血補氣

此胡 白芷各五 升麻 當歸各五

黃芪三錢 防風七分 蔓荊子 甘草炙各

右以咀作一服水一盞半煎至一盞去滓臨臥熱服避風寒忌食冷物

加減駐景圓 治肝腎氣虛視物眈眈血少氣多

車前子此藥 當歸去尾

熟地黃洗各 川椒炒

楮實子用各 五味子

枸杞子各二 免絲子酒浸

右為細末蜜水煮糊圓如梧桐子大每服三十圓空

用溫酒或鹽湯送下

甘菊湯 治內外障翳一切眼疾

甘菊花 升麻 旋覆花 石決明

芎藭 大黃炒各 羌活去蘆 地骨皮洗

石膏碎 木賊炒 青箱子 車前子

黃芩去黑 防風去蘆 梔子仁 草決明炒

荊芥穗 甘草炙各 黃連去分

右剉碎每服三錢水一盞蜜少許同煎至七分去滓

食後夜臥溫服

磁石圓 治眼肉患後起早元氣虛弱目無睛膜視物

昏暗欲成內障

磁石二兩燒醋淬七次 肉蓯蓉去酒浸一宿刮

免絲子酒浸五日澤乾 補骨脂微炒 巴戟去心

石斛去根 遠志去心 木香不見火 五味子

桂心 甘草炙各 熟地黃一兩

右為細末研勻煉蜜和搗三二百杵圓如梧桐子大

每服三十圓食前溫酒送下一方有疾神無遠志石

劑

蜜蒙花散 治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明胎生風

栗隱澁難開或痒痛漸生翳膜視物不明及久患偏

頭痛牽兩眼漸小并暴赤腫痛

蜜蒙花淨 石決明用鹽同米流水 木賊

羌活 菊花 杜蘅藥炒去刺

右為細末每服二錢食後臘茶清調服日二服

驅風一字散 治眼痒極甚連背頭皆痒

川烏炮五錢 羌活 防風去蘆 川芎

荊芥錢半

右為細末每服一錢食後茶清或薄荷湯調服

祕傳羊肝圓 治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁

白羊子肝一具洗淨去膜 黃連去蘆推

右將羊肝先入沙鍋內杵爛旋次入黃連末拌搗乾

濕得所為圓如梧桐子大每服五十圓食後用熟水

送下

熟地黃圓 治血弱陰虛不能養心致心火旺陽太

其偏頭腫悶瞳子散大視物則花法當養血涼血驅

風散火

熟地黃一兩 當歸身酒洗 柴胡八錢 人參二錢

地骨皮 百錢 甘草 錢二 黃芩 五錢 黃連 三錢

枳殼 錢炒 五味子 錢 天門冬 錢各二 生地黄 錢七

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服七十圓食後

茶清送下婦人尤宜服

杞菊圓 專治男子腎臟虛耗水不上升眼目昏暗遠

視不明漸成內障

白茯苓 去皮八兩 枸杞 酒蒸四兩 當歸 酒洗二兩 青鹽 一兩另研

兔絲子 二兩酒浸一日夜蒸

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五七十圓食

前白湯送下

白龍散 去翳膜明眼目

川芒硝 五兩

右芒硝取白如雪者置銀鍋內以新瓦蓋用熟炭火

慢慢熬溶清汁以鐵鉗鉗出傾在石器中凝結如玉

色研極細入片腦等分每用少許以金銀簪腳點入

目內凡點時先用新汲水洗眼淨然後點之或以少

許吹入鼻中亦可

點眼珍珠散 治暴赤熱眼腫障痒痛羞淚多淚

爐甘石 一斤 黃連 二兩

右將黃連煎湯以火煨爐甘石通紅入黃連湯內淬

之母經云虛則補其母實則瀉其子故也不可輕用

針刀點割偶得其愈出乎僥倖苟或失誤則為終身

之害然又不可過用寒涼之藥及冷水淋洗恐水其

血凝而不流則成痼疾當量人之虛實老少若久患

昏暗無光或生冷翳則當滋補下元以益腎水北方

之人患目最多皆因日冒風沙夜臥熱炕二氣交蒸

使然治之可用涼藥蓋北方稟受與南方不同故也

其餘五輪八廓偷針雀目內障外障及七十二證備

見本科龍木論中茲不多述

明目流氣飲 治肝經不足內受風熱上攻眼目視物

選要卷八 三十二

不明常見黑花當風多淚癢澁難開或生障翳婦人

血風時行暴赤一切眼疾並皆治之

大黃 炮 牛蒡子 炒 菊花

白茯苓 炒 細辛 去苗 防風 去苗 玄參 去蘆

山梔子 去皮 黃芩 甘草 炙 蔓荊子

荊芥 木賊 去根節已上各五分 草決明 半兩

蒼朮 米泔浸一錢

右咬咀作一服用水二鍾煎至一鍾食後執服或為

細末每服二錢臨睡溫酒調服亦可

撥雲散 治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜遮睛

薄荷

菊花 已上各半錢

布十味後藥以咀用臘雪水兩鍾用銀石器中和藥煎至一鍾去粗入好蜜三兩再文武火熬三二沸以綿濾去粗入磁器內却將前末藥一處攪勻內用油紙包固密其口旋取點用此方患重者點二三次輕者點一二次除根

青金圓 治風毒攻眼成外障翳膜

銅青

去皮尖與銅青同

石明

淨水磨

生犀角

淨水磨紙上飛過各一錢

龍腦

白香

水研帶去滓

海螵蛸

水飛過各半錢

進藥人

手

白香

水研帶去滓

右將銅青與麝仁先研如糊次入白丁香研次入四味研極細用好墨研濃汁於淨器中和熟為圓如紫豆太每用人乳汁化開點眼未用者常以龍腦養於磁器中

琥珀散 治目積年生花翳

琥珀

珊瑚

硃砂

硃砂

白者

馬牙硝

各半兩

烏賊魚骨

半兩先於粗石磨去其用者一錢

真珠末

一兩

右研極細令勻每日三五次點

耳聾耳鳴

耳者腎之竅也腎氣充足則耳自然聰矣腎氣一虛然後邪氣乘之而生諸證其所感不同有勞傷氣血風邪乘熱使精脫腎虛而聾者有挾風而聾者有勞損而聾者有臟氣逆而為厥聾者必有時乎眩暈之證耳者宗脉所附脉虛而風邪乘之風入於耳之脉使經氣痞而不宣則為風聾必有時乎頭痛之證若勞後傷於血氣淫慾耗其精元瘦悴力疲腎昏憤憤則為勞聾有能將適得所血氣和平則其聾暫輕其或日就勞傷風邪停滯則為久聾之證矣此外又有

進藥人

手

白香

水研帶去滓

耳觸風邪與氣相搏其聲嘈嘈眼或見光謂之風鳴熱氣乘虛隨脉入耳聚熱不散膿汁出焉謂之膿耳人耳間有津液輕則不能為害若風熱搏之結液成核塞耳亦能令人暴聾謂之聾耳前是數者腎脉可推風則浮而盛熱則洪而實虛則濇而濡治法風則疎散之熱則清利之虛則調養之邪氣屏退然後以通耳調氣安腎之劑主之如此則無不愈矣若夫鼻者清氣出入之道路也肺為氣之主通竅於鼻陰陽升降氣血和平則一呼一吸榮衛行焉自然氣息調停而香臭辨矣或若七情內蠹六氣外傷則清濁不

分泥九汨亂諸證迭起矣夫血之與氣相隨而行若
臟腑生熱乘於血氣故熱氣逼血妄行上自鼻孔中
出謂之鼻衄熱則津液中乾冷則髓涕流注若風冷
隨氣乘於鼻腦則津液交流不能自收謂之流涕鼻
淵是也肺為風寒所傷津液冷滯鼻淵不宜香臭不
聞於是壅作鼻艱冷氣停聚血脈陰凝歲月淹延轉
加壅結於是變生息肉或氣壅滯於上為邪熱留伏
不散則為鼻瘡久則變為疳鼻腐潰臭汗治之當究
其所因衄則以降大涼血之劑清之冷則宜溫散之
壅則宜通利之熱則宜清涼之風則宜祛解之息肉

金鑑卷八 三十五

者消之瘡而疳者宜解毒清肺而理之劉河間謂
鼻病悉屬平熱理固當矣然鼻者肺之候經云形寒
飲冷則傷肺蓋肺受寒邪則先見於鼻若驟用寒涼
之劑使氣道壅塞愈不能通也唯當溫散寒邪則氣
自通矣內經云視聽明而清涼香臭辨而溫煖此之
謂也

犀角飲子 治風熱上壅耳內聾閉聲腫痛膿血流出

犀角 鎊 木通 石菖蒲 甘菊花 玄參 赤芍藥 赤小豆 甘草

右吹咀分二服每服用水二鍾生薑三片煎至八分
食後服

芷芎散 治風入耳虛鳴

白芷 蒼朮 陳皮 石菖蒲

細辛 厚朴 半夏 紫蘇

辣桂 木通 甘草 川芎

右作一服用水二鍾生薑五片葱白二莖煎至八分
食後服

益氣聰明湯 治飲食不節勞役形體脾胃不足得受
內障耳聾之患服此令人精神過倍元氣自益身輕

金鑑卷八 三十六

體健耳目聰明矣

黃藥 芍藥 升麻 蔓荊子

葛根 人參 黃芪 甘草

右作一服用水二鍾煎至一鍾臨臥服

扶神散 治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急昏悶不利

茯神 羌活 防風 蔓荊子

黃芪 石菖蒲 薏苡仁 五味子

麥門冬 甘草

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食後溫服

治耳聾不聞言語此藥利腎氣退風熱

羚羊角錢一 沙參 澤瀉 前胡錢七

防風 木通錢半 旋覆花 石菖蒲錢六

犀牛錢半 右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食後溫服

方藥散 治熱生風耳內痛與頭相連膿血流出

赤芍藥 白芍藥 川芎 木鼈子

當歸 大黃 甘草錢半

右作一服用水二鍾煎至八分食後服

地黃湯 治男子二十歲因瘡毒後腎經熱右耳聽事不真每心中不寧則轉覺重聽虛鳴疼痛

運藥卷八

生地黃一兩 桑白皮一兩 磁石搗碎水淘一斗

羌活 枳殼 防風 黃芩

木通 甘草各半

右又咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓日二三服不拘時候一方無磁石

石菖蒲 治腎虛耳聾重聽過於思慮則其病尤甚此藥主之

石菖蒲 蜀椒大日片合口者炒 茵子炒半

皂角一兩 羊腎一對以酒一升煮乾

石為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服三五十圓空

心溫酒送下日三服凡欲服此藥臨睡時先將鐵物於所患耳邊口中以牙齒咬定却以磁石一小塊綿裹塞耳內覺氣微通略能聽聲然後服藥

通氣散 治耳聾氣閉不通

茴香 木香 全蠍去毒 延胡索

陳皮 苜蒲錢一 羌活 殭蠶

川芎 蟬蛻各半 穿山甲各二 甘草一錢

右為細末每服三錢不拘時溫酒調服

菴菴圓 治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴肉從容溫酒 石龍芮 石菖蒲 小葉更去

運藥卷八

兔絲子酒浸 羌活去蘆 鹿茸酒炙 磁石七次

附子炮去 石斛去根 全蠍去毒 麝香研入

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓空心用鹽酒或鹽湯送下

塞耳丹 治耳聾

石菖蒲一寸 巴豆一粒 全蠍一箇

右為細末苴涎為圓如棗核大綿裹塞耳中即通或用生川烏為末綿裹塞耳中亦効

通神散 治耳聾

全蠍一抄 地龍二條 土狗二枚 明礬半生

雄黃各半 麝香一分

右為細末每用少許蔥白蘸藥引入耳中閉氣面壁坐一時三日一次

紅綿散 治聾耳出膿及黃水

白礬錢一 乾胭脂二分 麝香少許

右為細末先用綿杖子經去耳中膿水盡另用綿杖子送藥入耳中令到底擦之一方加黃丹龍骨

清神散 治氣壅頭目不清耳常重聽

甘菊花 白礬錢一 羌活 荆芥穗

木通 川芎 防風各四兩 木香一錢

合藥卷八 三二

石菖蒲 甘草各一錢半

右為細末每服二錢食後茶清調服

蓖麻圓 治耳聾

蓖麻子去殼 松脂 黃蠟 杏仁去皮雙仁

乳香 食鹽 巴豆去皮沙

右搗爛如膏捻如棗核樣如小拇指大以黃蠟薄捲之大針刺兩三眼子兩頭透用塞耳經常聞鐘聲

黃水出池

羊腎附子圓 治勞聾

附子炮 肉苁蓉酒浸 遠志去心 兔絲子酒浸

牛膝去苗 磁石燒令赤耐淬七次搗

右為細末用羊腎五對去脂膜細切爛研入酒三升於銀鍋中微火煎如膏然後入藥末和搗三五百杵圓如梧桐子大每服五七十圓空心溫酒送下鹽湯亦可

三黃散 治耳內流膿

雄黃 硫黃 雌黃各等

右為細末以少許吹入耳內立効

白龍散 耳者宗脉之所聚腎氣之所通小兒腎臟盛而有熱熱氣上衝於耳津液結滯則生膿汁有因沐

合藥卷八 早

浴水入耳內水濕停積搏於血氣凝積成熱亦令耳

膿汁出謂之聾耳久而不瘥則變成聾

白礬枯 黃丹 龍骨各半 麝香一錢

右研極細先以綿杖子展盡耳中膿水用藥一字分

換兩耳內日二次勿令風入

鼻通治法

人參湯 治肺氣上攻鼻塞不通

人參 茯苓 黃芩 陳皮去白

羌活 麻黃去根 蜀椒去目并閉口者炒

石作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

辛夷散 治肺虛為四鼻所下鼻肉壅塞涕出不已或氣息不通不聞香臭

辛夷 川芎 木通去節 細辛洗去

防風去蘆 羌活 桑白皮 紫苑茸

白芷 甘草炙

右為細末每服二錢食後茶清調服增損通聖散治肺氣不和鼻塞不利

鼠粘子 桔梗 桑白皮 紫苑茸

荆芥穗二錢 甘草生用

右作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食後服

細辛散 治肺傷風冷鼻流涕頭目疼痛胃膈不利

細辛一兩 附子炮去 白木 訶梨勒煨

蔓荊子 芎藭 桂心各七 枳殼麩炒

甘草炙

右咬咀每服三四錢水一鍾生薑三片煎至六分食後服

溫衛湯 治鼻不聞香臭目中溜火氣寒血熱冷淚多

臍下冷陰汗多痿弱

蒼朮 升麻 柴胡 黃芪

知母 羌活各一 青皮 陳皮

黃連 木香三 當歸一 澤瀉

黃蘗 白芷 防風 人參去蘆

甘草炙

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分食後服

防風湯 治鼻塞不聞香臭

防風半兩 梔子七枚 升麻一兩 石膏研三

麻黃七錢 官桂半兩 木通一兩二

右咬咀每服三錢水一鍾煎至七分食後溫服日二服

離澤通氣湯 治鼻不聞香臭

黃芪四錢 羌活 獨活 防風

升麻 葛根 蒼朮三 甘草二

白芷 麻黃半兩 川椒一

右咬咀每服五錢水二鍾生薑三片棗二枚煎白三寸煎至一鍾去粗稍熱食遠服之忌一切冷物及風寒處坐卧行立

辛夷湯 治肺氣不利頭目昏眩鼻寒聲重咯唾稠黏

辛夷去毛 川芎 白芷 甘菊花

前胡 石膏 白朮 生地黃

薄荷 赤茯苓去心 陳皮去白 甘草炙

石咬咀每服五錢水一盞半煎至一鍾去粗食遠溫

通關散 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕多

厚朴 治急頭目昏痛風府怯寒

白附子 炮

益智 去皮

蒸梨 炒去

薄荷 各一

右為細末每服三錢不拘時溫酒調下

犀角散 治肺熱鼻乾無涕心神煩悶

犀角屑 木通

升麻

赤茯苓

黃芪 馬牙硝

杏仁 湯浸去皮尖雙

仁炒黃各半兩

麥門冬 去心

龍腦 研

甘草 炙

右為細末每服一錢食後竹葉湯調下

防風散 治鼻淵腦熱滲下濁涕不止

防風 二兩

黃芪 一兩

人參

甘草 炙

川芎

麥門冬 去心

各

甘草 炙

右為細末每服二錢食後白湯調服

蒼耳散 治鼻流濁涕不止

辛夷仁 五錢

蒼耳子 炒二兩

白芷 一兩

薄荷葉 去

右為細末每服二錢蔥湯或茶清食後調服

金細辛膏 治鼻塞腦冷注泪涕常出

細辛

川椒

川芎

黑附子 炮去

乾薑

吳茱萸 炒

桂心 三錢

皂角屑 炒

右用猪脂二兩煎油先一宿以米醋浸藥取入猪油

內同煎附子色黃為度以綿蘸藥塞鼻中

大楓油 治酒鼓鼻

草烏 尖七箇 麝香 少許

右為細末入大楓子油以磁器盛火上調勻先以生

薑擦鼻上然後用藥擦之日三次專治肺風面鼻赤

硫黃散 治酒鼓鼻及女人鼻并面上生黑粉刺

硫黃 一錢

輕粉 少許

杏仁 去皮四十

右為細末用杏仁膏和藥捏作餅貼鼻上

旦洗去一法以白鹽常擦妙

硝黃散 治赤鼻久不瘥

朴硝

大黃 各等分

右為細末用冷水調敷鼻上

鼻赤方 以新銀杏嚼爛敷於鼻上不過五七次復舊

醫方選要卷之八

醫方選要卷之九日錄

咽喉口齒門 附論

升麻散

清咽利膈湯

甘桔湯

玄參升麻湯

牛旁子湯

清胃散

獨活散

犀角升麻湯

柳花散

甘露飲

解毒雄黃圓

二聖散

千兩金圓

絳雪

上清圓

一字散

半牙散

蟾酥圓

香鹽散

宣風半牙散

雄黃散

牙疼神効方

碧玉散

玄參散

選要卷之九

玉粉圓

奪命無憂散

射干湯

如神散

如聖湯

金鎖匙

救命散

漱口玉池散

祕方指牙散

麝香白牙散

草烏頭散

麝脂散

鶴龜散

安腎圓

取牙不犯手

癰疽瘡癤門 附論

內補十宣散

五香連翹湯

內托千金散

漏蘆湯

十六味流氣散

托裏榮衛湯

托裏溫中湯

黃芪人參湯

升麻和氣散

當歸飲子

九珍散

神効托裏散

內疎黃連湯

乳香止痛散

竹葉黃芪湯

榮衛返魂湯

千金托裏散

復元通氣散

四聖散

雙解散

薏苡仁湯

涼血飲

射干湯

連翹飲

散腫清堅湯

赤芍藥湯

神仁追毒圓

苦參圓

麝香輕粉散

內固清心圓

拔毒消腫藥

烏龍膏

雞清散

神仙太乙膏

追毒萬應鐵頭圓

托裏護心散

神仙蠟礬圓

猪蹄湯

返魂湯

生肌紅玉散

十四味膿瘡膏

如聖散

選要卷之九

神異膏

苦參湯方

治漏瘡

飛龍奪命丹

立馬回疔丹

隔紙膏

神効當歸膏

蛤粉散

雞黃油

南星膏

桔梗湯

四順湯

黃蠟膏

摩風膏

天南星膏

神異膏

全絲萬應膏

祕方善應膏

援生膏

神功散

是齋立應散

薄荷丹

金線錠子

一掃光

醫方選要卷之九日錄 畢

醫方選要卷之九

咽喉口齒門

良醫副臣周文英編集

夫咽喉者一身之總要氣與食出入之門戶也咽以納氣故咽氣通於天喉以納食故喉氣通於地自其風邪客於喉間氣鬱而熱則壅遏而為咽痺自其熱氣生於肺胃風毒蘊隆則腫結而為喉痺又有尸咽穀賊之證尸咽者陰陽不和脾肺壅盛風熱毒氣不能宣通故令尸蟲發動上蝕於喉或癢或疼如胃之候也穀賊者稻芒強澁藏於米而誤食之滯於咽間不能傳化故風熱併聚與血氣搏逐令腫刺如咽噎

選要卷九

之生穀刺也胃脘實熱薰炙上焦發為白頭赤根固自咽瘡之證臟腑停寒寒則氣縮如物窒礙於其間亦有喉痺之證至若懸癰生於上腭雖不關於咽喉所以暴腫者抑亦熱氣使然也咽喉懸癰關要所係病不急療皆能殺人大咽喉為病其甚多有一十八種之證惟乳蛾纏咽風走馬喉痺最為緊急單蛾者其形圓小如筋頭生於咽喉關上或左或右雙蛾則兩邊俱生也若生於關下為難治纏喉風者熱結於喉腫逸於外且麻且痒腫而大也走馬喉痺者謂喉痺急其死又速故名走馬也治療之法微者可

以鹹軟之大者可以卒散之或去風痰或解熱毒至如走馬喉痺其死生如入反掌之間耳豈待藥之緩不及救耶其最妙者莫如用針針出毒血病即時愈若纏喉風腫甚藥不能下者以藥灌鼻中令吐之外以拔毒之劑敷之熱退腫消必自愈矣亦有陰證下虛亦能令人喉痺又當治其下寒則痺自通矣不可不知若夫口者脾之竅齒者腎之標諸經多有會於口者其齒牙是也蓋五味入口藏於胃脾為之運化津液以養五氣五氣者五臟之氣也節宣微爽五臟之氣偏勝由是諸疾生焉故口臭者乃臟腑腐之

選要卷九

氣蘊積於胃臆之間而生熱衝發於口也口瘡者脾氣凝滯加之風熱而然也治之當清胃瀉火是也若夫齒者受病實多有因胃熱而痛者有因風邪而痛者有蟲痛者有腎虛者大抵齒多屬手足陽明二經胃熱火旺之故且齒者骨之精華骨乃腎之所主外板則為牙內床則為齒入腎氣強則齒自堅衰則齒必為痛也其有胃熱者則齒動搖縫中出血或臭穢不可近或齒自疎落皆陽明經熱也治法當審其何部胃熱者瀉其火腎虛者補其水風者祛而散之蟲者毒而取之在乎活法而施治之可也

升麻散 治咽喉腫痛上膈壅熱口舌生瘡

升麻 人參 乾葛 赤芍藥

桔梗 去蘆各二錢 甘草 一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後熱服

清咽利膈湯 治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風 荊芥 薄荷 桔梗

黃芩 黃連 各一錢 山梔 連翹

玄參 大黃 朴硝 牛蒡子

甘草 各七分

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

甘桔湯 治風痰上壅咽喉腫痛吞吐如有所礙

苦桔梗 五錢 甘草 一兩

右作一服水二鍾煎至八分食後熱服

玄參升麻湯 治咽喉妨悶會厭喉腫舌赤

玄參 殭蠶 甘草 鼠麴子 各七

桔梗 連翹 各二錢 升麻 黃連 各二錢

防風 五分 苦芩 八分

右吹咀作一服用水二鍾煎至八分稍熱噙漱時

細嚥之即愈

牛蒡子湯 治風熱上攻咽喉腫痛或生癰瘡如有肉

牛蒡子 湯

簡

玄參 升麻 桔梗 炒 牛蒡子 炒

犀角 鎔 黃芩 木通 甘草 各一錢

右吹咀作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食後

服一方無犀角有羌活

清胃散 治因服補胃熱藥致使牙斷上下疼痛難忍

牽引頭腦滿面熱發大痛足陽明之別絡於腦喜寒

惡熱乃手足陽明經中熱盛而作痛也

牡丹皮 升麻 各一錢 當歸 生地黃

黃連 各一錢

右作一服用水二鍾煎至八分食遠服

獨活散 治風毒牙疼牙根腫痛

川芎 獨活 羌活 防風 各一錢

細辛 荊芥 薄荷 羌活 各一錢

右吹咀用水二鍾煎至八分食後稍熱漱牙徐徐嚥

犀角升麻湯 治陽明經受風熱口脣頰車連牙腫痛

犀角 二錢 升麻 一錢 防風 羌活 各一錢

川芎 白芷 黃芩 白附子 各一錢

甘草 五分

白芷 黃芩 白附子 各一錢

甘草 五分

右吹咀作一服水二鍾煎八分食後漱而服之

柳花散 治口舌生瘡

延胡索 一兩 黃蘗

黃連 各半 青黛

蜜陀僧 錢各二

右爲細末每用少許傳貼瘡上有津液吐去再用

甘露飲 治男婦小兒胃中客熱牙宣口氣齒斷腫爛

時出膿血及口舌生瘡咽喉腫痛又療脾胃受濕痰

熱在裏或醉飽多勞濕熱相搏致生痘病身面皆黃

肢體微腫大便不調小便赤澀或時身熱

枇杷葉 錢各二

熟地黃

天門冬 去心

枳殼 錢各二

○選要卷九

五

茵陳

生地黃

麥門冬 去心

石解

黃芩 錢各一

甘草 錢各一

分五

右吹咀作一服用水二鍾煎至一鍾食後溫服

解毒雄黃圓 治纏喉風急喉痺卒然倒仆失音不語

牙關緊急不省人事并小兒喉龍赤腫及驚熱痰涎

壅盛並宜服之

鬱金 錢各一

巴豆 十四箇

雄黃 二錢半

研飛

右爲細末醋糊圓如菡豆大每服七圓用熱茶清送

下吐出頑涎立甦未吐再服如牙關緊閉灌藥不下

者以刀尺鐵匙幹開口灌下

二聖散 治纏喉風急喉痺

鴨嘴膽礬 二錢

白礬 錢各五

右爲末吹入少許於喉中立驗

千兩金圓

蚶蜆草 錢各五

銅青 五錢

大黃 用錫紙

牙硝 錢各五

右爲末以白梅肉爛研一處搗勻每一兩作五圓以

新綿裹噙化嚥津有頑涎吐出大治喉風不問陰陽

內外急難證腫塞真起死迴生之藥也

絳雪 治纏喉腫痛嚥物妨礙及口舌生瘡

片腦 半字

蓬砂 一錢

辰砂 三錢

馬牙硝

寒水石 各二錢

右爲細末研勻每用一字摻於舌上津液嚥之或吹

入喉中亦可

上清圓 治咽喉腫痛痰涎壅盛

薄荷 一斤

川芎

防風 各二

桔梗 五兩

砂仁 半兩

甘草 四兩

右爲細末煉蜜和圓如皂角子大每服一圓不拘時

噙化

一字散 治喉閉氣塞不通飲食不下者或咽喉疼

雄黃 二錢半

礬稍 七枚

白礬 生研

藜蘆 錢各二

猪牙皂角七錢

右為細末每用一字吹入鼻中即肝吐出頑涎即愈
一方無蠟稍亦治時氣纏喉風累用救人萬無一失
牢牙散 治一切牙齒疼痛

全蠍七箇

細辛三錢

草烏三箇

乳香二錢

右為細末每用少許擦患處須臾鹽湯漱之

蟾酥圓 治牙疼不可忍

蟾酥一字

生附子大二錢

巴豆一粒

麝香研少

右為細末蒸餅糊為圓如棗豆大以新綿裹一圓咬

運毒丸

七

痛處有涎吐之

香鹽散 常用治蟲牙去風熱蛀齲宣露一切齒疾

香附子炒黑

青鹽二兩

右二味為細末每日如常法擦牙妙

宣風牢牙散、此藥注額堅腎牢牙齒

青鹽

細辛七錢

川芎

當歸酒浸焙

右為末每用少許清晨擦牙漱滿口連藥嚥之

雄黃散 治諸般風腫牙疼

雄黃

細辛

青鹽

石膏

良薑

草擬

胡椒各等

麝香少許

右為極細末早晚捺於牙上漱三五次吐出再捺
牙疾神效方

用蛇床子煎湯和熱頻頻漱之立效

碧玉散 治心脾積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下
若或喉痺舌舌腫脹皆可服

青黛

益硝

蒲黃

甘草各等

右為細末研勻每用少許吹入咽喉內細細嚥下若

作圓用砂礬為圓每兩作五十圓每服一圓嚥化嚥

下

玄參散 治懸壅腫痛不可忍

玄參

升麻

射干

大黃各一錢

甘草一錢

右作一服用米二鍾煎至一鍾不拘時緩緩嚥服

玉粉圓 治冬月寒痰咽喉不利語音不出鍼經云寒

氣客於會厭卒然如啞宜服

官桂

草烏各二錢

半夏湯洗

五苓

右為細末生薑自然汁浸蒸餅和圓如大實大每服

一圓至夜嚥化多年不愈者並皆治之

奪命無憂散一名玉屑

治纏喉風咽喉疼痛風涎壅

盛口舌生瘡心腹脹滿脾積癥塊小兒疳癖誤吞骨

屑硬塞不下熱盛喉閉涎滿氣急悶亂不省人事並皆治之

寒水石二兩

玄參

貫衆

緇砂仁去核

滑石研

黃連去毛

茯苓

山豆根

荊芥

甘草炙各半兩

蓬砂二錢

右爲細末每服一錢乾摻舌上後以新汲水嚥下不拘時任是百毒硬物可以除化如嚙着巴豆杏仁辛辣薑桂胡椒燥毒蔥韭蒜等物及諸藥毒火亦可
用此藥每服半錢能潤三焦消五穀除三尸去八邪殺九蟲趕瘟疫專醫渴疾其効如神魯直號金臺王

簡方

射干湯 治喉閉腫塞不通疼痛不下飲食并諸毒

動

射干

白芷

當歸切焙各一兩

杏仁湯浸去皮

升麻

犀角鎔

甘草炙各半兩

右咬咀每服三錢匕水一盞煎七分去粗不拘時溫服日三忌海藻松菜

如神散 治咽喉一切急患不得開

雄黃

藜蘆

玄參

白礬銼炒

白礬生用各一錢

乳香一字

右爲細末研勻每用一字兩鼻內嗅之口含水及舌下擦噤出涎立効

如聖湯 治痰去熱利咽喉治咽中有瘡熱物不下及咳嗽咯血肺痿痰唾氣促并小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

麥門冬半兩

牛旁子炒

桔梗

甘草生用各一兩

右爲細末沸湯調細細服入竹葉煎尤妙

金鎖匙

治咽喉腫塞

雄黃研末

巴豆一粒

右作一服用生薑自然汁調灌下或吐或利皆愈

方細研每遇急患不可鍼藥者用酒瓶裝灰至瓶口下裝火一炷焚藥候煙起將瓶嘴入一邊鼻中以紙

覆瓶口熏之愈

救命散 治脾胃熱毒上攻咽喉有瘡并纏喉風

膩粉三錢

五倍子一分

大黃剉炒

白礬銼炒

右爲細末每服一字大人以竹筒吸之小兒以竹筒吹之如餘毒攻心肺咽有瘡用男孩兒乳汁調藥不

字以雞翎探之嘔者生不嘔者死

漱口玉池散 治風蛙牙疼腫痒動搖牙斷清瀾宣露

出血口氣等疾

當歸

川芎

防風

白芷

藥本

細辛

升麻

地骨皮

槐花

甘草各等分

石作一服用水二鍾黑豆三十粒生薑二片煎至一

鍾去粗不拘時漱口吐去

秘方措牙散 治牙齒疼痛遇冷熱痛者

良薑

細辛

胡椒

草烏炙

右為細末每用少許擦牙疼處噙良久有涎吐去

麝香白牙散 治牙疼牙宣口臭

麝香

石膏半斤

細辛

疾藜各一兩

三柰

青鹽炒各半兩

丁香

檀香

甘松

白芷各三錢

右為細末研勻以指蘸些少擦牙加川芎半兩尤妙

草烏頭散 治牙齒疼痛

草烏頭

米川浸一宿去粗皮切作片炒一兩

五靈脂

高良薑

白礬鹽

草撥

細辛去苗各半兩

乳香另研一錢

右為細末研勻每用一字擦牙合口少時去涎盡以

鹽湯漱口吐去

麝香散 治走馬牙疳危惡疾

麝香

麝香小許

膽礬一錢

銅綠半兩

白礬生用一分

右為細末研勻上擦牙蝕處

鶴鵒散 治牙齒風疳膿血出牙根有蟲

鶴鵒

露蜂房燒灰

細辛各半兩

膩粉

麝香細研名一分

右為細末研勻每用臨睡時剪紙如柳枝葉樣塗藥

貼所患處一方以濕帛子摻藥貼患處

安腎圓 治虛壅牙齒浮腫疼痛

桃仁麩炒

肉蓯蓉酒浸

皮故紙炒

乾山藥

石斛大根

白蒺藜炒去刺

川草薢

川烏炮去皮

巴戟去心

白朮各等分

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服七十圓空心

用鹽湯送下

取牙不犯手

草烏

華撥各一兩半

川椒

細辛各一兩

右為細末每用少許措患牙內外其牙自落

癰疽瘡癰門

夫癰疽瘡癰其名甚多然各有形癰者大而高起屬乎陽六腑之氣所生也疽者平而內發屬乎陰五臟之氣所成也瘡者其總名也癰者有頭小瘡也經云諸痛瘡瘡皆屬心火蓋心主血而行氣氣血凝滯扶心火之熱而生癰疽之類也然所感有淺深故所發有陰陽輕重大小之不同耳六腑積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚腫皮光軟侵表廣大者癰也五臟風積熱攻於肌膚風毒猛暴初生一頭如瘡爛白色焦枯觸之應心者疽也發熱於皮膚之間是以浮

選要卷九

癰疽

腫根小至大不過二三寸者癰也夫癰發於六腑之燎原之火外潰肌肉疽生於五臟沉澁難瘳若陷之燧內消骨髓癰則易瘳惟難將息而遲瘳疽則難瘳易得瘳復夫癰與癰初生並宜灸之謂其氣本達以導其熱今速暢也疽則宜烙不宜灸謂其氣本深沉須達其原也凡瘡疽生於外皆由熱毒蘊於內明乎此一者腫毒丹痧可以類推矣諸瘡之中惟瘡疽疔瘡最為急證其初發也或先熱而後惡寒或先痒而後作痛若其不痛最為惡候且如背瘡始生如粟粒纔有覺時使用艾於痛處灸之痛則灸至痒痒

則灸至痛使毒氣隨火而散最為良法若失之於初其瘡已成又當審其虛實寒熱淺深而治之至於瘡瘡其名甚多必發於手足之間初生黃泡其中或紫黑色有一條如紅絲直二倉卒之際急宜以針於紅絲所經之處刺出毒血然後以蟾酥等藥於正瘡上塗之針時以病者知痛出血為好否則紅絲入腹必致危殆至若癰癰項疽癰癰諸瘡之類皆由七情怫鬱積熱於內而發也治之當流氣活血解毒散熱排膿內托必使氣血宣通熱毒外散然後可也其他如疥癬癰瘡風瘡濕毒之類亦當隨證按方治之此特

選要卷九

癰疽

述其大略也欲求其瘡之名證與夫治法之詳備則有外科精義精要等書在焉

內補十宣散 治一切癰疽瘡癰未成者自然消之已

成者能令速潰凡瘡痒者多是血虛此藥最能消風生血

人參 去蘆

黃芪

當歸 各錢

厚朴 薑汁

川芎

桔梗 去蘆

防風 去蘆

桂心 去皮

白芷

甘草 生用

七分半

右作一服水二鍾煎至八分食遠服

五香連翹湯 治諸瘡腫初覺一二日便厥逆咽喉寒

發寒熱及一切惡瘡結核癰癰疽並治之

乳香 木通 大黃 連翹

沉香 木香 獨活 桑寄生

丁香 射干 升麻 麝香

甘草 各七分

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

內托千金散 治腦背癰疽乳硬等惡瘡

白芷 人參 當歸 黃芪

川芎 防風 甘草 桔梗 金銀花

芍藥 官桂 桔梗 金銀花

△選聖藥元

右作一服用水二鍾煎至七分入酒半鍾再煎三五

沸去粗溫服如痛甚倍加當歸芍藥又加乳香日進

三服瘡口內有黑血出或遍身汗出皆藥之効也

漏蘆湯 治癰疽發背丹毒惡腫時行癰癰目翳吹入

及無名一切惡瘡與五香連翹湯兼服尤妙

漏蘆 麻黃 升麻 赤芍藥

甘草 白欬 白芨 枳殼 各一錢

大黃 二錢

右作一服用水二鍾煎至八分不拘時熱服如熱盛

而大便閉者加芒硝服之

十六味流氣飲 治無名惡瘡癰疽等證

川芎 當歸 芍藥 防風

人參 木香 黃芪 官桂

桔梗 白芷 檳榔 厚朴

烏藥 紫蘇 枳殼 甘草 各八分

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

托裏禁衛湯 治癰疽疔瘡及無名腫毒

桂枝 人參 黃芪 紅花

蒼朮 柴胡 連翹 當歸身

羌活 黃芩 防風 甘草 各一錢

△選聖藥元

右作一服用水二鍾酒一鍾煎至一鍾食前服

托裏溫中湯 治諸瘡為寒變而內陷者膿出清解皮

膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔氣短吃

逆不絕不得安卧時發昏憤

附子 炮去皮 乾薑 炮 羌活 各一錢 丁香

沉香 木香 茴香 陳皮

甘草 各一錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

黃芪人參湯 治諸瘡破後食少無睡及有虛熱穢氣

所觸者

黃芪	白朮	麥冬
蒼朮	陳皮	升麻
當歸	黃藥	甘草
右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服	甘草	炒麴
升麻和氣飲	治瘡腫諸毒疥癬痒痛	
升麻	桔梗	蒼朮
甘草	大黃	陳皮
半夏	茯苓	白芷
枳殼	芍藥	乾薑
右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服		
當歸飲子	治瘡疥風癬濕毒燥痒	
當歸	川芎	芍藥
防風	茯苓	荆芥
黃芪	甘草	何首烏
右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服		
九珍散	治一切癰疽腫毒因氣壅血熱而生者	
川芎	當歸	赤芍藥
白芷	大黃	枯葶實
甘草	黃芪	黃芩
右作一服用水二鍾酒半鍾同煎至一鍾食遠溫服		

婦人乳癰尤宜服之	神効托裏散	治癰疽發背腸癰疔癰無名腫毒煇作
疼痛增寒發熱不問老幼虛人並治	忍冬葉	黃芪
右為粗末作一服用酒二盞煎至一盞隨病上下食	當歸	甘草
前後服後留粗外敷		
內疎黃連湯	治諸瘡皮色腫硬發熱而嘔大便閉脉	
洪實者		
黃連	當歸	芍藥
木香	黃芪	梔子
桔梗	甘草	連翹
右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服		
乳香止痛散	治一切瘡腫疼痛不止	
乳香	沒藥	丁香
白芷	陳皮	甘草
右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服		
竹葉黃芪湯	治發背渴甚通治諸瘡大渴	
竹葉	生地黃	麥門冬
當歸	川芎	甘草
芍藥	人參	半夏
	石膏	黃芪

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

榮衛返魂湯 治流注癰疽發背傷折非此不能効至

於救壞病活死肌弭患於未萌之前拔根於既愈之後中間全君臣佐使如四時五行更相迭旺真神仙妙劑隨證加減其効無窮何則此藥大能順氣勻血故也

何首烏不犯鐵 當歸酒洗 木通 赤芍藥炒

白芷不見火 茴香炒 烏藥炒 枳殼炒

甘草各等分

右方止此九味各等分以咀每服五六錢或酒或水

○選要卷九

隨證煎服或爲末每服三錢酒湯任下病在上食復服病在下食前服若流注加獨活其他癰疽疔腫證虛實寒熱斟酌加減無不愈矣

千金托裏散 治一切癰腫發背疔瘡

黃芪一兩 厚朴製 防風 桔梗各二兩

川芎一兩 白芷二錢 連翹二兩 芍藥

官桂 甘草 人參各一兩 木香不忌火

沒藥各三錢 乳香二錢 當歸五錢

右咬咀每服五錢用水一盞酒一盞煎至二盞不換時服或爲末每服三錢酒一盞煎三五沸服亦可

復元通氣散 治發乳癰疽一切腫毒

木香 茴香 青皮 穿山甲酥炙

陳皮 白芷 甘草各一錢 貝母去心

漏蘆各一錢

右作一服用水一鍾半煎至八分入酒一小鍾食遠服或爲末酒調二錢服亦可

四聖散 治便毒初起發寒熱服之即愈

枳實去殼 大黃 木鼈子去殼 白礬鹽水浸

右咬咀作一服用酒一鍾水一鍾煎至一鍾食遠服服被蓋得汗爲妙一方無枳實有貝母

○選要卷九

雙解散 治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交錯腫結疼痛

辣桂 大黃 芍藥 澤瀉

牽牛炒搗破 桃仁去皮尖各一錢半 甘草四分 乾薑七分

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分食前服

蒼朮仁湯 治腸癰腹中疔痛煩毒不安或脹滿不食

小便澀婦人產後虛熱多有此病縱非是癰證疑似

間便可服

蒼朮仁 三錢 牡丹皮 桃仁去皮尖各一錢 枳實仁

右咬咀作一服水二鍾煎至八分去粗食前溫服

涼血飲 治心癰乃心肺有熱或作寒熱口乾好飲水
渾身疼痛內熱頭面赤

木通

瞿麥

荊芥

天花粉

薄荷

白芷

甘草

麥門冬

芍藥

山梔

連翹

生地黃

車前子

右咬咀作一服用水一鍾竹葉二十片燈心二十道

前至一鍾不拘時服如虛弱及年老加當歸羌活煎

射下湯 治胃脘壅熱成癰腐壞成膿身皮甲錯欬嗽

膿血

合選要卷九

三

射干

錢各一

山梔子

赤茯苓

升麻

錢各一

赤芍藥

錢二

白朮

錢一

右咬咀作一服用水一鍾煎至八分入地黃汁一合

蜜少許食遠溫服

連翹飲 治諸惡瘡痛痒不定心煩口乾石婦人血風

紅斑圓點開爛成瘡流黃汁

川芎

當歸

芍藥

生地黃

防風

荊芥

連翹

牛蒡子

山梔

黃芩

瞿麥

栝蒌根

木通

甘草

麥門冬

去心各八分

右作一服用水二鍾燈心二十道煎至一鍾不拘時服

散腫潰堅湯 治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆

中或至肩或於脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍

於頸或至頰重堅而不潰在足陽明經中所出或

瘡已破乃流膿水及生癰瘤大如升久不潰消者並

皆治之

知母

酒炒

黃蘗

酒炒

昆布

冷水洗

栝蒌根

桔梗

各半

廣茂

炒

三稜

酒洗

連翹

升麻

六分

黃連

芍藥

白

葛根

當歸

用稍

柴胡

甘草

各半

草龍膽

黃芩

錢半

用稍

錢一

酒洗

半生用

右咬咀每服七錢用水二鍾先浸多半日煎至一鍾

去粗熱服於臥處伸足在高處頭微低每噲一口作

十次嚥至服畢依常安臥取藥在胃中停畜故也

另攪一料為細末煉蜜圓如菉豆大每服一百圓或

百五十圓此藥湯留一口下更加海藻半兩少

赤芍藥湯 治一切疔瘡癰疽初覺壅塞疼痛

金銀花

赤芍藥

錢二

大黃

錢三

栝蒌根

當歸

甘草

枳殼

炒

各一錢

合選要卷九

三

右以咀作一服用水一鍾酒一鍾煎至一鍾不拘時服

神仙追毒圖又名聖授丹又名神仙解毒萬病圖能解一切毒如被狐狸

毒鼠弄毒藥南河純毒食疫死牛馬肉毒或蛇犬惡

蟲所傷又治癰疽發背及癰魚臍瘡人多不識喚作

癰疽致命殺人者及治諸風癰瘡赤腫瘤等

文蛤一名五和十和切山茨菰去皮淨

千金子一名續隨子去毒紅牙大戟去蘆洗淨焙

麝香二錢另

右除千金子麝香外三味為細末却入研藥令勻用

糯米煮濃飲為圓分為四十粒每服一圓研生薑

荷汁并華水研服乾薄荷濃煎湯冷磨服亦佳通利

一兩行無妨以用溫白粥止住合時宜用端午七夕

重陽日合或遇天德月德日亦佳合時要在淨室焚

香至誠脩製母令婦人雞犬見効驗不可具述宜珍

藏之喻良能云裴丞相傳此以為濟世衛生之寶凡

人居家或出入不可無此藥如毒藥最多若遊官鎮

未纔覺意思不快便服之即安二廣山谷間有草曰

胡蔓又名斷腸草若以毒人急水吞之急死緩水吞

之緩死又曰毒蛇殺之以草覆上以水灌之數日苗

生其上取為末調酒以毒人始以無患再飲酒即毒

發立死其俗淫婦人多自配合此人與之情相好多

不肯逐此人回陰以藥置食中比還即戒之曰子復

來若從其言即復以藥解之若過期不往必死矣名

曰定年藥若人屈彼亦宜誌之若覺中毒四大不調

即便服之或於雞豚魚羊鵝鴨等肉內下藥再食此

物即觸發其毒急服此藥一粒或吐或下隨手便瘥

一方加雄黃硃砂各五錢亦妙

一方一女子久年病癆瘵命在旦夕為血石蟲所咬

磨一粒服之一時間吐下小蟲千條大者正為兩段

後更服蘇合香圓半月遂愈 別具湯使于后

菌蕈菰子金石也毒瘰癧疫死牛馬肉河魃魚毒時行

瘟疫山嵐瘴氣急喉閉喉癰喉風脾病黃腫赤眼瘡

癰衝胃寒暑熱毒上攻自縊溺水打折傷死但心頭

微暖未隔宿者已上並用生薑蜜水磨一粒灌之須

臾復甦癰疽發背未破魚臍瘡諸般惡瘡腫毒湯水

所傷百蟲犬鼠蛇傷已上並用東流水磨塗并服

粒良冬覺痒立消打撲損傷折妙松節酒磨下半

粒仍以東流水磨塗男子婦人顛邪鬼氣鬼胎煖酒

磨下一圓可分作兩服有毒即吐下自止

苦參圓 治腎水虛少下焦濕熱以致腿足生瘡癰年
不愈及久患血風疥癬或漸成癩風常服補腎水散
濕熱結毒瘡風不可盡述

苦參 四兩 防風 荊芥 赤芍藥

白芷 川烏 生用 川芎 西白烏

獨活 山梔 牙皂 蔓荊子

茯苓 山藥 漢藥 各一 草烏 各三

黃芪 羌活 白附子 各一

右為細末麪糊為圓如梧桐子大每服三五十圓空
心好酒送下如不飲酒以好茶代之日進二三服

合選要卷九 五

麝香輕粉散 治一切癰瘡傷折瘡口不合用藥洗後
以此藥乾摻能肌合口止痛祛風

乳香 三錢 沒藥 三錢 白芷 五錢 五倍子 五錢

輕粉 三錢 國丹 三錢 麝香 一錢 赤石脂 三錢

檀榔 三錢 當歸 三錢 血竭 二錢 海螵蛸 三錢

赤芍藥 三錢

右研為細末摻瘡口邊
內固清心散 治惡瘡熱盛癰腫作痛煩渴此藥解毒

神効

辰砂 少 研 茯苓 人參 白豆蔻

雄黃 另研 菖豆 朴硝 另研 甘草 已上各

皂角 四錢 片腦 另研 麝香 另研 各一錢

右研勻為細末每服一錢不拘時用蜜湯調下

拔毒消腫藥 治諸般癰疽發腫亦痛不可忍或即

散已成即破用至平復而止

白芨 白欬 荊芥 赤芍藥

黃蘗 當歸 大黃 白芷

南星 赤欬 草烏 赤小豆

高陸 寒水石 各等分

右為細末用地黃汁調塗四畔中留瘡口如未潰遍

合選要卷九 五

塗之或用商陸根汁調亦可

烏龍膏 治一切腫毒收赤暈神効

木鼈子 去殼 半夏 各一 水粉 四兩即磨法

草烏 半兩

右四味於鐵鉢內慢火炒令焦黑色為細末出火毒
再研細以新汲水調敷一日一換凡上藥必先自外

向裏塗之須留瘡頂出毒氣

雞清散 治癰疽發背丹毒惡腫時行熱毒吹妳急敷

內消

赤小豆 黃藥子 大黃 盆硝

皂角

去皮弦

木鼈子

去殼研

右為細末用雞子清調敷

神仙入乙膏

治八發癰疽一切惡瘡軟癰不問年月

深遠已成膿未成膿貼之即效蛇虎蠍犬湯火刀斧

所傷並可內服外貼發背先以溫水洗瘡拭乾用

紙攤藥貼仍用水下血氣不通酒下赤白帶當歸

下效嗽喉閉纏喉風並綿裏噤化一切風赤眼貼太

陽穴後用山梔子湯下打撲傷損貼藥仍用橘皮湯

下諸漏先以鹽湯洗淨并諸瘡癰並量大小以紙攤

藥貼之並每服一圓於圓如櫻桃大以蛤粉為衣其

選要卷九

毛

藥可收十年不壞愈久愈烈神效不可具述

玄參

白芷

當歸

赤芍藥

肉桂

去皮

大黃

生地黃

各一兩

右咬咀用麻油二斤浸之春五日夏三日秋七日冬

十日用文武火熬待白芷焦色離火候冷濾去滓再

熬數沸候油稍溫旋旋下好黃丹一斤用柳木棍不

住手攪以藥滴水中不散為度黃丹務要以湯泡過

炒令紫色研之極細方好

追毒萬應銀頭圓

治一切腦背疽惡毒多瘡欲死一

粒即愈

麝香二錢

血竭

蟾酥

輕粉

硃砂各三

片腦一錢

全蠍

蜈蚣各一對

右為細末煉蜜和為劑如瘡有頭者用針挑破微有

血出將藥一黍米大內於挑破針眼內上用紙蓋周

圍用津唾黏住不過一時即愈

托裏護心散 治諸疔腫發背曾經汗下毒氣攻心迷

悶嘔吐而痛可服一二服

乳香

明淨者

真桑豆粉

四兩

右研細和勻每服三錢不拘時甘草湯調服

神效蠟藥圓 治一切癰疽發背及腸癰痔漏神效此

選要卷九

末

藥不問老幼皆可服之無不作效最止疼痛不動

黃蠟

要黃色好

白礬

要明者一兩

右將蠟用慢火鎔化離火入礬末和勻眾手乘熱圓

如梧桐子大每服二十圓漸加至三五十圓食遠用

溫白湯送下

猪蹄湯 治一切癰疽腫毒惡肉膿血不淨便須用

湯頻洗為妙

香白芷

不見

黃芩

赤芍藥

露蜂房

當歸

去塵

羌活

生甘草

各等

右咬咀看疽大小用藥如疽大加料用先將猪蹄煎

蹄兩隻一斤只用白水三升煮軟將汁分作二次澄去面上油花及下面肉滓每次用藥一兩投汁中再用文武火煎十數沸去滓以舊軟絹帛蘸藥湯溫溫徐徐揩瘡上死肉惡血隨洗而下淨洗訖以帛搥仍避風忌人口氣吹之有狐臭人并月經見行婦及猫犬並不許入病人房洗瘡切勿以手觸着洗瘡之方所傳甚多惟此方極効其用露蜂房有理蓋以毒驅毒者也

返魂丹 治十三腫疔瘡

硃砂

膽礬 各一兩半

血竭

銅綠

還魂丹

三

蝸牛

生用各一兩

雄黃

白礬

林各二兩

沒藥

蟾酥

各半兩

麝香

少許

輕粉

半兩

右將蝸牛蟾酥研爛餘藥研為細末同研和圓如雞頭實大每服一圓令病人先嚼蔥白三寸吐在手心內將藥圓裹在蔥內用熱酒一盞吞下如重車行五

里許有汗出即瘥如不能嚼將蔥研爛裏藥服有効驗

生肌紅玉散 治諸瘡蝕爛不生肌肉及金瘡出血并扶瘡疔瘡俱治之

寒水石

煨三錢

黃丹

五分

右為細末乾摻患處一方有龍骨輕粉各一錢治法同

十四味臙瘡膏 治臙瘡久不愈及刀斧傷損湯燙火灼瘡皆可治之甚妙

清油

一兩

黃蠟

二錢

天加一錢

夏

銀珠

一錢

黃丹

錢各一

乳香

另研

沒藥

另研

黃連

一錢

當歸

用黃

血竭

龍骨

另研

黃蘗

一錢

一錢

輕粉

各五錢

定下另研

瘡患四五年不愈者方加猪羊膽各一

右為細末先將蠟油用瓦器鎔沸先下銀珠黃丹次

還魂丹

三

下乳香等七味用竹棒攪冷定方下輕粉仍攪勻膏用油紙攤量瘡大小貼患處効不可盡述止可思

溫茶湯洗淨貼

如聖散 治肺臟風毒血氣凝滯瘡疥癢痒搔之皮起

作痂此藥活血脉潤皮膚散風邪止痒痒

蛇床子

五錢

黃連

各末七錢半

胡粉

一兩

水銀

二錢

半同胡

右四味同研勻用香油調和稀滑先以鹽漿水洗瘡

淨後以藥塗之乾即再換

神無膏

治一切瘡疥

全蠍七箇 皂角一錢 巴豆七箇 蛇床子三錢
 香油一兩 黃蠟半兩 輕粉半兩 雄黃三錢
 右件先用全蠍皂角巴豆煎油變色去粗入蠟化明
 取出冷處入雄黃輕粉蛇床和勻成膏每用少許
 瘡上須先煎苦參湯洗過然後擦藥

苦參湯方

苦參 蛇床子 白礬 荆芥

右以咀前湯放溫洗

治漏瘡

右以五倍子末和血竭末填塞之效

飛龍奪命丹

專治疔瘡發背腦疽乳癰疽附骨疽一切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便痛已成者服之立愈此乃惡證藥中至寶病危者服之立可奏萬無失一此乃傳家之祕方一生受用不敢輕洩神速之驗即愈立効

蟾酥二錢 雄黃三錢 輕粉半錢 乳香二錢
 沒藥二錢 雄黃三錢 輕粉半錢 膽礬一錢
 麝香半錢 銅綠二錢 寒水石一錢 硃砂一錢
 海羊二十 仙傳與世人
 天龍一條 酒洗黃去頭足

右為細末先將海羊研為泥和前藥為圓如菜豆大如圓不就入酒打麪糊為圓每服二圓先用蔥白三寸令病人嚼爛吐於手心男左女右將藥圓裹在內用無灰熱酒三四盞送下於避風處以衣蓋之約人行五里之久再用熱酒數盞以助藥力太汗出為度矣

初覺二圓即消如汗不出重者再服三圓汗出即効三五日病重者再服二圓即愈如疔瘡走黃過心者難治之汗出冷者亦死矣如病人不能嚼葱搗碎藥圓在內熱酒送下瘡在上食後服瘡在下食前服此藥後忌冷水黃瓜茄子油膩雞魚肉濕麵酒發風發瘡毒類之物不可食之又忌婦人洗換狐臭百發百中此藥活人多矣

歌曰

血竭蟾酥輕粉 雄黃銅綠硃砂
 膽礬寒水麝香加 三七海羊研化
 專治疔瘡惡毒 腦疽發背無差
 如菜豆大二圓佳 細嚼蔥酒送下
 衣被蓋之汗出 返魂救死堪誇
 神仙傳與世人 奪命金丹無價

立馬回疔丹 治疔瘡走亂不止

金脚信

蟾酥

血竭

硃砂

沒藥已上各半錢

輕粉

龍腦

麝香已上各半錢

右為細末用生草烏頭汁和作錠子如麥粒大甲將瘡頂刺破將藥一錠於瘡口內藥三日瘡腫

隔紙膏 治內外瘰癧

當歸

白芷

黃連

五倍子

雄黃

沒藥

血竭

海螵蛸

白芨

白欬

黃蘗

厚朴已上各半錢

黃丹六錢

乳香二錢五分

輕粉一錢

小選要方

毒

右為細末研勻用清油調成膏用油紙貼藥便瘡絹帛縛定有膿水解開刮去不潔再貼藥如此數次即愈須先用燒鹽湯洗淨片帛拭乾待片時水氣乾然後貼藥

神效當歸膏 治湯火瘡初起癰癤熱毒侵展嫩下

毒氣壅盛腐化成膿此藥欬口生肌拔熱毒止

當歸

黃蠟各一兩

麻油四兩

右將當歸入油煎令焦黑去滓次入黃蠟急攪拌

冷以磁盒盛用時以布帛紙攤貼一方用白蠟

蛤粉散 治湯火傷

右以蛤蜊殼不拘多少炙焦黃色搗為細末用生油調和如膏傳之如水仍無痕一方以蜜水調傳之疼立止不膿不瘕吳內翰居鄉中鄰家釜翻小兒頭至踵皆傷急以傳之啼立止遂無恙唯纔傷即用即効少緩即不及當預先合以備用耳

雞黃油 治湯火傷

右用雞子煮熟去白用黃於銀石鍋內炒乾再炒直待都化作油去火毒毛翎掃下入韶粉夜明沙為末香油調傳濕則乾摻之

南星膏 治皮膚頭面上瘡瘤大者如拳小者如栗

小選要方

毒

軟或硬不疼不痛可用神効

右用生大南星一枚細研入米醋五七滴為膏攤上貼患處如無生者用乾南星為細末醋調貼先貼小針刺瘡瘤上令透氣却以藥量大小貼之神効

桔梗湯 治男子婦人欬而胃膈隱痛兩脚腫滿

口燥煩悶多渴時出濁唾腫臭名曰肺癰小便赤

大便多澀

桔梗

貝母

當歸酒浸

栝蒌仁

枳殼麩炒

薏苡仁微炒

桑白皮

甘草節

防己去粗皮

百合蒸

黃芪各一兩

北五味子

地骨皮 知母 杏仁各半

右剉碎每服四錢水一盞半生薑三片煎七分不拘

時服服效者加百藥煎熱加黃芩大便秘不利加

黃少前小便澀甚加木通車前子煎煩躁加白

前蘇而疼甚加人參白芷煎

四順湯 治肺癰吐膿五心煩熱壅悶咳嗽

貝母去心 紫菀去苗 桔梗炒各 甘草炙

右搗篩每服三錢水一盞煎五七沸去粗不拘時

冷服如咳嗽甚加去皮尖杏仁三枚同煎小兒量

黃蠟膏 治冬月手足折裂

選要卷九

右用清油半兩盞內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎

入光粉五倍子末少許熬令稠紫色為度先以熱

洗火上烘乾即用藥傅以紙貼之其痛立止水亦

不流若合藥入粉多則硬而成塊旋以火炙動挑

不妨一方無五倍子

摩風膏 摩風止痒消腫定痰治頭面唇鼻諸瘡

裂破

高麗去毒 白芷 杏仁去皮 桃仁去皮

藿香去土 檀香 零陵香 川芎各三錢

沉香 木香 白附子 天麻

獨活 白芨 白欬各一錢 黃芪去根皮

防風 茅香 白芍藥 甘草各二錢

木通二錢 桔萸一箇 龍腦四錢 黃蠟

右剉藥用清油二斤二兩浸七日淨石器銀器

火煎候白芷微黃綿濾去粗於淨磁罐內密封

宿再濾過於磁盤中慢火再輕溫熬動次下黃蠟

勻放溫次下研細龍腦搽面於磁盆內盛每用少許

摩擦患處

天南星膏 治風毒癰癤

大天南星一兩 厚黃藥半兩 赤小豆二錢

選要卷九

皂角一挺不蛀者

右為細末以新汲水調成膏皮紙貼之已結即破

結即散之立効

神異膏 治發背癰疽諸般惡毒瘡癰其効如神治

疾先以麥飯石膏塗傳俟其瘡根漸收止於瘡

大却用神異膏貼之收口此藥隨其人病深淺

合時不可與婦人雞犬猫厭穢物見之

玄參半兩 細黃芪一分 杏仁去皮 金銀花

男子亂髮洗淨 露蜂房一兩 蜂房一兩

黃丹五兩 真麻油一升

右將麻油同髮入銀銚中文武火熬候髮焦鏽盡以杏仁投入候變黑色用好綿濾去滓再將所熬清油入銚內然後入玄參黃芪慢火熬一二時取出也
安冷爐上半時又火力稍息旋入露蜂房蛇蛻二將柳枝急攪却移銚於火上不住手攪慢火熬黃色用綿濾過復入清油在銚內乘冷投黃丹急攪片時又移銚於火上以文武慢火熬不住手柳枝攪千餘轉候藥油變黑色滴於水中凝結成珠則是膏成就若珠子稀再熬少時必候其得所然後磁器內收封待用或恐偶然熬火太過稍硬難於用却少將

選要卷九

圭

蠟發麻油在內以磁器盛封蓋於甌上蒸乘熱攪收用膏藥熬成了須連所盛磁器置淨水中出火在晝夜歇三日方可用日換兩次夜換一次熬此膏藥極難於火候須耐煩看火緊慢火猛則藥中火發不特失藥性又傷人面目救助不及千萬戒膏藥方甚多不下數十治疽之時神効無也此方千不換杖瘡尤妙

金絲萬應膏 治癰撲傷損手足肩并寒濕脚氣

渴不可忍小兒脾疳瀉痢欬嗽不肯服藥者

瀝青二斤

威靈仙二兩

蓖麻子一百粒

皮殼研

黃蠟二兩

木鼈子二十八粒

研

沒藥

乳香

別研各一兩

麻油

夏一兩春秋兩冬一兩

石先將瀝青同威靈仙下鍋熬化以槐柳攪候色重綿濾過以瀝青入水盆候冷成塊取出秤三淨再下鍋鎔開下麻油黃蠟木鼈子泥不住槐柳枝攪勻須慢火滴入水中不黏手扯拔如金絲狀方可如硬再旋加油少許如軟加瀝青試得如法却下乳沒末起鍋在灰火上再用槐柳條攪數百次又以籠布濾膏在水盆內扯拔如金絲頻換水浸一日却用小銚盛頓如落馬墜車於被傷疼痛處火上炙熱貼透骨肉為驗連換熱水數次冷之則熱血處自消小兒脾疳貼患處瀉痢貼肚上咳嗽貼背心上
秘方善應膏 治諸惡瘡腫毒發背癰疽瘰癧疔打撲接骨閃肭刀傷杖瘡蛇蟲毒犬馬咬傷湯火漆瘡等貼之即愈吹乳圓如梧桐子大新汲水下二十圓瀉腸瀉赤圓吞服酒米飲或桔梗甘草湯皆可下可犯暈腥手及火焰

黃丹八兩

白膠香

沒藥

乳香並另

當歸

白芷

杏仁去皮

大黃

草烏

川烏

赤芍藥

檳榔

生地黃

川芎

瀝青另研

亂髮湯洗

右除乳末白膠香瀝青丹外將瓷石銚盛真油

浸藥一宿慢火煎熬黑色再入蔥白亂髮煎少時

絹濾去粗留下一兩藥油復將濾油於慢火上

丹入油內用長條柳枝槐枝不住手攪候有微煙却

滴水成珠為度再攪無煙出却入乳沒膠香瀝青攪

勻傾入瓷器內將留下香油一併收入器內坐新炭

火中浸三日一換水出火毒方可用如膏藥硬

量如蠟香油熬攪勻得所煎膏藥最難須耐煩看

金鑑要略

火緊慢倘火猛則藥中火起不可不細心謹慎

援生膏 治諸般惡瘡及癰癤鼠瘡纔起者點破即愈

血竭 一錢

蟾酥 三錢

麝香 五分

雄黃 五錢

輕粉 三錢

乳香 三錢

沒藥 二錢

右用蕎麥粉灰或真炭灰一斗三升淋灰湯八九碗

用栗柴或桑柴文武火煎作三盤取一盤收留

盤盛於好磁器內候溫將前七味藥碾為極細末

灰湯內用鐵瓢或桑柳枝右攪又用細石灰一

盆藥灰湯攪勻取出候冷過宿盛於小白磁罐內凡

遇諸惡瘡點在當頭一日二次次日又一次瘡頭愈

破約五分血水出為妙恐日久藥乾將前收留灰湯

和用

神效散 專治發背癰疽一切疔毒并癰癤等

成患者效驗不可備述

川烏

火內炮製紋為度

川黃蘗

火炙去粗皮

右二味為細末後各等分用小兒或大人唾津調

膏如唾少漱口水亦可發背癰疽等瘡纔起者敷於

患處留頭候藥乾用淘米水時常潤濕每日換藥

一次如瘡已成重患將潰爛者先將槐枝艾葉煎湯

頓溫將瘡洗淨用絹帛展去膿血以香油潤患處

金鑑要略

綿紙仍照患處剪成圓錢留頭貼上後用藥塗於

如乾依前用淘米水潤日換一次聽其自然流膿不

可手擠如敷藥後病人瘡覺佳疼減熱即愈如生肌

則腐肉自落腐而不落者剪割亦可最不宜用針

背不宜貼膏藥凡醫瘡者去別醫止飲別藥可治

氣怒忌食辛辣并穿服氣飲酒之人飲食忌

羊雞魚肉瓜茄薑蒜之物若因氣怒反復發腫者

前治之如治對口并腦疽不必洗去舊藥逐次

恐動瘡口惹風也

是齋立應散 治癰癤神效已破未破皆可服

連翹

赤芍藥

川芎

當歸

甘草

滑石

黃芩

白牽牛

土蜂房

地膽

川烏尖

右為細末每服抄一大錢匕濃煎木通湯調下

服毒根從小便中出澁痛不妨毒根如粉片塊血

肉是也如未効後再服繼以薄荷丹解其風熱且地

膽性帶毒濟以烏尖或銜上麻悶不能強制嚼碎

一寸茶清下以解之如小便澁燈心煎湯調五苓散

服瘡處用好膏藥貼若瘡癰疽用此宣道惡毒本

去黃茶不用

薄荷丹 解癰癰風熱之毒自小便宜毒後常須服

杜薄荷

皂角

連翹

何首烏

蔓荊子

京三稜

荊芥

右為末好豉二兩半以米醋煎沸酒豉淹令軟

糊和圓如梧桐子大每三十圓食後熟水下日

病雖愈常服之

金線錠子 此藥乃牙疳之神藥也不逾日取效

人言

雄黃

乾胭脂

飛羅麵

右為細末滴水為劑搗成條子用米泔水漱淨齒

用錠搗如米粒大貼之會試累有驗

掃光

硫黃

人言

巴豆

草

荊芥穗

白礬

右為細末先用草火熏體後用猪脂油調搽

藥性緊不便處不可多搽

醫方選要卷之十目錄

折傷門 附論

傷原活血湯

加味芎歸湯

破血散

調經散

止痛膏

赤聲飲子

沒藥散

花並石散

接骨散

導滯散

沒藥乳香散

如聖散

定痛乳香散

紅圓子

塞上方

玉真散

紫金皮散

生肌膏

接骨定痛紫丹

接骨藥

婦人門 附論

四物湯

柴胡四物湯

八物湯

大溫經湯

逍遙散

加味吳茱萸湯

紅花當歸散

伏龍肝散

六神湯

延胡索湯

柴胡散

斷下湯

涼血地黄湯

膠艾湯

紫石英圓

養附萬安圓

內補當歸圓

勝金圓

滋補煖宮圓

神仙聚寶丹

濟陰丹

烏雞煎圓

通經圓

替灸圓

備金散

當歸煎

艾煎圓

養附圓

秦桂圓

驗胎法

桑寄生散

白朮散

竹茹湯

鯉魚湯

安胎飲

茯苓半夏湯

參橘散

安胎和氣飲

紫蘇飲

芎藭補中湯

安胎散

平安散

芎歸湯

人參當歸散

抵聖湯

連翹湯

如聖膏

黑神散

調經散

神應黑散

牛膝湯

玉露散

三之一湯

失笑散

小兒門 附論

益黃散

人參和中散

藿香安胃散

惺惺散

錢氏白朮散

人參羌活湯

實腸散

異功散

星香散

銀白散

瀉白散

瀉黃散

加味四聖散

紫草木香湯

黃芩甘草湯

如聖湯

消毒加味犀角飲

木香散

異功散

人參麥門冬飲

七香圓

香砂保安圓

天麻防風圓

五福化毒丹

助胃膏

加味盧會圓

木香圓

香蟾圓

涼驚圓

固真湯

大安神圓

大青膏

開關散

醫方選要卷之十目錄畢

活血散	萬金散	人齒散
五疳消食圓	抱龍圓	肥兒圓
暖驚餅子	香橘餅子	五疳保童圓
大盧會圓	虎睛圓	金箔鎮心圓
硃砂圓		

醫方選要卷之十

折傷門

良醫副臣周文采編集

折傷者謂其有所損傷於身體也或為刀斧所傷或墜墮險地或打撲身體損傷筋骨皮肉皆能使出血不止或瘀血停積於臟腑結而不散去之不早則有入腹攻心之患治療之法當視其所損輕重若血不止者外宜敷貼之藥內宜和散之劑血蓄於內者宜下去之然後調理必以順氣活血止痛和經使無留滯氣血之患此其要畧也若夫損折筋骨及出腸傷胃其用接縛縫補之法則有專門者在茲不備述

傷原活血湯

治從高墜下惡血流於脇疼痛不可忍

大黃酒浸

柴胡去苗

當歸各二錢

桃仁五十箇研如泥

紅花半錢

天花粉

穿山甲炮

甘草各一錢

右作一服用水一鍾酒半鍾煎至八分食前服

加味芎歸湯

治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血

如豆汁

川芎

當歸

芍藥

百合水浸一日

荊芥各二錢

右作一服用水一鍾半酒半鍾煎至八分不拘時服

破血散

治乘馬墮傷跌其脊骨惡血流於脇下其疼

苦楚不可轉側

羌活

防風

肉桂各一

水蛭炒煙毒另研半錢

柴胡

當歸稍

連翹各二錢

麝香少許另研

右作一服用水一鍾酒一鍾煎至一鍾去滓入水蛭麝香末調勻不拘時服

請經散 治跌撲損傷後疎利用此藥調理

川芎

當歸

芍藥

黃芪各一錢半

青皮

烏藥

陳皮

熟地黃

乳香易研

茴香各一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

止痛當歸散 治打撲損傷腫痛不可忍

粟殼去蒂隔四兩

白芷二兩

甘草炙一兩半

乳香

沒藥各少許另研待藥煎好去渣方入

右咬咀每服三四錢水一大盞酒半盞煎至八分入乳香沒藥末少許不拘時溫服

禁聲飲子 治棒瘡刀刃傷疼痛不可忍

防風去蘆

南星湯泡各等分

右咬咀每服五錢水酒各一鍾生薑一塊煎至八分食遠溫服日三服効若為細末名玉真散定風散專治破傷風及風狗咬神効每服二錢用溫酒調服或

敷搽瘡上亦妙此藥起死迴生神効不可具述

沒藥降聖丹 治打撲傷損筋斷骨折變急疼痛不能屈伸及榮衛虛弱外受風邪內傷經絡筋骨緩縱皮肉刺痛肩背拘急身體倦怠四肢少力

沒藥別研

當歸酒浸

白芍藥

骨碎補藥

川烏頭生去自然銅末火根醋淬十二次研為

生地黃川芎各一兩半

右為細末以生薑自然汁與煉蜜和圓每一兩作四圓每服一圓搥碎用水酒各半鍾入蘇木少許煎至八分去蘇木空心服

花蓋石散 治一切金刀折傷打撲身體血出急於傷處搽藥如有內損血入臟腑熱煎童子小便入酒少許調二錢服之立効若牛舐腸出不損者急送腸入用細絲或桑白皮為線縫合肚皮縫上搽藥血止立活如無桑白皮用麻線縫之亦可並不得封裏瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後搽藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死胎衣不下並用童子小便調服

花蓋石一兩搗為粗末

硫黃上色明者四兩搗為末

右二味和勻先用紙筋和鹽泥固濟罐子一箇候乾

入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚上上書八
卦五行字用炭一種籠疊置於已時午時從下着
火令漸漸上徹直至經宿火冷炭消又放經宿罐冷
取出細研磁瓶內盛依前法服

接骨散 治從高墜下及馬上折傷筋骨碎痛不可忍
者此藥能接骨續筋止痛活血

鵬砂一錢半 水粉 當歸各二錢

右為細末每服二錢煎蘇木湯調下服後時時進蘇
木湯

導滯散 治重物壓傷或從高墜下或吐血不能禁止

或痰血在內胸腹脹滿喘促氣短

當歸 大黃各二兩

右為細末每服三錢不拘時溫酒調服一方加麝香
少許

沒藥乳香散 治打撲傷損痛不可忍者

白木炒五兩 當歸焙 白芷 沒藥另研

肉桂去皮 乳香另研 甘草炙各一兩

右為細末入乳香沒藥研勻每服二錢不拘時溫酒
調下

如聖散 治破傷風止血定痛

蒼朮六兩 川烏炮去 兩頭尖炮去

防風去蘆 細辛各二兩 白朮 川芎

白芷各一兩 錫梢微炒 雄黃各半兩

右為細末每服一錢不拘時溫酒調下

定痛乳香散 專治金刀所傷并折骨打撲傷損

乳香 沒藥各二錢 敗龜板一兩 紫金皮二兩

當歸須 虎骨酥炙 骨碎補各半兩 穿山甲火炒

半兩錢五箇如無以自然

右為細末每服一錢好酒調服病沉服二錢損上者
食後服損下者食前服

紅圓子 治打撲傷損骨碎筋斷疼痛痺冷內外俱損

不問年月日久瘀血留滯外腫內痛肢節拘攣一應

傷損並宜服之常服補損堅筋骨滋血生力神効

不可具述孕婦勿服

牛膝酒浸 川烏炮 南星醋炙 細辛去苗

何首烏炙 桔梗去蘆 山桂去粗 當歸

白欽 赤芍藥 沒藥別研 骨碎補去

羌活去蘆 赤小豆 自然銅醋淬

右藥十五味各等分為細末酒糊為圓如梧桐子大
每服五十圓隨病上下服之溫酒食遠送下

塞上方 治墜傷撲損瘀血在內煩悶

蒲黃為末每服三錢空心熱酒調服

王真散 治諸瘡口入風為破傷風項強牙關緊急欲死者

防風 南星各三兩

右為細末每服三錢童子小便一大鍾煎熱調不拘時服

紫金皮散 治打撲傷損金刀箭鏃傷處浮腫用此

紫金皮 醋炒 南星 半夏 川當歸

黃蘗 鹽炒 草烏炮 川烏炮 杜當歸

川芎 烏藥 破故紙 川白芷 各等分

劉寄奴 川牛膝 桑白皮 各等分

右為細末生薑薄荷汁兼水調傳腫處或傷處皮熱甚加黃蘗皮生地黃半兩有瘡口者勿封瘡口四邊傳之

生肌膏 治金瘡及一切打損瘡

胡粉 白芍藥 薰陸香 乾薑 炮各一兩

油四兩 黃蠟一兩

右為細末以油蠟相和煎如膏用貼瘡上日二換之
撥骨定痛紫金丹 治打撲傷損筋骨斷折

川烏炮 草烏 炮各一兩 五靈脂 木鼈子 煮

骨碎補 威靈仙 金毛狗脊 自然銅

防風 錢各五 地龍 去土 烏藥 青皮

陳皮 小茴香 各二錢 乳香 沒藥 各另

紅娘子 麝香 各一錢 牽牛 錢半 禹餘糧 錢半

右為細末醋煮麪糊圓每服二十圓溫酒下病在上食後服病在下食前服

接骨藥

半兩錢 火煨 醋 木香 自然銅 醋 各一錢 麝香 少許

右研為極細末每服二錢先嚼丁香一粒乳香一粒

用無灰酒一盞調下病在上食後服病在下食前服次日如骨未接再服

婦人門

夫婦人以血爲本者蓋其血勝於氣也血藏於肝流注于臟而主其血者在心也上則爲乳汁下則爲月水合精而爲胞胎者也雖然血之所以流暢於經絡者氣實使之但以血爲本也夫女子十四而天癸至任脉通太衝之脉盛故月候以時而行衝任者血之海也月候者經絡之餘也天癸者月水也天者謂天真之氣癸者北方陰水也其候常以三旬乃見則無病矣一或血氣不調陰陽愆伏過於陽則經脉前期而來過於陰則經脉後期而至蓋血性得熱則宣流

卷之十

九

得寒則凝滯陰氣乘陽內寒血凝故其來乍少陽盛乘陰血熱流散故其來乍多過與不及皆致病也然經脉不行其候有三一則血氣盛實經絡過閉其脉滑實法當通經疎利之一則形體憔悴經絡涸竭其脉虛弱法當滋養血氣一則風冷外傷七情內賊以致經絡痺滯其脉浮濇法當散風逐瘀而生新血經脉不行此諸病所由生也若血虛潮熱盜汗筋攣則爲虛勞血少水涸燥氣乘肺則爲乾嗽宿寒留滯血與氣搏則爲腹痛敗血結塊時發寒熱則爲癥瘕或風寒滯經血化爲水流溢四肢謂之血分或脾不

卷之十

九

制水血與水并浮脹肌肉謂之虛腫或衝任氣虛內慾過度風邪冷熱之氣入於胞門穢液與血相熱而下冷則多白熱則多赤冷熱不調赤白相半謂之赤白帶或衝任勞損經海傷動脾虛衛弱不能約制其血倏然暴下謂之崩中亦有非時血行淋瀝不斷謂之漏下以至眩暈煩悶嘔惡怔忡迷惑健忘發狂妄語小便不禁此婦人以血受病最多而血之爲病遇夜愈增劇也自其血氣和平陰陽調順則精血聚而胞胎成胞胎已成而心腎二脉其動也應手而疾蓋心之所主者血腎之所主者精精血交并而成之精盛則爲男血盛則爲女此亦自然之理也其胎前有疾先以安胎順氣爲本然後兼治其疾不可驟用峻利有毒之藥慎之慎之如無他疾亦不可妄服藥餌待十月以候分娩至於臨產之時尤當謹護亦有難產及不順生路者皆當急備救之不可輕也產後最宜調理若腹中痛惡露未盡必須逐去之然後補養血氣蓋產後有疾悉屬虛弱惟當養血爲主雖有他病不可峻攻此其法也若產後將息失宜變生諸疾不可勝舉姑述其畧如此尚當考諸大千方及產寶等書以盡其述可也

四物湯 益榮衛滋氣血治月水不調臍腹疼痛婦人經病或前或後或多或少或痛不一腰足腹中痛或崩中漏下或半產惡露過多或停留不出妊娠腹痛下血胎不安產後血塊不散或亡血過多惡露不止四物湯加柴莖煎服若陽臟少使柴莖若陰臟多使柴莖一方加香附子治諸虛不足並皆治之

熟地黃 補血如臍痛非此不能

川芎 治風泄肝木也如血虛頭痛非此不能除乃通於肝經之藥也

芍藥 和血理脾如腹中痛非此不能除乃通於脾經之藥也

當歸 和血如血刺痛非此不能除乃通於腎經之藥也

右為釐末水煎服加減於後治婦人骨蒸加地骨皮牡丹皮○若妊娠胎動不安下血不止者加艾葉阿膠一片又加蔥白黃芪若血虛冷崩中去血過多亦加膠艾○若婦人常服春倍川芎脉弦頭痛夏倍芍藥脉洪澹泄○秋倍地黃脉沉瀝血虛冬倍當歸脉沉寒而不食○若春則防風四物加防風倍川芎○若夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥○若秋則門冬四物加天門冬倍地黃○若冬則桂枝四物加桂枝倍當歸○若血虛而腹痛微汗而惡風四物加茂桂謂之腹痛六合○若風眩暈加秦艽羌活謂之風

六合○若氣虛弱起則無力眩然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合○若發熱而煩不能睡臥者加黃連梔子謂之熱六合○若虛寒脉微自汗氣難布息清便自調加乾薑附子謂之寒六合○若中濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之濕六合

川芎 當歸

柴胡 八錢 人參

甘草 各三

右吹咀每服一兩用水二鍾生薑三片棗二枚煎至

八分食遠服

若四物湯中加吳茱萸或加香附子治婦人百病八物湯 治婦人傷寒汗下後或產後血虛飲食減少者宜服之

當歸 川芎

黃芪 白朮

右作一服用水二鍾煎至八分食遠服

大溫經湯 治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行或崩中去血過多或四半產瘀血停留小腹急痛五心煩熱並宜服之

吳茱萸 <small>湯泡</small> 麥門冬 <small>去心</small> 半夏 <small>二錢</small> 牡丹皮	白芍藥 肉桂 <small>去粗皮</small> 人參 當歸 <small>去蘆</small>	芫荽 阿膠 <small>碎炒</small> 甘草 <small>炙</small>	右作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食前服	逍遙散 治血虛煩熱月水不調脘腹脹痛痰嗽潮熱	此胡 <small>二錢</small> 白朮 茯苓 <small>各二錢</small> 當歸 <small>去蘆</small>	芍藥 <small>各二錢</small> 薄荷 <small>半錢</small> 甘草 <small>炙</small>	右作一服用水二鍾煨薑五片煎至一鍾不拘時服	加味吳茱萸湯 治衝任衰弱月候愆期或前或後或崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至經行時頭眩飲	食減少氣滿心怯肌肉不澤並宜服之	吳茱萸 當歸 <small>各一錢</small> 官桂 <small>去粗皮</small> 杜仲 <small>辛各五錢</small>	半夏 <small>二錢</small> 麥門冬 乾薑 白茯苓	桔梗 南木香 <small>不見火</small> 防風 牡丹皮	甘草 <small>各一錢</small>	右作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至八分食前服	紅花當歸散 治婦人血海虛竭或積瘀血經候不調或斷續不定時作腹痛腰膝重寒攻刺小腹堅硬及室女月水不通並宜服之
--	---	---	---------------------	-----------------------	--	--	----------------------	---	-----------------	--	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------	---

紅花 紫葳 牛膝 白芷	蘇木 <small>各錢</small> 桂心 <small>三錢</small> 當歸 <small>用尾</small> 劉寄奴 <small>各二錢</small>	甘草 <small>半錢</small> 赤芍藥 <small>三錢</small>	右作一服用水二鍾酒一鍾煎至一鍾空心服	伏龍肝散 治血氣勞傷衝任脉虛經血非時注下或如豆汁或成血片或五色相雜脘腹冷痛月經不止	伏龍肝 麥門冬 <small>去心</small> 赤石脂 <small>各一錢</small> 熟地黃	艾葉 <small>炒各錢半</small> 當歸 <small>炒</small> 川芎 <small>各二錢</small> 肉桂 <small>去粗皮</small>	乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>各半錢</small>	右作一服用水二鍾棗三枚煎至一鍾食前服	六神湯 治血氣不足肌體煩熱四肢倦怠飲食不進	川芎 當歸 白芍藥 熟地黃	黃芪 地骨皮 <small>各二錢</small>	右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服	延胡索湯 治婦人室女七情所感血與氣併心腹疼痛或連腰脇甚作搐搦一切血氣經候不調並宜服之	延胡索 蒲黃 赤芍藥 片薑黃	當歸 <small>各一錢</small> 乳香 木香 <small>不見火</small> 官桂 <small>不見火</small>	沒藥 <small>各一錢</small> 甘草 <small>半錢</small>
-------------	---	--	--------------------	---	--	--	---	--------------------	-----------------------	---------------	---------------------------	-----------------	--	----------------	--	--

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

此胡散 治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

此胡 赤茯苓 黃芪 白朮各一

麥門冬三錢 龍甲二錢 人參 地骨皮

枳殼幾炒 生地黃 桑白皮 赤芍藥

桔梗 甘草各半

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分不拘時服

斷下湯 治婦女衝任氣虛崩中漏下經脈不調每遇月候將來臍腹腰脚先痛漸減飲食四肢乏力及帶

下三十六疾悉能療之

人參 熟地黃 艾葉 海驢蛸

當歸 川芎七分 乾薑 阿膠

右作一服用水二鍾煎至八分食前服

涼血地黃湯 治婦人血崩不止腎水陰虛不能鎮制

包絡相火故血走而崩也

生地黃 當歸尾 黃連 黃蘗

知母 藁本 川芎 升麻各四

紅花 此胡 防風 羌活

黃芩 細辛 荊芥 蔓荊子

甘草各二分

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分食前服

膠艾湯 治勞傷血氣月水過多淋瀝漏下連日不止

臍腹疼痛及妊娠將攝失宜胎動不安腹痛下墜或

勞傷胞絡胞阻漏血腰痛悶亂或因損傷胎上搶心

奔衝短氣及因產乳衝任氣虛不能約制經血淋瀝

不斷延引日月漸成臍瘦

熟地黃 白芍藥各一 當歸 艾葉各

阿膠 川芎 甘草各七分

右咬咀作一服用水一鍾半酒半鍾煎至八分食前

服日二三服有汗加黃芪

紫石英圓 治婦人月經不調乍多乍少或前或後時

發疼痛

紫石英 研水 川烏炮 杜仲 桑寄生

遠志 桂心 澤瀉 人參 肉蓯蓉酒浸

龍骨 別研 當歸 五昧子 甘草各

石斛 乾薑 杜鵑 川椒 炒去目并各口者

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓食前

用米飲湯送下

黃附萬安圓 治婦人諸虛百損五勞七傷食積氣積
經候不調赤白帶下

熟地黃 當歸酒浸 厚朴薑製 枳殼麩炒

陳皮 川芎 白芍藥 烏藥

縮砂 木香各一 茯苓二兩 白朮四兩

香附四兩 艾葉二兩與香附同用

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服五十圓或酒
或淡醋湯送下食前服

內補當歸圓 治血氣虛損月水不調或崩中漏下去
血過多肌體羸困及月水將行腰腿重痛並宜服之

當歸去蘆 阿膠炙炒 白芷 續斷

乾薑炮 芎藭 甘草炙各 熟地黃半兩

附子炮去 芍藥 肉桂各二 吳茱萸湯洗

白朮各三 蒲黃八錢

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五十圓空心
溫酒送下

勝金圓 治婦人久虛無子及產前產後一切病患無

治男子下虛無力此藥能安胎催生妊娠臨月服五

七圓產時減痛婦人無子是子宮冷如服二十日男

女自至又治積年血氣脚手麻痺半身不遂赤白帶

下血如山崩及治產後腹中結痛吐逆心痛子死腹
中繞臍作痛氣滿煩悶失蓋汗不出月水不通四肢
浮腫無力血勞虛勞小便不禁中風不語口噤產後
痢疾消渴眼前見鬼迷暈敗血上衝寒熱頭痛面色
痿黃淋瀝諸疾血下無度血痢不止飲食無味產後
傷寒虛煩勞悶產後血癖產後羸瘦凡婦人眾疾不
問年深日近並宜服之一方名不換金圓治婦人諸
虛不足心腹疼痛

藥本 當歸酒洗 石脂赤白 皂藥

人參去蘆 白薇 川芎火不見 牡丹皮

桂心 白芷 白朮米泔 白朮

沒藥 甘草炙 延胡索已上各

右為細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓溫酒化下
初產後用熱醋湯化下此方係王承宣祖傳傳家

凡婦人懷娠便服此藥甚有神効常服尤妙係在京
師於能家傳一方有沉香無沒藥一方有附子無沉

香

滋補煖宮圓 煖血海實衛任治子宮虛弱風寒寒滯

因而斷續不成孕育及帶下赤白漏下五色頭虛眩

懷懷少氣胸滿心悸腰腹刺痛連引腰背下血過多

脇肋牽急嘔逆不食面黃羸瘦汗自出舉動乏竭
常服溫補胞室和養血氣光悅容顏散逐風冷退除
萬病足成孕育安固胎氣

當歸三兩

續斷

吳茱萸

五味子

薑本

人參去蘆

白朮

白茯苓

金釵石斛

川芎

黃芪蜜炙

香白芷

砂仁

草薢酒浸

熟地黃

乾薑

牡蠣粉

香附子炒去毛

白龍骨

山藥

兔絲子

酒蒸乾羌活各二兩

山茱萸去核

延胡索

小茴香

川椒各五錢

十八

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五七十圓溫

酒空心送下或淡醋湯亦可

神仙聚寶丹

治婦人血海虛冷外乘風寒縛結不散

積聚成塊血氣攻注腹脇疼痛及經候不調崩中帶

下並宜服之

沒藥另研

琥珀另研

當歸酒洗焙

木香取末各兩

辰砂另研

麝香另研各一錢

乳香滴珠明者另研二錢半

右研勻滴水為圓每兩作十圓每服一圓空心溫酒

磨下

濟陰丹

治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血衝

心中風口噤子死腹中聲開口灌藥須臾生下便得

無恙治墮胎腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣不下血

暈血癖血崩帶血入四肢一應血臟有患及諸種風

氣或傷風吐逆咳嗽寒熱往來遍身生瘡頭痛惡心

經脈不調赤白帶下乳生惡氣胎臃虛冷數曾墮胎

崩中不定因此成疾及室女經脈不通並宜服之常

服煖子宮和血氣悅顏色退風冷能消除萬病

三稜二兩

蓬茂切片

蒼朮酒浸

枳殼炒

艾葉

劉寄奴

香附子

敗薑各一兩

烏豆三合右九味以米醋

當歸身酒

橘皮去白

十九

白芍藥各一兩

蒲黃炒

牡丹皮去骨

官桂去粗皮

赤芍藥

片薑黃

青皮去穢各一兩

生地黃酒浸

熟地黃酒浸

川芎各七錢半

延胡索炒

五靈脂酒浸

白朮各半兩

右為細末以糯米粉用穀醋打糊為圓如梧桐子大

每服五十圓空心用沉香煎湯送下或紫蘇湯鹽湯

亦可

烏雞煎圓 治婦人胎前產後一切疾病此藥溫補經

血壯氣和中令人有子

烏雄雞一隻烏藥

石淋

牡丹皮

人參 <small>去蘆</small>	白水	黃芪 <small>各一兩</small>	蒼朮 <small>米泔洗</small>
海桐皮	肉桂 <small>去粗皮</small>	附子 <small>地黃去</small>	白芍藥
蓬莪朮	川烏 <small>炮</small>	紅花	陳皮 <small>各二兩</small>
延胡索	木香	琥珀	熟地黃 <small>洗焙</small>
肉豆蔻	草果 <small>各半兩</small>		

右細剉成咀用烏雞去毛及腸肚將藥安放雞肚中用瓦器或銀鍋內以好酒一斗同煮候酒乾去雞骨慢火焙乾為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五七十圓溫酒或淡醋湯任下

通經圓 治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕

桂心	青皮	大黃 <small>煨</small>	乾薑 <small>炮</small>
川椒 <small>去目炒出汗</small>	蓬莪朮	乾漆 <small>炒煙</small>	川烏 <small>炮</small>
當歸	桃仁 <small>各等分</small>		

右為細末用四分同米醋熬膏和六分末盛薑剉日中杵一二百下圓如梧桐子大每服三五十圓空心醋湯送下一方有紅花無川烏

替灸圓 治婦人久冷赤白帶下肚腹疼痛經脈不調面色痿黃脚手疼痛四肢無力久無子息此藥服之久能溫中暖臍調經有子藥服不盡即有效驗

茯苓去皮 艾葉各八兩 當歸洗 香附子各四兩

川芎 芍藥各二兩 吳茱萸炒三兩

右用米醋五升砂鍋內煮乾為細末醋糊和圓如梧桐子大每服五十圓空心淡醋湯下日三服

備金散 治血崩不止

香附子炒四兩 當歸尾二錢 五靈脂炒

右為細末每服二錢空心溫酒調服

當歸煎 治赤白帶下不止腹內疼痛四肢煩疼不欲飲食日漸羸瘦

當歸酒浸 赤芍藥 牡蠣火煨 阿膠炒

白芍藥 續斷酒浸各一兩 地榆半兩 熟地黃兩

右為米醋糊為圓如梧桐子大每服五十圓空心米飲送下

艾煎圓 治婦人室女經候不調臍腹冷痛惡心腹常滿脹至晚則增

食茱萸湯洗 當歸各七錢 熟地黃 白芍藥

石菖蒲炒 川芎 人參去蘆各一兩

熟艾四兩 糯米一兩 艾葉一兩 艾葉一兩

右為末酒煮糊為圓如梧桐子大每服五十圓淡醋湯空心送下

養附圓 治婦人室女一切血氣經候不調臍腹疼痛

面色痿黃心忪乏力腹脹脇疼頭暈惡心飲食減少崩漏帶下大腸便血積聚癥瘕並皆治療若以其名人之言之耗氣不喜此藥世訛之久不肯服者甚多殊不知獲効非常方書所載香附子乃婦人之仙藥不可輕忽修製相感豈可同日而語哉能久服之自顯其功耳

右以香附子不拘多少先搗去毛淨用好醋煮半日出焙研為末醋糊圓如梧桐子大每服五六十圓米飲送下不拘時候婦人數墮胎由氣不升降所以胎氣不固此藥尤妙一方加陳艾等分名艾附圓治婦

人百病

秦桂圓 治婦人無子經進有効

秦元去蘆 桂心去粗皮 杜仲炒去絲 防風去蘆

厚朴各七錢 附子生用去皮 白茯苓各一兩半 白薇

乾薑炮 沙參 牛膝酒炒 半夏各半兩

人參一兩 細辛二兩二錢

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓空心用淡醋湯或米飲送下未効更加圓數服如覺有孕便不可服

撥胎法 婦人經脉不行已經三月欲驗有胎

川芎一兩五錢

右為細末空心濃煎艾湯調下方寸匕覺腹內微動則有胎

桑寄生散 治妊娠或因房室驚觸勞力過度傷動胞胎或食毒物致令子宮虛滑經脉淋瀝若不急治敗血湊心子母難保日漸胎乾危亡不久

桑寄生 當歸酒浸 川續斷酒浸 川芎

香附子炒去毛 茯神去木 阿膠蛤粉炒 白朮已上各

人參去蘆 甘草炙各半兩 陳艾葉一兩 烏梅去核半兩

右以咀咀每服七錢水一鍾半生薑五片煎至八分不拘時候服

拘時溫服

白朮散 治妊娠氣不和飲食不美

白朮炒 紫蘇各一兩 白芷微炒 人參各三

訶子皮 青皮去穢 川芎各五錢 甘草炙半

右件咀咀每服三四錢水一鍾半生薑三片煎至八分不拘時候服

竹茹湯

治妊娠乾嘔頭痛寒熱往來五心煩熱四肢不和

人參 陳皮去白 白朮 麥門冬去心

厚朴薑製 茯苓去皮 竹茹各五錢 甘草二錢

石件吹咀每服五錢水一鍾半生薑三片煎至七分不拘時服

鯉魚湯 治妊娠渾身浮腫大小便赤澀

當歸酒浸 白芍藥各三錢 白茯苓四錢 白朮三錢

右吹咀每服四錢用鯉魚一尾約重一二斤者破洗

鱗腸白水煮熟去魚每用魚汁一盞半生薑七片橘

皮少許煎至八分空心服如胎水未盡再服有效

安胎飲 治妊娠惡阻嘔吐不食胎動不安或時下血

川芎 白朮 茯苓去皮 熟地黃

地榆 當歸去蘆 半夏炒 白芍藥

阿膠炒成 黃芪去蘆 甘草炙各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食遠服

茯苓半夏湯 治妊娠惡阻惡聞食氣胸膈痰逆嘔吐

惡心

赤茯苓去皮 半夏湯泡 熟地黃各一錢 旋覆花

陳皮去白 人參去蘆 桔梗 白芍藥

川芎 甘草炙各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食前服

參橘散 治妊娠三月惡阻吐逆不食心虛煩悶

人參去蘆 橘皮去白 茯苓各三錢 麥門冬去心

白朮 厚朴炒 甘草炙各一錢

右作一服用水二鍾生薑七片竹茹少許煎至一鍾

不拘時服

安胎和氣飲 治胎冷腹脹痛引兩脇小便頻數大便

虛滑

訶子炮 白朮各二錢 陳皮去白 良薑炒

木香不見 白芍藥 陳米炒 甘草炙各一錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至八分不拘時服

紫蘇飲 治胎氣不和接上心腹脹滿疼痛謂之子懸

紫蘇葉 大腹皮 陳皮去白 白芍藥

當歸酒浸 川芎各一錢 人參去蘆 甘草炙各一錢

右作一服用水二鍾生薑五片蔥白七寸煎至八分

不拘時服

芎藭補中湯 治懷孕血氣虛弱不能衛養以致數月

而墮名曰半產

芎藭 阿膠蛤粉 乾薑炮 五味子各一錢

黃芪蜜炙 當歸酒浸 白朮 赤芍藥各一錢

木香不見 人參 杜仲去皮 甘草各五錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾去粗不拘時服

安胎散 治妊娠自高墜下或為重物所壓觸胎動氣

脹下血

縮砂去殼炒令熟

右爲細末每服二錢不拘時熱酒調服或艾湯鹽湯亦可

平安散 治妊娠上氣喘急大便不通嘔吐不食腹脇脹痛

川芎

木香各一錢半

陳皮

熟地黃酒洗

乾薑炮

生薑

厚朴薑汁炒

甘草各一錢

右作一服用水二鍾入燒鹽二捻煎至八分不拘時服

芎歸湯 治產後去血過多血暈不省

川芎

當歸各等分

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分食前服腹中刺痛加白芍藥口乾煩渴加烏梅麥門冬發熱寒加白芍藥水停心下加茯苓生薑虛煩不得眠加人參竹葉

葉

人參當歸散 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛則生內熱其證心胃煩滿呼吸短氣頭痛悶亂晡時轉甚與大病後虛煩相類

人參去蘆

當歸去蘆

肉桂去粗

熟地黃

麥門冬各一錢 白芍藥二錢 血熱甚者加生地黃二錢

右作一服用水二鍾粳米一合竹葉十片煎至一鍾食遠服

抵聖湯 治產後血氣傷於脾胃腹脇滿悶嘔吐惡心

芍藥

半夏湯泡

陳皮去白

澤蘭葉

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

連翹湯 治產後瘀乳并乳癰

連翹

升麻

芒硝

玄參

芍藥

白欬

防風

射干

大黃 杏仁 甘草各一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

如聖膏 治難產胎衣不下或胎死腹中不下

莖麻子二兩去殼

雄黃二錢

右二味研成膏塗母右足下纔下即便洗去

黑神散 治婦人產後惡露不盡胞衣不下攻衝心胃痞滿或臍腹撮聚及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾並皆治之

黑豆炒半升

熟地黃酒浸

當歸酒浸

肉桂去粗

乾薑炮

甘草炙

芍藥

蒲黃各四兩

右為細末每服二錢用酒半盞童子小便半盞同煎
沸不拘時服

調經散 治產後敗血停積五臟流入四肢令人浮腫
不可作水腫治之但調經其腫自消

當歸酒浸 赤芍藥各一錢 麝香另研
琥珀另研 肉桂不見 沒藥另研 甘草二錢各

右為細末每服二錢不拘時生薑汁溫酒調服

神應黑散 最治難產因緣自有難易其胎橫逆皆因
坐草太早努力過多兒轉未逮或已破水其血必乾
若先露手為之橫或先露足為之逆養生方云倉皇

本草卷下

子入

之間兩命所係不可不知此藥之功也人多不服以
為極賤之藥大槩產難或一日兩日未免水血先下
如舟坐難殊不知香白芷百草霜再固其血服之如
魚得水決自轉生無治月水不調崩中等疾

香白芷 百草霜各等分

右為末每服二錢童子小便米醋半呷許沸湯澆入
六七分點服見功甚速再服即分晚矣或用蜀葵子
四十九粒白滑石末三錢順流水煎湯調空心二服
如人行五里即下

牛膝湯 治產兒已出胞衣不下臍腹堅脹急痛甚及

子死腹中不得出者

牛膝酒浸 瞿麥各一兩 滑石二兩 赤豆二合

當歸酒浸 木通各一兩 葵子一兩二錢半

右咬咀每服三四錢水一鍾半煎至八分不拘時服

玉露散 治產後乳脉不行身體壯熱頭目昏痛大便
澀滯悉能治之涼膈壓熱下乳

人參去蘆 白茯苓去皮甘草各半 苦梗炒

川芎 白芷各一兩 當歸酒洗 芍藥七錢

右咬咀每服五錢水一鍾半煎至八分溫服如煩熱
大便秘者加大黃

本草卷下

子入

三之一湯 治產後虛勞發熱日久不安

北胡 黃芩 人參 半夏

川芎 當歸 芍藥 熟地黃

甘草各一錢半

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘
時服

失笑散 治產後心腹絞痛欲絕

蒲黃炒 五靈脂酒研淘去砂

右為細末先用米醋調二錢熬成膏入白湯半盞化
開服

小兒門

小兒之疾其證最多自初生以後在嬰兒之中尤難調護若稟受胎元素厚其疾病自少若稟受怯弱疾病必多焉加以保護不謹或受驚觸或飲食過度衝冒寒暑以致變生諸證蓋小兒謂之亞科疾病不能言精神猶未備形聲未正脉理未全所以比大人爲難治也語不能問其得病之由脉不能診其必然之理况臟腑虛實更變易如反掌治之或差其害不淺凡小兒之疾若爲四氣所感悉與大人治法一同但藥劑差小耳惟吐瀉驚疳痘疹與大人爲異耳蓋吐

小兒門
三十一

瀉有寒有熱有因食積者治之須辨其寒熱虛實當以參朮爲主熱則佐以黃連滑石之類寒則加以木香豆蔻薑桂之類或分利以除其濕或消導以去其積此其大法也至若驚風則有急慢二證虛實寒熱不同不可不辨也急驚者本因熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤劇則發搐蓋熱甚則生風風屬肝此陽盛陰虛也或熱痰客於心胃因聞大聲非常則動而驚搐矣發過則如故若心火熱極雖不聞聲及驚亦自發搐當用清涼利驚之劑以除其痰熱則愈矣若慢驚者則因病後吐瀉脾胃虛損遍

身冷口鼻氣出亦冷手足時瘳瘳昏睡睡中露睛此無陽也卒多難治當溫補其脾胃助其元氣其風庶幾可退也切不可用寒涼之藥愈弱脾胃之氣則不可治也疳疾之由多因小兒關乳喫食太早或乳食不調或風寒停飲以致結積於脾胃之中久則變成疳疾其爲病也身瘦皮黃目生白膜羞澁不開唇赤身熱喜臥冷地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水顏色變易腹脹滿大四肢枯細頭髮作穗項細極瘦口乾飲水日久亦或變成冷疳治法當辨其冷熱冷者以溫補消積治之如木香圓之類熱者以清熱化

小兒門
三十二

積治之如胡黃連蘆會青黛之類此治疳之要法也至若痘疹一證最爲重候不可不謹然初出之間有類傷寒之狀其證自然增寒壯熱身體疼痛大便黃稠乃爲正病也若無他疾不宜服藥或未出疑似之間宜與四味升麻湯發之若已出則不可服其或根窠紅活飲食如故大小便調亦不可服藥若瘡疹灰色頂平不起加以寒戰咬牙或瀉或嘔手足厥冷可與木香散甚者用異功散設若倒陷不起氣血虛弱亦宜服木香異功之類或用四聖散人牙散之類發之其或兒稟受素厚瘡勢太熱煩燥引飲又當以清

熱解毒之劑治之丹溪論之詳矣已上小兒之證姑論其大畧如此欲求其至當全備又當參考活幼錢氏陳氏等書以盡其詳茲不多贅

益黃散 治小兒不熱四肢困睡脾胃虛弱

陳皮一錢 青皮 訶子各五分 丁香

甘草各三分

右吹咀作一服水一鍾煎至半鍾食前服

人參和中散 治小兒吐瀉微熱作渴

人參 白朮 茯苓 藿香各錢

乾葛一錢 木香不見 甘草各三分 陳皮

金匱要略

卷之二十三

砂仁各七分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至半鍾食前服若

小兒未及一歲分爲二三次服後皆倣此

藿香安胃散 治小兒感寒嘔逆吐瀉

藿香一錢 半夏湯泡 陳皮 厚朴薑炙各七分

甘草五分 蒼朮米泔浸一錢 砂仁七分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至半鍾食前服

惺惺散 治小兒傷風壯熱及瘡疹毒氣時疫溫壯風

熱等疾

人參 白朮 桔梗 天花粉

細辛 甘草炙 川芎 白朮各五分

右作一服用水一鍾生薑三片薄荷三葉煎至半鍾

不拘時服

錢氏白朮散 治小兒脾胃虛弱昏困多睡乳食減少

調中和氣止吐逆除煩渴

人參 白朮 茯苓 甘草

藿香 乾葛各五分 木香二分

右作一服用水一鍾煎至半鍾食遠服

人參羌活散 治小兒傷寒頭疼發熱渾身拘急時行

瘡疹

金匱要略

卷之二十三

羌活 獨活 柴胡 前胡

川芎各五分 桔梗 人參 茯苓

天麻 枳殼各三分 地骨皮 薄荷

甘草各二分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至半鍾食遠服

寶腸散 治小兒泄瀉腸滑脾虛此藥厚腸胃

茯苓 陳皮 砂仁 肉蓯蓉炒慢

厚朴薑炙 訶子煨 蒼朮米泔浸各七分 木香不見火

甘草各三分

右作一服用水一鍾生薑三片棗一枚煎半鍾食前

服

異功散 治小兒吐瀉不思飲食此藥溫中壯胃療虛冷

人參

白朮炒

茯苓各一錢半

陳皮七分

甘草炙

木香各五分

右作一服用水一鍾生薑三片棗一枚煎至半鍾食遠服

星香散

治小兒急慢驚風搐搦竄視涎潮

南星

圓白者一錢半 木香不見火

橘紅各七分

全蠍去毒二枚

右咬咀水一鍾生薑三片煎至半鍾頻灌大便去涎

即愈

銀白散 治小兒或吐或瀉涎為微喘露睛驚跳

石蓮肉

白扁豆炒

茯苓各二錢半

人參

天麻

白附子炮

全蠍炒

木香不見火

甘草炒

藿香各一錢二分 陳米三錢

右為末每服一錢用生薑冬瓜仁煎湯調下此藥助脾祛風急慢驚風通用

瀉白散 治小兒肺氣盛致令鼻塞乳食不下或氣壅喘噎熱嗽亦治

地骨皮

桑白皮

甘草各等分

右為末每服一錢粳米百粒煎湯調下

瀉黃散 治小兒脾經有熱唇口生瘡偷鍼眼等疾及身上生黃水粘瘡並宜服之

藿香葉

梔子仁

石膏

甘草

防風各等分

右用蜜酒拌微炒香為末每服一錢溫熱水調不拘時服

加味四聖散 治瘧瘧出不快及變陷倒靨小便赤澀餘熱不除一切惡候或被風吹復隱入皮膚內者

紫草茸

木通去皮

木香不見火

黃芪炒

川芎

甘草

人參各二錢

蟬蛻去毒

右咬咀每服二錢水一鍾煎六分不拘時服大便便秘加枳殼少許大便如常加糯米百粒性解毒能暖而發之

紫草木香湯 治痘瘡出不快大便泄利

紫草

木香

茯苓

白朮

甘草炒各等分

右剉散每服二錢水一盞糯米三十粒煎六分溫服

黃芩甘草湯 治挾熱作疹瘡不出煩躁不得眠

黃芩七錢

赤芍藥

甘草各三錢

右吹咀每服三錢水一盞煎至六分溫服若嘔者如
半夏三錢生薑三片煎食少者加人參紅棗煎量太
小加減服

如聖湯 治痘疹毒攻咽喉腫痛

桔梗 甘草 牛旁子炒各三錢 麥門冬去心

右為末每服一錢沸湯點服入竹葉煎尤妙

消毒加味犀角飲 治痘疹毒氣壅遏壯熱心煩雖出
未能勻透口舌生瘡不能吮乳

牛旁子炒三兩 荆芥穗五錢 甘草炙一兩 防風去蘆

升麻各七錢半 犀角三錢 麥門冬去心 桔梗去蘆

右吹咀每服二錢水一鍾煎至半鍾去粗徐溫灌
之若大便滑利者不再服

木香散 治發瘡疹身熱作渴

木香 大腹皮 人參去蘆 桂心

赤茯苓去皮 青皮去穢 前胡去蘆 訶藟去核

半夏薑製 丁香 甘草炙各三錢

右吹咀每服二錢水一盞薑三片煎五六分空心服
異功散 治痘瘡出欲靨未靨之間頭溫手冷腹脹渴

瀉急服此切不可與蜜水

木香不見火 當歸各三錢半 官桂去皮 白朮

茯苓各三錢 陳皮 厚朴薑汁 人參去蘆

肉豆蔻炮裂 丁香各二錢 附子炮去皮 半夏薑製

右吹咀每服二錢水一鍾生薑二片棗二枚煎至六
分不拘時溫服

人參麥門冬散 治痘疹發熱煩渴

麥門冬去心 人參去蘆 甘草炙 陳皮

白朮 厚朴薑汁炒

右吹咀每服二錢水一盞煎至六分不拘時服

七香圓 消食快膈和胃氣上腹痛

木香不見火 丁香不見火 檀香 甘松

丁皮 陳皮 砂仁 三稜醋炙

蓬茂醋煮 益智三錢 香附一兩 白豆蔻二錢

右為細末水糊為圓如麻子大每服三五十圓食遠
薑湯或米飲送下

香砂保安圓 治小兒乳食停滯胸膈不寬肚腹膨脹

香附三兩 砂仁 白朮 神麴炒

麥芽各一兩 棠棣半兩 益智 陳皮各七錢半

甘草三錢 木香不見火 檳榔 使君子去殼

右為細末煉蜜為圓如雞頭子大每服一圓空肚米

湯化下

天麻防風圓 治小兒一切驚風壯熱痰涎壅盛

天麻煨

防風去蘆

人參各一兩

牛黃二錢

硃砂

雄黃

麝香各二錢

麝香炒去

全蝎去毒炒

右為細末煉蜜和圓如雞頭實大每服一圓不拘時

用薄荷湯化服

五福化毒丹 治小兒上焦有熱胎熱胎毒口舌生瘡

玄參一兩

桔梗去蘆

赤茯苓

人參

馬牙硝各五錢

青黛

甘草各一錢

麝香五分

右為細末煉蜜為圓如芥實大每服半圓用薄荷湯

不拘時化服

助胃膏 治小兒胃寒吐瀉乳食不化不思乳食脾胃

虛弱

人參去蘆

白朮炒

白茯苓去皮

甘草炙

丁香各五錢

砂仁四十

木香三錢

白豆蔻十四

山藥一兩

肉豆蔻四錢

右為細末煉蜜為圓如芥實大每服一圓食前用米

飲化下

加味盧會圓 治小兒五疳腹中痞積有蟲面黃肚大

眼閉羞明四肢枯細腸鳴泄瀉髮聚潮熱溺色如米

泔多服神効

胡黃連

宣黃連

盧會各一兩

蘇莢仁

木香

青黛各五錢

青皮

使君子

檳榔各七錢

蟬殼四錢

乾蝦二錢

麝香二錢

右為細末用猪膽一箇和粟米糊為圓如小芥豆

大每服三十圓用米飲送下

木香圓 治小兒五疳脾胃不和泄瀉腹脹四肢羸弱

木香五錢

青黛別研

檳榔

肉豆蔻炒

白豆蔻去皮各五錢

麝香一錢半

續隨子一兩

麝香三錢

右為細末煉蜜和圓如芥豆大每服三五圓至一二

十圓用米飲或薄荷湯食前送下

香薷圓 治疳消食積蟲積肉積腹脹

白朮一兩

三稜炒

蓬朮炒

青皮炒

陳皮

神麴炒

麥蘖炒

檳榔

草龍膽各五錢

黃連

胡黃連

川練去核

使君子各五錢

木香二錢

乾蝦二錢

麝香二錢

右為細末麴糊為圓如麻子大每服十五圓食前米

飲送下

涼驚圓 治小兒心經有熱面赤口乾急驚搐搦大小

便不利

龍膽草

末

防風

末

青黛

研各三錢

釣藤

末一錢

牛黃

末

麝香

各二錢

黃連

末五錢

龍腦

研一錢

右同研勻麪糊為圓如粟米大每服三五圓至一二

十圓不拘時煎金銀湯送下

固真湯 治小兒吐瀉後脾胃虛弱遂傳慢風不省人事

人參

末

白茯苓

末

白朮

末

附子

炮去脂

乾山藥

末

黃芪

末

肉桂

末

甘草

炙二錢

右剉碎每服二錢水一盞生薑三片紅棗一枚煎至

五分不拘時服

大安神圓 治小兒心熱夜啼煩躁常用安神定志去

驚

人參

去蘆

茯苓

各半

甘草

炙一錢

僵蠶

炒去絲

白朮

煨半兩

桔梗

半錢

辰砂

半兩

全蠍

去尾

金銀箔

各六片

麥門冬

炒去心

木香

各半兩

酸棗仁

炒粉

代赭石

醋半兩

右為末水圓或煉蜜圓如雞頭實大每服一圓隨引

子化下○急驚潮熱竹青薄荷湯下○夜啼驚心土

湯下○傷風荆芥湯下○疹痘蟬蛻湯下○搐搦防

風湯下○常服金銀薄荷湯下○慢驚冬瓜子仁湯

下○凡驚風已退神志未定加琥珀三錢別研遠志

半兩去心薑汁炒

大青膏 治小兒急驚搐搦涎潮

天麻

一錢

白附子

一錢

蜈蚣

半錢

硃砂

二分

青黛

一錢

天竺黃

二分

麝香

末

烏藥

末

右為細末煉蜜和圓如雞頭實大每服一圓薄荷竹

葉湯化下

開關散 治小兒驚風牙關不開

赤蜈蚣

一條

直僵蠶

末

南星

炮各一錢

麝香

二分

猪牙皂角

二錢

右為細末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物搗開

滴入藥兩三點涎出自開

活血散 治痘瘡已出未出煩躁不寧

白芍藥

不拘多少

右為末每服二錢白湯調下大能活血止痘瘡脹痛

屢用屢效

萬金散 治痘瘡已出未能勻通色不紅活

防風

三錢

人參

末

蟬蛻

末

右為細末每服量兒大小或一錢或二錢用蘿蔔汁

下

子化下

傷風荆芥湯下

疹痘蟬蛻湯下

搐搦防

湯調下服了急用芥子末白湯調如膏塗兒脚心乾
即再傳其毒漸漸復出瘡疹依前紅活

人齒散 治瘡痘初出光壯忽然黑陷心煩性躁氣喘
妄語或見鬼神並宜速治不然毒氣入臟必死

人齒燒存性

右為末每箇作一服酒調下

五疳消食圓 治疳殺蟲退熱磨積和脾進食

使君子肉 炒 麥芽 炒

陳皮

神麴 炒

蕪荑 炒

草龍膽

黃連 炒

崇秘 各等分

右為細末陳米飯為圓如黍大每服十圓米飲下

抱龍圓 治小兒風痰壅盛驚搐昏睡

雄黃

辰砂

天竺黃 各四錢

麝香 一錢

牛膽南星 八錢

右為末甘草煮糊為圓如皂角子大三歲兒服一圓

量大小與服薄荷湯化下

肥兒圓 治諸疳多因闕乳喫食太早或因久患臟腑

胃虛蟲動日漸羸瘦腹大不能行髮豎發熱無精神

黃連

神麴 各一兩

麥芽 半兩

木香 三錢

檳榔 二箇 下

使君子肉

肉豆蔻 各半兩

麝香 各半兩

右為末麪糊圓如蘿蔔子大每服三二十圓量兒大

小加減熟水送下

暖驚餅子 治小兒急慢驚風涎潮發搐或吐或瀉不

思飲食大有神効

人參 去蘆

茯神 去木

茯苓 去皮

赤石脂

山藥 各二兩

白朮 一兩

硃砂 五錢

乳香 三錢

麝香 半錢

右為末煉蜜為圓如雞頭實大捏作餅子每服一餅

米飲化下

香橘餅子 治小兒食積腹脹作疼面黃肌瘦不思飲

食

木香

橘紅

青皮 各一兩

厚朴 二兩

砂仁

神麴

麥芽 各一兩

蓬萊根 一兩

三稜 各一兩

右為細末煉蜜和圓如雞頭實大捏成餅每服一餅

薑米飲化下

五疳保童圓 治小兒五種疳疾

青黛

五倍子 生用

盧會 另研

夜明砂 洗去土

黃連 去蘆

龍膽草 生用

乾膽 炙

黃連根皮

麝香 另研

蕪荑 仁

蟬殼 去土各

右為細末用粟米粉打糊為圓如麻子大二歲小兒

服二十圓用米飲湯送下不拘時量見大小加減

大盧會圓 治小兒諸疳殺蟲和胃止瀉

胡黃連 黃連 盧會 白無裏仁

木香 青橘皮 雷圓破弱白者佳赤者殺人不無用

鶴虱微炒各半兩

右為細末搗粟米飯為圓如菉豆大每服一二十圓米飲湯下不拘時

虎睛圓 治小兒驚癇邪氣入心

虎睛細研 遠志薑製去心焙 犀角鎊 大黃湯洗

石菖蒲 麥門冬去心各二錢半 羌活三錢 地黃三錢

右為細末粟米粉打糊為圓如梧桐子大每服五七

圓竹葉煎湯磨化或金銀煎湯亦可不拘時服

金箔鎮心圓 治小兒驚悸睡臥不寧心神恍惚此藥

安神鎮心退熱

山藥半兩 硃砂一兩 馬牙硝一錢 紫河車黑豆煮二錢半

甘草 人參 茯苓五錢 麝香半錢

片腦一錢 金箔十片

右為細末煉蜜為圓如芡實大每服半圓或一圓用

薄荷湯化下不拘時

硃砂圓 治小兒口眼喎斜筋脉牽引

硃砂五錢 全蠍炒去毒 天麻 白附子炮

僵蠶絲炒去嘴 乾薑炮 牛黃各五分 麝香一分

石為細末粳米糊為圓如黍米大每服三十圓用薄荷湯不拘時化服

醫方選要十卷

兩淮鹽政
採進本

明周文采編李時珍本草綱目引作周良采字之
訛也其里貫未詳是書乃其爲蜀獻王椿侍醫時
承獻王之命所作則洪武中人也每門皆抄錄古
方而各冠以論嘉靖二十三年通政使顧可學奏
進詔禮部重錄付梓仍行兩京各省翻刻前有獻
王序及文采自序併載禮部尙書費宗題覆疏二
篇蓋亦翻刻本也

袖珍小兒方六卷

〔明〕徐用宣撰

上海圖書館藏明刻本

附《四庫全書總目·袖珍小兒方十卷》提要

卷之一

袖珍小兒方目錄

虎口脈紋圖

水鏡訣

虎口脈訣歌

察形色圖

觀形察色

伍位所屬

命門部位圖

命門部位歌

小兒無病歌

小兒生死候歌

小兒十五候歌

卷之二

初誕

甘草法

黃連法

朱蜜法

刺池法

回氣法

通便法

貼額法

奇方

護養

消乳丸

禁風撮口臍風

龍騰湯

控痰散

甘草湯

益脾散

辰砂膏

天麻丸

定命丹

僵蚕丸

蝎梢散

牛黃散

撮風散

五聖散

蜈蚣散

蜘蛛散

朱銀散

麝香散

安臍散

立聖散

瓜蒂散

傷臍散

大連翹飲

不乳

茯苓丸 木香散 奇方

胎疾

大連翹飲 消風散 生地黃湯 釀乳方

赤芍藥散 川白姜散 當歸散 浴體法

變蒸

紫陽果散 柴胡湯 紫霜丸 惺惺散

人參散 當歸散 調氣散

卷之三

急驚

全蝎散 通關散 疳積散 開牙散

羌活散 羌活湯 釣藤飲 琥珀散

鎮心散 天麻防風丸 涼驚丸 定心丸

鎮心丸 利驚丸 朱砂膏 疎風散

牛黃涼膈丸 柴胡加大黃湯

金星丸 揭風湯 生氣散 和中湯

定志丸 奇方 溫膽湯 全蝎散

酸棗仁湯 防風散 宣風散

青金丹 京墨散 鎮心丸 珍珠丸

犀角湯 銀葉湯 清心丸 膽心丸

若菴散

慢驚

括萎湯 太乙保生丹 蟬蝎散

聚寶丹 神保既濟丹 太醒脾散

王六惺惺散 醒脾散 木附湯

烏沉湯 沉香散 生香全蝎散

定命飲 溫白丸 天南星散 靈脂丸

七珍丸 釣藤散 礞石丸 天南星丸

四聖散 釀乳法 烏蝎四君子湯

封頤法 銀白散

急慢驚風

黑附湯 川烏散 蝎附散 箭四君湯

白僵蚕丸 星蘇散 木香散 快脾湯

金液丹 異功散 陰疳散

胎驚

猪乳膏 全蝎散 至聖保命丹

獨活湯

卷之四

驚風

青龍丸 至寶丹 防風導赤散

蟬退釣藤飲 七寶洗心散

神芎丸	清心丸	寬熱散	安神丸
天藥內癰			
釣藤膏	魏香散	釣藤飲	木香丸
又釣藤飲	保命丹	乳香丸	
中風			
通關散	排風湯	追風毒刺散	
小續命湯	星香散	阿膠散	防風通聖散
牛黃丸	省風湯	百部丸	
夜啼客熱驚啼			
釣藤散	乳頭散	花火膏	蟬銀膏
六神散	雄麝散	黃土丸	龍涎散
卷之五			
驚癇			
南星散	散風丹	獨活湯	仁寶鎮心丸
當歸大黃湯		全蝎五疳丸	
細辛大黃湯	斷癰丹	牛黃丸	
妙聖丹	蜜陀僧飲	生朱丸	代赭石散
五癰丸	雌黃丸	楊氏蛇黃丸	
錢氏蛇黃丸		養生蛇黃丸	
保命丸	比金膏	清神湯	

斷癰丸	蝎虎散	日應丹	雄朱丸
地龍散	鎮驚丸		
諸疳			
黃連肥兒丸		太玄膏丸	生熟地黃丸
清肺湯	至聖丸	地黃丸	銅青丸
香薷丸	加味肥兒丸		史君子膏
肥兒丸	黃連丸	胡黃連丸	蚶蚶丸
妙應丸	木香丸	黃芪湯	五珍丸
十全丹	湯氏十全丹		五疳良方
脾積丸	疳積散	疳連丸	
茯苓丸	神效換肌丸		天麻丸
地黃清肺飲	化毒丸		雷驚丸
下虫丸	龍膽丸	君朴丸	驚風散
散魚甲丸	養雞丸	黃雞煎丸	梅肉丸
五疳保赤丸	五疳保赤丸	六神丹	芒各膏丸
卷之六			
傷寒			
升麻湯	解肌湯	香蘇散	十神湯
麻黃湯	桂枝麻黃各半湯		參蘇飲
桂枝湯	射干湯	人參敗毒散	

袖珍小兒方卷之二

虎口脈紋圖



水鏡訣

夫陰陽運合男女成形已分九竅四肢乃生五臟
六腑部位各分逆順難明若憑寸口之浮沉必乃

袖珍方卷一

橫亡於孩子頃明虎口辨別三關詳詳辨藥必
無差誤未至三歲看男左女右虎口從第二指
第一節名風關若肺見初交病第二指節名氣
關肺見則難治第三節名命關肺見病深則死
證又當辨其色若四足驚三關必青水驚三關必
赤人驚三關必黑紫黑色瀉痢黃色雷驚如三關
脈通度是極驚之證必死餘病可治或青或紅有
紋如線一直者是娘食傷脾及發熱驚風左右一樣者
是驚風與積齊發有二三條或散見是肺生風痰或似
釣胎聲有青是傷寒及嗽如紅火是驚有黑

相兼主下痢紅多白痢黑多赤痢有紫相兼皆
不虛虎口脈紋亂乃氣不和也至血脈紋見有五
者曰黃紅紫青黑由其病盛色能加變如黃紅
之色紅盛作紫紫紅之色紫盛作青紫青之色青
盛作黑青黑之色至於純黑之色者不可得而治
矣又當辨其形如流珠形主肺熱三焦不和飲食欲
吐泄瀉腸鳴自利煩燥哭啼環珠形主氣不和脾
胃虛弱心腹膨滿虛煩作熱長珠形主痰積滯
肚腹疼痛寒熱飲食不化米蛇形主中脘不和積氣
攻刺臟腑不寧乾嘔去蛇形主脾虛冷積泄瀉神

袖珍方卷一

困多睡弓反裏形主感受寒熱邪氣頭目昏
重心神驚悸倦怠四肢稍冷小便赤色弓反外
形主痰熱心神恍惚作熱夾驚夾食風癰證候
形主邪熱痰盛生風發搐驚風魚骨形主驚痰
熱水字形主驚積熱煩燥心神迷悶夜啼痰盛
暴搐掣針形主肺受熱熱極生風驚悸煩悶神困不食
痰盛搐搦透關射指主驚風痰熱四証皆聚在胸膈
不散透關射甲主驚風惡候受驚驚傳入經絡風熱發
生十病一生難治此十二位形脈悉有輕重察其病根則
詳其証

歌曰三首

左右紅生筋線形定是驚風發熱驚風有雙紋如左狀
食如驚積一齊生紋頭有似二又橫肺氣生痰夜哭
有青應有傷寒証只是空紅瀉發生

又

虎口前紋多須知氣不和色青驚積聚下乳瀉如
何青黑慢驚驚入掌內吊多三關忽通過此候必
沉痾

又

指上青紋認是四足驚黑色因水瀉亦是振人驚紫

色多成瀉黃色是驚驚曲裏風驚盛發分食生蒸

但看以手慶方可辨其形

胎脈訣歌三首

小兒有病須憑脈一指三關定其息浮洪風盛數多
驚虛冷沉遲實有積


又

小兒一歲至三歲呼吸須將八至者九至不為平至
困短長大小有那十小兒脈緊是風癰沉肺煩知乳
化難腹夜緊弦牢實秘沉而數者骨中寒

又

小兒脈大多風熱沉細原因乳食難化長多是腸
風驚驚風四肢制浮洪胃口以火燒沉緊腹中
痛不欲食有氣更驚驚脈亢多痢大便血則大
移小童脈順前小後大必氣咽四至洪來若煩滿
沉細腹中疼切切滑主露濕冷所傷弦長客忤
分明說五至夜甚浮大晝六至夜細浮晝別息數
平和八至九此是聖人傳妙訣

察形色之圖



額

印堂

山根

額紅大熱燥青色有風印堂青色見人驚是驚
山根青隱隱驚主以重重

年壽

年壽上平并更隨時人壽大亦其由忍因利疾黑色

候霍亂吐瀉黃色浮

鼻准微黃紫灰幾深黃死証黑應危人中短縮吐因

利唇反死候黑柳墮

正口

正口當紅號曰平燥號曰熱即黃生有主失血黑繞口青

黑驚風盡死形

承漿水 兩眉

承漿青色食時驚黃多吐逆是具形煩燥夜啼青色

吉久病眉紅死証遲

兩眼

白睛青色有肝風有積黃色未及瞳若見黑睛黃

色見傷寒病後此為縱

風池 氣池 兩順

風氣二池黃土逆燥煩啼吐色鮮紅更有兩順胚

樣赤肺家客熱此非空

兩太陽

太陽青色驚風始紅色赤嫩萌藥起要知死証

是如青青色從茲生入耳

兩臉

兩臉黃為痰實咽青色客忤紅風熱傷寒赤色紅

主淋二色請詳分兩頰

兩頰 金貴 風門

吐虫青色帶順黃二色順間兩白詳風門黑赤青

驚風水紋青金貴主驚風狂

觀形察色

凡者小兒疾病先觀形色而切脉次之蓋面部氣

色按見而五位青色者驚風不散欲發風候五位紅

色者痰積壅盛驚風不寧五位黃色者食痰癥

傷雅候痞瘕五位白色者肺氣不實滑泄吐瀉五

位黑色者臟腑欲絕為疾危惡面青眼青肝氣病

面赤心之病而白肺之病面黃脾之病面黑腎之

病先別其五臟各有所主次者稟受虛弱胎氣

虛實陰陽二証補過泄多當救其失無五臟六腑

表裏各有相應若能辨其標本則神聖工巧矣

五位所屬

心為額南方火脾為鼻中央土肺為右頰西方金腎

為左頰北方水肝為左頰東方木也

命門部位之圖



命門部位歌

中庭與天庭司空及印堂額角方廣處有病定
存亡青黑驚風惡體和滑澤光不可陷兼發黑
最難當青其須急昏瞶亦堪傷此是命門

地醫師妙較量

小兒無疾病歌

小兒常體貌情態自端然鼻內無乾涕候中絕
無施頭如青黛染唇似點殊鮮脫共花映竹願綻
水中蓮喜引絲方笑非因手不宣縱哭無多哭
雖眠不久眠意同波浪靜情若月明天此兒安
吉何愁病患纏

小兒生死候歌

小兒乳後嘔逆更兼脈亂無憂慮弦急之時
被氣纏脈緩只是不消乳緊數細快亦少苦虛

通氣邪氣助利下宣腸急痛時浮大之脈歸泉

小兒外証二十五候歌

眼上赤脈下貫瞳人顙門腫起兼及作坑鼻乾黑
燥壯大筋青目多眵視覩不轉睛指甲黑色忽
作鴉聲虛舌出口嚙齒咬人魚口氣急啼不作
聲蛔虫既出必是死形用藥速救十無一生

小兒方卷一

八

袖珍小兒方卷之一終

袖珍小兒方卷之三

初論

嬰兒在胎稟陰陽五行之氣以生五臟六腑百骸之體悉具必藉胎液以滋養之氣受既足自然分娩初離母體口有液毒啼聲未出急用軟綿裹指拭去口中惡汁此雖良法然倉卒之際或有不及如法者古人有黃連法朱審法甘草法用之殊佳免使惡物嚥下伏之於心過天行時氣又熱不除乃乘於心心主血脈得熱而散流溢於胃而胃主肌肉發出於外故成瘡疹之候世之長幼無有可免

袖珍小兒方卷之三

者若依初生拭口之法得免瘡疹之患或有時氣侵染只出膚層細疹易為調理亦孩童之幸也

甘草法臨月預以甘草細切少許以綿裹產時沸湯泡浸蓋內候兒出來未作聲急以軟綿裹指蘸甘草汁拭其口次用黃連朱審法

黃連法臨月用黃連五分細切搥碎綿裹沸湯同甘草一處泡浸如前法拭口

朱審法葛氏肘後方先用黃連甘草汁法拭口吐其惡汁更與朱審定魄安神鎮心

朱砂大星詩

右細研以蜜一蜺殼許和朱砂旋抹口中非獨鎮心安神能解惡物之毒一生免痘瘡之患

刺泡法小兒繞生下即死用此法可救活急看兒口中懸癰前脰上有泡以手指摘破用帛拭拭血

令淨若血入喉即不可治

回氣法初生氣欲絕不能啼者必是難產或胃寒所致

急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶且將胞衣

置炭火爐中燒之仍作大紙攤攤清油點着於臍帶上往來通帶燎之蓋臍帶得火氣由臍

袖珍小兒方卷之三

入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼叫如常方可浴洗了却斷臍帶

通便法初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以

溫水漱口了吸咂兒前後心并臍兩手足心共七處每一處凡三五次漱口吸咂取紅赤為度須臾自

通不爾無生意遇有此証依此法可得再生

貼顙法治出胎時被風吹鼻塞服藥不退

右用天南星為末生姜自然汁調成膏貼顙

上自愈

奇方治初生下遍身無皮但是紅肉宜速以白早米

粉乾候生皮方止

又方治生下遍身如魚泡又如水晶碎則成水流瘡用

蜜陀僧研極細乾糝仍服蘇合香丸

又方七日腎縮乃初生受寒所致

硫黃 姜更各五錢

右為細末研大蒜調塗其腹仍以蛇床子微炒火

燒熏

護養法論

葉氏曰小兒始生肌膚未實不可煖衣煖甚則令肌

骨緩弱宜類見風日若不見風日則肌膚脆軟易

得損傷當以故絮着衣勿加新綿天氣和煖之時地

出日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉堅硬可耐

風寒不致疾病若病於帷帳之內重衣溫煖譬如

陰地草木不見風日軟脆不任風寒當以薄衣但令

背煖薄衣之法當從秋習之不可以春夏減其衣

否則令中風寒所以從秋習之者以漸稍寒如此則

耐寒冬月但着兩薄襦一複裳耳若不忍見其寒適

常略加其若愛而煖之適所以害之也又當消息無

令出汗如汗出則表虛風邪易入也晝夜寤寐常當

慎之其乳哺之法亦當有節不可過飽或宿滯不化

常用消乳丸化積溫脾等劑治之陳氏所謂忍三分

寒喫七分飽頻揉肚以導洩及要背煖肚煖足煖要

頭涼心胸涼亦至論也

消乳丸 治宿食不消脾胃虛冷乳食不化

砂仁 陳皮 三稜煨 蓬朮煨 神麴 炒麥蘗 炒各

香附子炒兩

右為末麵糊丸如麻子大食後紫蘇湯送下

禁風撮口臍風方論

初生禁風撮口臍風三者一種病也夫禁風者眼閉口

緊啼聲漸少舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐

白沫大小便皆通蓋由胎中感受熱氣流毒於

心脾故形見於喉舌間也抑亦生下復為風邪擊

搏所致自滿月至百二十日見此名曰犯風禁依

法將護防於未然則無此患撮口者面目黃赤

氣息喘急啼聲不出蓋由胎氣挾熱熱風邪入

臍流毒心脾之經故令舌強唇青撮口撮面飲乳

有妨若口出白沫而四肢冷者不可救其或肚脹

青筋吊腸疝疝內氣引痛皆腸胃鬱結不通

致之治法貴乎疎利撮口最為惡候一臍內見之

尤急臍風者斷臍之後為水瀝風冷所乘風濕之

入於臍而流於心脾遂令肚脹臍腫身體重者四
 時常自日夜多啼不能吃乳甚則發熱風搖若臍
 上青黑腹口是為內搭不治小兒者即死其或
 熱在胸臍中引驚氣亦令臍腫可與千金龍膽湯如
 三者受病之源非一朝一夕大抵寒氣鬱結壅閉不
 通並用取下胎毒天麻丸定命丹朱銀丸之類可量
 與之千金云小兒始生其氣尚盛若有微患即
 慎下之若不時下即成大疾則難療矣紫霜丸可
 量服之治風寒用控痰散吐風疹不若用甘草湯極
 熱然後和胃益脾散加減用之又用辰砂膏利散即
 愈或手握拳口不開者不治撮口用僵金膏
 傳唇中或甘草湯搗風散臍風用心常散湯氏
 治小兒因臍傷於外風致臍急不乾用白礬龍
 骨為末少許德之又用舊綿燒灰為末少許乾
 糝之斷臍不盈尺一臍之內隨其根蒂自腐實者
 除之弱者淺之深淺之理以其稟賦得之蓋初生
 之兒在熱母在胸則頻伸引呃呃作聲努脹其氣
 抑入根本之中所以臍突腫赤虛大可畏將謂斷臍
 不利而使之然者非也此乃由胎中母多驚悸或
 因食熱毒之物所作宜大連翹飲子其熱自散又

有小兒臍風撮口初生七日內患此証者百無一生
 如坐視其楚者良可憫焉凡患此証者看小兒
 腹上有一小泡子如粟米大以溫水蘸熟帛裹指
 擦破即開口便安不須服藥亦良法也
 安臍散治臍中汁出或赤腫用白石灰一日三度傳
 之或油髮灰或常歸末傳亦佳
 千金龍膽湯治胎毒月內氣盛發熱臍風撮口吐
 熱血脈盛實四肢驚悸發熱大吐及變蒸不解中
 客入鬼氣并諸驚風悉皆治之十歲以下皆可服之
 又有鬼氣者加人參當歸如龍膽散一百日兒加三

銖一歲加伍錢

龍膽草	釣藤	柴胡	黃芩
桔梗	芍藥	茯苓	甘草

蟻蝦二枚去足大者一
 右劉散每服二錢水一酒盞煎半盞服之以漸
 加服得下即止直指方加防風麥門冬以導心
 熱黃芩減半此藥煎服去蟻蝦亦可
 控痰散治臍風先用此吐風涎次與益脾散和胃
 蠅尾 銅青各五 朱砂一錢 膩粉一錢 麝香少許
 右為細末每服一字茶清調下或用甘草湯吐痰

亦可

甘草湯治撮口取吐風痰

甘草一升

右劉散煎服令吐出痰涎却以猪乳點入口中即瘥

益脾散和胃進乳食

白茯苓

人參

草薺根

木香

甘草

陳皮

厚朴製

蘇子

右劉散每服一錢姜棗煎服滓乳母服之

辰砂膏治眼開口禁啼聲不出吃乳不得口吐白沫大

小兒神方卷二

七

小便皆通

辰砂三

明砂

牙硝

玄明粉

全蝎

真珠

麝香

右為末和畢用好油紙封裏自然成膏每服一豆

粒許薄寄金銀湯下潮熱汗草湯下月內用乳汁

調傳妳上令兒吮下

天麻丸治因斷臍後為水濕風冷所乘入於臍流於心

脾遂令肚脹臍腫四肢柔直日夜多啼不能吮乳此藥

利驚化痰丸釣腸鎖肚撮口並宜服之

南星炮

白附子炮

牙硝

天麻

金蝎

五靈脂

巴霜

右為末稀糊丸麻子大每服三九薄寄姜煎湯

送下若臍邊青黑及小甲黑者不治

定命丹治急驚風天鈞撮口通利痰熱

全蝎

天麻

南星炮

白附子

朱砂

青黛

麝香

腦子

右為末粟米糊丸粟豆大每服一丸荆芥薄

荷湯送下完研半分吹入鼻中一方無腦子

僵蚕方治撮口

小兒神方卷三

僵天虫

右為末用茶調傳唇口中立効

蝦梢散治胎風及百日內撮口臍風

蝦梢

僵蚕

腦子

麝香

右先將蝦梢每箇用薄寄葉包定以線札放砂

鉢內炒令薄寄乾為度同僵蚕研細入腦子麝

香末研勻用紫荳雞肝二片煎湯調下

牛黃散治初生七日口禁

牛黃

右為末以竹瀝調一字灌之更以猪乳點於口中

撮風散治撮口
蜈蚣半條炙 釣藤 朱砂 僵蚕炒

蝎梢各一 麝香一字

右為末每服一字用竹瀝調下竹瀝鮮熱

立聖散治口瘡

蝎梢七箇 乾蜘蛛一箇去口足以竹瀝粉火許

右為末入臘粉研勻每一字乳汁調治時時滴入口中

蜈蚣散治口瘡不開不能收乳

赤脚蜈蚣半條去頭足炙令焦

右為末入麝香少許以猪乳一合分三服猪乳治小兒口瘡不開最良

蜘蛛散治口瘡不開

蜘蛛一技去足嘴炙令焦

右為末猪乳調灌神效牙疳亦用蜘蛛麝香

硃銀丸治疳風壯熱發盛翻眼口瘡取下胎中蟲受之毒亦治驚積但量用之

金蝎一錢 白附子一錢 南星 硃砂一字

牛黃 麝香各半 天漿子 麝香各半

腦子一字 水銀一錢蒸棗肉研如泥

金霜半錢和冰研

右為末要末糊丸如芥子大每一丸薄荷湯下如未利加至二三丸

麝香散治疳風撮口

赤脚蜈蚣半條炙 川烏頭尖三箇

麝香少許

右為末每服半字金銀湯調下

立聖散治疳風撮口

赤蜈蚣一條酒炙 蝎梢七箇 僵蚕半錢

僵蚕七箇炒

右為末先用綿毛管吹少許入鼻內啼則可醫仍用薄荷湯調下

安膈散小兒斷膈後便傳之

赤蜈蚣一寸炙 羚羊角一錢燒存性

麝香少許 雄雞三枚 亂髮一團燒存性

右為末傳於膈上

瓜蒂散治疳風撮口吹入鼻內則可治疳瘕小兒三歲忽發心滿堅硬脚手心熱則變為黃

病不急治殺人

赤豆七粒 林米七粒

右為米用三豆計吹兩鼻內令黃水汁出後藥

赤豆四兩為末每服一錢溫水調下以吐為吐

出黃水為妙

傳勝膏

瓜蒂 南星 白 赤小豆

右為末每三錢用芭蕉自然汁調傳勝四圍

是

大連翅湯方見胎疾門

神方卷一

不乳方論

嬰兒初出胞胎而不吮乳者蓋由產婦取冷過

度胎中受寒則令兒腹痛故不吮乳前所謂

兒初出胎其聲未時急以手拭其口令惡血淨

盡不得下咽則無他疾若口不前惡穢腹

則腹滿氣短不能吮乳宜發苓九服之

赤茯苓 黃連枳殼 各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每一丸乳汁磨下

一方冷証者去黃連加芍藥

丁香散治惡穢入腹嘔吐不止

木香 乾姜 茯苓 木瓜

甘草炙 丁香各等分

右劉散每服一錢姜煎綿蘸灌之

奇方治初生不乳及不小便

右用葱白二十四界破之以乳汁砂瓶內煎灌

之文效

胎疾方論

胎疾謂月數將滿母失安護或勞動氣血相

干或半臥則胎氣相感飲酒食肉令熱相制或

恐怖血脈相亂胎氣有傷兒形無補有胎熱胎

寒胎黃胎肥胎弱等証胎熱則兒在胎中母多

驚悸或因食熱毒之物降生之後兒多虛痰

氣急喘滿眼目眵淚神困呵欠呢呢作聲大小便

不利或通利即有血水盛則手常拳緊脚常搐

縮服常邪視身常拳跳皆由胎中受熱宜速

與大連翅飲子解散諸熱次服消風散散胎寒

者則兒在胎中母因感寒邪或喜食生冷過

度寒盛則腸鳴泄利邪氣以亂當用和餅治

臍寒則溫臍寒甚則有盤腸內吊皆寒而得

之大便青者是也胎黃者則小兒生下遍體面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如
 施汁乳食不思啼叫不止亦因乳母受熱而傳於
 胎也凡有此証乳母服生地黃湯仍忌熱毒之
 物胎肥者則生下肌肉原遍身血色紅滿月以
 後漸漸羸瘦目白五心煩熱大便難時時生涎
 宜浴體法治之胎弱者則生下而無精光肌肉
 薄大便白水身無血色目無精光亦宜浴體法
 治之凡胎氣稟賦有壯有弱其母飲食恣令肌
 脆起止無忌故令兒得病不寒則熱不虛即怯

熱方卷三 十三

熱乃作壅塞乃作洩虛則作驚怯則作結寒則
 溫之熱則涼之虛則壯榮怯則益衛驚則安神
 結則微利詳審用之可保無虞不若古人胎教
 之法則自然無諸証矣

大連翹飲治胎熱大小便不利諸般瘡癰丹毒
 臍風瘡疹壯熱小便不通

- | | | | |
|-----|----|----|------|
| 連翹 | 瞿麥 | 荆芥 | 木通 |
| 赤芍藥 | 當歸 | 防風 | 紫胡 |
| 滑石 | 蟬蛻 | 甘草 | 炒各山施 |
| 黃芩 | 各半 | | |

右劉散每服一錢加紫草煎服熱甚加大黃
 消風散治胎熱胎寒兼治諸風上攻頭目昏痛
 項背拘急肢疼目眩旋暈白裏寒多嚏皮膚頑
 癢瘡癰瘡小兒虛風

- | | | | |
|----|----|----|----|
| 茯苓 | 川芎 | 羌活 | 荆芥 |
| 防風 | 去苦 | 藿香 | 僵蚕 |
| 甘草 | 厚朴 | 製 | 陳皮 |

右為末每服半錢茶清調下薄荷湯亦可急
 慢風乳香荆芥湯調下或加桂黃名雄風散
 生地黃湯治小兒生下遍體皆黃色壯熱大小便

不通不思乳食啼叫不止乳母服之并與兒服
 生地黃 赤芍藥 川芎 當歸

天花粉 各等分
 右劉散每服半兩水一盞煎至六分溫服
 釀乳方鮮胎中受熱生下面黑眼閉不開大小便

- | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|----|-----|---|
| 澤瀉 | 一兩 | 猪苓 | 半兩 | 茯苓 | 半兩 | 天花粉 | 兩 |
| 茵陳 | 四兩 | 甘草 | 三兩 | 生地黃 | 半兩 | | |

右劉散每服半兩水一盞煎食後令乳母捏去
 宿乳却服此藥

赤芍藥散治胎熱發瘡小便不利

生地黃 黃芩 川芎 當歸

木通 甘草 芍藥 各等分

右劉散每服二錢用淡竹葉同煎

川白薑散治胎中受寒腹痛不乳

木香 陳皮 官桂 枳殼

甘草炙 白薑 炮各等分

右劉散每服一錢水一合煎以綿蘸蘸之嘔加

木瓜 香

當歸散治小兒胎中受寒面色青白四肢厥

冷大便青黑心腹疼痛盤腸內釣並宜治之

當歸 官桂 去皮 川芎 白薑 炮

香附子 木香 甘草 各等分

右為末每服一字以乳汁調下日三服看大小

加減服

浴體法

天麻 二錢 朱砂 半錢 白礬 石

青黛 各三 麝香 一字 烏蛇肉 三錢 酒浸

右同研勻每用三錢水三碗洗肢一握并葉

五六葉同煎至十沸溫熱浴之勿浴背

變蒸方論

變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形體成就是

五臟之變氣而七情之所由生也蓋兒生之日至

三十二日一變每變者畢即覺性情有異於前

何者長生臟腑意至故也何謂三十二日長骨添

精神人有三百六十五骨以象天數以應期歲以

分十二經絡故初生至三十二日一變生至屬足少

陰腎臟精與志六十四日二變生至屬足太陽

膀胱其發耳與眦冷至九十六日三變生至屬

手少陰心經心藏神其性為喜至一百二十八

日四變二蒸生丙屬手太陽少陽其發汗出

而微驚至一百六十日五變生乙屬足厥陰肝

肝藏魂喜哭至一百九十二日六變三蒸生甲屬

足少陽膽其發目不開而赤至二百二十四日七

變生辛屬手太陽肺肺藏魄生至二百五十

六日八變四蒸生庚屬手陽明太陽其發膚熱

而汗或不汗至三百八十八日九變生己屬足太陰

脾脾藏意與志至三百二十日十變五蒸生戊屬

足陽明胃其發不食腸痛而吐乳又手厥陰心

包經手少陽三焦此二經俱無形狀故不變而不

蒸也前十變五蒸乃天地之數以生成之然後始生
 止能言知喜怒哀故云始全也太倉云氣十四股長
 骨於十變後六十四日為一大蒸計三百八十四
 日長其經脈手足受以故能持物足受血故能
 行立經云變且蒸謂蒸畢而足一歲之日有餘也
 師曰不汗而熱者發其汗大吐者微止不可別治
 又六十四日為一大蒸計四百四十八日又六十四日
 三大蒸計五百一十二日五百七十六日變蒸既畢兒
 乃成人也變者變生五臟也蒸者蒸養六腑也
 所以成人變者上氣蒸者體熱每經一變一蒸
 情能既異經則發熱微汗其狀似驚重則壯熱
 脈亂而數或吐或汗或煩啼躁渴者五日解重
 者七八日解其候與傷寒相似亦有變蒸之餘
 續感寒邪者但變蒸則耳冷鼻冷上唇發冷
 狀如燭珠若寒邪持之則寒熱交爭腹中作
 痛而啼呼之聲日夜不絕變者易也蒸於肝
 則目眵微赤蒸於肺則噴嗽毛聳九五臟六腑
 筋脈骨節皆壞各有証應其治法和平之劑
 微表熱實者微利之或不治亦自愈可服紫
 霜丸一九或二九并黑散子柴胡湯若吐瀉多

帝者當歸散調氣散主之變蒸之外小兒以此平
 安夫人得中之道以為純粹陰陽得所則氣相濟
 氣血相和百脈相順所以心益智通精神俱備
 臟腑形體固壯自然無病也
 紫霜丸治變蒸熱氣治變蒸
 麻黃一兩 大黃 半兩 杏仁 二兩 半兩
 右劉散燒存性為末每服一字水煎服抱出於
 溫煖處連服之有微汗身涼即瘥一方為末再
 以杏仁少許研膏和每用二豆許乳汁調下
 紫胡湯治變蒸熱心煩啼呼不已
 人參 甘草 炙 麥門冬 各二錢 去心
 防風一錢 柴胡三錢 龍膽草一錢
 右劉散服三錢煎服
 紫霜丸治變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯汗後不
 歇胸中有痰喘哺乳不進乳則吐乳先寒後熱者
 又治食積乳哺失節宿滯不化或因食而發癰大
 便酸臭並宜服之
 代諸石 赤石脂 各一 杏仁 五十粒 巴豆 三十粒
 右先將杏仁巴豆入乳鉢內細研如膏却入代諸

石赤石脂末研和勻以湯蒸餅丸如粟米大歲 兒服五丸米飲吞下二三百日見三九亦要覓 肥瘦加減微利為度百日見乳汁下此藥熱治 驚積諸疾雖下不虛人惶得散治變熱發熱或 咳嗽痰涎白寒寒發耳重瘡疹發熱	
人參	白朮 茯苓 甘草
芍藥	桔梗 細辛 天花粉 <small>各五分</small>
右剉散每服一錢姜煎服有熱加柴胡去天 花粉	
人參散治傷寒熱心煩啼叫	
人參 甘草 麥門冬 柴胡 <small>各二分</small>	
防風	龍膽草 各一分
右剉散每服三字水一盞煎服	
苦酒散治變熱有寒無熱	
當歸	二分 木香 肉桂 <small>各一分</small> 人參
甘草	一分
右剉散每服一錢姜煎服	
調氣散治變熱吐瀉不乳多啼	
木香	杏附子 <small>各一分</small> 人參 陳皮
藿香	洗 甘草 各等分

右剉散每服三字姜三片棗一枚水一盞煎溫服	
細砂小兒方卷之二終	

神效小兒方卷之三

行誠藥室徐

編集

急驚風方總論

小兒急慢驚風古所謂陰陽痼是爾急者屬陽陽盛而陰弱慢者屬陰陰盛而陽弱陽動而陰疾陰靜而陽緩其始也皆因臟腑而得之虛能發熱熱則生風是以風生於肝痰生於脾驚出於心熱出於肺而心亦主熱驚風痰熱合為四証已具八候主為九搭眼搖頭張口出舌唇紅臉赤面青眼青舌青瀉青太陽髮際印

急驚風方總論

堂青筋二關旁口紋紅紫或青者皆為風狀也大抵熱論虛實証別逆順治有先後蓋實熱為急驚虛熱為慢驚慢驚本無熱所以發熱者虛使然爾急驚用藥以寒慢驚用藥以溫甚不可以陰陽無別故曰熱論虛實者此也男搖左視左女搖右視右男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲凡此皆順反之則逆亦有先搖左而後搖右者但搖順則無聲搖逆則有聲其指形勢彎曲入衣者順出外者逆出入相半者難痊故曰証別逆

順者此也熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風盛發搐治搐先於截風治風先於利驚治驚先於豁痰治痰先於解熱其若四証俱有又當兼施並理一或有遺必生他病故曰治有先後者此也綱領如此若新急慢脾風而言之則暴烈為驚驚沉重為慢驚而慢脾則重而深夫其証及論之千類下

急驚風方論

夫急驚者牙關緊不食桂熱必潮驚視反張搐搦搖頭唇口目眼張引頸餅口中熱氣類赤辰口紅大

急驚風方論

小便黃赤其脈浮數細數者皆由內有實熱外挾風邪心火受熱而積驚肝家生風而發搐肝風心火二臟交爭血氣併聚痰涎壅塞所以百脈凝滯關竅不通風氣蓄盛而無所泄故暴烈也治法大要用藥有序通關以後且與截風定搐發熱尚作逆下之痰熱一泄又須急與和胃定心之劑如搐定而痰熱無多則但用輕藥消痰除熱可也蓋急驚雖當下切不可過用寒涼之藥及巴粉銀消葷湯條太驟銀粉巴消腦麝等劑清家不得已而開之僅去痰即止或不當用而用或

當用而過用往往由此而成慢驚矣欲下之者須
當審問前人已下未下或曾經吐瀉否已下及吐
瀉者不可再下但驅風化痰消熱而已然急驚
在一時治之不可寬緩稍緩則証轉深若一時體
認未明又不可妄施藥餌截風定搐先與通關定
驚散以與人參養活散定搐散以意擇用下劑
有三輕下則利驚凡稍重則疎風散紫胡加大黃
湯重則用天麻九牛黃涼膈丸下後和胃助氣生
氣散茯苓三陳湯蘇合香之類寧心定志則用
定志丸全蝎散溫膽湯不冷不熱祛風鎮驚之

劑又當繼此以防其再發也

全蝎散治驚風不語通竅豁痰

全蝎七枚每一枚用紫蘇葉包徐蜜炙去葉丹

右為末每服一字姜汁入蜜少許搜和含化

通關散治驚風搐搦關竅不通

南星泡一錢麝香一字猪牙皂角二挺

赤蜈蚣一條僵蚕炒二錢

右為末以手熱姜汁煎藥少許擦牙以用勑引

滴入藥兩三點從出自開皂角略燒存性為末

驚驚散

半夏一錢猪牙皂角半錢

右為末用一豆許用管子吹入鼻內立醒

牙散

細辛 南星 朴消各一錢 全蝎五枚

麝香半錢

右為末以少許用烏梅肉擦和擦牙兼用細

辛皂角刺芥末吹入鼻中

人參養活散治驚風熱痰潮牙關緊急或中風

柴胡半兩 地骨皮法 天麻酒炙 前胡各半

人參 芍藥 獨活 枳殼炒

全神效方卷三

茯苓 羌活 桔梗各半 甘草三錢

右劉散每服三錢生薑薄切煎服加煆退治

驚風熱體硬加麻黃乾葛黃芩杏仁

活治急驚風角弓反張

人參 黃芩 杏仁 石燕各一錢

麻黃 甘草 肉桂 芎藭

乾葛 升麻 當歸 獨活各三錢

右劉散每服二錢姜煎服

釣藤飲治一切驚風潮搐眼視昏迷但是驚風

變易宜服

右為末煉蜜九如小豆大每一歲一九薄許湯下
或白糊丸亦可

殊砂膏治驚風痰盛

殊砂 牙硝各二錢 川靈脂 苦杏仁各一錢

麝香半錢 腦子一字

右研細甘草膏九煮豆大含湯為末每一九薄許湯下

疎風散治驚風痰熱俱盛

檳榔 陳皮 牽牛 大黃各半

右為末每服半錢生薑少許調下

牛黃涼膈丸治熱盛便秘

牙硝 石膏 甘草各半

膽製半錢 牛黃 紫石英 麝香

腦子各半錢 寒水石煨半兩

右為末甘草膏九如小豆大每一九薄皮湯下

紫胡加大黃湯最利痰熱

紫胡一兩 黃芩 人參 半夏

生薑各三錢 甘草一錢 太黃 量虛實加之

右劉散每服三字事字煎服

金匱丸治風熱結喉內痰鳴喘急咳嗽面頰紅夾

願赤腫痛腫塞目閉不開發熱狂言煩燥多渴飲
生驚風或大便不通小便如血并宜服之

鮮金 雄黃各一錢 膩粉半錢 巴豆七粒

右為末米醋糊丸如麻子大黃薄許湯下各方加胡椒

一錢南星一箇无住

揭風湯利下痰熱

青黛 苦杏仁 全蠍各一錢 南星半兩

水調作餅餅散以一分 輕粉 牙硝各半

右將南星餅包輕粉散日三味煨冷赤色取出同

為細末每服一字金銀湯調下

丁香 白木各二錢 青皮一分 木香

人參 甘草各一分

右為末每服半錢沸湯調下如更有餘熱不宜

服之溫藥必用涼藥以解之

和中湯和胃氣止吐瀉

茯苓 蓮肉各三錢 藿香 天麻人參

扁豆煨 木香 白木 甘草各一分

右劉散服二錢姜棗煎

定志丸治驚風已退神志未定以此定之

琥珀 茯苓 遠志肉 人參

天麻	天附子	白附子	酸棗仁
甘草 各等分			
右為末煉蜜丸如皂子大辰砂為衣打心薄荷湯磨下 一九或二九			
奇方治驚鎖心			
地黃	大辰砂 各二分		
右為末諸心血水調下			
溫膽湯治驚悸瘵			
半夏	枳實 各二分	茯苓 半兩	陳皮
甘草 各一分	酸棗仁 二分	半兩	去殼
右劉散每服二錢入竹茹少許姜棗煎			
全蝎散治急慢驚風疳積			
僵蚕 各三分	全蝎 各七分	薄荷 各少	
右為末煎石榴皮湯下			
酸棗仁散治驚心不安怕怖恍惚			
人參 二分	茯神 半兩	粉草 一分	辰砂 半兩
麥門冬 三分	遠志 肉	酸棗仁	麝香 少許
右為末釣藤湯調下內釣加木香			
防風散治風熱痰壅大便不通			
羌活	防風	枳實	川芎

甘草 各一分	大黃 各一分		
右劉散每服二錢姜棗煎可加赤芍藥			
宣風散治驚風熱			
樟柳	草	橘紅 各半	牽牛 各半
右為末每	用蜜湯調下		
名香散治驚風痰盛發搐			
金蟬 五箇	巴霜 一字	輕粉 半錢	芳木 各
南星 泡	硃砂	川蘇金 一分	皂角 小者
腦子	傳香 各一字		
右為末每服一字煎金銀薄荷湯調下			
青金丹疎風利痰			
羌活	牙硝	青黛 各一分	史君子 各
朋砂	車粉 半兩	蟬梢 十四箇	
右為末香墨水丸如麻子大每服一九薄荷湯下			
王監京墨丸治痰熱驚積			
青黛	史君子 各一分	蘇合 各一分	膠製 各二
川墨 三錢	臍粉	麝香 半兩	腦子 一字
右為末麵糊丸梧桐子大每服一九薄荷湯磨下			
楚州王監京此藥著名大利痰熱驚積疳積			
鎮心丸治急驚化痰鎖心			

珠砂 龍磁 牛黃 鐵粉

琥珀 人參 茯神 防風

金蝎 七箇炙

右為末煉蜜九梧桐子大每九薄荷湯磨下如

無半黃以膽南星代之

珍珠丸治急驚風候潮熱盛

滑石 白附子 輕粉 巴豆 十五粒

右為末通糊丸如黍豆大三歲服九二九歲白湯

送下一方加南星全蝎

犀角湯治熱盛心驚

神效方卷三

犀角另磨 防風去土 木通去節甘草

茯苓 桑白皮 各半分

右劉散每服三錢

銀葉湯治驚熱潮熱

麥門冬 地骨皮 遠志肉 人參

茯苓 防風 甘草 各三 大黃 二錢

右劉散每服一錢

清心丸治驚熱煩燥

人參 茯苓 防風 紫胡

辰砂 各二 金箔 二十片

右為末煉蜜丸如梧桐子大用竹瀝湯磨下一丸

膽星丸鎮心壓驚驚利痰解熱

膽南星 兩 辰砂 防風 各一 麝香

右末用生膽皮湯浸為丸如梧桐子大每九

井水下

導赤散 方見 至寶丹 方見驚風

辰砂七寶散 方見口瘡

天麻丸方見撮口 異功散

茯苓二陳湯 加連肉石首蒲黃桑葉煎和胃助氣

慢驚方論

神效方卷三

夫慢驚者因病或吐或瀉脾胃虛損通身冷口鼻
氣出亦冷手足瘳瘳昏睡露睛此無陽也必萎湯
主之凡慢驚之証或吐或瀉或喘或微喘眼開神緩則
露睛驚桃搐搦下發不靜或熱身冷或四肢熱口鼻
冷氣面色淡青眉間唇間或青或黃其脉沉遲散緩
蓋由急驚過用寒藥或轉下太驟傳變成之又有吐
利下而成者有氣虛暴吐瀉而成者有臟腑虛弱泄
而成者有久痢氣脫而成者有下積取瀉而成者有
吐血瀉血而成者有感風誤藥成者有傷寒轉變
陰證者有得久嗽發痼不已者有舌積衝心者

有得之氣氣脹痛者其或日夜汗出脾困多睡煩燥引飲四肢浮腫小便便閉丹毒龍帶纏腰走馬急疳并傳慢候性吐瀉積痢成虛致之則程發甚速治法大要須當審問原流不可藥曰慢候如瀉得之則理市湯加木香以溫其中五苓散以道其水臟寒洞瀉得之先與木附湯下積取轉得之則先與調氣散外感寒邪則先與桂枝湯解肌湯其他可以類推矣然慢候推為陰亦難準較陰陽虧盛虛實如何不可純用溫藥及燥烈大熱之劑惟於生固氣中加以截風定痛如金蟬花蛇僵蚕白附天麻南星重為良方傳慢候而尚有陽証者不必回陽但與截風調胃可冷可熱切正陰陽而已太乙保生丹聚寶丹蟬蝎散神保既濟丹來復丹三氏煙煙散醒脾散溫白七可選而用之若陽虧陰盛病過純屬陰慢候無不效制其引實視之証而但昏沉者星香全蝎散定命飲四聖散烏蝎四君子湯烏沉湯沉香散之屬是也水冷者方可回陽用疏黃附子下痰身暖者天南星丸蘇合香丸白丸子痰盛者神寶既濟丹礞石散虛寒者不可下痰者靈脂丸七珍丸但不可服腦麝色霜朴梢通關利腸輩如未發慢驚先要睡吐舌搖

頭面青黃者吐乳作醒額上有汗此証乃吐後胃虛生出當早截風省脾散或四君子湯加金蟬防風銀白散熱脈飲去麻黃更宜多方支變藥餌不可輕服又有慢驚為正發吐瀉冷汗及眼閉唇紅搖頭髮直兩脇動心悶氣喘口瘡當用南星家貼脚底心左好火間口瘡不納乳食名曰鎖腸則難救矣

括萎湯治慢驚馬
括萎根 二升
白甘遂 二升
神效方卷三 十四

右為末同於銚內慢火上炒焦黃研勻每服一字煎麝香薄荷湯調下無時

太乙保生丹治慢驚馬尚有陽証

全蝎 白附子 僵蚕 膽南星
蟬退 琥珀 辰砂 麝香 半水
防風 一升

右為末粟米糊為丸梧子大金箔衣每丸薄荷湯下

蟬蝎散方傳慢驚馬可用

全蝎 七箇 蟬退 二十箇 甘草 二錢 南星 大一箇

右為末每服半錢姜蜜煎服

神寶丹方傳溫驚風可用

人參

茯神

琥珀

天麻

僵蚕炒

防風

南星炮

白附子生

全蝎

烏蛇肉

朱砂

麝香

右為末煉蜜丸如梧桐子大每一丸薑蒲湯

化下

神寶散濟丹分陰陽平冷熱定吐瀉驚風

硫黃

硃砂

五靈脂

青皮

陳皮

半真曲

各等分

右將硫磺研用磁器鑄汁傾出候冷丹研細入

諸藥末內拌和粟米糊丸麻子大每服三九食前

米飲下

王氏惺惺散治吐瀉脾困內虛

人參

茯苓

木香

天麻

扁豆炒

全蝎炙

陳木炒各等分

右劉散每服二錢姜蜜煎服

大醒脾散治吐瀉脾困不食

南星

茯苓

橘紅各一分

全蝎炙

甘草

薄荷

白附子

人參

木香

陳木炒二百粒

右劉散每服二錢姜蜜煎服

醒脾散治吐瀉脾困不思乳食

人參

金匱

白附子

天麻

甘草炙

茯苓

五靈脂

木香

蓮肉

白朮

右為末每服三錢姜蜜煎服有熱去木香驅風

醒脾散方皆可用醋乳小兒胃虛消乳食尤頑

節紛

木附湯治風濕相搏身重體煩不能轉側不嘔不渴

大便堅硬不使自利及風虛頭目眩重者不知食味

白朮四兩

甘草炙

附子

右劉散每三錢水盡半生薑五片東三枚煎食前溫

服此藥肢肌補助陽氣止自汗

烏沉湯治濕驚風助胃

天麻

人參

川芎生

全蝎炙

南星炮

不香

沉香各一分

甘草炙

右劉散每服三錢姜蜜煎服

沉香散生胃氣止吐瀉

茯苓二分 沉香 丁香 木香

藿香 厚朴 甘草 各一分

右極細末每服一字米湯調下

星香全蝎散治傷寒驚風昏迷痰瀉

南星 木香 人參 橘紅 各一分

全蝎 甘草 有熱加防風

右劉散每錢入紫蘇葉煎服

定命飲治傷寒吐瀉重飲傳慢脾通用

半夏 茯苓 木香 生薑 各一分

白朮 一分 甘草 一分 天麻 二分

右為末每半錢姜葉煎湯調下

溫白丸驅風豁痰

人參 防風 白附子 生薑 各一分

全蝎 南星 天麻 各一分

右為末麵糊丸如梧桐子大每九姜湯磨下

天南星散驅風豁痰

南星 一箇重八九錢者

右將南星就地上作小坑深七寸許用火炭五斤燒

通紅以好米醋半盞洒入坑中即納南星於內次以

大炭條密蓋之用盆蓋其上伏時取出洗切

煅為末入琥珀全蝎末一錢每服半錢煎生薑防風湯調下

靈脂丸治慢驚馬痰盛搐弱

五靈脂 白附子 木香 僵蚕 各一分

全蝎 硃砂 一分 南星 炮半兩

右為末米醋煮生半夏糊丸每服三九姜湯下

姜湯下

七珍丸治諸風頑痰痼疾大小通用

細辛 川靈脂 僵蚕 白附子 各一分

硃砂 半兩 全蝎 四箇

右為末用大南星末煮糊丸每服五九姜湯下

姜湯下

釣藤散治吐利脾胃氣虛生慢風

釣藤 鈎三 附子 天麻 防風 各一分

蝎尾 人參 附子 麻黃 去節 僵蚕 炒 各一分

耳草 川芎 一 鹿茸 許

右劉散白水煎寒多加附子半錢可後煇退

釣藤飲煎煮對証用

礞石丸又名奪命散大能利痰不問急慢驚風脾風

痰涎潮盛塞於咽間其響如潮名曰潮涎百藥俱

不能過其咽命在瀕死但先用此藥入喉其痰墜下
則有萬全奪天地之造化起危篤之疾夜

青礬石

男研 煅硝半兩一方用一兩同蒙石
煅硝入高子內用白炭火燒過

金礬石

煅硝半兩一方用一兩同蒙石
煅硝入高子內用白炭火燒過

右為末急為風痰壅主身熱如火用生薄荷自

然汁入蜜調微溫服之良久其痰自果痰墜

下隨大便通痰涎與藥夾和如稠膠黏乃藥

之效也次服退熱法風痰壅等藥又方為末稀

糊丸散豆大每服一丸急風薄奇刺芥湯下慢

脾風用大香湯磨下慢驚慢脾虛風亦痰涎

潮寒性咽喉藥食俱不能入用此藥以青白白

子真研為末稀糊丸熟蜜湯調下其痰即墜入腹

飲服治慢驚藥其痰過時如前說不動臟腑不

傷真氣但見藥雜其稠涎亦無驚始知此藥神驗

天南星先治慢驚痰壅惟身熱者可服

南星

一升每箇重二兩者為去乳皮及酒浸一

麝香

丁香 龍腦 辰砂 二兩一

右為細末煉蜜丸入酒少許硃砂為衣每服一

九生薑煎湯磨下

四聖散治慢驚痰壅熱若有竅視搖振証

金礬石

煅硝半兩一方用一兩同蒙石
煅硝入高子內用白炭火燒過

右將南星末水調作餅裹錫香川烏用濕紙重

包慢火灰中煨令赤色頓地上一伏時為末每

一字煎金銀湯點好茶清少許調下更以少許

用管吹入鼻中亦好

人參

木香 藿香 沉香

陳皮

神麝 麥蘖 炒丁香 各等

右生散每服四錢姜十片紫蘇十葉棗三枚

煎乳母食後捏去奶汁服之即仰臥霎時入

乳之絡令兒吃不可過飽亦良法也

烏蝎四君子湯

右四君子湯加川烏全蝎為末每服半錢姜棗

煎湯調下再服去川烏

封鎖法

麝香

一字 蝎尾 半字 蜈蚣 一字 薄荷 半字

青礬石

煅硝半兩一方用一兩同蒙石
煅硝入高子內用白炭火燒過

右為末棗肉和成膏新綿上塗為貼額上四方

可出一指許火上炙百口裏外兒可用此

銀白散 方見

琥珀丸 方見

四君子湯 方見

理中湯 方見

五苓散 方見

調氣散 方見 變蒸

蘇合香丸 一倍

白九子 二倍 和每服半 水調下

慢脾風方論

失慢風之候面青額汗舌短頭低眼合不開兩瞳中搖頭吐舌頻嘔腥臭口咬牙手足攣搐而不收或身冷或身溫而四肢冷其脈沉微陰氣極盛胃氣極虛十救二蓋由慢驚之候後吐瀉損脾病傳已極總歸虛廢惟脾所受故口脾風若逐風則

袖珍卷三 二上

無風可逐若痰驚則無驚可療但脾間痰涎虛熱往來其合眼者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯然亦世所謂慢風難療者慢脾風是也然慢脾一名虛氣九小兒或吐或瀉之後面色虛黃大勢虛損若因虛而發熱繼此必得慢脾風總見搖頭斜視以手撲人皆因喜睡額上多汗身亦粘汗其舌沉小而焦即是脾風之証不必皆由急慢風傳次而至治法大要生胃回陽黑附湯川烏散金液丹白九子各平生附子四君子湯可酌斟用之胃氣漸復則異功散溫平而調理之如蝎附散陰癇散等亦可參用

若是眼半開半合手足不冷証候尚在慢驚則不必

用回陽或已入慢脾而陽氣未甚脫者亦不可用硫

黃附子輩九版回陽湯劑手之新變者仍以醒脾

散類慢驚下痰者神保既濟丹白僵蚕此重者

而少高安慢脾風遇惡証服藥不效者如有大

衝賦則取百會穴灸之此治慢脾風之要也

黑附湯治慢脾風或四逆散逆

附子 三錢 地 木香 半 甘草 半 白附子 一

右劉散每服三錢姜五片煎服若手之攣而

匙省即止

袖珍卷三 二上

川烏散驅風回陽

川烏 生 二分 全蝎 不香 各一分

右劉散每服三字姜四片煎服吐者加丁香

蝎附散回陽氣蘇風痰

全蝎 七箇 附子 二水 南星 泡 白附子 泡

木香 各一水

右劉散每服半錢姜五小片慢火煎服

生附四君子湯助胃回陽

右以四君子湯如生附子四分之一煎過者對每

錢姜三片煎熱以匙送下

傷寒方傳慢驚脾陽未甚脫者可用此散風寒

膽二升 僵蚕炒 地龍 全蝎炙

五靈脂各一

右為末煮半夏糊大麻子大每服五丸姜湯下

慢驚散治慢脾風口禁不語痰熱及治諸驚風口禁

六南星一箇泡

右劉散每服三錢姜四斤紫蘇五葉同煎出入性

猪膽汁少許溫服九不語者大小便須要調導

慢脾風不語只用南星以人參石菖蒲為佐

木香湯治慢驚慢脾風得効

南星泡 白附子煨 天麻 木香

陳皮 茯苓 蓮肉各二錢 黃芪炙

白朮 石菖蒲各一錢 甘草各一錢

右劉散每服三錢姜煮煎服

慢脾湯治慢驚脾困不食和胃祛風

大南星一兩切菓子用生薑一兩厚切一兩

木香二升 茯苓半兩 天麻二升 全蝎七箇

右為末甘草生薑湯調下

金液丹治吐利日久脾胃虛損手足厥逆精神昏睡

盛陰寒身冷脉微自汗小便不禁

附子硫黃 十兩研細用酒合燒令八分水和赤

以三日三夜加火一服 出為末

右以附子根乳鉢內研細每服二錢生薑湯下

不入藥末兩用蒸餅梧子大每五十丸米湯下

異功散溫中和氣吐瀉不思飲食及治下痢冷病生

服正氣 人參 茯苓 白朮 甘草

橘紅 木香各等分

右劉散每服三錢姜煮煎一升無木香

陰痢散祛風熱散回陽正胃

白附子生 附子生 南星生 半夏各等

右劉散并水浸七日逐日換水浸去水乾入全蝎

末二錢同研極細每服一字生薑湯下

至聖保命丹 方見

醒脾散 方見前慢驚

胎驚方論

胎驚風者以妊婦調適非常飲酒嗜欲忿怒驚

撲母有所觸胎必感之或外挾風邪有傷於胎故

子乘母氣生下即病也其候月內溫壯翻眼

逆舉禁口咬牙身腰強直痰潮嘔上搐制驚帶
 腰縮顛開或頰赤面青眼合更胎風眼合不可誤
 作慢脾風妄用溫藥要視其眉間氣色若紅赤
 鮮碧者可治若黑青黑者不治虎口指紋曲
 入裏者可治出外者不治其治法解散風邪利
 驚化痰調氣則顛甚則以朱銀九利之面青拳
 搐者宜服保命丹釣藤散全蝎散初生嬰兒難
 以用藥凡有此候急取猪乳細研辰牛黃麝香
 各少許調抹入口中即愈矣
 猪乳專治胎驚

琥珀 防風 猪乳 大辰砂 半斤

右研極細以猪乳調一字拭入口中

全蝎散治胎驚癇諸驚

全蝎一箇 琥珀 辰砂 各少許

右為末麥門冬湯調下一字

至聖保命丹治小兒驚內癇腹肚堅硬眠睡不
 安夜多啼哭及治急慢驚風眼目上視手足抽掣

不肖人事采皆瘡之

全蝎 十箇 防風 二錢 白附子 一錢 南星 一錢

蟬退 去毒 僵蚕 去毒 天麻 各二錢 辰砂 一錢

麝香 半分 另研

右為末探類米飯九如茨寶大以金箔十片
 為衣每服一錢釣藤心煎湯磨下有熱加牛
 黃膽子明砂一方加羌活二錢此藥常服鎮心
 化痰

獨活湯治胎驚發散風邪

羌活 獨活 各二錢 煎

麻黃 去毒 甘草 各二錢

右剉散每服一錢白水煎內加天南星末蜜調
 可貼顛門上

不抽珍卷三 廿六

朱銀九方見前驚風撮口

釣藤散方見前慢驚

袖珍小兒方卷之三終

袖珍小兒方卷之四

驚風方論

驚風者虛陽怔忡氣怯神散痰涎未去其氣至動生風而未至風也驚邪入心則面紅頰赤湯湯夜啼驚邪入肝則面目俱青眼睛驚邪入胃則面黑惡吐噤咬牙驚邪入肺則面色淡白喘息氣乏入脾則嘔吐一食虛汗多睡面色淡黃驚風之虛則散而驚則聚而聚則法鎮驚化痰安神定志亦須察竟何臟受病之虛而調理之然有所謂溫驚有所謂利驚有所謂涼驚驚虛者溫之實者利之熱者涼之是為治法睡中驚啼聲聲者易治聲沉不響者難痊又有驚積者受驚日久而積成之其狀額上有汗喘息煩渴潮熱往來肚皮有熱腫中覺腹內有物跳動瀉下如白脂豆汁是也治法量輕重而疎導之與調氣和胃取愈大凡小兒腹中或熱或脹或硬皆為內實法當疎利辰砂膏青龍丸主之凡疎利之劑皆可隨証而用之熱甚心煩煩渴者至寶丹解之卷活散防風道赤散蚩退釣藤飲天麻丸可選而用之天便秘澀者七寶洗心散加辰砂服之亦

便不利者神驚丸驚熱散輕者化風用安神丸主

青龍丸治驚有熱

青黛 茯神

芳膏

南星 各一

麝香 少許 輕粉

巴霜

全蝎 三箇

右先將巴豆研如泥次入諸藥末研極細探飯九粟米大硃砂為衣年一丸薄許湯送下

至寶丹治諸癇急驚驚心執平中客忤不得眠睡煩燥風逆搐搦及傷寒狂語伏熱嘔吐并宜服之

生犀角

玳瑁屑

琥珀

硃砂

雄黃 醋

金珀

銀珀 各五十粒

片腦 一分

麝香 一分

牛黃 半兩 安息香 一兩

半為末少銀反過飛過

右生犀玳瑁為極細末入諸藥同研勻將安息香

膏以重湯煮凝成和搜為劑如乾入蜜盛不

津器中旋丸如梧桐子大二歲兒服二丸以人參

湯化下大小以意加減又治大人卒中不語中

惡氣中熱暗風產血暈死胎不下用童子小

便合生薑自然汁三五滴同溫化下三五丸立

効

防風道赤散治小兒初發驚

生地黃 木通 去節防風 甘草各等分

有熱加黃芩赤芍藥蒸活

右劉散每服三錢水一盞竹葉三葉煎

蟬退釣藤飲治肚疼驚啼

釣藤 天麻 茯苓 川芎

右劉散灯心煎加木通麥門冬防風蒸活各一

七寶洗心散治驚風煩熱熱治小兒煩熱生瘡

生地黃 荆芥 防風 甘草

金抽環卷四

黃芩 羌活 赤芍藥各等分

一方加當歸

右為末入辰砂減半每服錢灯心薄荷湯調下

空服

神芎丸治風熱癰瘰頭目昏眩口舌生瘡牙齦瘰

蝕或遍身瘡疥咬牙驚惕心忪燥煩多渴大小便

澀滯或積熱腹滿驚風潮搐并皆治之

大黃兩 黃芩 牽牛 滑石各四兩

黃連 薄荷 川芎各半兩

右為末熟水丸如梧桐子大每四十九至五十九溫

水吞下一方加蒲黃止血証

清心丸治驚熱煩燥

人參 茯苓 防風 硃砂

柴胡各二分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每九竹瀝調下

寬熱散治小兒中風吊手足搐搦肚腹有熱

兼治食癆積乳癆服此則下惡物或成塊如臭

涕腥臭與兒得腹肚漸消

枳殼大棗一分以水浸之少許 大豆 大黃一兩

金抽環卷四

右為末每服一字或半錢用薄荷湯調下一

或入砂糖一塊皂子大以薄荷湯調勻空心乳

食服看兒肥瘦加減服之或小兒通身生瘡

可早晨服推出毒氣

安神丸治驚 人參 茯苓 麥門冬 山藥各二

龍齒一分 片腦一字 硃砂一分 甘草半

寒水石半兩

右為末煉蜜丸如鷄頭實大金箔為衣灯心

湯藥下錢氏有牙硝無龍齒人參金箔

天麻丸

夜臥驚風方見前腦風標口

化風丹

天麻內傷方論

天麻者陽也內傷者陰也蓋天麻壯熱驚悸眼目翻騰手抽搐或啼或笑喜怒不常甚者不
甲皆言如祟之狀蓋由乳母酒肉過度毒氣
入乳兒吮遂使心肝生熱痰鬱氣滯加之外換
風邪致有此耳治法解利風熱則愈又有內傷
者腹痛多啼腹裏脹腫偏攣反張腹內有紅筋

抽搦卷四

五

斑血蓋風氣壅結兼驚風而得之經云內動胸高
肘後安眠星紅腫見是也此病胎中有風有驚故有
此証先是內藏抽搐極痛狂叫或泄瀉縮脚一
啼驚証一過外証抽搐又來內外交攻極難調理
須分兩項下藥內証服聚室丸釣藤膏調香散
外搗服釣藤飲保命丹最要連乳得小兒受此病
問有好事楊氏乳香丸木香丸治內傷之要藥也
釣藤膏治小兒腹中極痛乾啼名盤腸內傷
乳香別研 沒藥別研 木香 姜黃各半
不驚子十二箇去殼

右為末燉蜜丸皇子大煎釣藤湯化下歲可
服半丸次服麝香散

麝香散

蓬朮半兩 阿魏一分

右將阿魏用溫酒化浸蓬朮一晝夜焙乾為末
煎蘇湯調下

釣藤飲治小兒夜啼乃臟冷也陰盛於夜則冷動
冷動則為陰極發燥寒盛作疼故夜啼不歇宜
服之

釣藤鈞 茯苓 茯苓 川芎

當歸 木香 甘草 芍藥各半

右劉散每服一錢姜裏煎服其或心熱煩啼
必有臉紅舌白小便赤色去木香如反砂一
錢研極細和前藥末每服一錢水通湯調下
如驚啼加蚘退防風天麻

木香丸治驚風內傷肚痛驚啼

沒藥 木香 茴香 釣藤各一

全蝎 乳香 各半

右將乳香沒藥另研細入諸藥末燉大絲糊在如
梧桐子大每服二丸釣藤灯心湯化下

釣藤飲直指

釣藤 茯苓 羊兩 大黃 煨 防風

砂 另研 蟬退 羌活 獨活

青皮 甘草 各二

右劉散每服一錢 姜裏前調服 砂六服

又釣藤飲治天癰潮熱

釣藤 人參 犀角屑 各半兩

甘草 半分 全蝎 天麻 各一分

右劉散每服一錢

保命丹

全蝎 蟬退 僵蚕 天麻

犀角 天葵子 有子者 白附子

南星 炮 青黛 硃砂 姜黃 各等

右為末 猪膽汁為丸 如桑豆大 先將井水調開

丸入果令噤定 次以釣藤煎湯磨下

乳香 凡治驚風內癰腹疼驚啼

乳香 半兩 沒藥 沉香 各半 蝎梢 四箇

右為末 煉蜜丸 如梧桐子大 每服二丸 溫酒送下

扶柳 一分半

右為末 煉蜜丸 如梧桐子大 每服二丸 溫酒送下

右為末 煉蜜丸 如梧桐子大 每服二丸 溫酒送下

湯化下

中風方論

小兒中風者 以其血氣未定 寒溫失調 內則盛熱 蘊

蓄外則腠理虛開 故風邪乘其外虛而暴中之 其狀

昏不知人 執壯狂燥 高熱 口氣穢濁 是也

心中風則便臥不能傾側 熱甚者其舌焦赤 若

汗流唇赤者可治 灸心俞或唇間白里 黃黃乃

心變為 或面目青 時時疎動者並不治 用

中風則 坐不能低頭 左肋疼痛 諸筋急 頭

目眴動 其目青者若連兩目連 青

唇青面黃者可治 灸肝俞大段 青黑其目黃

白者不治 腎中風則居坐而浮腫 脊痛引小腹 其

耳黑若兩脇 有黃色起者可治 灸腎俞或臍

間如黃主髮 而齒黃赤者不治 肺中風則便

臥脚滿喘息 咳嗽 汗出其鼻白若口下

至鼻四圍唇口皆白色可治 灸肺俞或色帶黃

肺壞為血併手尋衣縫者不治 脾中風則居坐

腹滿安肉 動四肢不收其唇黃若一身通黃

口吐鹹汁者可治 灸脾俞或手足厥冷者不治

九人為風邪所中 皆自背上五臟俞而入 風入

於頸筋之筋則口喎而牙禁風寒於咽喉声音之
 門則語不出而失音風與氣搏氣以痰隔則喉間
 如針刺之舌顫者是風也始入於腠膚次達於經絡
 而搏於筋脉筋得寒則拘急變痛得熱則緩弛
 不隨風挾寒邪即變急也風挾熱氣即緩弛也拘
 攣筋脉必浮脈緩筋脉必浮寒者小續命湯熱者
 追風毒刺散之類脉浮者病在表脉實者病在裏
 脉促者病在表在裏者散之在裏者泄之在上者
 湧之若虛而寒者則烏附之類古人治法以灼
 艾為本亦須消息參度而後割焉雖然風寒
 暑濕皆能中人况又有因氣而中者人之體病
 莫若中風一時倉卒若未能留且先與下氣豁
 痰蓋諸中因痰鬱氣滯而作通關以還急
 必南星生薑木香湯調蘇合香丸灌之身熱者
 南星細辛末入麝香梅肉點擦牙自開進藥之後
 痰消氣下病勢稍蘇即詳審五藏外証而調理
 之省風湯活活散勢甚者防風通聖散化
 風丹牛黃散鈎藤散至寶丹選而用之心中風
 先灸可服牛黃丸肺中風急以陳皮桑白皮煎
 更服煎湯化百部丸仍意灸肺

通關散治卒暴中風昏塞不省人事牙關緊急
 藥不得咽下

犀 薄荷 牙角 雄黃 各一

右為末每用少許吹入鼻中候噴嚏然後進藥
 或用白 擦牙更以薑蒲末着舌下牙開即
 開食亦可

排風湯治十風風瀆或狂語失音精神錯亂

白鮮皮 白朮 芍藥 桂枝

川芎 常山 杏仁 羌活 防風

甘草 獨活 麻黃 去節 桑葉 各上

右制散每服一錢姜茶煎溫服

三風毒散治中風內外皆熱

大黃 一分 枳殼 桑白皮 各二兩

防風 各半兩 厚朴 仁 各一

右制散每服一錢黑豆三十粒同煎 後服

小續命湯治中風不省人事涎鳴及失音痰

麻黃 人參 黃芩 川芎

芍藥 甘草 杏仁 防己

肉桂 各半兩 防風 七半

右除杏仁附子在分并為從末入杏附夾和每

服一錢姜三片棗一枚煎服有熱去附子桂

星香散治中風

南星 二錢 木香

陳皮 各一錢

全蝎 二箇

甘草 半錢

石劉敵每服一錢姜三片煎虛冷者加附子川

烏少許

白部丸

蘇合 各半兩

杏仁 四十粒

右為末煉蜜丸如芡實大常服溫水化下治

壅嗽若肺受風邪不散喘息前陳皮桑白

皮湯化下

阿膠散治小兒肺風喘促逆潮氣視

透明阿膠 煨片班

右用紫蘇烏梅各人參各小許同煎溫服

防風通聖散治小兒熱甚諸般風熱或斑疹未出

不快者更熱極黑陷將欲死者或風熱瘡疥久不

愈者驚風發熱者宜服之或方中久不語或暴

音不語皆治

防風

川芎

當歸

薄荷

大黃

芍藥

麻黃

連翹

黃芩

石膏

黃芩

桔梗

滑石

山梔

荊芥

白木

甘草 一兩

右劉敵每服一錢生薑二片煎服

半黃丸治驚風中風五瀉天瀉客忤逆潮

白化地酒泥肉

白附子

全蝎

川烏生

天麻

薄荷

雄黃

辰砂

牛黃

麝香

腦子

右件一處和勻麻黃去根二兩酒一升煎麻

黃至一盞許去麻黃用酒數盞得所丸如芡實

大每五粒銀箔薄哥湯磨下分作五服大能

發散驚邪

省風湯治驚風中風口禁筋脉攣急抽搐痲痛

風盛發實旋暈暈仆頭目眩胸膈煩悶恍惚不

定神志昏憤

天南星 生

防風 各四

甘草

半夏

黃芩 各二

劉敵每服二錢姜五片煎溫服

此方見

釣藤散 方見天癰

至寶丹 方見驚風

人參羌活散 方見急驚

夜啼客忤驚啼方論

夜啼者陽也陰盛於夜則令動令動則為陰極發燥寒厥作夜所以夜啼而不歇也釣藤散主之或心熱煩啼必有臉紅舌白小便赤澀之証釣藤散去當歸木香加辰砂木通煎湯調下有隔犯禁忌而夜啼者當用醋炭熏服藥合香丸客忤者小兒神氣嫩弱外邪之氣數重藥物暴觸而作

之其候驚啼口出青黃白沫穀雜雜面色變易喘息腹痛反側瘦瘵似驚癇但眼不上掌耳脈未弦急而數視其口中懸癰左右若有小小疳核即以竹針刺之或以火筒破之治法碎邪正氣散驚定心為上過久則難為力也九客忤中惡急作驚或降直香皂角并用熏之服蘇合香丸即自痊愈驚啼物哭龍齒散主之花火膏亦卒急可用也夫心藏神神安則五臟和故小兒畫得精神安而夜得穩睡若心氣不和邪氣乘之則精神不安故暴驚而啼也又有軀啼之証小兒胎中

風冷則邪氣入於胞胎既生之後冷氣傳留後因乳哺不節邪氣於正氣相搏故腹痛軀張或氣而啼也牛黃丸主之冷者理中丸主之

釣藤散

釣藤

茯神

茯苓

川芎

當歸

木香

甘草

木通

右劉散每服二錢姜棗煎或心熱煩啼臉紅舌白小便赤澀去木香當歸加辰砂木通煎湯調下

乳頭散治夜啼不止腹中疼痛

黃芪

當歸

甘草

赤芍藥

木香各等分

右為末每批少許乳頭上令吮之

花火膏治夜啼驚風而痛也

燈花

三顆

朋砂

辰砂各少許

右為末入熟蜜調成膏塗乳上令兒吮

蟬退散膏

蟬退

二十

辰砂

少許

右為末煉蜜丸令兒吮之

六神散治腹痛啼哭面青口中冷氣四肢亦冷曲

腰而啼或大便泄瀉及不吮乳

人參

山藥

白朮

甘草二錢

茯苓

扁豆各一兩炒

石為末每服一錢姜三片棗一枚煎方用當歸

白芍藥人參各二錢半甘草桔梗陳皮各一錢

為散每服二錢水煎時服之

雄雞散治客忤腹痛危急

雄雞一隻 明乳香半斤

古為末并一字刺雞冠血調灌之

黃土散治小兒驚風

灶中黃土 蛇蛻各等分

益研細末調塗小兒頭上及五心為良

龍齒散治拘攣肚夜驚熱

龍齒 蟬退 鈞藤 羌活

茯苓 人參 天麻 防風

全蝎各等分

古為末灯心煎湯調下煎服亦可

牛黃丸方見諸癰

理中丸方見

細細小兒方卷之四

細細小兒方卷之四

細細小兒方卷之四

小兒方卷之五

驚風方論

發癰者小兒之惡病也初血氣不斂氣骨不聚為風邪所傷驚悸所觸乳哺失節停滯結癖而得之其候神氣憊憊目睛直視面自牽引口禁涎流腹脹緊手足抽掣似生似死或舌或黑或青或黃或赤或強直但四體柔軟發而時醒者為癰若一身強硬終日不醒則為癰瘕矣癰有五癰瘕關五臟面赤目瞪吐舌齒心下煩燥曰心癰面青唇青其眼上青手足拳攣抽掣反折曰肝癰面黑而睛振目視人其吐清沫不動如尸者曰腎癰面如枯骨目白反視驚悸搖動亦吐涎沫曰肺癰面色萎黃眼睛直視腹自利四肢不收曰脾癰此五臟之証然也調理之法惟以驚風食三種陰陽二証別而治之風癰者汗出解脫風邪乘虛其初在指如計數有熱生痰是也驚癰者食積懷怖打墜積驚其初驚叫大啼恍惚心忪是也食癰者食時得驚停宿結滯其初乳不哺大便酸臭或結成乳癖先寒後熱是也別之以陰陽則始身熱抽掣啼叫是為陽癰病脈洪而色光澤病在腑肌膚此猶易愈始者身體無熱手足青冷不抽掣啼叫

癰瘕方論

此猶易愈始者身體無熱手足青冷不抽掣啼叫

是為陰癰陰癰狀沉而色黯晦病在五臟骨髓此最難
 痊或以仰臥重陽覆臥為陰亦可參驗蓋陽証不可溫
 陰証不可寒風癰則先為之散風驚癰則先為之利驚
 癰則先為之消積續以定癰湯等劑調之大抵無帶心
 竅邪氣在心積驚成癰通行心經調平心血順氣豁
 蓋小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安常驚驚悸此
 皆發癰之漸即以紫霜和酒服之時與之減其盛氣則無
 驚風癰之患其証方萌耳後高骨間必有青紋
 紛如線見之急與入破頭令血出常叫尤得氣通
 濯兒衣不可露天恐與純維落羽所汚染觸其間未
 有不為癰也按邪性者而色鮮赤不常見人羞
 怕者癰瘡不能言者蓋咽喉為氣之道路風傷
 其氣以掩其道路之門抑亦血滯於心竅不通
 所致耳南星和雄猪膽汁以許名星蘇散吹之即動若
 錢氏玉癰丸并南星散以高滿煎湯調下其逐猪心
 湯以和蘇合香丸皆治癰之要藥也許叔微治見
 癰癰欲發眼暗癰飛舌惡嘔古雄黃丸主之治
 風癰宜服薄荷散有熱服細辛大黃湯蛇黃丸
 斷癰丹散風丹保安丸獨活湯牛黃丸驚癰則用
 比金膏虎睛丸七寶鎮心丸清神湯密陀僧飲食

癰則用如聖丹天麻丸斷癰先當歸大黃湯蝎尾
 散諸石散白應丹龍散金蝎七癰丸星珠散輕
 者化風丹可選而用之
 南星散又名星蘇散治癰後瘡不能言諸風口喎不語
 大南星 一箇
 右為末每 字雄猪膽汁調下又方以姜四片紫
 蘇五葉煎 入雄猪膽汁以許溫服九不語者大
 小便須要 導引治慢風不語只用南星更以人
 參石菖蒲為佐
 散風丹治風癰先用此
 膽南星 紅卷活 獨活 防風
 天麻 人參 荆芥 川芎
 細辛 各一
 右為末煉蜜丸如梧子大每服二九紫蘇湯磨
 下
 獨活湯治風癰餅表通裏
 獨活 麻黃 去節 川芎 各一 大黃 煨
 甘草 各半
 右劉散每服三錢姜二片煎服
 已寶鎮心丸治驚癰心熱

遠志肉	雄黃	鐵粉	琥珀各三
辰砂一	麝香半	金銀箔二十片	
右極細末	肉九每服	九寒則冬湯下	
當歸大黃湯治諸癰熱壯利下心中惡血			
大黃	甘草	當歸	芍藥各三
半夏也	川芎各半		
右劉散姜棗煎之			
全蠲五癰九治小兒五癰			
蜈蚣一條去頭足	南星	麝香半	
全蠲	防風	遠志肉	姜汁炒
白附子	羌活	地胡索	辰砂各
金銀箔各三片	一方加麝香少許		
右為末糊丸梧子八每服一丸當酒茶蘇湯下			
細辛大黃湯治風癰熱癰			
細辛	大黃	防風	甘草一
右劉散每服一錢磨犀角入少許服一方加天			
麻川芎			
斷癰丹治癰瘡後復作證候多端連綿不除			
黃耆	熟地	細辛	甘草
蛇退	三寸酒炙	蟬退	牛黃

右為末煮棗肉為丸如麻子大煎人參湯下			
歲十丸			
牛黃治風癰迷悶抽搐逆潮			
附製	金蠲	蟬退各二	防風
白附子生	天麻	僵蚕各一	半炒
麝香半			
右為末煮棗肉丸如煮豆大荆芥生薑湯下			
一方加水銀半鎰入棗肉內丸			
妙聖丹食癰通用			
代赭石	醋煨七	雄黃	蝎尾
辰砂	輕粉	麝香	杏仁
巴豆	心		
右為末煮棗肉丸梧子大每一丸杏仁煎湯下			
密陀僧			
通用			
右為細末每服一字米醋湯下大人用二錢熱			
酒下			
星珠丸定癰利痰			
南星	二兩紙包煨	辰砂一錢	

欽定四庫全書

丁或金銀煎湯化下

青神湯治驚癇

犀角

遠志肉

白鮮皮

石菖蒲

人參

甘草

茯苓

半夏

大黃

右剉散每服三字麥門冬去心煎湯下

斷癇丸治諸癇痰盛

皂角

白礬

雄黃

南星

蜈蚣

僵蚕

雄黃

白附子

麝香

烏蛇

赤蜈蚣

生蠟

硃砂

右為末用水煮半夏糊和皂角膏為丸如梧子

大每一丸姜湯化下

蠲痰散治驚癇要効

生蠟

右入硃砂末并麝香少許同研薄膏湯調作一

服數年癲癇亦効蓋癇疾皆心血虛滯生蠟

可以官守其血繼是即以三陳湯服若無生

蠟當取帶性惟猪血代用入于代諸石散中亦効

白麻丹治癲癇連年不瘥

黑錫

硫黃

水銀

鐵粉

雄黃

金銀箔

右水銀鐵粉金銀箔灰和一處先將黑錫於鉢內

錫開吹入硫黃子住手就鉢內研攪候硫黃煙氣

欲息吹入餘藥就火上同攪少頃時傾出在

地一宿出火毒再研細粳米飯在麻子大硃砂

為衣每服三九食後人參湯下

雄珠丸治癲癇狂言妄語叫呼奔走及驚失心憂

慮過度積成痰涎在心包塞心孔

雄黃

硃砂

右為末猪心血丸如梧子大硃砂為衣每一丸

人參煎湯下一方加麝香尤妙

地龍散治諸癇發歇無時

地龍

人參

金銀箔

天竺黃

硃砂

代赭石

鐵粉

雄黃

輕粉

右為末每服半錢紫蘇煎湯下

鎮驚丸治一切驚癇

紫石英

鐵粉

遠志

輕粉

茯神

人參

琥珀

煨石

南星

蛇黃

龍齒

熊膽

方為細末煉蜜丸硃砂為衣梧子大每服一丸

金銀湯下

至寶丹 方見諸風

化風丹

開牙散

諸耳方論

兒童二十歲以下其病為疳二十歲以上其病為勞甘氣血虛逆腸胃受傷致之同出而異名也夫小兒臟腑嬌嫩則易傷乳哺飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆乳食不調其肥無節而作也

不抽卷五

或嬰幼乳哺飯太早耗傷形氣則疳之根生或二三日晝後乳食稍多過飽無度則疳以傷得或恣食甘肥粘膩生冷鹹酸以滯中脘則疳因積成或乳母養哺失理飲食非常喜怒勞勞即與兒乳則疳因母患傳氣而入此非病家不能調之過乎其皆脾胃受病內無津液而作也有因大病或生傷後施下津液枯得之者有因熱大下利無禁約胃中焦燥得之者有因傷寒裏証令勢太過渴飲水後變而生熱熱氣未散復干此邪付之者又有病疳寒邪熱腸下痛硬或者不能斷

諸瘵瘵以咽巴峻尖津液異傷得之者此非醫家之病也瘵病之起乎咽之為候頭皮光急毛髮焦然口乾口苦口乾白兩眼昏瞶揉鼻擗眉脊脊體黃開牙咬甲焦乾有汗口渴尿白溺酸肚脹者皆其候也大瘵曰五疳病關乎五臟以臟別之心肝脾肺腎小便赤澀五心煩熱盜汗渴眩暈是疳用也其証諸頭側目白膜赤睛眼青多淚頭焦髮立諸青筋熱渴多汗下痢瘡疥是疳腎疳即急瘵也其証腦熱肌削手足如米寒熱時來滑泄肚痛齒斷生瘡口臭乾渴不黑面黃身多瘡疥是疳肺疳即氣瘵也其証咳嗽喘逆熱壯惡寒皮膚粟生鼻爛涕涕咽不利頤爛嚔紅氣脹毛落泄利頻併是疳脾疳即食疳也其証面黃身黃肚大脚細吐逆中滿之力哭啼不消泄下酸臭合面困睡或食與泥是疳五臟疳傷大抵然也折而論之又五疳出虫者然疳傷之源雖起於乳哺不調而臟腑傳積已久莫不化為虫其虫或如絲絲或如馬尾多出於頭項胸腹背之間黃白赤者可治

不抽卷五

即急瘵也其証腦熱肌削手足如米寒熱時來滑泄肚痛齒斷生瘡口臭乾渴不黑面黃身多瘡疥是疳肺疳即氣瘵也其証咳嗽喘逆熱壯惡寒皮膚粟生鼻爛涕涕咽不利頤爛嚔紅氣脹毛落泄利頻併是疳脾疳即食疳也其証面黃身黃肚大脚細吐逆中滿之力哭啼不消泄下酸臭合面困睡或食與泥是疳五臟疳傷大抵然也折而論之又五疳出虫者然疳傷之源雖起於乳哺不調而臟腑傳積已久莫不化為虫其虫或如絲絲或如馬尾多出於頭項胸腹背之間黃白赤者可治

袖珍卷五



神功卷五

士

胃合服宜服之

黃連 一兩 蕪荑 炒 麥蘖 炒 中曲各半

青皮 炒 史君子 各二分 半去殼

右為米用酒醋膽汁九麻子大每七九米湯下

大芩薈九治痢殺虫和胃止瀉

胡黃連 黃連 白蘼荑 芩薈

木香 青皮 雷丸 白蘼荑亦

鵝風 各半 麝香 二分

右為末粟米飯九麻子大每飯下一二九

生熟地黃九治肝脾白膜瘕疳面而臥肉色青

黃髮金筋青腦熱癰腫

生地黃 熟地黃 各半 川芎 赤茯苓

黃連 杏仁 半夏 天麻

甘草 當歸 枳殼 炒 地骨皮 各二分

右劉散每服二錢姜三片黑豆十五粒水煎臨臥

溫服

清肺湯治肺癰咳嗽氣逆多喘吐熱惡寒

桑白皮 半兩 紫蘇 前胡 去芦

黃芩 當歸 枳殼 炒 連翹

防風 赤茯苓 枳殼 去芦 生地黃

甘草各一

右劉散每服二錢水煎服

三聖丸治冷痺痺瀉

丁香 丁皮 各一 木香 厚朴 製

史君子 取肉 陳少 肉豆蔻 各二分 煨

右為末神曲糊丸麻子大每九米湯吞下

地黃九治腎痺極瘦身瘡疥癩熱作時頭熱脚冷

熟地黃 八分 山藥 山茱萸 澤瀉

牡丹皮 茯苓 各三分 一方山茱萸黃蘗湯洗

本加史君子川練子

右為末煉蜜丸梧子大每服三九溫湯化下

銅青散治走馬疳口內生瘡不眠痛癢齒黑欲脫

或出血

白芷 半兩 牙硝 一分 銅青 一分 麝香 一字

古為末乾傅口角及瘰癧牙齒上甚妙

香薷九治痺瀉

黃連 三分 肉豆蔻 煨 木香 訶肉 煨

砂仁 茯苓 各一分

右為米糠飯九麻子大每十五九米飲下

加味肥兒丸治諸疳身黃肚急痞塊世寫瘦弱

加味肥兒丸治諸疳身黃肚急痞塊世寫瘦弱

胡黃連 <small>一兩</small> 史君子 <small>去殼</small> 三稜 <small>煨</small>	木香 <small>一兩</small> 義木 <small>一兩</small> 香附子 青皮 <small>炒</small>	陳皮 炙甘草 <small>炒</small> 神麴 <small>各一</small> 枳櫛	川黃連 蒼朮 <small>各半兩</small>	右為末以神麴麥蘖糊丸如黍豆大空心米飲下	三四丸如小兒無熱去胡黃連世編加入參肉豆	寇茯苓	史君子 <small>高治</small> 諸症調理脾胃殺虫解熱	史君子 <small>肉一兩</small> 陳皮 厚朴 <small>各五</small>	右為末煉蜜丸如皂子大三歲一丸二歲以下服半	九米湯化下忌油膩甜物	肥兒丸治諸疳多因缺乳食太早或因病久臟	腑胃虛虫動者漸瘳瘦肚大筋青不能行立髮	豎發熱無顏色	黃連 神麴 <small>各一</small> 麥蘖 <small>半兩</small> 木香 <small>二</small>	枳櫛 <small>二箇</small> 肉豆蔻 <small>炮</small> 史君子 <small>各半兩</small> 炙甘草	右為末麵糊丸麻子大每服二十九米飲下量歲數	加減	又方治証前同	黃連 陳皮 神麴 <small>炒</small> 麥蘖 <small>炒</small>
---	---	---	---------------------------	---------------------	---------------------	-----	----------------------------------	--	----------------------	------------	--------------------	--------------------	--------	--	--	----------------------	----	--------	---

白糯米 <small>半</small> 川練子 <small>一兩</small>	右為末麵糊丸麻子大	益黃散方見吐瀉	黃連 <small>治</small> 諸渴乾痺勞	黃連 <small>治</small> 諸渴乾痺勞	烏梅肉 杏仁	湯下	右為末用黃牛膽汁丸麻子大每服十五丸烏梅	胡黃連 <small>治</small> 諸有熱証者	胡黃連 黃連 <small>各半</small> 辰砂 <small>一分</small> 芒薈	麝香 <small>各一分</small>	右二味為末入辰砂末却填入猪膽內用酒煮以	枝子於鉢上用綿紗之勿着底候一炊久取出研入	若蒼麝香末揉飯為丸如麻子大每服五七丸	又方治小兒疳疾一切虛弱此藥無功此極効	胡黃連 芒薈 黃連 肉豆蔻	桂心 人參 辰砂 麝香 <small>一字</small>	史君子 木香 鈎藤 龍齒	茯苓 <small>各等分</small>	右為末用猪膽汁兩枚取汁和藥令勻却入膽袋
--	-----------	---------	---------------------------	---------------------------	--------	----	---------------------	----------------------------	--	-----------------------	---------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------------------	--------------	-----------------------	---------------------

內盛之以繩扎定湯煮半日取出切破更入荳
芽二錢微炒黃丹一錢二味研末入前藥和勻搗
五百杵九菴豆大米飲吞下五七丸不喫米飲乳
頭令吻治十二種疳痢及無辜疳亦効

蠅九治無辜疳諸疳一服虛熱退二服渴止三服
瀉利住

蟾蜍 按夏月購渠中取腹大
者不眠不鳴其身多脂

右取蟾蜍一杓置桶中以尿浸之桶上要乾不與
虫走却將蟾蜍殺之頓在虫中任與虫食一日一
夜次以新布袋包繫定置水急處浸一宿取

小神效卷五 十八

出毛上焙為末入麝香一字揉飯為丸麻子大
每服二三十九米飲下此丸累修合活人多矣
無不効驗

蚊應老治疳虫積氣臟腑等疾

換柳 大像子 黑豆 白豆 各一

黃連 木香 白燕黃 史君子 各二

右為末皂角湯丸如菴豆大

木香九治疳痢冷熱不調五色雜下裏急後重

黃連 木香 厚朴 枳殼 破仁

夜明砂 各三分 訶肉 一分

右為末粳米飯為丸麻子大每服十五丸艾葉生
姜湯下

黃耆湯治疳疔疔毒不定虛汗骨蒸渴而復渴乳
食遲遲

黃耆 當歸 川芎 芍藥

生地黃 人參 白茯苓 陳皮 各半

柴胡 史君子 甘草 各二分

右剉散每服二錢姜二片棗一枚煎食前服
五疳九治疳傷肚大

小神效卷五 十九

青皮 炒 乾姜 炮 五靈脂 各一

右為末每二兩用巴豆霜一錢拌和揉飯丸麻子
大每三五丸米湯下

十全丹治丁奚哺露

青皮 陳皮 莢木 煨 川芎

五靈脂 白豆蔻 煨 史君子 各一

木香 史君子 煨 史君子 各一

右為末猪膽汁浸糯米糊丸麻子大每服二十九米飲下

有熱薄荷湯下

湯氏十全丹治丁奚哺露夫哺露者因乳哺不

調傷於脾胃致令脾虛弱漸不能食血氣耗損肌肉不榮而骨蒸熱露其臟腑之氣不宣則汲汲苦熱謂之哺露

枳櫛

枳殼

青皮

陳皮

三稜

木香

砂仁

丁香

香附

木香

右為末用酒九粟米大空心米飲吞下

吳希真痘方

三稜

木香

青皮

陳皮

胡黃連

甘草

烏梅肉

蘇莢

玄胡索

麥冬

百草霜

巴豆

神曲

麥冬

雷丸

巴豆

右為末

先九一兩入巴豆五十粒如麻子大

米湯

下可加川練子史君子

下可加川練子史君子

脾積丸

山楂子

青者多用

香附子

烏藥

紫金皮

砂仁

甘草

各等分

右為末

楮子生用搗碎

末米糊丸

梧桐子大

米飲下

三五十九

噤痢散治痢

噤痢散治痢

苦薈

黃連

瓜蒂

諸牙皂

蟾蜍

各半

麝香

少許

右為末吹入鼻內嚏則可治

脂連丸治五疳潮熱肚脹身直

胡黃連

各半

五靈脂

一兩

右為末用猪膽汁丸如麻子大每服十五丸米飲下五疳潮熱慎勿用大黃黃芩

五疳良方治疳

黃連

蘇莢

神曲

炒

麥蘖

炒

陳皮

木香

蘇莢

神曲

炒

麥蘖

炒

肉豆蔻

枳殼

二箇

麝香

一字

研

右為末

以猪膽二箇取汁入好酒打麵糊丸

芥子大每服十五丸米湯下

茯苓丸治心疳驚風

茯苓

各三分

琥珀

黃連

各三分

石菖蒲

一分

右為末

粟米糊丸

麻子大每服十九薄許湯下

神効換肌丸治脾疳肌瘦潮熱盜汗飲食易傷臟

神効換肌丸

治脾疳

肌瘦

潮熱

盜汗

飲食

易傷

臟

腑糟粕飲食不化頭大腹急

黃連炒去 鱉甲醋炙 肉豆蔻煨 訶肉煨

麥蘖炒各 麝香半字 史君子牛兩煨神麝炒

右為末麵糊丸麻子大米湯下量歲加減服

天麻丸治肝風疳疳眼

青黛 黃連 天麻 五靈脂

夜明砂炒 川芎 蒼朮炒 龍膽草

防風 蟬蛻各一分半 全蝎炒

麝香少許 乾膽頭二分

右為末猪膽汁浸糕丸如麻子大每十九薄苛湯

神珠卷五 十三

下

地黃清肺飲治肺熱疳腫蝕為穿孔臭或生息肉

或鼻生瘡

桑白皮半兩 紫蘇 前胡 防風

赤茯苓 黃芩 當歸 天門冬去心

連翹 桔梗 生地黃 甘草各二

右剉散每服二錢食後服次用化鹽丸

化鹽丸

無美 荊蒿 青黛 蝦蟇灰

川芎 白芷 胡蘆連各等分

右為末猪膽汁浸糕糊丸麻子大每服二十丸食

後臨臥以杏仁煎湯吞下其鼻常用熊膽泡

湯小筆蘸洗俟前藥各進數服却用青黛當歸

赤心豆瓜蒂地榆黃連若蒼各等分雄黃少許

細末入臭欬瘡

靈脂丸治脾疳食疳

白豆蔻 麥蘖炒 五靈脂 砂仁

蓬朮炒 青皮 陳皮 史君子各二

蝦蟇炒

右為末米糊丸麻子大米湯下

神珠卷五 十三

下虫丸治疳蛔諸虫

木香 桃仁燉 無美 枳殼各二

鶴虱炒 輕粉兩 乾蝦蟇多焦

史君子五十粒 白苦練根皮酒浸焙

綠色貫衆各二分

右為末麵糊丸麻子大每服二十丸空心清肉

汁下內加當歸黃連各二錢半治香疳疳勞

龍膽丸治腦疳熱餅瘡

龍膽草 升麻 苦練根皮 防風

赤茯苓 荊蒿 油髮灰各二分

黃連 各三升

右為末煉蜜丸黍豆大每服二十九薄湯下食後服仍以苦茶吞吹入鼻

君朴九治諸疳小便白濁久則黃瘦不長肌肉

史君子 煨厚朴製 黃連 木香 同炒

右為末麵糊丸如赤小豆大三歲服三十九米湯吞下三五服效

魚血煎治疳疔

蕪荑 柴胡 川芎 各一 人參 半兩

史君子 二枚 胡黃連 川黃連 各二升

神效卷五

右用鯊血一盞吳茱萸二兩拌和黃連連一宿次早炒乾去茱萸更鯊血只用二連末和餘藥

作末粟糊丸麻子大每服二十九食前白湯下

鯊甲九治無辜瘡腹中毒起四肢瘦弱

鯊甲 黃連 枳殼 夜明砂 各半

訶肉 二枚 麝香 分 蝎虎 一枚 炙

右為末煉蜜丸黍豆大每服五九米湯下日三服

蒸雞九治疳疔勞骨蒸潮熱盜汗瘦弱腹急面黃

食不生肌肉日哭夜啼多渴少食

黃連 一兩 柴胡 一兩 蕪荑 鶴虱 各半

秦光 知母 升參 史君子 各一

右為末以黃雄雞一隻重一兩者籠之用大麻子飼之五七日去毛令淨於臂上開一孔去腸肚

淨拭乾之前藥於雞腹內以線縫之取小飢先以

黑豆鋪底厚三寸安雞在甑中傍以黑豆

圍更上以黑豆蓋之自朝蒸至晚候溫冷取雞

肉研和得所如硬入酒麵糊丸前藥末如赤豆大

二歲二十九米湯吞下十五歲溫酒下忌食豬肉

黃雌雞肉

加味經驗黃雌雞前九

神效卷五

柴胡 知母 秦光 洗淨 川練肉 各一

黃連 二兩 胡黃連 岩薈 鱉瓦

蕪荑 枳殼 升參 川芎

神麴 麥蘖 青皮 五靈脂 各半

史君子 一兩 水銀 一兩 麻子 五兩 黑豆 五升

右依前方修合

海肉九治諸疳煩渴飲水不休

定粉 龍膽草 烏梅肉 黃連 各半

右為末煉蜜丸黍米大每服二十九溫水吞下

五疳保童九治小兒五疳一切疳証無不治療

黃連

白蟾頭 炙今焦黃元即炒

龍膽草

去雄黃研

青皮

五倍子

夜明砂

蟾頭一枚

苦練根

天漿子炒

胡黃連

麝香另研

青黛研

熊膽研

若翁

一方有蝸牛微炒一分

右為細末都研令勻用糯米飯和丸如麻子大每

服一歲兒三九不計時候溫米飲下日進三服

五海消食丸治五疳八痢絞腹脹水瘰癧勞及走

馬牙齒腐爛壯大青筋此藥大能進食悅顏色長

肌膚

麥藥

史君子炒

黃連

橘紅

燕夷

龍膽草

各等分

橘紅

右為末粟米糊丸如粟米大每服二三九空

米飲下不拘時量數加減

六神丹治小兒疳氣羸瘦臟腑怯弱泄利虛滑乳

食減少引飲無度心腹脹滿

丁香

木香

肉豆蔻

各半兩

右三味麵裹同入慢火煨令麵熟取出放冷

訶子

史君子炒

荳蔻

各一兩

右為細末以棗肉和丸如麻子大每服五九至七九

米飲下乳食前服

米飲下乳食前服

蘆薈是治疳氣羸瘦面色痿黃腹脇脹滿頭髮

作穗好喫泥土利色無定寒熱往來自泄口臭齒齲

爛黑常服長肌退黃殺疳虫進乳食

大皂角

青黛一分

若翁

麝香

各一分

乾蝦蟆

同皂角各等分

硃砂另研

右為末浸蒸餅丸如麻子大每三歲兒二十九米飲

下乳食前服

蘆薈是治疳氣羸瘦面色痿黃腹脇脹滿頭髮

作穗好喫泥土利色無定寒熱往來自泄口臭齒齲

爛黑常服長肌退黃殺疳虫進乳食

大皂角

青黛一分

若翁

麝香

各一分

乾蝦蟆

同皂角各等分

硃砂另研

右為末浸蒸餅丸如麻子大每三歲兒二十九米飲

下乳食前服

袖珍小兒方卷之六

傷寒方論

或問小兒傷寒可得聞乎曰小兒傷寒得之與大人無異所異治者兼驚而已又有人夾食而得治法與大人則同但分劑小用藥少吟耳請發明藥証而調析之惡風惡寒者必限人藏身引衣室隱是為表証可微取其汗也惡熱內實者必出頭露面揚手擲足煩渴燥糞掀衣氣籠是為裏証可略與疎利也至若頭顱冷足涼口中冷氣面色黯淡大便瀉青此則陰病裏虛當以救其裏也則用溫藥以治之壞是三者汗

袖珍卷六

下溫之法可以類推矣發汗用桂枝麻黃各半湯加黃芩鮮肌用芫芷香蘇散加乾葛通利四順清涼飲微利人參敗毒散溫裏理中湯厥冷并章乾姜湯尋常感冒惺惺散參蘇飲傷風發熱人參羌活散熱者升麻葛根湯潮熱者小柴胡湯加大黃小便不通者導赤散五苓散夾食紫霜九夾驚赤當發散退熱莫令發渴如渴便欲飲水不渴截風化痰則用抱龍丸羌活散輩然亦視其小便或赤或白可以知裏熱之有無或青或濁可以知裏熱之輕重幼而嬰孩則以辨虎口指紋之色紅驗之長而童孺則以一指按其三關據左

手人迎之緊盛者斷之所謂七二証其方某証皆無誠張未格例時不過小小分劑而中病則止也不然幼幼新書駢集小兒傷寒雖略舉巢源二而已我升麻湯治小兒時行瘟疫頭痛發熱肢疼及瘡疹已發未發疑二之間傷寒中風所痛皆寒壯熱肢疼發熱惡寒鼻乾不得睡兼治寒時人多疫痛作暖脫著及暑熱之次忽變身疼頭痛頭重如石加柴胡無汗加麻黃

升麻

乾葛

芍藥

甘草

右劉散每服三錢服藥身涼即止加紫蘇陳皮

袖珍卷六

香附子名升蘇散有熱加黃芩咽喉痛加桔梗發斑丹毒加玄參亦効

鮮肌湯治傷寒溫病頭痛項強發熱惡寒肢體拘

急骨節煩疼腰脊強痛胸膈煩悶無汗惡風壯熱

乾葛

麻黃

芍藥

甘草

桂枝

右劉散每服三錢棗子一枚水一盞煎熱服取汗

為度夏月加石膏一方加升麻

香蘇散治四時傷寒頭痛發熱惡寒

香附子

紫蘇

陳皮

甘草

右劉散每服三錢葱根三箇姜三片水盞煎熱服
頭疼加川芎白芷有傷暑感冒發熱加香薷
散名二香散如有食加草果砂仁麥蘖如嘔吐瀉
加茯苓半夏十神湯治時令不正瘟疫妄行感冒
發熱或欲出疹此藥不問陰陽兩感風寒溫脾胃
可服之

川芎 甘草 麻黃 升麻 各五分
乾葛 赤芍藥 白芷 陳皮
紫蘇 香附子 各四分

右劉散每服三錢生薑五片頭疼發熱葱白五箇

煎熱服取汗為度

麻黃湯傷寒頭疼發熱身痛惡風無汗喘滿又治太
陽病脈孔緊無汗八九日不解表証仍在此當發其汗
服藥已略除其人必曰腹劇者必出

麻黃 一兩 甘草 四錢 桂枝 七錢 杏仁 二十五枚

大劉散每服三錢水煎服取微汗至後須加知
母石羔黃芩蓋麻黃湯性熱夏月溫之必有發
黃班出之失凡傷寒熱病藥性須涼不可太溫

唯春冬病用正方

桂枝麻黃各半湯治太陽病八九日如瘧狀發熱惡寒

熱多寒少其人不自嘔清便欲自行一日三度發脈
微緩者欲愈也脈微而惡寒者此陰陽不和更發
汗吐下也面色反有熱者未欲解也以其不能得少
許汗出身必涼

桂枝 一兩 芍藥 生薑 甘草
麻黃 各半兩 杏仁 十二枚 大棗 二枚

右劉散每服三錢水一盞煎八分服

參蘇飲治感冒發熱頭疼傷風咳嗽食傷寒嘔吐
胸膈不快交飲疑

紫蘇 前胡 去若 陳皮 半夏 各五分

乾葛 茯苓 枳殼 炒 桔梗 各三分

甘草 一分 人參 二分

右劉散姜棗煎本方有木香隨意加減易簡方
無木香

桂枝湯治太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發
陰弱者汗自出蓋蓋惡寒翕翕發熱鼻鳴乾嘔者

桂枝 芍藥 各半 甘草 半兩 生薑 七錢

大棗 三箇

右劉散每服三錢服後須更發熱粥一盞以助藥
力溫覆身一時許通身熱熱微似有汗者佳加減

桂枝湯四時行之無不應驗江准間唯冬及春可行自春末及夏至已前桂枝証加黃芩一分謂之陽旦湯夏至後有桂枝証加知母二錢半石膏半兩蘇麻一分若病人素虛寒者依古方不在加減也戒曰桂枝最難用雖云表不解可發汗宜桂枝湯須是病人常自汗出小便不數手足溫和或手足稍作微冷須臾却溫雖似煩而又憎寒始可行之若病人身無汗小便數或手足冷不惡寒或飲酒家不喜甘者不可服桂枝也人參敗毒散治傷寒時氣頭項強壯熱惡寒

金神珍卷六

五

身體煩疼及寒壅咳嗽臭塞舌重風痰頭寒熱瘧毒并宜治之

柴胡去芦 甘草 桔梗 人參去芦

川芎 茯苓去皮 枳殼炒 前胡去芦

羌活 獨活各等分

右剉散每服三錢生薑薄荷煎

桂枝加芍藥湯治太陽病反下之因腹痛復有裏証宜服

桂枝芍藥 芍藥一兩 生薑七分 大棗三箇

甘草半兩

右剉散每服三錢水煎服屬太陰証加大黃半兩小柴胡湯傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急胸滿脇痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘硬或遇經未解或潮熱不除

半夏三升 柴胡一兩 人參四兩 甘草四兩

黃芩四分

右剉散每服三錢生薑三片棗一枚同煎方加

乾葛枳殼桔梗治胸脇痛

五物人參湯治天行壯熱咳嗽心腹滿

人參 甘草二兩 麥門冬二兩 白芍二兩

金神珍卷六

六

生地黃半兩

右剉散每服二錢水煎服

葱白湯治頭疼不止身疼發熱渴小便赤黃脉浮

教無汗

乾葛 芍藥 知母略半 川芎二兩

右剉散每服三錢生薑二片葱白四枚煎熱服出

汗如有汗溫服加甘草治小兒夾驚傷風嘔者加

半夏

五苓散治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口渴燥咽乾煩渴飲水上入即吐或小便不利及汗出表解煩

渴不止又治霍亂吐瀉燥渴飲水

澤瀉二兩半 去毛 猪苓

茯苓去皮 白朮各半 醋半

肉桂一兩半 去皮

右為末每服二錢沸湯調下黃疸加茵陳湯調

四順散解小兒腸熱退壅盛涼心經

大黃

甘草

當歸

芍藥

右劉散薄荷葉二葉煎服

薄荷散治熱極生風夾驚傷寒痰涎壅盛

薄荷半兩

羌活

全蝎去毒

麻黃

川草半兩 僵蚕炒

天竺黃

白附子

金神珠卷六

右為末薄荷湯調下一匙略煎數沸加竹瀝少許

七寶散治時氣頭昏體熱夾食傷寒乳母同服

紫蘇三分

陳皮

桔梗

香附子各三

甘草

川芎

白芷各二分

如麻黃去節

右劉散姜棗湯有熱加乾葛并麻荊芥

竹葉石羔湯治傷寒表裏俱虛胸中煩悶或得汗

已解內無津液虛羸少氣虛煩如傷寒未解不可服

石羔二兩

半夏各一分

人參二分

甘草二分

麥門冬各一分

右劉散每服二錢水一盞青竹葉生姜各四片煎

米六七十粒同煎嘔加生姜竹葉

柴胡石羔湯治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻

塞咽乾心煩悶寒熱往來痰實咳嗽涕唾稠粘

桑白皮

黃芩各三分

升麻

石羔

前胡

柴胡

乾葛各半

荊芥三分

赤芍藥半兩

右劉散每服二錢水一盞姜三片淡豉半粒煎無汗加

麻黃半夏

陰旦湯治傷寒肢節疼痛內寒外熱虛煩

桂心各半

芍藥

甘草各三分

乾姜一分

金神珠卷六

黃芩各半兩

右劉散每服三錢棗一枚同煎溫服略出汗

白虎加人參湯治傷寒若吐若下後七八日不解熱結在

裏表裏俱熱惡寒大渴大汗出煩渴不解脈洪大者

石羔二兩

知母半兩

甘草二分

粳米五勺

人參一分

右劉散每服三錢水煎米熟為度去滓溫服

玉露散涼心經解諸熱口燥咽乾煩渴燥嘔小便不利

寒水石

石羔各二兩

甘草三分

右為末每服半錢麥門冬湯下加辰砂金箔名桃紅

散亦治急驚入施子名金蓮散加滑石半兩白玉

真散湯氏方治小兒秋夏伏暑多有熱吐黃涎

頭溫五心熱小便赤或乾嘔無物先服香茹散

又宜服此方生薑汁和白湯調下

四逆湯治陰証傷寒自利不渴嘔吐小便或澀或利

厥微欲絕腹痛脹滿手足厥冷吐利俱作或發或利

內寒外熱四肢沉重或汗出身疼痛而惡

甘草一兩 乾姜一兩半 附子一枚生用

右剉散每服三錢水一盞煎溫服

神效散治傷寒體熱頭目昏沉不思飲食寒驚寒

神效散

食寒熱大小便閉或赤白煩燥作渴冷汗妄流夾

積傷滯胸滿腹急日夜大熱及治傷風傷暑驚癇

客忤疳熱并宜服

柴胡 當歸

人參 知母 甘草

右剉散每服三錢連翹葱根三枚水盞煎服此方

散熱扶表救裏表虛令汗下安行裏熱令氣不閉結

外即通關內即開渠通關流行經絡開渠不雍去臟

腑熱在表裏之間施無不可積傳驚癇之候功

理中湯方見吐瀉門

大柴胡湯方見瘧症

大承氣湯方見瘧症

瘧症方論

夫發瘧之候先傷於風又感寒濕致之此虛極生熱

極生風之甚者也傷寒發熱頭痛汗出又自嘔逆汗之

必發瘧濕家發汗稍多亦發瘧其証項背強直腰身

及張搖頭瘧瘧瘧口不語發熱腸痛其狀可畏病在

足太陽經剛瘧無汗柔瘧有汗其面紅眼赤牙緊手

張痰涎壅盛昏憤煩渴小便赤澀生瘧語而發者

此剛瘧也無汗當發汗其大便滑泄不語不渴先手

神效散

足冷而發者此柔瘧也有汗當解肌并以小續命

湯加減剛瘧去附子用麻黃桑葉麻黃用附子

大便利厥者則以熟附佐之其間一証身體壯熱識

語口乾手足反微寒大便反滑泄為此剛柔不分

之瘧無汗葛根湯主之有汗桂枝加葛根湯主之

無汗則用麻黃有汗謹勿用也其若瘧寒氣盛則

南星半夏茯苓以消其痰枳實陳皮紫蘇以順

其氣消痰則風止氣順則神清後審其熱之輕

重而解利之熱輕者敗毒散熱盛者小柴胡湯

熱有汗胸滿口噤咬齒而大便秘者是為內實

大承氣湯下之後用大柴胡湯解之症最難痊
救其一二日難治宜早瘳之

桂枝加葛根湯治頭項背強兀兀汗出惡風者

桂枝 芍藥 甘草 葛根

右劉散生姜棗煎每服三錢

大承氣湯治剛產胸滿內實口禁大熱發渴大便閉

大黃 芒硝 厚朴 枳實

右劉散每服二錢姜三片水一盞煎服

大柴胡湯治傷寒十餘日邪氣結在裏往來寒熱大

便秘腹滿胸脇脹滿心下硬飲食不下或不大便

柴胡 黃芩 芍藥 枳實 大黃 半夏 牡蠣 芒硝

五六日續膈痛時時煩躁及汗後如瘧日晡發熱脉

有力者可服

柴胡 黃芩 芍藥 枳實 大黃 半夏 牡蠣 芒硝

枳實餅

右劉散每服三錢姜三片煎

敗毒散

小柴胡湯 方見傷寒

小續命湯 方見中風

傷風咳嗽

夫嗽者肺感微寒八九日間肺氣大壯病嗽者其

病必實非久病乎其証面赤痰盛身熱法當以葶

藶丸下之若久嗽不可下冬月嗽乃傷風也當以麻

黃湯汗之有熱証面赤飲水涎痰濃實咽喉不利

者宜甘桔湯有肺盛者咳而後喘而腫飲飲水

有不飲水者其身即熱以瀉白散瀉之有嗽而

吐痰涎乳食者以白餅子下之然肺主氣應於皮毛

肺為五臟華蓋小兒感於風寒客於皮毛傷肺

經微者咳嗽重者喘急肺傷於寒則嗽多痰涎

喉中鳴急肺傷於熱則嗽聲不通壅滯於寒者

必散寒邪傷於暖者必泄壅滯發散為以甘辛

即桂枝麻黃細辛者是也湯泄係以酸苦乃葶藶

大黃是也更五味烏梅之酸可以飲肺氣亦治咳嗽

之要藥也久嗽不已必主驚悸頑涎血脈腫脹其嗽

傳受五臟或吐逆或痰涎或厥冷或恐悸甚而至於眼

目兩眶紫黑如物傷損眼白紅赤如血謂之血眼治

之之法當用生地黃及黑豆溫研成膏掩於眼上

而眼腫黑自消其血於眼淚而出其良方也兼服

麥煎散而嗽自止久嗽成癰常服散癰等劑凡治

嗽先要發散寒邪然後服寬氣化痰止咳之藥宜

九室飲華蓋散葶藶丸枳龍丸細辛五味子湯如

有熱可服涼肺之藥柴胡黃芩等利濕白散痰多氣喘
 飲調理而安冷言咳嗽小青龙湯加杏仁去麻黃有
 熱及時氣咳嗽柴胡散柴胡石羔湯生犀散有驚
 咳嗽天麻防風九厘厚散川金沸草散三拗湯加
 減乃治傷風咳嗽之常劑也和鮮湯治四時感冒可
 加減服

九寶散治小兒咳嗽是肺感寒瀕是表散工却服
 止嗽藥

麻黃 去節 大腹皮 紫蘇 各半 陳皮
 杏仁 去皮 肉桂 去皮 桑白皮 炙 枳殼 各二

甘草 一兩半 加龍腦葉
 右劉散每服二錢生薑烏梅煎冷嗽去龍腦葉熱

去桂陳皮
 三拗湯治感冒風邪鼻塞舌重語音不出或傷風
 頭疼目眩四肢倦怠咳嗽多痰胸滿氣短

麻黃 不去 杏仁 不去 甘草 各等分
 右劉散每服三錢姜葱根煎服取汗為度一方
 加荊芥桔梗嗽甚加五味子細辛又方麻黃去節
 杏仁去皮尖甘草炙各三和湯有熱加前胡有

痰加半夏

桑蓋散治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩悶項背拘
 急聲重鼻塞頭目昏眩痰氣不利

麻黃 去節 紫蘇 子炒 桑白皮 炙 杏仁 去皮尖
 茯苓 陳皮 各半 甘草 二

右劉散每服二錢水半盞煎食後服
 金沸草散治傷風化痰頭目昏痛往來寒熱肢疼煩
 悶交感不利咳嗽喘滿涕瀝稠粘壯熱惡風

金沸草 新芥 一兩半 前胡 麻黃 各二兩
 甘草 半兩 半夏 七

右劉散每服二錢姜棗煎溫服有寒邪則汗出
 嗽甚加杏仁五味子

加減金沸草散治傷寒中脫有痰令人吐熱頭疼筋
 緊急時發寒熱皆類傷風但不頭疼為異

前胡 旋覆花 各一兩 荊芥 三錢 赤茯苓 各
 細辛 甘草 半夏 各四

右劉散姜棗煎熱服未愈再服
 麥煎散治小兒夾驚傷寒吐通壯熱表裏不解氣粗
 喘急面赤自汗或狂語驚叫或不叫語無汗及癇疹
 遍身赤痒往來潮熱時行痲痘疹子餘毒未盡

滿身浮腫咳嗽或變急慢風手足攣眼目上視
及傷風頭疼并治

滑石

地骨皮

赤芍藥

石羔

茯苓

杏仁去皮尖

知母

甘草

葶藶

人參冬五

麻黃去節一

甘草

右為末每服一錢用麥子煎湯調下如小兒初生

感冒風冷鼻寒身熱噴嚏多啼每二字小麥子

煎湯調下一方去地骨皮滑石加羌活川芎薄荷

煎湯調下

星散治咳嗽痰逆喘滿心忪驚悸風熱

金神卷六 十五

杏仁三分

桔梗二分

茯苓一分

前胡一分

人參一分

半夏一分

五味子一分

甘草一分

右劉散每服二錢生薑薄荷煎有熱加羌活或

加麻黃

化風丹治傷風咳嗽痰壅生驚

羌活

川芎

防風

天麻

川芎

荆芥

南星炮各

人參二分

甘草三分

右為末煉蜜丸如芡實子大以辰砂為衣薄荷

湯下一方加蟬退全蝎

天麻霍亂散治小兒驚風驚風

天府

防風

甘草

人參

桔梗

白朮

川芎

半夏各等

右劉散每服二錢姜三片麥門冬十四粒同煎食

後服有熱去白朮加芍藥枳殼

和鮮湯治小兒四時感冒寒邪壯熱煩燥鼻塞多

涕驚悸自汗肢體疼痛及疹疹已發未發皆可服

升麻

甘草各半

羌活

防風

川芎

人參各一

乾葛

芍藥各半

右劉散每服二錢姜三片煎加荆芥無汗加麻黃

金神卷六 十六

咳嗽加杏仁五味子桔梗

紅綿散治傷風咳嗽氣急流涕退熱化痰亦治乳蛾

全蝎五箇

麻黃去節

僵蚕

川芎

白芷

天麻各二分

甘草一分

蘇木一分

桔梗二分

右劉散每服二錢用綿包裹煎服有熱加荆芥一

方有防風羌活白附子蟬退茯苓藿香隨加

神木散治傷風發熱口渴

前胡

桔梗

乾葛

荆芥

台芎

白芷

蒼朮各半

甘草二分

右劉散每服二錢姜半片同煎

羌活湯解利邪氣傷風

羌活

防風

川芎

人參各等分

右劉散每服二錢生薑薄切煎加芍藥甘草

細辛五味子湯治肺經不足胃氣怯弱或胃風邪

或傳寒有飲咳嗽倚息不得安臥胸滿短氣乾嘔

作熱或吐涎沫頭目昏眩身休寒語聲不出不問

新久并服之

細辛

半夏

烏梅

甘草

鴛鴦散

去濕炒

五味子

桑白皮

合神錄卷六

十七

十七

右劉散每服二錢生薑五片煎

粉紅丸治傷風化痰退熱治驚

膽製

天竺黃

煅礬石

辰砂

坏各三

右為末甘草膏丸如梧子大生薑湯下有熱

薄苛湯下

抱龍丸治傷風溫疫身熱氣促痰實壅盛常

服安神

膽製

天竺黃

雄黃

辰砂

麝香少許

右為末甘草膏丸如梧子大薄苛湯下有痰喘

加枯礬

百部

麻黃

杏仁

炙甘草

幼方加甘草二升半

右為末陳密丸如梧子大熟湯化下伸陽加松子仁

肉五十粒炒焙丸含化更加胡桃肉極妙

葶藶丸治乳食衝脾咳嗽傷風面赤痰盛身熱喘

促化痰寬氣進食

葶藶炒

防已

黑豆炒

杏仁

合神錄卷六

十八

十八

右為末研入杏膏拌勻取熟棗肉搗為丸麻子大

每服五丸淡姜湯下臨夜服量大小加減

瀉白散化痰止嗽寬氣進食

地骨皮

桑白皮

炙甘草

甘草

右劉散每服二錢梗米煎

柴胡散方見潮熱

柴胡石羔湯方見傷寒

惺惺散

百辟內嗽方論

百辟內嗽者此名乳嗽實難調理亦惡証也當

虛實而施治焉實者散之虛者補之其証氣喘
痰盛發散後可利之比金丸并華主之散其實也又
有嘔吐後驚悸困倦自汗當用補肺散天麻散益
黃散補其虛也琥珀散主之如未滿百時咳嗽
不止宜服天麻丸

補肺散又名同交散治小兒久患咳嗽氣急有痰
惡心喘急肺虛

阿膠半兩 用麝子分 馬兜鈴半兩 杏仁七粒 去
糯米一兩 甘草半兩

右劉散每服二錢水一盞煎食後服

天麻散治小兒咳嗽有痰氣難主面紅

南星半兩 天麻二兩 辰砂一分

麝香一字

右為末每服一字用杏仁湯調下人參湯亦可

天麻丸治小兒未滿百時咳嗽不止名乳散

天麻 蟬退 僵蚕 人參各一分

川芎一分 甘草二分 明砂半分 辰砂二分

天竺黃 膽製二 白朮子一分

雄黃一分 金箔五片

右為末陳蜜丸如鷄頭實大金箔為衣每服

一在薄詩湯下此藥治驚風急驚咳嗽有痰
比金丸方身驚癇

琥珀散 方見急驚

喘急哮喘方論

此曰小兒因驚暴觸心肝氣虛發喘者有傷寒肺
氣壅盛發喘者有感冒咳嗽肺虛發喘者有因食
酸酸傷肺氣發虛發喘者有食毒物熱物觸
三焦肝肺氣作喘者喘與氣急同出而異名也別
之輕重耳痰多喘即閉隘於胸臆氣急即取

神效卷六 二十

息短滿心神迷悶盛則加之喘促其因驚發喘或觸
心肝暴急張口虛煩神困者大效惟朱化痰定喘丸
主之佐以天麻定喘飲乃效其傷寒肺氣壅盛發喘
者是表不解之青龍湯麻黃杏子草蒸湯辨其
冷熱而施治焉其感冒咳嗽肺虛發喘則二拗湯加減
治之其食酸酸而喘者痰以生府有熱以涼肺定
喘之劑治也又有哮喘喘者喉間如拽鋸之聲可
服梅花飲子并半夏丸計升微治十六般哮喘
之症服之無不愈又有汗下之後而喘急葛根
黃連黃芩湯加葶藶寬氣進食千金射干湯

服之皆効

大効雄朱化痰定喘丸治因驚發喘逆觸心肺暴急張口虛煩神困

雄黃

硃砂

蟬蛻

全蠍

炒

僵蚕

南星

白附子

輕粉

半斤

右為末麵糊丸麻子大每服二十九薄荷茶清下食後服

麻黃杏仁草羔湯治傷寒發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱下後喘亦治

麻黃

杏仁

石羔

甘草

二兩

右劉散每服二錢

人參散治喘救發熱氣喘面紅

人參

天花粉

右為末每半錢蜜水調下

紫苑湯治喘咳哮喘

紫苑

貝母

真蘇子

杏仁

去皮炙

桔梗

陳皮

麻黃

半夏

茯苓

桑白皮

甘草

各等分

右劉散每服二錢生薑三片紫蘇葉三葉同煎紫蘇飲治咳逆上氣因乳哺無度內挾風冷傷於

肺氣或啼叫未定即與乳喫乳與氣相逆氣不得下

真蘇子

訶子

蘿蔔子

杏仁

去皮炙

木香

人參

青皮

甘草

各四

右劉散每服二錢水一盞薑二片煎量大小加減真珠丸治喘嗽化風痰

南星

半夏

明礬

半兩

炒

右為姜糊丸麻子大辰砂為衣每服三十九姜湯下一方雄黃為衣名青金丸

雄黃丸治小兒諸般喘嗽鹽醋等煎哮喘

雄黃

信石

半夏

白礬

三

巴豆

信石

半夏

白礬

三

右將白礬同信末二件拌勻焙乾再研再炒人前藥末內和勻糊丸粟米大辰砂為衣每服五

七丸臨臥用桑白皮煎湯吞下或清茶亦可

治十六般哮喘方

阿膠

馬兜鈴

甘草

半夏

姜汁

杏仁

人參

甘草

半夏

姜汁

右劉散每服二錢隨病有湯使嚥臥食後服心嗽面赤或汗流乾葛煎湯服肝嗽眼中淚出

入烏梅一箇糯米十四粒煎脾嗽不思飲食或惡
 心入生薑三片煎胃嗽吐逆酸水入蚌粉煎膽嗽
 不睡用藥半兩茶清調下肺嗽上氣喘急入桑
 白皮煎膈嗽出痰如圓塊入生薑自然汁服
 勞嗽入秦艽煎冷嗽至天曉入葱白煎血嗽
 連頻不住入當歸棗子煎暴嗽涕唾稠粘入
 烏梅生薑煎氣嗽肚疼腹滿入青皮煎哮喘嗽
 如拽鋸入半夏二枚同煎腎嗽時復三兩生黃
 藏白飴糖煎今依此法煎無不效矣
 千金射干湯治小兒咳嗽喘急如水鷄聲

金神聖卷六 廿三

射干 麻黃 紫苑 甘草
 生薑 略半 半夏 三升 桂心 二升 大棗 十五
 右剉散每服二錢水一盞半煎入蜜少許服
 梅花飲子治小兒驚熱朝熱積熱五臟蘊熱上焦
 壅手足心熱喉中多痰涎面色或紅或白咳嗽鼻流
 清涕氣急肝肺壅熱目赤咳嗽或被入驚夜啼不
 安或場寒漸安尚有餘熱亦宜服化痰退熱
 朋砂 牙硝 芒硝 人參 二兩
 甘草 略半 辰砂 梅花腦子 麝香 各一
 右入味為末以瓶收之遇有此証服一匙安爾冬

湯調下氣喘咳嗽桑白皮湯調下常服金銀湯下
 半夏丸治肺氣不調咳嗽喘滿痰涎雍塞心下堅
 滿及風痰嘔吐惡心涕唾稠粘
 白礬 一兩 半夏 三兩 七次
 右為末生薑自然汁丸赤豆大每服十丸生薑湯
 吞下

治咳嗽方
 桂黃 一升 寒水石 二升 半夏 三升 鵝管石 一升
 信石 一升 菜豆粉 兩半 一方有明砂枯礬礬南星
 右為末糊丸麻子大臨臥茶清吞下

鮮肌散治小兒傷寒傷風咳嗽面紅赤嘔吐身壯
 熱服人參散後熱退若稍輕脈候不洪數面不赤煩燥
 只服此
 人參 三升 石羔 一升 麻黃 四升 甘草 二升
 杏仁 四升 葶藶 一升 茯苓 一升 釣藤 一升
 桔梗 一升 川芎 三升

右剉散每服一錢棗子煎服如麻痘之証不宜服
 潮熱方論
 天潮熱者時發熱過時即退來日依時發熱此欲發
 驚也發來潮熱瘧氣風熱兩日發三日一發并用梨

將水飲主之王氏云潮熱乃是血氣蘊滯五臟蒸熱
發於外故令發熱傷寒論云潮熱者實熱當利大便大
柴胡承氣湯主之盛熱者地骨皮散犀角飲藥中飲
靈犀散等主之利將水飲子治潮熱藥熱兩日
發三日一發五臟熱寒邪熱在發瘧瘧獨熱
青蒿 取頭用童子小便浸三次乾為度 柴胡 人參
黃芩 前胡 秦艽 甘草
或加生地黃
右劉散每服二錢水一盞煎入生藕梨薄苛
葉煎

神效卷六 廿五

地骨皮散治虛熱亦治傷寒壯熱
知母 柴胡 甘草 人參
地骨皮 茯苓 半夏
右劉散生薑三片煎有驚熱加蟬退天麻黃芩
全嬰方加秦艽名秦艽飲子
犀角飲治小兒骨蒸潮熱盜汗肌瘦
犀角屑 鱉甲 炙 柴胡 知母
地骨皮 胡黃連 各半 大黃 桃枝 各二
右劉散每服二錢水煎
鱉甲飲治潮熱骨蒸盜汗咳嗽多渴心燥多驚面

黃瘦

鱉甲 炙 地骨皮 秦艽 柴胡
枳殼 炒 知母 當歸 各半分

右劉散每服二錢桃柳枝各三寸烏梅一箇同煎
靈犀散治小兒骨蒸潮熱盜汗咳嗽可食多渴面黃瘦

犀角 秦艽 甘草 羌活
柴胡 桔梗 地骨皮 胡黃連 各半

右劉散每服二錢烏梅竹葉煎
生犀散治小兒骨蒸肌瘦煩赤口渴日夜潮熱夜有盜

神效卷六 廿六

汗五心煩熱四肢困倦飲食雖多不生肌肉及大病後
餘熱不鮮或傷寒病瘥後因食羊肉體熱不除

地骨皮 秦艽 人參 羚羊角
大黃 麥門冬 枳殼 柴胡
茯苓 赤芍藥 桑白皮 鱉甲 炙

右劉散每服二錢入青蒿少許煎服亦治疳勞
柴胡散治小兒骨蒸潮熱面黃瘦弱

柴胡 地骨皮 甘草 各半兩

右劉散每服二錢水一小盞煎
青蒿散治小兒肌瘦潮熱

青蒿三分 甘草一分 烏梅一箇 小麥手粉

右剉散水一盞煎至三分去滓分三次服

壯熱溫壯方論

夫壯熱者一向熱而不已甚則要發驚癇也溫壯者但溫而不熱也葉氏云壯熱者是熱氣盛裏發於外故令身休壯熱其熱無漸大體與溫壯相似少有異者熱加甚也此証宜服惺惺散活潑散剉給之甚則柴胡黃芩乾葛之剉散之夫溫壯者由小兒臟腑不調內有伏熱或按宿寒皆搏於胃氣故令不和氣行藥止總積體熱名曰溫壯大便黃而臭者內有伏熱其大便白而酸臭者則按宿寒故也宜溫之服理中四君子輩加桂治之散熱宜五苓散并白虎湯主之如腹中有伏熱溫壯柴苓湯主之其心神不安大瞶秘結三黃犀角散主之溫壯常熱不止牛黃散主之凡解後餘熱不退可服地骨皮散黃龍湯壯熱直指羚羊角湯諸驚壯熱治下後熱不退身熱百骨節疼地子仁湯連翹散六物黃芩湯五物人參飲對証選用古法去伏熱則用龍膽湯去宿滯則用柴霜九當効其法而治之

柴苓湯治小兒腹中有伏熱溫壯來去

柴胡五分 麥門冬心法 人參 茯苓

甘草各二分 黃芩二分

右剉散每服二錢入小麥二十粒竹葉一片煎溫服

犀角散治小兒身休溫壯心神不安大瞶秘熱

犀角屑 大黃 蟬 鈎藤 梔子仁

甘草 黃芩 各等分

右為末量大小加減熱湯調下

牛黃散治小兒溫壯身休常熱不止

牛黃 甘草 柴胡 梔子仁

龍膽草 黃芩 各二分

右為末每服半錢金銀湯下

黃龍湯治傷寒身熱不退

柴胡五分 黃芩 甘草二分 赤芍藥各三分

右剉散每服二錢姜棗煎

連翹散治小兒一切熱

連翹 梔子仁 甘草各一分 防風 去芦

右剉散每服一錢白水煎

羚羊角湯治諸熱驚熱

羚羊角 蟬退 茯苓 麥門冬

柴胡各二分 地骨皮 黃芩 甘草 各二分

右劉散每服二錢姜棗煎

梔子仁湯治傷寒壯熱下後熱不退百節疼痛

梔子仁

赤芍藥

大青

知母各五升

升麻

黃芩

石羔各

柴胡十升

甘草

杏仁一兩上煎

右劉散每服三錢水一斗生薑三片豆豉一百粒煎

大物黃芩湯治天行壯熱小腹大熱有津退食不化

黃芩

大青

甘草

麥冬

石羔

各半桂心三升

右劉散每服三錢白水煎溫服

理中湯

方見吐瀉

五苓散

方見傷寒

四君子湯

方見脾胃

五物人參湯

方見傷寒

白虎湯

方見傷寒

袖珍小兒方卷之六

終

袖珍小兒方十卷

浙江范懋柱家天一閣藏本

明徐用宣撰用宣衢州人藝文志稿作徽州人蓋字形相近而訛其書以脈訣爲首方論鍼灸圖形次之總七十二門六百二十四方蒐采頗備惟論斷多襲舊文無所發明耳是書作於永樂中嘉靖十一年贛撫錢宏重刊以是書原本宋錢乙也